

ЗАВАНТАЖЕНО З САЙТУ ТЕСТУВАННЯ.УКР

Ендокринологія

Категорія: **Геріатрія**

Кількість запитань: **115**

1. "Що таке екзофтальм?"
2. "Який симптом характерний для клімактеричної міокардіодистрофії?"
3. "Норма вмісту глюкози в капілярній крові натщесерце ортотолуїдиновим методом для людей понад 60 років:"
4. "Основний критерій зниження толерантності до глюкози в літніх і старих людей:"
5. "Причини пізнього цукрового діабету:"
6. "Характерні клінічні симптоми пізнього діабету:"
7. "Характерна лабораторна ознака пізнього цукрового діабету:"
8. "Стан ниркового порогу до глюкози в старості:"
9. "Які клітини підшлункової залози виробляють інсулін:"
10. "Чим обумовлена малосимптомність пізнього цукрового діабету:"
11. "Що первинне в патогенезі інсуліннезалежного цукрового діабету:"
12. "Найбільш часте ускладнення пізнього цукрового діабету:"
13. "Найбільш характерні ознаки гіпоглікемічного стану в хворих літнього і старечого віку:"
14. "Причина розвитку гіпоглікемічного стану і гіпоглікемічної коми:"
15. "Причина розвитку кетоацидотичної коми:"
16. "Основний напрямок у лікуванні кетоацидотичної коми:"

17. "Показання до призначення інсуліну:"
18. "Особливість лактацидемічної коми:"
19. "Основна ознака гіперосмолярної коми:"
20. "Який із препаратів сульфанілсечовини, що зменшує вміст цукру, може бути призначений при недостатності видільної функції нирок:"
21. "Який з гіпоглікемічних препаратів найбільш часто поєднують з манінілом"
22. "Основне протипоказання до призначення бігуанідів:"
23. "Який критерій є основним у діагностиці явного цукрового діабету:"
24. "Який препарат, що знижує цукор, варто призначити хворому з вперше виявленим цукровим діабетом II типу середнього ступеня важкості з нормальною вагою, без кетоацидозу:"
25. "Основний напрямок крім інсулінотерапії в регідратації хворого з гіперосмолярною комою:"
26. "Адекватна доза глюкози при проведенні цукрового навантаження:"
27. "Який із названих препаратів може потенціювати дію засобів, що знижують цукор:"
28. "Який із названих препаратів погіршує стан вуглеводного обміну"
29. "Назвіть критерії компенсованого цукрового діабету в літніх і старих людей:"
30. "Критерії субкомпенсованого цукрового діабету:"
31. "Критерії декомпенсованого цукрового діабету в літніх і старих хворих:"

32. "Основна відмінна ознака гіперосмолярної коми від кетоацидотичної:"
33. "Назвіть важливий чинник регуляції секреції інсуліну:"
34. "Що таке синдром Сомоджи?"
35. "Скільки стадій виділяють у розвитку діабетичної нефроангіопатії?"
36. "У яких хворих частіше зустрічається гіперосмолярна кома?"
37. "При діабеті II типу легкої форми не показані:"
38. "Який із препаратів сульфанілсечовини недоцільно призначати хворим старшого віку:"
39. "Ендокринне захворювання, при якому зустрічається гіпоглікемія:"
40. "Яка особливість обміну вуглеводів характерна для літніх і старих людей:"
41. "Патогенетичний чинник розвитку кетоацидозу:"
42. "Назвіть ускладнення лікування діабетичної коми введенням великих доз інсуліну:"
43. "З якими станами диференціюють лактатацидоз?"
44. "Зміна якого ферменту характерна для дифузного токсичного зобу?"
45. "Найнебезпечніше ускладнення тиреотоксичного кризу:"
46. "Який основний механізм дії мерказолілу?"
47. "Показник ефективності антитиреоїдної терапії:"

48. "У якому випадку при патологічному клімаксі протипоказані жіночі статеві гормони?"
49. "Ранньою ознакою розвитку лактатацидозу є:"
50. "Зазначте найбільш характерні клінічні симптоми пізнього гіпотиреозу:"
51. "Нормальний базальний рівень загального тироксину в крові у літніх і старих людей:"
52. "Вікові зміни біохімізму жирової тканини, що спричинюють ожиріння:"
53. "Діагностичний критерій гіпотиреозу за рівнем загального тироксину в крові:"
54. "Найбільш рання ознака первинного гіпотиреозу:"
55. "Зазначте початкову, стартову дозу тиреоїдину при лікуванні гіпотиреозу в літніх і старих людей:"
56. "При необхідності збільшення початкової дози тиреоїдину проводиться через:"
57. "Чим визначається необхідність дотримання принципу малих доз тиреоїдних гормонів і дуже повільного добору доз препарату при лікуванні гіпотиреозу в старих хворих:"
58. "Початкову стартову дозу тиреоїдину при лікуванні гіпотиреозу в старих людей збільшують не більш, ніж на:"
59. "Основний напрямок у лікуванні гіпотиреоїдної коми у хворого з первинним гіпотиреозом:"

60. "Абсолютний критерій повної компенсації при проведенні замісної терапії первинного гіпотиреозу:"
61. "Найбільш частою формою гіпотиреозу в старості є:"
62. "Який метод дослідження функції щитовидної залози недоцільно проводити в старих людей за винятком гіпотиреозу:"
63. "Зазначте показник, що є найбільш характерний для гіпотиреозу:"
64. "Який показник, характерний для гіпотиреозу, може трактуватися як наслідок гострого інфаркту міокарда:"
65. "У процесі старіння атрофічні зміни відбуваються в наступних ендокринних залозах і утвореннях, крім:"
66. "Яка форма гіпотиреозу зустрічається найбільш часто у людей літнього і старечого віку:"
67. "Яке порушення серцевого ритму характерне для гіпотиреозу в літніх людей:"
68. "Симптом, найбільш інформативний для гіпотиреозу у літніх і старих хворих:"
69. "Найчастіша причина гіпертиреозу у літніх і старих людей:"
70. "Максимальна частота гіпертиреозу спостерігається у віці:"
71. "Максимум частоти вузлового токсичного зобу припадає на вік:"
72. "Пусковий чинник "базедофікації" вузлового зобу у людей похилого віку:"
73. "Для гіпертиреозу в пізньому віці є характерними:"

74. "Назвіть найбільш постійний симптом гіпертиреозу у літніх хворих:"
75. "Назвіть ознаку синусової тахікардії не характерну для гіпертиреозу:"
76. "При гіпертиреозі в літніх людей зростає частота наступних порушень ритму:"
77. "Які зміни на ЕКГ при пароксизмальній мерехтливій аритмії, викликаній гіпертиреозом, трактуються у літніх людей як прояв ІХС:"
78. "ЕКГ-ознака гіпертиреозу в хворих літнього і старечого віку:"
79. "Застійна недостатність кровообігу в літніх і старих хворих гіпертиреозом частіше розвивається на тлі:"
80. "Характерна риса застійної серцевої недостатності при гіпертиреозі у літніх і старих хворих:"
81. "Вікова особливість артеріальної гіпертензії при тиреотоксикозі:"
82. "Яке ускладнення терапії глібенкламідом найбільш часто зустрічається у людей похилого віку?"
83. "Назвіть характерні клінічні ознаки "сенильного гіпертиреозу":"
84. "Яке порушення ритму частіше буває при клімактеричній міокардіодистрофії?"
85. "Для тиреотоксичного кризу характерним є:"
86. "У діагностиці гіпертиреозу у літніх найбільш інформативними є:"
87. "Характерна риса ліпідного обміну при гіпертиреозі в літніх:"

88. "Яка з ознак у літнього хворого з кардіальною симптоматикою є підставою для виключення гіпертиреозу?"
89. "Який із методів лікування вузлового токсичного зобу у літніх є резервним?"
90. "Синдром скасування бетаадреноблокаторів при гіпертиреозі включає:"
91. "Оптимальна добова доза анаприліну для літніх і старих людей із гіпертиреозом:"
92. "Препарат першого вибору для лікування гіпертиреозу з супутньою серцевою недостатністю:"
93. "Ожиріння чинник ризику нижчеперелічених захворювань:"
94. "Аліментарне ожиріння найчастіше розвивається у віці:"
95. "Частота первинного ожиріння:"
96. "Основний патогенетичний чинник первинного ожиріння:"
97. "Критерій, що визначає II ступінь ожиріння:"
98. "Який із симптомів при тиреотоксикозі III ступеня часто відсутній у літніх і старих людей:"
99. "При тиреотоксикозі I ступеня у літніх і старих людей частота пульсу становить:"
100. "Для Т3 тиреотоксикозу основним діагностичним критерієм є:"
101. "Що уражається при діабетичній ретинопатії?"
102. "Ураження якого органу є найбільш характерним для цукрового діабету?"

103. "Малими симптомами цукрового діабету вважаються:"
104. "У якому віці частіше зустрічається цукровий діабет типу II?"
105. "Скільки стадій виділяють в розвитку діабетичної ретинопатії:"
106. "Глімепірид - це:"
107. "Мікронізація лікарської речовини це:"
108. "Найбільш грізним ускладненням терапії метформіном вважають:"
109. "При лікуванні хворих на ЦД II типу акарбозою необхідно регулярно контролювати рівень:"
110. "Абсолютними показами для терапії інсуліном вважають:"
111. "Діабетон MB це:"
112. "До гострих ускладнень цукрового діабету належить:"
113. "До симптомів кетоацидозу відноситься:"
114. "Регітрацію при гіперосмолярній комі проводять:"
115. "Лабораторними та клінічними ознаками гіперосмолярної коми є:"