

ЗАВАНТАЖЕНО З САЙТУ ТЕСТУВАННЯ.УКР

Гігієна та ООЗ - база тестів 2012 року

Категорія: **Бази тестів українською мовою 2012 року**

Кількість запитань: **296**

1. В Японии при употреблении в пищу рыбы и ракообразных возникает болезнь Минамата. С какими химическими соединениями связана эта болезнь?

*** А) Соединения кадмия**

- В) Соединения ртути
- С) Соединения селена
- Д) Соединения свинца
- Е) Соединения меди

2. Участковым врачом поликлиники установлен у прибывшего на прием пациента диагноз дизентерии. Какой учетный документ отражает данный вид заболеваемости?

*** А) Экстренное извещение**

- В) Статистический талон
- С) Извещение о важнейшем неэпидемическом заболевании
- Д) Листок нетрудоспособности
- Е) Контрольная карта диспансерного больного

3. У 13-летнего мальчика получены следующие данные: длина тела - 147 см (+2), масса тела - 38 кг (+1,5), окружность грудной клетки - 72 см (+0,2). Оцените гармоничность физического развития ребенка:

*** А) Дисгармоничное**

- В) Гармоничное
- С) Выше среднего
- Д) Резко дисгармоничное
- Е) Чрезмерное

4. Лікар-терапевту доручено провести аналіз стану здоров'я дорослого населення на дільниці обслуговування. Які групи показників ним будуть залучені до цього аналізу?

*** А) Демографічні, захворюваності, інвалідності**

В) Демографічні, захворюваності, фізичного розвитку

С) Захворюваності, інвалідності, смертності

Д) Народжуваності, захворюваності, інвалідності

Е) Захворюваності, смертності, фізичного розвитку

5. Праця оператора машинного набору вимагає запам'ятовування на короткий проміжок часу великої кількості послідовних окремих елементів роботи. Який вид пам'яті характеризує працю оператора?

*** А) оперативна**

В) довгострокова

С) короткострокова

Д) логічна

Е) рухова

6. У мальчика 11 лет, длина тела 148 см (М+1,5()), масса тела- 42 (+ 1,9) кг, окружность грудной клетки 70 см (+1). Болеет ОРВИ 4-5 раз в год. Хронической патологии не выявлено. К какой группе здоровья можно отнести ребенка ?

*** А) 2**

В) 4

С) 3

Д) 5

Е) 1

7. Одним із чинників, що впливають на організацію лікувально-профілактичної допомоги сільському населенню є низька щільність розселення його по території. Яку особливість її організації він обумовлює?

*** А) Етапність.**

- В) Відсутність дільничності.
- С) Наявність вузькоспеціалізованої допомоги на сільській лікарській дільниці.
- Д) Відсутність долікарської допомоги.
- Е) Централізація терапевтичної допомоги на сільській лікарській дільниці.

8. У хворого, який вживав три доби тому консервовані гриби - опеньки відмічається розлад зору (диплопія, мідріаз), розлад мовлення, порушення ковтання. Яке харчове отруєння має місце?

*** А) Ботулізм.**

- В) Харчова токсикоінфекція.
- С) Фузаріотоксикоз.
- Д) Отруєння опеньками.
- Е) Отруєння солями свинцю.

9. Хлопчик 11 років за останній рік п'ять разів хворів на гострі респіраторні захворювання. До якої групи здоров'я повинен його віднести сімейний лікар ?

*** А) До другої групи.**

- В) До першої групи.
- С) До третьої групи.
- Д) До четвертої групи.
- Е) До п'ятої групи.

10. Робота оптичного квантового генератора супроводжується виникненням деяких несприятливих факторів виробничого середовища, що можуть негативно впливати на організм робітників, які його обслуговують. Назвіть ці фактори.

*** А) Лазерне випромінювання, шум, УФ-випромінювання, електромагнітні поля радіочастот, м'яке рентгенівське випромінювання, озон і оксиди азоту.**

В) Лазерне випромінювання, УФ-випромінювання.

С) Електромагнітні поля радіочастот, шум.

Д) М'яке рентгенівське випромінювання.

Е) Озон і оксиди азоту

11. Після вибору джерела води була проведена оцінка її якості . На які показники , в першу чергу, орієнтувалась медична служба при виборі джерела водопостачання для пиття особового складу військового підрозділу ?

*** А) Безпечність в епідеміологічному підрозділі**

В) Нешкідливість у токсикологічному відношенні

С) Добрі органолептичні характеристики

Д) Оптимальний сольовий склад

Е) Оптимальний мікроелементний склад

12. Хворий на виразку дванадцятипалої кишки перебуває безперервно на лікарняному листі на протязі 4 місяців. Хто має право встановити групу інвалідності?

*** А) МСЕК**

В) Дільничний терапевт

С) Завідувач терапевтичного відділення

Д) Головний лікар

Е) ЛКК

13. У мешканців населеного пункту, що розташований у 3 кліматичному поясі масове ураження на флюороз зубів. При якій концентрації F-іону в питній воді може спостерігатися ураження на флюороз?

*** А) 1,5 мг/л**

В) 0,7 мг/л

С) 1,0 мг/л

Д) 0,3 мг/л

Е) 0,1 мг/л

14. Для профілактики забруднення довкілля використовується механічна сепарація не токсичних твердих побутових відходів. Назвіть метод, за допомогою якого можна здійснити механічну утилізацію цих відходів.

*** А) Пресування відходів у будівельні блоки.**

В) Гідроліз.

С) Спалювання як енергетичного палива.

Д) Полігонне захоронення відходів.

Е) Знешкодження в біотермічних камерах.

15. На хімічному заводі внаслідок аварійної ситуації стався випадок гострого професійного отруєння. Куди повинен надіслати експертне повідомлення “про гостре професійне захворювання (отруєння)” лікар, що виявив дане захворювання?

*** А) в санітарно епідеміологічну станцію**

В) в адміністрацію підприємства

С) в профспілковий комітет підприємства

Д) в медико-санітарну частину підприємства

Е) в міністерство охорони здоров'я України

16. У поточному році лікарями загальної практики міської поліклініки було направлено в стаціонар 11 хворих з ішемічною хворобою серця. У 3 випадках діагноз не підтвердився. Яке управлінське рішення найдоцільніше прийняти в цьому випадку ?

*** А) аналіз кожного випадку розходження діагнозу**

- В) аналіз якості диспансерного спостереження
- С) аналіз якості діагностичних досліджень
- Д) аналіз рівня кваліфікації лікарів поліклініки
- Е) аналіз матеріально-технічної бази поліклініки

17. При гигиенической экспертизе партии зерна, в исследуемом образце обнаружено 2% зерен, пораженных микроскопическими грибами рода Fusarium. На основании данных лабораторных исследований партия зерна:

*** А) Допускается к реализации без ограничений**

- В) Подвергается проверке на токсичность
- С) Используется для производства фуража
- Д) Используется для производства спирта
- Е) Подлежит уничтожению

18. При аналізі захворюваності з тимчасовою непрацездатністю робітників машинобудівного заводу було використане поглиблене вивчення захворюваності. Назвати обліковий документ, що використовується при цьому.

*** А) Карта обліку тимчасової непрацездатності**

- В) Особова карта робітника
- С) Лікарняний листок
- Д) Звіт про причини тимчасової непрацездатності
- Е) -

19. Під наглядом жіночої консультації протягом року знаходилося 620 вагітних жінок, 310 з них стали на облік у термін до 12 тижнів вагітності. Вкажіть назву показника за допомогою якого найкраще оцінити діяльність жіночої консультації в даній ситуації?

*** А) Своєчасність постановки на облік вагітних у жіночій консультації**

В) Повнота охоплення вагітних диспансерним спостереженням

С) Регулярність спостереження за вагітними жінками

Д) Рівень якості диспансеризації вагітних жінок

Е) -

20. До лікаря-терапевта районної поліклініки звернувся хворий, що працює у цеху меблевої фабрики, де покривають меблі фарбами і лаком. Скарги хворого і об'єктивні дані свідчили про гостре професійне отруєння. Лікар тимчасово звільнив постраждалого від роботи, призначив лікування і надіслав „Екстрене повідомлення” у таку установу:

*** А) Районну санітарно-епідеміологічну станцію**

В) Підприємство, де працює постраждалий

С) Медико-санітарну частину підприємства

Д) Головному лікарю ТМО

Е) Спеціалізовану клініку, що підтверджує захворювання

21. Робітник, що працює з лазером (довжина хвилі= 0,63-1,5 мкм), піддається несприятливій дії на шкіру дифузно відбитого випромінювання і знаходиться на відстані 10 см від дифузно відбитої поверхні. До якого класу за ступенем небезпеки відноситься даний лазерний генератор?

*** А) IV**

В) III

С) II

Д) I

Е) --

22. Робітники обслуговують лазер, який становить небезпеку при опроміненні очей прямим, дзеркально відбитим, а також дифузно відбитим випромінюванням на відстані 10 см від дифузно відбитої поверхні та при опроміненні шкіри прямим і дзеркально відбитим випромінюванням. Вкажіть, до якого класу за ступенем небезпеки відноситься цей лазер.

*** А) До 3-го класу**

В) До 1-го класу

С) До 4-го класу

Д) До 2-го класу

Е) При дії на очі до 3-го, а при дії на шкіру до 2-го класу

23. Комплексна оцінка здоров'я дітей, які проживають в Закарпатському регіоні України, показала, що 20% обстежених спостерігалось збільшення долей щитовидної залози (залозу видно під час ковтання), 15% дітей мали низький рівень фізичного розвитку. Вміст йоду у воді, якою користуються жителі, складає 0,2 мкг/л. До якої групи здоров'я відносяться діти з такою патологією? Які заходи необхідно передбачити щодо поліпшення цієї ситуації?

*** А) Друга група здоров'я. Використовувати йодовану сіль**

В) III група здоров'я . Використовувати йодовану сіль.

С) IV група здоров'я. Відселення дітей з району проживання

Д) III група здоров'я. Призначення препаратів, які підвищують функцію щитовидної залози

Е) II група здоров'я -функціональний стан залози у дитячому віці.

24. Учні 10-х класів загальноосвітньої школи під час занять з основ інформатики та обчислювальної техніки працюють на протязі 40 хв. за одним персональним комп'ютером. В кінці заняття скаржаться на біль в очах, зниження функцій зору. За період навчання у школі у 17% учнів діагностовано міопію слабкого та середнього ступеню, астигматизм. Визначте групу здоров'я для учнів, передбачте заходи з профілактики порушень органів зору.

*** А) Група здоров'я II. Безперервна робота за комп'ютером повинна бути не більше 25 хв. Кожний учень повинен бути забезпечений окремим робочим місцем.**

В) Група здоров'я II. Обмежити тривалість роботи за комп'ютером до 20 хв.

С) Група здоров'я III. Кожен учень повинен мати окреме робоче місце.

Д) Група здоров'я III. Заборонити роботу на персональних комп'ютерах.

Е) Група здоров'я III обмежити тривалість роботи за комп'ютером до 10 хв.

25. У населеному пункті планується будівництво лікарні. При обґрунтуванні площі земельної ділянки, яка відводиться під будівництво, лікарю в першу чергу необхідно звернути увагу на:

*** А) ліжковий фонд лікарні**

В) територіальні розміри населеного пункту

С) систему лікарняного будівництва

Д) категорійність населеного пункту

Е) рівень захворюваності населення

26. У населеному пункті N планується будівництво інфекційної лікарні на 100 ліжок. Стічні води перед скидом у міську каналізацію проходять попереднє очищення та знезаражування. Яка з приведених споруд можна використати для попереднього очищення?

*** А) Септик полями підземної фільтрації**

В) Піщано-гравійний фільтр

С) Фільтруючий колодязь

Д) Фільтруючу траншею

Е) Біофільтри малої потужності

27. При експертизі проекту лікарні було встановлено: операційний блок, до складу якого входить 4 операційних, знаходиться на другому поверсі, розміри операційних 56 м², вікна операційних орієнтовані на північ, на відстані 10 м знаходиться головний корпус висотою 20 м. Що з приведених даних не відповідає гігієнічним вимогам?

*** А) недостатня площа операційної**

- В) невірна орієнтація вікон
- С) недостатня кількість операційних
- Д) недостатня відстань до головного корпусу
- Е) невірно вибраний поверх для операційної

28. В місті Н. заплановано будівництво промислового підприємства (1 А класу небезпеки) у викидах якого будуть міститися діоксид сірки і діоксид азоту. На якій відстані від джерела викиду даного підприємства концентрації зазначених інгредієнтів в атмосферному повітрі повинні відповідати ГДК ?

*** А) 3000 м**

- В) 1000 м
- С) 500 м
- Д) 100 м
- Е) 50 м

29. На хімічному виробництві робітниця зайнята дозуванням, зважуванням та завантаженням в камеру реакції вихідних продуктів синтезу полімерних матеріалів. Лікарем акушером-гінекологом у робітниці встановлено вагітність. Які профілактичні заходи необхідно застосувати для запобігання негативного впливу хімічних чинників на організм робітниці та майбутньої дитини?

*** А) перевід на роботу не пов'язану з дією шкідливих чинників**

- В) зменшення тривалості робочого дня
- С) зменшення часу дії хімічних чинників
- Д) збільшення кількості регламентованих перерв
- Е) надання додаткових вихідних днів

30. Оператор комп'ютерного набору зайнята вводом тексту, редагуванням та друком документів на персональному комп'ютері. Тривалість її робочого дня становить 8 годин. Лікарем акушером-гінекологом у робітниці встановлено вагітність. Які профілактичні заходи необхідно застосувати для запобігання негативного впливу виробничих чинників на організм робітниці та майбутньої дитини?

*** А) перевід на роботу не пов'язану з роботою на персональному комп'ютері**

- В) зменшення тривалості робочого дня
- С) зменшення часу роботи на комп'ютері
- Д) збільшення кількості регламентованих перерв
- Е) надання додаткових вихідних днів

31. При обробці деревини на меблевій фабриці на робочих місцях робітників протягом робочої зміни встановлена наявність виробничого шуму, рівні якого при виконанні різних операцій становили 81, 84 і 85 дБА. При вимірюванні рівнів звукового тиску за окремими октавними смугами встановлено перевищення допустимих рівнів в октавній смузі 2000Гц на 2 дБ, в октавній смузі 4000 Гц - на 6 дБ і октавній смузі 8000 Гц - на 3 дБ. Вкажіть характер даного шуму за часовою, спектральною і частотною характеристиками.

*** А) Шум постійний, широкосмуговий, високочастотний.**

- В) Шум непостійний, тональний, середньочастотний.
- С) Шум непостійний, широкосмуговий, високочастотний.
- Д) Шум постійний, тональний, низькочастотний.
- Е) Шум непостійний, широкосмуговий, низькочастотний.

32. Для збирання врожаю картоплі у сільськогосподарському підприємстві "Мрія", яке знаходиться в зоні гарантованого добровільного відселення планується залучити школярів 10-11 класів. Яке рішення повинна прийняти дирекція школи з даного питання?

*** А) Заборонити роботу школярів**

- В) Заборонити роботу школярів тривалістю більше 2 годин
- С) Заборонити роботу школярів тривалістю більше 6 годин
- Д) Заборонити залучення до роботи дівчат
- Е) Заборонити залучення до роботи школярів 10 класу.

33. Сім'я пенсіонерів, яка була евакуйована після аварії на ЧАЕС до Харківської області, вирішила повернутися для постійного проживання до села К., яке знаходиться в зоні безумовного (обов'язкового) відселення. Які рекомендації є найбільш правильними в даному випадку?

*** А) Постійне проживання категорично заборонено**

- В) Заборонено проживання більше 1 року
- С) Заборонено проживання більше 3 років
- Д) Заборонено проживання більше 5 років
- Е) Заборонено проживання без прийняття додаткових профілактичних заходів

34. Основний спектральний склад штучного джерела ультрафіолетового випромінювання складає 280... 10 нм. Якої специфічної біологічної дії слід очікувати?

*** А) Сильна бактерицидна**

- В) Слабка загальностимулююча
- С) Пігментоутворення
- Д) Синтез холекальциферолу
- Е) Загальностимулююча

35. Якій з молочних продуктів патогенетично обґрунтовано включати в дієту хворих з гіперацидним гастритом, виразковою хворобою шлунку та 12 - палої кишки?

*** А) Вершки**

- В) Дієтична сметана
- С) Слабкий (одноденний) кефір
- Д) Симбівіт
- Е) Кумис

36. Якій сік порекомендуєте включити в комплексну медикаментозно- дієтичну терапію хворим з виразковою хворобою шлунку або 12 - палої кишки з низькою або нульовою кислотністю шлункового соку з метою прискорення загоєння виразкового дефекту?

*** А) Капустяний, капустяно - моркв'яний**

- В) Яблучний, березово - яблучний
- С) Гарбузовий
- Д) Картопляний, картопляно - моркв'яний
- Е) Селери, петрушки

37. Громадянин К. , перебуваючи у відрядженні в іншому місті, захворів і звернувся по медичну допомогу до найближчої поліклініки. Чий дозвіл необхідний для видачі листка непрацездатності цьому громадянину ?

*** А) Головного лікаря**

- В) Лікуючого лікаря
- С) Завідувача відділенням
- Д) Заступника головного лікаря з ЛТЕ
- Е) Лікарської консультативної комісії

38. Громадянину, вчителю загальноосвітньої школи, після обстеження виставлено діагноз: Туберкульоз легень. На який максимальний термін з дня настання непрацездатності йому може бути видано листок непрацездатності ?

*** А) На 10 місяців**

- В) 5 місяців
- С) 4 місяці
- Д) 2 місяці
- Е) 1 місяць

39. З метою оцінки раціональності використання ліжкового фонду проводиться реєстрація госпіталізованої захворюваності. Який статистичний документ є основним джерелом інформації в цьому випадку?

*** А) Статистична карта хворого, що вибув із стаціонару**

- В) Статистичний талон для реєстрації заключних (уточнених) діагнозів.
- С) Медична карта стаціонарного хворого
- Д) Виписка із медичної карти стаціонарного хворого
- Е) Звіт лікувально-профілактичного закладу за рік

40. У дитини після обстеження було встановлено діагноз: епідемічний паротит. Який документ слід заповнити для обліку даного захворювання?

*** А) Екстрене повідомлення про інфекційне захворювання.**

- В) Статистичний талон для реєстрації заключних (уточнених) діагнозів.
- С) Історія розвитку дитини.
- Д) Талон амбулаторного пацієнта.
- Е) Медична карта стаціонарного хворого.

41. Жінку виписали зі стаціонару з живою дитиною, яка народилася на 29 тижні вагітності. На який максимальний термін жінці буде видано листок непрацездатності в зв'язку з вагітністю та пологами?

*** А) На 140 днів.**

В) На 126 днів.

С) На 90 днів.

Д) На 70 днів.

Е) На 56 днів.

42. Районному кардіологу доручено розробити план проведення комплексу лікувально-профілактичних заходів по зниженню смертності від серцево-судинних захворювань. Які заходи мають бути заплановані щодо вторинної профілактики цих захворювань?

*** А) Попередження рецидивів і ускладнень захворювань.**

В) Направлення хворих на санаторно-курортне лікування

С) Попередження виникнення захворювань.

Д) Направлення хворих на стаціонарне лікування.

Е) Оптимізація способу і умов життя.

43. В результаті аварії на одному з промислових підприємств відбувся витік озону та радіоактивних речовин в одному з цехів. Група працівників цього цеху підпала під одночасний вплив обох чинників. Яким буде вплив цих чинників на організм?

*** А) Поєднаний радіоміметичний вплив.**

В) Поєднаний.

С) Ізольований.

Д) Комбінований.

Е) Комплексний.

44. Серед мешканців присадибних ділянок с. Іванівка, які прилягають до поля агрофірми “Дружба”, через 1 тиждень після зрошування його пестицидами (гексахлораном) з’явилися симптоми отруєння пестицидами. В результаті лабораторних досліджень вміст гексахлорану в ґрунті сусідніх з полем приватних садиб перевищував ГДК в 2 рази, в повітрі - в 10 разів, у воді криниць (водопостачання населеного пункту є децентралізованим)- в 2 рази. Назвіть вид впливу пестицидів на організм людей, що має місце.

*** А) Комплексний**

В) Ізольований

С) Поєднаний

Д) Комбінований

45. Вказати, до якої групи здоров(я треба віднести дитину, у якої під час поглибленого медичного огляду було виявлено хронічний гастрит у стані компенсації.

*** А) 3**

В) 2

С) 1

Д) 4

Е) 5

46. Выборщицы породы углеобогатительной фабрики в течение 12-ти часовой рабочей смены выполняют работу стоя. Масса поднимаемого и перемещаемого груза составляет 1-10 кг. Работницы жалуются на отеки, боли в нижних конечностях, чаще появляющиеся во второй половине смены. С каким заболеванием можно связать характер труда и жалобы работниц

*** А) Варикозное расширение вен.**

В) Подагра.

С) Бурсит.

Д) Артрит.

Е) Миозит.

47. У зв'язку з підвищенням рівня гострої захворюваності в дитячому дошкільному закладі проведено: вивчення фактичного харчування та аналіз результатів лабораторного обстеження дітей. Встановлено, що в примірний варіант сезонного меню харчового раціону входять страви, виготовлені з м'яса, круп, макаронів, яєць молока та кондитерські вироби. Дані лабораторного обстеження дітей: кількість еритроцитів крові - $3,6 \times 10^{12}/\text{л}$; Hb - 124,0 - 138,0 г/л; кольоровий показник 0,85-0,90; часова екскреція аскорбінової кислоти з сечею 0,25 мг/год. Які з отриманих матеріалів можуть бути використані як керівні для розробки комплексу оздоровчих заходів?

*** А) Харчовий раціон; мг/часова екскреція аскорбінової кислоти з сечею.**

В) Гемоглобін крові, харчовий раціон.

С) Харчовий раціон.

Д) Кольоровий показник крові.

Е) Мг/часова екскреція аскорбінової кислоти з сечею, Hb крові.

48. Жінка у віці 42 років, з ростом 168 см. та масою тіла 74 кг., приймає їжу 4 рази на день, працює на виробництві по виготовленню свинцевих білил. Який лікувально-профілактичний раціон повинна отримувати робітниця для профілактики профпатології.

*** А) Лікувально-профілактичний раціон №3.**

В) Лікувально-профілактичний раціон №2.

С) Лікувально-профілактичний раціон №1.

Д) Лікувально-дієтичний раціон №1.

Е) Лікувально-дієтичний раціон №9

49. За дорученням лікаря медична сестра зробила вимірювання, необхідні для оцінки мікрокліматичних умов в лікарняній палаті для інвалідів Вітчизняної війни. Результати вимірювань: середня температура повітря - 19 0C , швидкість руху повітря - 0,1 м/сек, відносна вологість повітря - 50%, що відповідає комфортному мікроклімату. За рахунок яких заходів можна досягти таких умов в палаті для літніх хворих?

*** А) Відповідного опалення приміщення, провітрювання та кондиціонування повітря.**

В) Підбору відповідного одягу та взуття.

С) Загартування.

Д) Раціонального режиму харчування.

Е) Достатньої інсоляції.

50. Лабораторією СЕС визначений вміст афлотоксинів у м'ясі корів, яким згодовували запліснявілий корм. Рівень афлотоксину перевищує гранично-допустимий у 5 разів. Назвіть можливі зрушення в здоров'ї внаслідок афлатоксикозу у населення, що тривалий час вживає таке м'ясо.

*** А) Рак печінки.**

В) Атеросклероз.

С) Гломерулонефрит.

Д) Анемія.

Е) Вегето-судинна дистонія.

51. Робітник, зайнятий на обробці відливок у ливарному виробництві, тримає шліфувальний інструмент вагою 10 кг, 260 хвилин за зміну. Робота здійснюється тривалим скороченням м'язів, при цьому в руховий центр безперервно надходить потік імпульсів, що досить швидко викликає виснаження функціонального потенціалу і розвинення втоми. Яку роботу виконує робітник?

*** А) Статичну роботу.**

В) Позитивну динамічну роботу.

С) Негативну динамічну роботу.

Д) Напружену роботу.

Е) Важку роботу.

52. Хлопчик 12 років має деякі функціональні та морфологічні відхилення (міопія 0,5Д) та знижений опір організму. Хронічні захворювання відсутні. За останній рік 5 раз хворів на респіраторні захворювання. До якої групи здоров'я можна віднести цього хлопчика?

*** А) Друга група здоров'я.**

В) Перша група здоров'я.

С) Третя група здоров'я.

Д) Четверта група здоров'я.

Е) П'ята група здоров'я .

53. Дівчинка 14 років. Хронічне захворювання бронхіальна астма у стадії субкомпенсації. За останній рік 3 рази хворіла на пневмонію. Яка група здоров'я у цієї дівчинки?

*** А) Четверта група здоров'я.**

В) Перша група здоров'я.

С) Друга група здоров'я.

Д) Третя група здоров'я.

Е) П'ята група здоров'я.

54. На початку травня жінка збирала гриби. Приготувала обід, однією із страв якого були смажені гриби. Через декілька годин потому вона і чоловік відчували біль і різь у ділянці шлунку, що супроводжувались нудотою, блюванням. На другий день з'явилась жовтяниця. Після інтенсивного лікування їх у лікарні видужування почалося з 6 дня. Визначити гриб, від якого виникло отруєння.

*** А) Сморжі.**

- В) Бліда поганка.
- С) Несправжня сіра опенька.
- Д) Зморжки.
- Е) Печериця.

55. В інфекційну лікарню поступив підліток з клінічною картиною гострого отруєння афлотоксинами: порушення функції травної системи, координації рухів, геморагії, набряки. Із анамнезу відомо, що він часто вживав арахіс. Який вид профілактики і боротьби з мікотоксинами є найбільш ефективним?

*** А) Виключення умов, які створюють підвищену вологість рослинної сировини і продуктів.**

- В) Ретельне лущення арахісу перед вживанням.
- С) Смаження арахісу перед вживанням.
- Д) Заборона дітям і підліткам вживання арахісу без теплової обробки.
- Е) При зберіганні арахісу добавляти кухонну сіль.

56. Хворому на атеросклероз лікар порекомендував вживати молоко коров'яче незбиране, вершки, йогурти з високим вмістом жиру. Які негативні властивості молочного жиру не враховані лікарем?

*** А) Недостатній вміст ПНЖК для впливу на надлишок холестерину.**

- В) Присутність насичених жирних кислот.
- С) Присутність ненасичених жирних кислот.
- Д) Присутність фосфопротеїдів, стеринів.
- Е) Присутність жиророзчинних вітамінів.

57. Після вживання яєчні, приготовленої вдома з яєць качки, у хворих через 8 годин виникли наступні симптоми захворювання: температура 39 0С, головний біль, блювання, біль у животі, потім приєднався понос. Випорожнення часті із слизом, смердючі. Тривалість захворювання 3 доби. Яка хвороба мікробної природи має місце?

*** А) Сальмонельоз.**

В) Харчовий ботулізм.

С) Бруцельоз.

Д) Туляремія.

Е) Сибірка.

58. Шліфувальник механічного цеху працює ручною шліфувальною машиною. Рівень переривчастої локальної вібрації, яка діє на робітника при цьому, перевищує допустиме за санітарними нормами значення на 3 дБ. Який із названих заходів повинен виконати роботодавець у першу чергу для профілактики вібраційної хвороби?

*** А) Розробити режим праці та відпочинку.**

В) Забезпечити віброзахисними рукавицями.

С) Забезпечити оптимальні параметри мікроклімату.

Д) Зменшити вагу машини.

Е) Організувати теплові процедури для рук.

59. У пологовому будинку за рік народилося живими 616 дітей, 1 дитина народилася мертвою, 1 дитина померла на 5-й день життя. За допомогою якого показника можна найточніше оцінити дану ситуацію?

*** А) Перинатальна смертність**

В) Загальна смертність

С) Народжуваність

Д) Смертність немовлят

Е) Природній приріст

60. На розгляд до міської СЕС надійшов проект реконструкції заводу лако-фарбних виробів. Технологічні стічні води, що матимуть утворюватися, містять в своєму складі 25 хімічних сполук - елементів лаків і фарби. Передбачається після очищення стічних вод скидати їх в річку нижче за течією території міста. Що перш за все треба враховувати лікарю СЕС при визначенні переліку пріоритетних речовин для контролю якості води річки у зв'язку з майбутнім функціонуванням заводу лако-фарбних виробів:

*** А) Клас небезпеки хімічних речовин, що містяться у стоках.**

В) Концентрації хімічних речовин у стоках.

С) Можливість виникнення ефекту сумації токсичної дії між окремими речовинами.

Д) Аналітичні можливості санітарно-гігієнічної лабораторії СЕС.

Е) Лімітуючі показники шкідливої дії окремих речовин.

61. В місті Д функціонує система централізованого господарчо-питного водопостачання. Його джерелом є поверхнева водойма - річка К, яка за показниками якості води відноситься до II класу вододжерел. При здійсненні поточного лабораторного контролю за якістю води в точці "перед надходженням води у зовнішню розподільчу мережу" місцевою СЕС було зафіксовано два поспіль відхилення якості води за показниками епідемічної безпеки. Що найвірогідніше є причиною погіршення якості води за епідемічними показниками:

*** А) Незадовільна робота очисних (головних) споруд водопроводу.**

В) Погіршення санітарного стану водойми - річки К.

С) Порушення правил відбору проб.

Д) Незадовільне транспортування проби до лабораторії.

Е) Застій води у розподільчій мережі.

62. В одному з хірургічних відділень проведений контроль якості стерилізації хірургічного інструментарію. При дії на інструмент 1% розчину фенолфталеїну розчин дав рожеве зафарбування. Це свідчить, що на інструменті є:

*** А) Залишки синтетичних миючих засобів**

- В) Залишки крові
- С) Залишки лікувальних речовин
- Д) Залишки тканин
- Е) Залишки дезінфікуючих засобів

63. При обстеженні дитини п'яти років лікар-педіатр встановив факт захворювання на дифтерію. Який медичний документ повинен оформити лікар для реєстрації цього захворювання?

*** А) Екстрене повідомлення про інфекційне захворювання ... (ф. № 058/0)**

- В) Звіт про медичну допомогу дітям (ф. №31)
- С) Виписка з Історії розвитку дитини (ф. № 112/0)
- Д) Звіт про деякі інфекційні та паразитарні захворювання (ф. №1)
- Е) Статистичний талон для реєстрації заключних (уточнених) діагнозів (ф. №025-2/0)

64. При обстеженні дитини п'яти років лікар-педіатр встановив факт захворювання на дифтерію. Протягом якого часу лікар повинен проінформувати санепідстанцію про цей випадок?

*** А) 12 годин**

- В) 24 годин
- С) 36 годин
- Д) 48 годин
- Е) 72 годин

65. При оценке питания мужчины 25 лет индекс массы тела (вес (кг): рост (м²)) составил 18,0. Хронические заболевания в анамнезе отсутствуют, жалоб на состояние здоровья не предъявляет. Пищевой статус мужчины по индексу массы тела (индекс Кетле) характеризуется как:

*** А) Гипотрофия I степени.**

В) Гипотрофия II степени.

С) Нормальная масса тела.

Д) Избыточная масса тела.

Е) Ожирение I степени.

66. В инфекционное отделение поступила женщина 47 лет с жалобами на высокую температуру, озноб, сильную слабость, головную боль, тошноту и рвоту. Стул частый, жидкий. Заболевание началось через 12 часов после употребления в пищу омлета из утиных яиц. Наиболее вероятный диагноз:

*** А) Сальмонеллез.**

В) Стафилококковое пищевое отравление.

С) Ботулизм.

Д) Пищевое отравление, вызванное *B. cereus*.

Е) Пищевое отравление, вызванное *V. parahaemolyticus*.

67. Усредненная проба почвы, отобранной на территории детского сада характеризуется как чистая по количеству личинок и куколок мух, слабо загрязненная по санитарному числу Хлебникова и числу гельминтов, умеренно загрязненная по титру санитарно-показательных микроорганизмов. Общую оценку санитарного состояния почвы следует давать по:

*** А) Титру санитарно-показательных микроорганизмов.**

В) Числу личинок и куколок мух.

С) Санитарному числу Хлебникова.

Д) В центре жилой зоны населенного пункта.

Е) Количеству гельминтов.

68. Город частично канализирован. Очистка бытовых сточных вод канализованной части города осуществляется на станции биологической очистки. Для обезвреживания сточных вод из неканализованной части города могут быть применены:

*** А) Поля фильтрации.**

В) Биотермические камеры.

С) Поля запахивания.

Д) Двухслойный фильтр.

Е) Поля ассинизации.

69. В городе для очистки городских сточных вод планируется строительство очистных сооружений, включающих песколовку, первичные радиальные отстойники, аэротенк, метантенк, дегельминтизатор, контактный резервуар. Из приведенной схемы обезвреживания сточных вод в состав биологической очистки входит:

*** А) Аэротенк.**

В) Песколовка.

С) Радиальный отстойник.

Д) Метантенк.

Е) Дегельминтизатор.

70. Из контингента III группы здоровья трое детей, которые состояли на диспансерном учете у участкового педиатра, выздоровели от хронических заболеваний. Какие дальнейшие действия участкового врача являются правильными ?

*** А) перевести во II группу здоровья**

В) перевести в I группу здоровья

С) снять с диспансерного учета

Д) оставить в той же группе здоровья

Е) передать под наблюдение специалистам по профилю патологии

71. На участке педиатра К. к концу года уровень общей заболеваемости вырос на 75\%. Какое мероприятие, требует первоочередного изучения для выяснения причин такого роста?

*** А) необходимо изучить структуру заболеваемости**

- В) необходимо изучить жилищные условия детей
- С) необходимо изучить уровень культуры родителей
- Д) необходимо изучить материальное положение семей
- Е) необходимо изучить здоровье родителей

72. На рабочем месте врача кабинета УЗИ уровень контактного ультразвука превышает ПДУ на 10 дБ. Продолжительность рабочего дня врача 6 часов с одним 30-минутным перерывом для приема пищи. Средства индивидуальной защиты им не используются. Развитие какой профессиональной патологии возможно у врача диагностического центра?

*** А) Ангioneвроз.**

- В) Вегетососудистая дисфункция.
- С) Астено-вегетативный синдром.
- Д) Неврозы.
- Е) Тендовагинит.

73. Рабочий день оператора ЭВМ составляет 8 часов с одним 30-минутным перерывом для приема пищи и двумя 5-минутными перерывами для личных надобностей. Параметры микроклимата, уровни шума, освещенности соответствуют санитарно-гигиеническим требованиям. Оцените режим труда и, при необходимости, дайте рекомендации по его оптимизации.

*** А) Необходимо делать 15-минутные перерывы через каждые 2 часа работы.**

- В) Режим труда соответствует гигиеническим требованиям.
- С) Необходимо продлить обеденный перерыв до 1 часа.
- Д) Необходимо ввести дополнительно два 10-минутных перерыва.
- Е) Необходимо делать 15-минутные перерывы через каждый час работы.

74. Оценка учебника для 6-х классов произведена по следующим параметрам: гарнитуре, размеру шрифта, печати, межстрочному расстоянию, качеству бумаги. Какой из основных параметров не оценен?

*** А) Плотность набора.**

В) Кегль.

С) Апрош между словами.

Д) Апрош между буквами.

Е) Петит.

75. Школьница правша сидит за партой с уменьшенной дифференцией. Какое отклонение может развиваться у нее?

*** А) Левосторонний сколиоз.**

В) Кифотическая осанка.

С) Лордотическая осанка.

Д) Поясничный лордоз.

Е) Правосторонний сколиоз.

76. У учащегося во время занятий за ученическим столом голова опущена, уменьшено расстояние от глаз до тетради, органы грудной и брюшной полостей сдавлены. У него выявлен левосторонний сколиоз I-й степени. Что послужило причиной указанной картины?

*** А) Заниженная дифференция.**

В) Завышенная дифференция.

С) Отрицательная дистанция сиденья.

Д) Нулевая дистанция сиденья.

Е) Положительная дистанция сиденья.

77. Рабочая поза учащегося 1-го класса характеризуется следующими признаками: дифференция мебели соответствует высоте свободно опущенной руки над сиденьем, глубина сиденья соответствует 2/3 длины бедра, высота сиденья на 3 см больше длины голени со стопой. Соответствуют ли параметры мебели антропометрическим показателям ребенка?

*** А) Занижена дифференция.**

В) Соответствует.

С) Завышена дифференция.

Д) Увеличена глубина сиденья.

Е) Уменьшена глубина сиденья.

78. Работники ОТК осуществляют визуальный контроль качества часовых механических изделий на конвейере с применением оптических приборов. Плотность рабочего дня достигает 96%. Условия труда и эргономическая обеспеченность рабочих мест соответствуют гигиеническим требованиям. На медицинском осмотре работники предъявляли жалобы на повышенную утомляемость, сонливость. Регистрировалось повышение АД, ухудшение способности концентрировать и распределять внимание, удлинение латентного периода зрительно-моторной реакции. Эти изменения можно связать с:

*** А) Монотонией.**

В) Личной ответственностью за выполняемую работу.

С) Высокой плотностью рабочего времени.

Д) Нагрузкой на зрительный анализатор.

Е) Работой с оптическими приборами.

79. Работа водителей большегрузных машин связана с постоянным пребыванием в рабочей позе сидя, нервно-эмоциональным напряжением. На водителей действует неблагоприятный микроклимат (летом температура воздуха достигает 35-39 °С, зимой – около 2-7 °С, скорость движения воздуха 0,1-0,8 м/с в разные периоды года). Шум, общая и локальная вибрация превышает ПДУ. Развитие какой профессиональной патологии наиболее вероятно у водителей.

*** А) Радикулопатия.**

- В) Перегрев.
- С) Ангioneвроз.
- Д) Сенсоневральная тугоухость.
- Е) Вибрационная болезнь.

80. В боксе инфекционного отделения вытяжная вентиляция организована автономно на естественной тяге с дефлектором, приток – механическим побуждением с подачей воздуха в коридор отделения. Оцените правильность организации вентиляции в отделении.

*** А) Вентиляция организована правильно.**

- В) Необходимо оборудование механической вытяжной вентиляции.
- С) В боксе должно быть естественное проветривание.
- Д) Чистый воздух должен подаваться непосредственно в бокс.
- Е) Подача и вытяжка воздуха должны организовываться из коридора.

81. Районный центр не канализован, нечистоты собираются в выгребных ямах дворовых уборных. Для обезвреживания нечистот районного центра следует применять

*** А) Поля ассенизации**

- В) Поля орошения
- С) Поля фильтрации
- Д) Биологические пруды
- Е) Земледельческие поля орошения

82. У 4-х месячного ребенка, находящегося на искусственном вскармливании, во время обследования выявлены признаки дистрофии, кожа сухая с участками пигментации. В крови лейкоцитоз. Проба Сулковича резко положительна. Наиболее вероятным причинным фактором заболевания является избыточное поступление в организм с молочной смесью:

*** А) Витамина D.**

В) Витамина А.

С) Витамина С.

Д) Витаминов В1 и В2.

Е) Витамина РР.

83. В женскую консультацию обратилась беременная женщина 24-х лет с жалобами на головокружение, одышку, слабость, повышенную утомляемость, сонливость, сухость во рту, изменение вкуса (желание употреблять мел). При осмотре выявлена тахикардия, сосочки языка сглажены, трещины в уголках рта, поперечная исчерченность ногтей. В крови - анизоцитоз. Все вышеперечисленные симптомы характерны для недостаточного поступления с пищей в организм:

*** А) Железа.**

В) Меди.

С) Цинка.

Д) Селена.

Е) Магния.

84. В инфекционное отделение сельской больницы поступил больной 28 лет с диагнозом ящур. Заболевание у данного пациента вероятнее всего, связано с употреблением в пищу:

*** А) Молока.**

В) Творога.

С) Сыра.

Д) Говядины.

Е) Субпродуктов (печени).

85. При об'єктивному обстеженні вагітної виявлені набряки нижніх кінцівок. В раціоні харчування переважно м'ясо, сало, оселедці. Які продукти харчування необхідно включити до раціону

А) Курагу, банани

В) Фрукти

С) Кефір

Д) Каши

*** Е) Овочі**

86. При дослідженні свинини у 22 зрізах на компресоріумі зі збільшенням у 60 разів виявлена 1 трихіNELA. М'ясо необхідно піддати

*** А) Технічній утилізації**

В) Реалізації через мережу громадського харчування

С) Глибокому заморожуванню

Д) Переробці на ковбасні вироби

Е) Проварюванню дрібними шматками.

**87. Під час огляду м'яса великої рогатої худоби на площі 50 см² виявили 2 фіни.
М'ясо необхідно піддати**

- * А) Проварюванню дрібними шматками.**
- В) Реалізації через мережу громадського харчування
- С) Охолодженню.
- Д) Переробці в м'ясний фарш.
- Е) Технічній утилізації

88. Населення, яке користувалося водою з шахтного колодязя скаржилося, що вода має підвищену мутність, кольоровість, неприємний в'язучий присмак, опалесцює, псує смак чаю, при пранні білизни надає їй жовтуватого відтінку і залишає іржаві плями. Такі властивості вода придбала за рахунок:

- * А) Перевищення концентрації заліза більше 1 мг/л**
- В) Концентрації заліза 0,1 – 0,3 мг/л
- С) Концентрації хлоридів 30 – 50 мг/л
- Д) Концентрації хлоридів 500 мг/л
- Е) Концентрації сульфатів 250 мг/л

89. Яка необхідна бути площа боксу у інфекційному відділенні?

- А) 26 м²
- * В) 22 м²**
- С) 20 м²
- Д) 24 м²
- Е) 18 м²

90. Через 2 год. після вживання у їжу недовареної червоної квасолі у хворого виникли: нудота, блювота, діарея. Який токсин пептидної природи зумовив виникнення даного харчового отруєння?

- * А) Фазин.**
- В) Соланін.
- С) Мускарин.
- Д) Мускаридин.
- Е) Фалотоксин.

91. У регулювальника дорожнього руху появились скарги на головний біль, запаморочення, порушення сну, зниження пам'яті та уваги, задишку, біль у ділянці серця. У крові під час лабораторного обстеження виявлено підвищений вміст карбоксигемоглобіну. Який чинник навколишнього середовища найімовірніше міг спричинити такі зміни в організмі?

- * А) Оксид вуглецю.**
- В) Діоксид вуглецю.
- С) Оксид азоту.
- Д) Діоксид азоту.
- Е) 3,4-безпірен

92. Мешканці села Підлюте користуються водою з шахтного колодязя, розташованого на околиці. Колодязь має старе дерев'яне цямбриння, кришку, спільного відра немає. Лабораторним аналізом води з цього колодязя виявлено підвищений вміст термостабільних кишкових паличок. Про що це свідчить?

- * А) Фекальне забруднення.**
- В) Забруднення води вірусами.
- С) Органічне забруднення.
- Д) Попадання забруднених вод.
- Е) Забруднення органічними речовинами тваринного походження

93. В с. Голинь зареєстрований спалах інфекційного гепатиту А. Усі хворі користувались водою з центрального водогону. Водозабором є річка. Який мікробіологічний показник якості води є індикаторним показником, що характеризує забруднення вірусами:

*** А) Чило колі-фагів.**

- В) Число патогенних мікроорганізмів.
- С) Число термостабільних кишкових паличок.
- Д) Число бактерій групи кишкових паличок.
- Е) Число бактерій в 1 см³ води

94. Лікар сільської лікарської амбулаторії був викликаний до громадянки О., жительки відділеного села, яка вдома без подання медичної допомоги народила дитину. Який документ повинен оформити лікар для того, щоб зареєструвати цей випадок народження дитини?

*** А) Медична довідка про перебування дитини під наглядом лікувального закладу**

- В) Історія розвитку дитини
- С) Історія розвитку новонародженого
- Д) Обмінна карта: відомості про новонародженого
- Е) Медичне свідоцтво про народження

95. Після тривалого захворювання вдома помер громадянин С. Дільничний лікар виписав “Лікарське свідоцтво про смерть” і повідомив родичів, що його потрібно зареєструвати в місцевому органі реєстрації актів цивільних станів. Протягом якого часу з дня смерті це потрібно зробити згідно із чинним законодавством України ?

*** А) не пізніше трьох днів**

- В) не пізніше десяти днів
- С) не пізніше одного місяця
- Д) не пізніше трьох місяців
- Е) не пізніше одного року

96. Після тривалого захворювання, з приводу якого останніх 7 років знаходився на диспансерному спостереженні в районній поліклініці, вдома помер громадянин С. Згідно із чинним законодавством України випадок смерті потрібно зареєструвати в місцевому органі реєстрації актів цивільних станів. На підставі якого документу це можливо зробити в даному випадку ?

*** А) Лікарське свідоцтво про смерть**

- В) Медична карта амбулаторного пацієнта
- С) Фельдшерська довідка про смерть
- Д) Виписка із журналу обліку померлих
- Е) Карта обліку диспансерного спостереження

97. Головному педіатру району доручено провести аналіз рівня смертності немовлят і визначити наскільки він залежить від керованих причин, пов'язаних із недоліками в організації лікувально-профілактичної допомоги дітям. Питома вага (частка) якого явища в загальній кількості померлих дітей до 1 року найточніше це відображає ?

*** А) Частка неонатальної смертності**

- В) Частка мертвонароджуваності
- С) Частка ранньої неонатальної смертності
- Д) Частка постнеонатальної смертності
- Е) Частка перинатальної смертності

98. Для аналізу діяльності амбулаторії із річних звітних документів взяли відомості про середньорічну кількість населення, кількість лікарів, кількість зареєстрованих захворювань (всього і по окремих класах хвороб) та кількість відвідувань. Відношення яких даних відповідає поняттю показник інтенсивності ?

- * А) кількість захворювань до середньорічної кількості населення**
- В) кількість лікарів до середньорічної кількості населення
- С) кількість захворювань по окремих класах до загальної кількості захворювань
- Д) середньорічна кількість населення до кількості лікарів
- Е) кількість відвідувань до середньорічної кількості населення

99. Для аналізу діяльності амбулаторії із річних звітних документів взяли відомості про середньорічну кількість населення, кількість лікарів, кількість зареєстрованих захворювань (всього і по окремих класах хвороб) та кількість відвідувань. Відношення яких даних відповідає поняттю показник екстенсивності ?

- * А) кількість захворювань по окремих класах до загальної кількості захворювань**
- В) кількість лікарів до середньорічної кількості населення
- С) кількість захворювань до середньорічної кількості населення
- Д) середньорічна кількість населення до кількості лікарів
- Е) кількість відвідувань до середньорічної кількості населення

100. Вміст пилу цукрової тростини в повітрі робочої зони при виготовленні цукру перевищує ГДК в 4-6 разів. Робітники, які працюють в таких виробничих умовах скаржаться на постійний сухий кашель зранку і вдень з незначною кількістю мокротиння з прожилками крові, іноді кровохаркання, гострі напади задишки увечері, вранці і при фізичному напруженні. У хворих відзначають підвищення температури тіла до 39 °C з лихоманкою увечері або зранку, виражену астеною, анорексію, швидку втрату маси тіла, іноді - дисфонію. Поліпшення настає (зі слів робітників) через тиждень після припинення контакту з чинником хвороби. Вказані ознаки характерні для пилу, який володіє дією:

*** А) Алергенною.**

В) Фіброгенною.

С) Гастронаправленою.

Д) Канцерогенною.

Е) Мутагенною.

101. У воді шахтного колодязя, розташованого на околиці села в 60 м нижче ферми великої рогатої худоби виявлені азотисті з'єднання, у таких концентраціях: аміак - 0,9 мг/л, нітрити - 0,3 мг/л, нітрати - 52 мг/л. Для якого забруднення характерний такий аналіз води?

*** А) постійне**

В) свіже

С) недавнє

Д) давнє

Е) латентне

102. Для водопостачання в населеному пункті використовується вода, яка у своєму складі містить: хлоридів 250 мг/л, сульфатів 240 мг/л, заліза 0,3 мг/л, нітратів 45 мг/л, фтору 0,26 мг/л, залишкового вільного хлору 0,4 мг/л. При тривалому вживанні такої води у населення може розвинути захворювання на:

*** А) карієс зубів**

- В) флюороз
- С) ендемічний зоб
- Д) тиреотоксикоз
- Е) метгемоглобінемія

103. Заплановано будівництво нової поліклініки в районі з близьким розташуванням машинобудівного заводу (2-й клас небезпеки). Визначити необхідну ширину санітарно-захисної зони між підприємством і поліклінікою:

*** А) 500 м**

- В) 300 м
- С) 100 м
- Д) 50 м
- Е) 1000 м

104. При визначенні взимку параметрів мікроклімату в кабінеті лікаря встановлено: температура повітря 20 0С, відносна вологість 71%, швидкість руху повітря 0,1 м/с, вертикальний перепад температури повітря 2,5 0С, горизонтальний - 2 0С. Який з показників мікроклімату не відповідає гігієнічним нормативам?

*** А) Відносна вологість повітря**

- В) температура повітря
- С) швидкість руху повітря
- Д) вертикальний перепад температури повітря
- Е) горизонтальний перепад температури повітря

105. В навчальній кімнаті за допомогою люксметра визначали рівень штучної освітленості, що здійснюється люмінесцентними лампами. Мінімальна загальна освітленість приміщення повинна складати:

*** А) 300 лк**

В) 200 лк

С) 400 лк

Д) 150 лк

Е) 100 лк

106. Які значення мікробіологічних показників безпеки питної води, що подається централізовано, дають можливість використовувати воду без шкоди для здоров'я населення?

*** А) мікробне число не більше 100 в 1 мл, а колі-індекс не більше 3**

В) мікробне число 150 в 1 мл, а колі-індекс 4 в 1 л

С) мікробне число 100 в 1 мл, а колі-індекс 5 в 1 л

Д) мікробне число 200 в 1 мл, а колі-індекс 6 в 1 л

Е) мікробне число 300 в 1 мл, а колі-індекс 10 в 1 л.

107. Питна вода, що використовується для приготування лікарських розчинів в аптеці містить: нітратів - 200 мг/л, хлоридів - 250 мг/л, сульфатів - 200 мг/л, заліза - 0,2 мг/л. До яких захворювань може призвести застосування такої води ?

*** А) Водно-нітратна метгемоглобінемія**

В) Гемосидероз

С) Ентероколіт

Д) Флюороз

Е) Подагра

108. На одному із майданчиків міста Луганська було завезено для продажу коров'яче молоко, яке мало слідуючу жирність. Зазначте оптимальну жирність молока.

*** А) 3,2**

В) 2,8

С) 4,5

Д) 3,0

Е) 6,0

109. Зазначте експрес-метод оцінки свіжості м'яса:

*** А) Проба гарячого ножа**

В) Проба піджарювання м'яса

С) Дослідження з допомогою овоскопа

Д) Дослідження з допомогою мікроскопа

Е) Бактеріологічне дослідження

110. В харчоблок лікарні доставлен знежирений кефір. На кришці фляги виставлена дата його зберігання до моменту доставки. Зазначте оптимальний термін (години) зберігання кефіру:

*** А) 36**

В) 40

С) 20

Д) 50

Е) 60

111. Укажіть, яка найбільш оптимальна орієнтація вікон операційній по сторонах світу в умовах середніх широт (45-55 0):

*** А) Північ**

- В) Південь
- С) Південно-східна
- Д) Південно-західна
- Е) Західна

112. Дайте гігієнічну оцінку природного освітлення операційної за показником світлового коефіцієнту

*** А) 1/2 - 1/3**

- В) 1/4 - 1/5
- С) 1/6 - 1/8
- Д) 1/8 - 1/10
- Е) 1/10 - 1/12

113. Укажіть, які повинні бути мікрокліматичні умови в палаті для хворих із тяжкими опіками?

*** А) температура 22-25 0С, відносна вологість повітря - 55%, швидкість руху повітря - 0,05 - 0,1 м/с**

- В) температура - 20 0С відносна вологість повітря - 40% швидкість руху повітря - 0,1 м/с
- С) температура - 18 0С відносна вологість повітря - 50% швидкість руху повітря - 1 м/с
- Д) температура - 15 0С відносна вологість повітря - 60% швидкість руху повітря - 1 м/с
- Е) температура - 28 0С відносна вологість повітря - 65 % швидкість руху повітря - 0,5 м/с

114. Найменший рівень освітленості (Лк) з використанням люмінесцентних ламп в операційних становить:

*** A) 400**

B) 300

C) 200

D) 100

E) 75

115. Необхідна кратність повітряобміну за 1 годину у приміщеннях для санітарної обробки хворих становить:

*** A) + 3 - 5**

B) + 1,5 - 2

C) - 0 + 5

D) - 5 + 0

E) + 2 - 2

116. Укажіть, який мінімальний об'єм вентиляції на 1-го хворого в терапевтичному відділенні лікарні повинен бути:

*** A) 40 - 50 м3**

B) 20 - 30 м3

C) 10 - 15 м3

D) 60 - 80 м3

E) 80 - 100 м3

117. При обстеженні земельної ділянки лікарні встановлено, що ця ділянка міститься з навітряного боку і на значній відстані від джерел, які забруднюють повітря. Рівень звуку в денний час 50 дБ, у нічний - 30 дБ. На одне ліжко приходить 150 м² території. Який показник не відповідає гігієнічним нормативам ?

*** А) рівень звуку в денний час**

- В) рівень звуку в нічний час
- С) розміщення земельної ділянки з навітряного боку.
- Д) розрахунок земельної території в залежності від кількості ліжок у лікарні.
- Е) усі показники не відповідають

118. Дайте оцінку фізичного розвитку хлопчика 10 років, якщо згідно з графічним зображенням профілю фізичного розвитку довжина тіла дорівнює (+ 1,2 сигми), вага тіла - (-0,5 сигми), коло грудної клітки - (+0,5 сигми)

*** А) диспропорційний**

- В) пропорційний
- С) різко диспропорційний
- Д) гармонічний
- Е) низький

119. Дайте оцінку фізичного розвитку дівчинки 12 років за методом сигмальних відхилів, якщо показник ваги тіла дорівнює +0,5 сигми:

*** А) середній**

- В) вище середнього
- С) високий
- Д) низький
- Е) нижче середнього

120. При обстеженні класу загально-освітньої школи проведено дослідження мікрокліматичних параметрів. Отримано такі результати: температура повітря - 25 °C, відносна вологість - 40%, швидкість руху повітря - 0,15 м/с. Які показники, або показник потребує корекції?

*** А) Температура повітря**

- В) Відносна вологість повітря
- С) Швидкість руху повітря
- Д) Температура та відносна вологість повітря
- Е) Швидкість руху повітря та температура повітря

121. При визначенні показників природного освітлення робочого місця в класі загальноосвітньої школи встановлено, що кут падіння сонячних променів складає 25 °, кут отвору - 3 °, СК - 1 : 4, КПО - 0,5%, коефіцієнт заглиблення - 2. Який показник не відповідає гігієнічним нормативам?

*** А) Коефіцієнт природної освітленості**

- В) Кут отвору
- С) Світловий коефіцієнт
- Д) Коефіцієнт заглиблення
- Е) Кут падіння

122. При вивченні розкладу уроків учнів 8-го класу загально-освітньої школи встановлено: кількість уроків протягом тижня - 30, у понеділок перший урок - математика, другий - іноземна мова, 3- фізика, всього 6 уроків. Яке порушення має місце у розкладі уроків?

*** А) Місце уроку математики у розкладі**

- В) Кількість уроків протягом тижня
- С) Кількість уроків протягом доби
- Д) Місце уроку іноземної мови у розкладі
- Е) Місце уроку фізики у розкладі

123. Хлопчик 8 років знаходиться на диспансерному обліку з приводу хронічного бронхиту. До якої групи фізичного виховання належить дитина?

*** А) спеціальної**

- В) основної
- С) додаткової
- Д) підготовчої
- Е) лікувальної

124. У палаті терапевтичного відділення було проведено вимірювання, необхідне для оцінки мікрокліматичних умов. Результати вимірювань: температура повітря становить 200С, швидкість руху повітря – 0,02 м/с, відносна вологість повітря 58\%. Дати загальну гігієнічну оцінку мікроклімату палати.

*** А) Мікроклімат комфортний**

- В) Мікроклімат дискомфортний з підвищеною швидкістю повітря
- С) Мікроклімат дискомфортний нагрівного типу
- Д) Мікроклімат дискомфортний з підвищеною вологістю повітря
- Е) Мікроклімат комфортний охолоджувального типу.

125. В обласній лікарні рентгендіагностичного кабінету, для створення радіаційної безпеки медичного персоналу використані захисні засоби типу екранів: просвинцюване скло на екрані рентгенкабінету, велика і мала пересувні захисні ширми, нагрудний фартух з просвинцюваного матеріалу. Які ще засоби екранування необхідні.

*** А) Захисні рукавиці з просвинцюваної гуми.**

- В) Гумові чоботи з додатком свинцю
- С) Обмеження тривалості робочого дня
- Д) Дистанційне управління рентгенапаратом
- Е) Вказаних заходів досить

126. Який відсоток палат в секції лікарні повинен бути на чотири, два та одне ліжко ?

*** А) 60%,20 %, 20%**

В) 50%, 30%, 20%

С) 40%, 40%, 20%

Д) 30%, 60%, 10%

Е) 70%, 20%, 10%

127. В інфекційному відділенні міській лікарні було проведено бактеріологічне дослідження повітря. Яким апаратом користувалися дослідники?

*** А) Апарат Кротова**

В) Люксметр

С) Електроаспіратор

Д) Гігрограф

Е) Барометр-анероїд

128. Під час медичного огляду у хворого було виявлено затримку росту, гіпогонадизм, статевий інфантилізм, відсутність вторинних статевих ознак, збільшення печінки та селезінки. Це свідчить про недостатність у харчуванні:

*** А) Цинку**

В) Кальцію

С) Міді

Д) Йоду

Е) Вітаміну D

129. При обстеженні дитини у неї виявлено підвищену подразливість, рухове занепокоєння, загальну слабкість, пітливість, затримку розвитку зубів, підвищену активність лужної фосфатази. Дефіцит якого вітаміну є в організмі дитини?

*** A) D**

B) A

C) PP

D) E

E) Групи B

130. Пекарі хлібопекарного виробництва працюють в умовах високої температури повітря та інтенсивного теплового випромінювання. Для підвищення стійкості організму до несприятливого впливу цих шкідливих чинників виробничого середовища використовують:

*** A) Вітамінні препарати**

B) Молоко

C) Пектин

D) Лікувально-профілактичний раціон № 1

E) Лікувально-профілактичний раціон № 3

131. Добовий раціон харчування дівчинки віком 10 років містить: вітамін B1 - 1,2 мг, вітамін B2 - 0,6 мг, вітамін B6 - 1,4 мг, вітамін PP - 15 мг, вітамін C - 65 мг. При оцінці харчового статусу у дівчинки виявлено хейлоз, глосит, ангулярний стоматит, кон'юктивіт. З найбільшою вірогідністю у дівчинки має місце:

*** A) B2 - гіповітаміноз**

B) B1 - гіповітаміноз

C) B6 - гіповітаміноз

D) PP - гіповітаміноз

E) C - гіповітаміноз

132. При розслідуванні випадку харчового отруєння у лікаря СЕС виникла підозра, що отруєння викликано умовно патогенними мікроорганізмами. Які з перелічених збудників могли викликати отруєння?

*** А) Ентеропатогенні серотипи кишкової палички**

- В) Гриби роду *Aspergillus*
- С) Гриби роду *Fusarium*
- Д) Ентеротоксичні стафілококи
- Е) *Cl.botulinum*

133. Хворий переніс гострий гепатит. Який з перелічених продуктів чи страв слід рекомендувати у його раціон?

*** А) Мед**

- В) М'ясні та рибні бульйони
- С) Консерви рибні
- Д) Смажені страви
- Е) Жирне м'ясо

134. Громадянин Н. працює з неорганічними сполуками свинцю. Що з переліченого слід рекомендувати йому у раціон харчування?

*** А) Печені яблука**

- В) Свіжі черешні
- С) Виноград
- Д) Цукор
- Е) Тугоплавкі жири

135. В селищі, що знаходиться в зоні добровільного відселення проведено радіометричний аналіз питної води з криниці. В результаті проведеного дослідження встановлено, що вміст радіонуклідів ^{90}Sr становить 3,7 Бк/л. Чи дозволяється використання даної питної води ?

*** А) Дозволяється**

В) Заборонено.

С) Дозволяється вживати протягом 1 місяця.

Д) Дозволяється вживати в обмеженій кількості.

Е) Дозволяється вживати лише дорослому населенню.

136. При обстеженні пацієнта виявлено симптоми: прогресуюча кволість, зниження працездатності, швидка фізична та психічна втомлюваність, відчуття мерзлякуватості та голоду, втрата маси тіла. Встановіть вид аліментарного захворювання.

*** А) Білково-енергетична недостатність**

В) Вітамінна недостатність

С) Мінеральна недостатність

Д) Недостатність ПНЖК

Е) Недостатність харчових волокон

137. Работница, 38 лет работает на высушивании льна. Обратилась в поликлинику с жалобами на затрудненное дыхание, чувство стеснения в груди и приступообразный кашель. Эти симптомы возникают в первый день рабочей недели. В остальные дни симптомы уменьшаются. Развитие какого заболевания органов дыхания возможно?

*** А) Биссиноз**

В) Силикоз

С) Аллергический ринофарингит

Д) Бронхиальная астма

Е) Бронхит с астматическим компонентом

138. Мужчина, 37 лет рабочий железорудной шахты при периодическом медосмотре предъявляет жалобы на боли в груди, сухой редкий кашель, умеренную одышку. Стаж работы 6 лет. Содержание соединений железа в пыли рабочей зоны 50\%. Рентгенологически: выявлено диффузное разрастание соединительной ткани по всем легочным полям. Развитие какого профессионального заболевания возможно у рабочего?

*** А) Сидероз**

В) Силикоз

С) Талькоз

Д) Силикатоз

Е) Бронхит хронический

139. Мальчик 13 лет имеет отклонения в физическом развитии: масса тела ниже средней возрастной нормы. В анамнезе тубинфицирование. При осмотре окулистом поставлен диагноз миопия слабой степени. К какой группе здоровья следует отнести ребенка.

*** А) Ко второй**

В) К третьей

С) К первой

Д) К пятой

Е) К четвертой

140. У аспірантки М. занедужала 1,5 річна дитина і хворіла 18 днів. У родині є непрацююча бабуся. Дитина виховується в повній родині. Провести експертизу працездатності по догляду за хворою дитиною.

*** А) матері видається листок непрацездатності на весь період хвороби дитини**

В) матері видається довідка по догляду за хворою дитиною на весь період хвороби дитини.

С) матері видається листок непрацездатності максимально на 7 днів, на решту - довідка.

Д) матері видається листок непрацездатності максимально на 14 днів, на решту - довідка.

Е) -

141. Больной, длительно питающийся рафинированными продуктами, жалуется на головную боль, утомляемость, депрессию, бессонницу, раздражительность. Объективно: мышечная астения, боли и судороги в икроножных мышцах, в ходьбе наступает на пятку, затем на наружный край стопы, со стороны ССС - тахикардия, гипоксия, дистрофические изменения сердечной мышцы, отмечаются нарушения со стороны ЖКТ. Какой диагноз можно поставить?

*** А) Гиповитаминоз В1**

В) Гиповитаминоз В2

С) Гиповитаминоз В12

Д) Гиповитаминоз В6

Е) Гиповитаминоз В15

142. В населенном пункте К., после аварии на Чернобыльской АЭС и по настоящее время регистрируется уровень радиации 16-20 мР\ч. Какие рекомендации вы можете предложить для рационализации питания и профилактики действия ионизирующего излучения на людей, проживающих в данном населенном пункте.

*** А) Увеличение в рационе количества белка, продуктов, богатых клетчаткой, пектиновые вещества, кальцием, калием, селеном, витаминами.**

В) Уменьшение в рационе количества белков и жиров. Увеличение количества минеральных веществ и витаминов.

С) Увеличение количества бобовых и злаковых культур в рационе.

Д) Увеличение в рационе количества белка, жи-ров, крахмала, железа, цинка, йода, фосфо-ра, витаминов

Е) Увеличение в рационе количества белков, жиров и витаминов, ограничение поступления минеральных солей

143. Девушка 15 лет, 2 группа здоровья, в ноябре начала закаливаться, принимая холодный душ по утрам (температура воды 10 0 С). Проживает в неотапливаемой квартире (температура воздуха 12 0 С). Дайте рекомендации по осуществлению закаливания.

*** А) Закаливание прекратить до начала отопления квартиры и повышения температуры воздуха до 20 0 С**

- В) Закаливание проводить ежедневно снижая температуру воды на 20 С
- С) Закаливание проводить ежедневно, вечером перед сном снижая температуру воды на 0,50 С
- Д) Закаливание проводить ежедневно снижая температуру воды на 10 С
- Е) Закаливание проводить ежедневно, утром снижая температуру воды на 10 С

144. 15 летние девушки на уроках труда переносят металлоконструкции весом 8 кг. Уроки труда сдвоенные, продолжительность их по 45 минут. Стоят на 4-5 уроке в среду. Какие факторы в данном случае нарушены?

*** А) Масса тела металлоконструкции больше допустимой.**

- В) Уроки труда сдвоенные.
- С) Продолжительность уроков труда.
- Д) Проведение уроков труда на 4-5 уроке
- Е) Проведение уроков труда в среду.

145. В результаті аналізу дитячої смертності в населеному пункті К. встановлено, що в неонатальному періоді помирає 54\% дітей від загальної кількості померлих на першому році життя. Визначте тип дитячої смертності в даному населеному пункті?

*** А) Тип "А"**

- В) Тип "В"
- С) Тип "С"
- Д) -
- Е) -

146. В дитячій поліклініці проведено вивчення захворюваності дітей алергічними захворюваннями шляхом викопіювання даних з облікової медичної документації. Відповідно з програмою дослідження для формування вибіркової сукупності в реєстратурі була відібрана кожна третя історія розвитку дитини. Вкажіть який метод формування вибіркової сукупності використовували дослідники?

*** А) Механічний добір**

В) Випадковий добір

С) Типологічний добір

Д) Спрямований добір

Е) Серійний добір

147. В зоні радіаційного забруднення внаслідок аварії на ЧАЕС у працюючої жінки захворіла дитина на обструктивний бронхіт. Лікування дитина одержувала амбулаторно. В зв'язку з необхідністю догляду за хворою дитиною, мати була непрацездатна 19 днів. На який максимальний термін необхідно оформити листок непрацездатності матері по догляду за хворою дитиною в цьому випадку?

*** А) На всі 19 днів хвороби дитини.**

В) На 14 днів, а на решту - довідку встановленої форми

С) На 14 днів, а на решту - довідку довільної форми

Д) На 7 днів, а на решту - довідку встановленої форми

Е) На 7 днів, а на решту - довідку довільної форми

148. У хлопчика 8 років під час профілактичного медичного огляду визначені зміни кривизни хребта у фронтальній площині: праве плече опущене і стає як би плоским, кути лопаток знаходяться на різних рівнях за рахунок опущення правої лопатки, трикутники талії виражені по обидва боки, подовжні м'язи спини ліворуч утворюють м'язовий валик. Який вид постави виявлений у дитини?

*** А) Сколіотична**

В) Кіфотична

С) Лордотична

Д) Сутулувата

Е) Виправлена

149. Хворому на інфаркт міокарду протягом 4-х місяців у встановленому порядку відкритий і продовжується листок непрацездатності. Хвороба прогресує. Вирішується питання про необхідність направлення його на МСЕК. Хто має право в лікувально-профілактичному закладі це зробити?

*** А) Лікарсько-консультативна комісія**

В) Лікуючий лікар

С) Завідувач відділення

Д) Заступник головного лікаря з експертизи тимчасової непрацездатності

Е) Головний лікар

150. У атмосферному повітрі на відстані 700 м від промислового підприємства були присутні підвищені концентрації окису вуглецю та сірчаного газу. Яку дію мають ці речовини на організм населення?

*** А) Комбіновану**

В) Комплексну

С) Незалежну

Д) Канцерогенну

Е) Сполучену

151. При плановому обстеженні школярів у дівчинки 15 років виявлено порушення осанки у виді кіфозу. Який із перелічених факторів має етіологічне значення для розвитку цієї патології?

*** А) Неправильне розсажування дітей**

- В) Порушення режиму харчування
- С) Неправильна орієнтація вікон у класі
- Д) Велика відстань робочого місця від дошки
- Е) Підвищена температура повітря

152. Швидка допомога в ночі доставила до інфекційної лікарні хворого, який з ранку з'їв гриби. Захворювання почалось раптово – різкий біль у животі, частий пронос, неспинне блювання, нестерпна спрага, головний біль, запаморочення. На третій день хвороба закінчилась смертю. Отруєння якими грибами мало місце?

*** А) Бліда поганка**

- В) Сморчки
- С) Мухомори
- Д) Несправжні опеньки
- Е) Сироїжки

153. Захворюваність карієсом серед мешканців населеного пункту N складає 89%. Встановлено, що вода містить 0,1 мг/л фтору. Які профілактичні заходи варто здійснити?

*** А) фторування води**

- В) чистити зуби
- С) робити інгаляції фтору
- Д) застосовувати герметики
- Е) їсти більше овочів

154. З метою оцінки епідеміологічної небезпеки повітряного середовища у виставочному центрі проводиться оцінка бактеріальної обсіяності повітря. Який мікроорганізм є санітарно-показовим для повітря закритих помешкань?

*** A) Str. haemoliticus**

B) St. aureus

C) Pseudomonas aeruginosae

D) Escherichia coli

E) Clostridia

155. В радіологічному відділенні лікарні для лікування злоякісних новоутворень використовують гама-установки променевої терапії типу “Агат” та інші закриті джерела іонізуючих випромінювань. Які із перелічених заходів треба використовувати для захисту персоналу при роботі з радіоактивними джерелами такого типу?

*** A) Скорочення часу роботи та екранування джерела**

B) Герметизація установок та організація вентиляції приміщення

C) Екранування джерела та використання засобів індивідуального захисту органів дихання

D) Збільшення відстані до джерела та виконання правил індивідуальної гігієни

E) Систематична очистка поверхонь від радіоактивних забруднень та скорочення часу роботи

156. В школі після проведення поглибленого медичного огляду в п'ятому класі діти розподілені за групами здоров'я. До якої групи здоров'я слід віднести дітей, які мають функціональні, морфологічні відхилення, функціональні відхилення після перенесених захворювань, та тих, що часто хворіють?

*** A) 2**

B) 1

C) 3

D) 4

E) 5

157. Хворий знаходиться на стаціонарному лікуванні з діагнозом гострий панкреатит. З метою максимального щадіння підшлункової залози лікар призначив йому повне голодування на 1-3 дні. У період покращення стану здоров'я після скасування режиму голоду хворому дозволяється:

*** А) Картопляно-морквяне пюре**

- В) Бульйон
- С) М'ясо відварене
- Д) Молоко
- Е) Виноградний сік

158. В лабораторії СЕС при бактеріологічному дослідженні кремових кондитерських виробів, взятих на кондитерській фабриці, виявлено наявність коагулозопозитивного стафілококу в 0,01 г готового продукту. Яке головне джерело забруднення кремових кондитерських виробів патогенними стафілококами?

*** А) Робітники підприємства**

- В) Згущене молоко
- С) Яєчна маса
- Д) Цукор або цукрова пудра
- Е) Вершкове масло

159. Воздух палат хирургического отделения, в которых пребывают больные с нагноившимися ранами, загрязнен гнойной микрофлорой в количествах, превышающих допустимые уровни. Для предупреждения загрязнения воздуха операционной этого хирургического отделения в операционной должна быть предусмотрена вентиляция:

*** А) Приточно-вытяжная с преобладанием притока**

- В) Только приточная
- С) Только вытяжная
- Д) Приточно-вытяжная, равная по объему притока и вытяжки
- Е) Приточно-вытяжная с преобладанием вытяжки

160. Атмосферный воздух промышленного города интенсивно загрязняется выбросами нескольких промышленных предприятий. Анализ заболеваемости городского населения показал, что наиболее частое заболевание - хроническая пневмония, особенно у детей. Эта картина заболеваемости вероятнее всего может быть связана с промышленным выбросом в атмосферу:

*** А) Оксидов серы**

- В) Соединений кадмия
- С) Метилртути
- Д) Соединений свинца
- Е) Соединений мышьяка

161. Больной госпитализирован в лечебно-профилактическое учреждение с диагнозом трихинеллез. Употребление в пищу какого продукта с недостаточной кулинарной обработкой является причиной данного заболевания?

*** А) Свинины**

- В) Рыбы
- С) Баранины
- Д) Говядины
- Е) Мяса птицы

162. Выполнение ремонтных работ в закрытом автомобильном боксе проводилось при работающем двигателе. Через 30-40 мин. у слесарей-ремонтников появилась сильная головная боль в области висков, шум в ушах, тошнота, рвота. Эти признаки характерны для острого отравления:

*** А) Оксидом углерода**

- В) Парами бензина
- С) Тетраэтилсвинцом
- Д) Оксидом азота
- Е) Масляным аэрозолем

163. У учащегося 4 класса выявлено резко дисгармоничное физическое развитие. Мальчик страдает хроническим бронхитом в стадии компенсации. В течение года острыми заболеваниями он не болел. К какой группе здоровья относится мальчик?

*** А) III-я**

В) I-я

С) II-я

Д) IV-я

Е) V-я

164. При осуществлении медицинского контроля за детским дошкольным учреждением педиатром установлено: группа проветривается до прихода детей, перед занятиями и во время прогулок (сквозное проветривание). Спальня проветривается (угловое проветривание) перед сном и после сна, во время сна осуществляется аэрация. Правильно ли организован воздушный режим?

*** А) Правильно**

В) Неправильно организовано проветривание группы

С) Неправильно организовано проветривание перед сном

Д) Неправильно организовано проветривание в спальне после сна

Е) Неправильно организована аэрация

165. Жінка 55 років скаржиться на багаторазовий пронос, лущення та пігментацію відкритих ділянок тіла (шиї, кистей та ступней), роздратованість та занепокоєння. Про яку вітамінну недостатність йде мова?

*** А) Нікотинової кислоти**

В) Ретинолу

С) Тіаміну

Д) Рибофлавіну

Е) Пантотенової кислоти

166. При обстеженні групи осіб, що мешкають на одній території, виявлені загальні симптоми захворювання: темно-жовта пігментація емалі зубів, дифузний остеопороз кісткового апарату, осифікація зв'язок, закостеніння суглобів, функціональні порушення діяльності ЦНС. Надлишок якого мікроелементу у продуктах або питній воді може бути причиною цього стану?

*** А) Фтор**

В) Мідь

С) Нікель

Д) Йод

Е) Цезій

167. Тепло, що продукується організмом робітника гарячого цеху в умовах високих температур і зниженої вологості, втрачається переважно випаровуванням, що може призвести до судомної хвороби. Який вид обміну є визначальним при цьому ?

*** А) Водно-сольовий.**

В) Вуглеводний

С) Жировий

Д) Білковий

Е) Вітамінний

168. У дитячій дошкільній установі до меню входять наступні страви: каша гречана молочна, макарони з м'ясним фаршем, салат з огірків, кисіль, хліб житній. Яку з перелічених страв необхідно вилучити з меню?

*** А) Макарони з м'ясним фаршем**

В) Кашу гречану молочну

С) Кисіль

Д) Хліб житній

Е) Салат з огірків

169. Внаслідок багаторічного забруднення навколишнього середовища викидами металургійного заводу на прилеглій житловій території міста сформувалася біогеохімічна провінція. За якою ведучою ознакою можна надати їй гігієнічну оцінку?

*** А) Накопичення в ґрунті специфічних хімічних речовин**

- В) Обмеження умов санітарно-побутового водокористування
- С) Забруднення атмосферного повітря
- Д) Погіршення якості продуктів рослинного походження
- Е) Підвищений рівень захворюваності населення

170. Робітники працюють в умовах високих рівнів запиленості. Для виникнення професійних пилових захворювань мають значення хімічні (вміст діоксиду кремнію) та фізичні властивості аерозолей пилу. Яка головна фізична властивість аерозолей пилу?

*** А) Дисперсність**

- В) Намагнічування
- С) Електрозарядженість
- Д) Розчинність
- Е) Іонізація

171. Умови праці робітника будівельного підприємства характеризуються дією охолоджуючого мікроклімату, пилу з вмістом діоксиду кремнію, їдкого лугу (негашене вапно), шуму. Який лікар-спеціаліст повинен бути головним в комісії, що проводить періодичний медичний огляд робітників вказаної категорії?

*** А) Терапевт**

- В) Офтальмолог
- С) Невропатолог
- Д) Дерматолог
- Е) Отоларинголог

172. На території міста відмічено підвищений рівень марганцю в атмосферному повітрі, питній воді та продуктах харчування сільсько-господарського походження. Яка дія даних чинників на здоров'я населення?

*** А) Комплексна**

В) Комбінована

С) Поєднана

Д) Синергічна

Е) Роздільна

173. Головний лікар поліклініки дав завдання дільничому лікарю визначити патологічну ураженість населення N-ою хворобою на дільниці. За яким документом визначається патологічна ураженість населення на хвороби на лікарській дільниці?

*** А) За журналом профоглядів**

В) За статистичними талонами "+"

С) За статистичними талонами "-"

Д) За статистичними талонами "+" і "-"

Е) За талонами на прийом до лікаря

174. В класній кімнаті розмірами 6 x 10 м² встановлено 6 світлоточок, обладнаних лампами розжарювання потужністю 150 Вт кожна. Освітленість на робочих місцях коливається у межах 70-80 лк. Дайте гігієнічну оцінку штучному освітленню класу.

*** А) Штучне освітлення класу нерівномірне та недостатнє: освітленість на робочих місцях низька.**

В) Штучне освітлення класу рівномірне: освітленість на робочих місцях низька.

С) Штучне освітлення класу нерівномірне та достатнє: освітленість на робочих місцях достатня.

Д) Штучне освітлення класу рівномірне та достатнє: освітленість на робочих місцях достатня.

Е) Штучне освітлення класу рівномірне та достатнє: освітленість на робочих місцях низька.

175. В лікарняній палаті розміром 5 x 3,5 м² є два вікна. Провітрювання палати здійснюється шляхом 4-х разового відкривання кватирок протягом дня.

Визначення вмісту вуглекислоти проводили шляхом пропускання балончиків з повітрям через склянки Дрекслея з лужним розчином. Назвіть допустимий вміст вуглекислоти в повітрі палати.

*** А) 0,1%**

В) 0,04%

С) 0,01%

Д) 0,15%

Е) 0,20%

176. За дорученням лікаря медична сестра провела вимірювання, які необхідні для оцінки мікрокліматичних умов палати терапевтичного відділення.

Результати вимірювань: середня температура повітря становить 20°C, швидкість руху повітря - 0,2 м/с, відносна вологість повітря - 58%. Дайте гігієнічну оцінку мікроклімату палати.

*** А) Мікроклімат комфортний**

- В) Мікроклімат дискомфортний охолоджувального типу
- С) Мікроклімат дискомфортний нагрівного типу
- Д) Мікроклімат дискомфортний з підвищеною вологістю повітря
- Е) Мікроклімат дискомфортний з підвищеною швидкістю повітря

177. Проведено дослідження води, які відібрана із шахтної криниці.

Установлено: прозорість - 18 см, колір - 15°, запах - 3 бала, окислюваність - 8 мг/л, вміст азоту амонійного - 0,4 мг/л, азоту нітратів - 0,1 мг/л, , колі-титр - 80, колі-індекс - 12. Обґрунтуйте гігієнічний висновок щодо якості питної води.

*** А) Вода не відповідає гігієнічним вимогам, необхідно провести санацію колодязя.**

- В) Вода відповідає гігієнічним вимогам
- С) Вода не відповідає гігієнічним вимогам, необхідним є проведення її очистки
- Д) Вода не відповідає гігієнічним вимогам, необхідним є проведення її знешкодження
- Е) Вода не відповідає гігієнічним вимогам, необхідним є проведення її дезактивація

178. Чоловік 40 років, який працює сталеваром на металургійному комбінаті, звернувся до лікаря зі скаргами на погіршення зору. Дані об'єктивного дослідження: прозорість кришталика зменшена, гострота зору становить 0,6, спостерігається гіперемія склери. Поставте діагноз та визначить етіологічний фактор, що викликав захворювання.

*** А) Катаракта, вплив інфрачервоного випромінювання**

- В) Катаракта, вплив ультрафіолетового випромінювання
- С) Катаракта, вплив видимого спектру випромінювання
- Д) Фотоофтальмія, вплив ультрафіолетового випромінювання.
- Е) Фотоофтальмія, вплив видимого спектру випромінювання.

179. Дівчинка 10 років має середній гармонійний фізичний розвиток; за минулий рік хворіла 2 рази. Поглиблений медичний огляд виявив наявність карієсу середньої активності та міопії 4,5D. До якої групи здоров'я слід віднести цю дівчинку?

*** А) 3 група.**

В) 1 група.

С) 2 група.

Д) 4 група.

Е) 5 група.

180. У виробничих умовах реєструються високі рівні шуму та забруднення повітря робочої зони ангідридом сірки. Який вид шкідливої дії на організм можуть справляти ці чинники з даних умов?

*** А) Поєднану.**

В) Роздільну.

С) Комбіновану.

Д) Комплексну.

Е) Специфічну.

181. При проведенні дослідження вмісту радіонуклідів цезію-137, стронцію-90 у молоці та картоплі місцевого виробництва було виявлено перевищення тимчасово допустимого рівнів активності цезію-137 у молоці. Який із технологічних прийомів з метою зменшення вмісту радіонуклідів в молоці є найбільш ефективним?

*** А) Переробка молока на топлене масло.**

В) Пастеризація молока.

С) Переробка молока на м'який сир.

Д) Переробка молока на твердий сир.

Е) Переробка молока на сметану.

182. На автотранспортному підприємстві за останні п'ять років захворюваність на попереково-крижовий радикуліт зростає з 5,3 до 6,8 випадків на кожні 100 робітників. Одночасно на 1,2 дні зростає й середня тривалість випадку захворювання. Яка група факторів у даному разі найбільш ймовірно зумовила ці негативні тенденції?

*** А) Умови праці.**

- В) Рівень побуту.
- С) Рівень матеріальної забезпеченості.
- Д) Спадковість.
- Е) Умови та характер відпочинку.

183. Для захисту персоналу радіолокаційних станцій від короткохвильового випромінювання у приміщенні передбачені: екранування робочих місць екранами з просвинцьованого скла, використання комбінезону та окулярів, скорочений робочий день операторів. Які заходи ще треба впровадити?

*** А) Необхідне екранування робочих місць металевими сітками.**

- В) Необхідності в захисті від короткохвильового випромінювання немає.
- С) Всі засоби захисту відповідають гігієнічним вимогам.
- Д) Необхідне використання ізолюючого костюму.
- Е) Необхідне використання протигазу та рукавичок.

184. Для створення радіаційної безпеки медичного персоналу рентгенодіагностичного кабінету використані захисні засоби типу екранів: просвинцьоване скло на екрані рентгенкабінету, велика і мала пересувні захисні ширми, запона та захисні рукавиці з просвинцьованої гуми. Які ще засоби екранування необхідні?

*** А) Нагрудний фартух з просвинцьованого матеріалу.**

- В) Гумові чоботи з додатком свинцю.
- С) Обмеження тривалості робочого дня.
- Д) Дистанційне управління рентгенапаратом.
- Е) Вказаних заходів досить.

185. В гальванічному цеху машинобудівного заводу, де працюють жінки, має місце ручне періодичне (до 2 раз за годину) переміщення оброблених деталей. Яку граничну норму підймання і переміщення вантажу жінками слід рекомендувати адміністрації згідно нормативів, затверджених МОЗ України?

*** А) 10 кг**

В) 20 кг

С) 15 кг

Д) 7 кг

Е) 5 кг

186. За даними звіту про роботу поліклініки одержані дані про структуру захворюваності, розподіл захворювань за класами хвороб, питому вагу та рівні окремих захворювань, а також про зниження загальної захворюваності на 5 \%. Які з наведених показників є інтенсивними?

*** А) Рівні окремих захворювань.**

В) Розподіл захворювань за класами хвороб.

С) Зниження загальної захворюваності на 5 \%.

Д) Питома вага окремих захворювань.

Е) Структура захворюваності.

187. У радіологічному відділенні для внутрішньопорожнинної терапії використовується гама-установки типа “Агат”, джерелом ізотоп кобальту, який знаходиться в стальній ампулі. Який з перелічених способів захисту персоналу від впливу іонізуючого випромінювання необхідно використовувати в першу чергу з урахуванням типу джерела?

*** А) Екранування джерела та робочого місця.**

В) Герметизація установки.

С) Заходи планувального характеру (зонування приміщення).

Д) Устаткування приміщень ефективною вентиляцією.

Е) Використання засобів індивідуального захисту та санітарна обробка персоналу.

188. При поступлении в детское дошкольное учреждение врач установил у 20 \% детей затянувшуюся адаптацию. Какой из показателей у этих детей нормализуется в первую очередь?

*** А) Аппетит**

- В) Сон
- С) Эмоциональное состояние
- Д) Секреция иммуноглобулина
- Е) Речевая активность

189. Случай пищевого бактериального отравления имел место 20 июля в семье одного служащего после употребления жареных котлет из телятины. Теленок неделю болел и был вынужденно забит без ведома ветеринарного надзора. Основные симптомы заболевания: инкубационный период 12-16 часов, высокая температура, сильные боли в области живота, рвота, частый жидкий стул, общая слабость, головная боль. Наиболее вероятный возбудитель данного отравления:

*** А) Сальмонеллы**

- В) Энтеротоксигенные стафилококки
- С) Патогенные серотипы E. coli
- Д) Cl. botulinum
- Е) Бактерии рода Proteus

190. В воздухе рабочей зоны литейщика присутствует аэрозоль конденсации с размером пылевых частиц 2 нм (90 \%), 2-5 нм (2 \%), свыше 5 нм (6 \%), до 2 нм (около 2 \%). Охарактеризуйте дисперсность пыли.

*** А) Мелкодисперсная**

- В) Среднедисперсная
- С) Крупнодисперсная
- Д) Ультрамелкодисперсная
- Е) Туман

191. Содержание пыли в воздухе рабочей зоны при бурении скважины в гранитном карьере превышает ПДК в 6-10 раз. Бурильщик (стаж работы 10 лет) жалуется на одышку при нагрузке, боль и чувство стеснения груди, кашель; рентгенологически - усиление диффузного процесса в паренхиме легких.

Указанные признаки характерны для пыли, обладающей действием:

*** А) Фиброгенным**

В) Аллергенным

С) Раздражающим

Д) Остронаправленным

Е) Канцерогенным

192. Рабочий N занят литьем цветных металлов и сплавов на протяжении 12 лет. В воздухе рабочей зоны регистрируется повышенное содержание тяжелых металлов, оксидов углерода и азота. При проведении периодического медицинского осмотра у него отмечен астено-вегетативный синдром, резкие боли в животе, запоры, боль в области печени. В моче - аминолевулиновая кислота и копропорфирин. Со стороны крови - ретикулоцитоз, снижение уровня гемоглобина. Причиной этой интоксикации является

*** А) Свинец и его соли**

В) Олово

С) Оксид углерода

Д) Оксид азота

Е) Цинк

193. В приемное отделение местной больницы в мае месяце поступило 2-е детей из одной семьи в возрасте 4-х и 6-и лет с жалобами на тошноту, першение в горле, рвоту, частый жидкий стул. Заболевание началось вскоре после употребления картофеля, сваренного в кожуре. При осмотре картофеля, употребляемого в пищу семьей, обнаружено много проросших и позеленевших клубней. Наиболее вероятный причинный фактор отравления:

*** А) Соланин**

В) Фазин

С) Амигдалин

Д) Фагин

Е) Синильная кислота

194. При дослідженні свинини у 24 зрізах на компресоріумі виявлені 2 трихіNELI. М'ясо необхідно піддати

*** А) Технічній утилізації**

В) Проварюванню дрібними шматками

С) Глибокому заморожуванню

Д) Переробці на ковбасні вироби

Е) Реалізації через мережу громадського харчування

195. При огляді цеховим лікарем робітників доменного цеху, що мають тривалий стаж, відзначені випадки захворювання первинною катарактою. Що з'явилося причиною її виникнення?

*** А) Інфрачервоне випромінювання**

В) Високий рівень шуму

С) Високий рівень вібрації

Д) Ультрафіолетове випромінювання

Е) Електромагнітне випромінювання видимого спектра

196. В одному з виробничих приміщень параметри мікроклімату не відповідають гігієнічним вимогам :найбільш ефективним засобом його нормалізації є:

*** А) Оснащення кондиціонерами**

- В) Оснащення приміщення потужною витяжною вентиляцією
- С) Оснащення ефективною припливною вентиляцією
- Д) Оснащення ефективною припливно-витяжною вентиляцією
- Е) Оснащення входних дверей приміщення повітряно-тепловою завісою

197. У одного з учнів восьмого класу ї лікар встановив наявність гіпертрофії міндалін III ступеню, хронічний риніт та вегетосудинну дістонію. . За станом здоров'я цей учень відноситься до наступної групи здоров я:

*** А) IV**

- В) I
- С) II
- Д) III
- Е) V

198. Дівчинка 10 років має середні показники довжини тіла та окружність грудної клітки вище середніх величин ,показник ваги тіла збільшений за рахунок жировідкладення. Функціональні ознаки фізичного розвитку нижче середнього. Фізичний розвиток цієї дитини можна комплексно оцінити як:

*** А) Дісгармонічний**

- В) Середній
- С) Нижче середнього
- Д) Гармонічний
- Е) Різко дісгармонічний

199. У промисловому центрі з розвинутою металургійною промисловістю у атмосферне повітря потрапляють пильові частинки оксидів металів, які входять до складу димових викидів від плавильних печей. Такі пильові частинки відносяться до:

*** А) Аерозолів конденсації**

- В) Аерозолів дезінтеграції
- С) Рідких аерозолів
- Д) Аерозолів возгонки
- Е) Аерозолів суміші

200. Робітники гранітного кар'єру працюють в умовах високих рівнів пилу, що сприяє виникненню силікозу, причиною якого є наявність в пилу:

*** А) Діоксиду кремнію**

- В) Оксиду алюмінію
- С) Оксиду вуглецю
- Д) Оксидів азоту
- Е) Диоксиду сірки

201. Характер розселення, проживання, виробничої діяльності сільського населення тощо призводять до певних особливостей організації їм медичної допомоги. Назвіть основну особливість.

*** А) Етапність надання медичної допомоги.**

- В) Сезонність надання медичної допомоги.
- С) Значна питома вага долікарської допомоги.
- Д) Дільнично-територіальний принцип організації допомоги.
- Е) Наявність пересувних форм надання допомоги.

202. При изучении расписания уроков 6- го класса общеобразовательной школы установлено: количество уроков в течение недели- 34, продолжительность перемен по 10 мин., после 2- го урока- 20 мин. Во Вторник 1-й урок- история, 2-й - русский язык, 3-й- физкультура, 4-й- литература, 5-й- биология, 6-й- рисование. Какой основной недостаток в организации учебного процесса имеет место ?

*** А) Количество уроков в расписании занятий**

- В) Продолжительность перемен
- С) Место урока физкультуры в расписании
- Д) Место урока истории в расписании
- Е) Место урока биологии в расписании

203. Рабочий литейного цеха электромеханического завода обратился с жалобами на боли в грудной клетке постоянного характера, одышку при физической нагрузке, кашель. Рентгенологически обнаруживаются узловые образования в легких, четкие, но с неровными контурами, периодически отмечается гипертермия . Какой диагноз наиболее вероятен ?

*** А) Силикоз**

- В) Двухсторонний хронический бронхит
- С) Доброкачественные новообразования
- Д) Злокачественные новообразования
- Е) Литейная лихорадка

204. Из собранных в лесу грибов приготовлено блюдо ,после потребления которого ночью у пациента отмечается рвота, понос, жажда, судороги в икроножных мышцах, присоединилась боль в области печени, желтуха, сонливость. При явлении сердечной недостаточности наступила смерть. Определите гриб,явившийся наиболее вероятной причиной летального исхода.

*** А) Бледная поганка**

- В) Шампиньон
- С) Мухомор
- Д) Ложные опята
- Е) Сморчки

205. В строящемся хирургическом отделении на 60 коек планируются две операционных площадью 10 и 20 м². Окна их ориентированы на северные румбы. Световой коэффициент 1:2, КЕО 2,5%. Какие параметры не соответствуют гигиеническим нормам

*** А) Площадь операционных**

- В) Количество операционных
- С) Ориентация окон
- Д) Световой коэффициент
- Е) КЕО

206. Площадь четырехкоечной палаты в терапевтическом отделении больницы составляет 28 м². Соответствует ли это гигиеническим требованиям?

*** А) Соответствует**

- В) Не соответствует
- С) Соответствует только для городских больниц
- Д) Соответствует только для сельских больниц
- Е) Соответствует только для больниц с централизованной системой застройки

207. У зв'язку з нерегулярним харчуванням, пацієнт скаржиться на зниження працездатності, різке відчуття голоду та втоми, періодичні головні болі. Який інтервал між прийомами їжі йому повинен порекомендувати лікар?

*** А) 4-5 год.**

В) 5-6 год.

С) 6-7 год.

Д) 7-8 год.

Е) 8-9 год.

208. У місті К. виник спалах харчового отруєння з клінічною картиною харчової токсикоінфекції. На наявність якого чинника необхідно провести лабораторний аналіз відібраних продуктів харчування для підтвердження діагнозу?

*** А) Мікробна контамінація.**

В) Екзотоксин.

С) Афлатоксин.

Д) Соланін.

Е) Мускарин.

209. На підприємстві громадського харчування не реалізовану під час вечері продукцію охолоджено до 4 0С і вона зберігалась у холодильній камері протягом 12 год. Зранку була проведена вторинна теплова обробка. Протягом якого часу повинна бути реалізована дана їжа?

*** А) 1 год.**

В) -3 год.

С) -5 год.

Д) -8 год.

Е) 12 год.

210. Для отримання інформації про чисельність і склад населення проводиться перепис населення. Який це вид та метод дослідження?

*** А) суцільне одномоментне**

В) вибіркове одномоментне

С) суцільне поточне

Д) вибіркове поточне

Е) основного масиву

211. Концентрація альбуміну (г/л) в сироватці крові 10 жінок, що були включені в одне обстеження, склала: 42, 41, 44, 47, 38, 40, 35, 38, 43, 41. Які із статистичних величин або показників узагальнюють ці дані?

*** А) середні**

В) екстенсивний

С) інтенсивний

Д) наочності

Е) динамічного ряду

212. В результаті впровадження нової методики середня тривалість лікування в експериментальній групі хворих склала $12,3 \pm 0,2$ дні порівняно із $15,4 \pm 0,4$ дні в контрольній групі хворих, яких лікували за старою схемою. Обчисленням якого коефіцієнта (критерія) можна оцінити суттєвість різниці цих результатів?

*** А) коефіцієнт вірогідності (t - критерій Стьюдента)**

В) критерій знаків (z - критерій)

С) критерій відповідності (хи-квадрат)

Д) T - критерій Вілкоксона

Е) критерій Колмогорова-Смирнова

213. Працівникові, який знаходиться на диспансерному спостереженні з приводу виразкової хвороби 12-палої кишки, на підприємстві виділили пільгову путівку для санаторно-курортного лікування на 24 дні. Тривалість щорічної основної відпустки працівника складає 24 календарних дні, на проїзд до санаторію і назад необхідно витратити 4 дні. Який порядок оформлення тимчасової непрацездатності в цьому випадку?

- * А) через ЛКК оформляється листок непрацездатності на 4 дні**
- В) через ЛКК оформляється листок непрацездатності на 28 днів
- С) лікуючий лікар видає листок непрацездатності на 4 дні
- Д) лікуючий лікар видає довідку і “Санаторно-курортну карту” на 28 днів
- Е) через ЛКК видається довідка на 4 дні

214. Гр. Н. по дорозі на роботу посковзнувся і підвернув ногу. При звертанні за медичною допомогою було діагностовано розрив зв'язок правого гомілково-ступеневого суглобу. Лікувався амбулаторно 18 днів. Як оформити непрацездатність в цьому випадку?

- * А) видається листок непрацездатності з першого дня на весь період**
- В) видається на 5 днів довідка, з 6-го дня – листок непрацездатності
- С) видається на 10 днів довідка, з 11 дня – листок непрацездатності
- Д) видається листок непрацездатності на 6 днів
- Е) видається листок непрацездатності на 14 днів

215. У працівниці захворіла на вітряну віспу 5-річна дитина. Хвороба тривала 17 днів. Лікування здійснювалось амбулаторно під доглядом матері дитини. Як оформити непрацездатність працівниці в даному випадку?

- * А) видається листок непрацездатності максимально на 14 днів, на решту 3 дні - довідка**
- В) видається листок непрацездатності на весь час хвороби дитини
- С) видається на 5 днів довідка, з 6-го дня – листок непрацездатності
- Д) видається довідка на весь час хвороби дитини
- Е) видається листок непрацездатності максимально на 7 днів, на решту 10 днів - довідка

216. На першому прийомі вагітної акушер-гінеколог дає їй направлення на обов'язкову консультацію до інших лікарів. До кого було скеровано жінку?

*** А) Терапевта, стоматолога.**

- В) Терапевта, хірурга
- С) Стоматолога, хірурга
- Д) Хірурга, окуліста.
- Е) Терапевта, окуліста

217. В терапевтичному відділенні стаціонару знаходилось на лікуванні 500 хворих, 400 із них працюють. Перед випискою із стаціонару працюючим видавались листки непрацездатності. Хто має право підписувати листки непрацездатності?

*** А) Лікуючий лікар, завідувач відділення**

- В) Завідувач відділення, заступник головного лікаря по медичній частині
- С) Головний лікар, лікуючий лікар
- Д) Головний лікар, завідувач відділення
- Е) Завідувач відділення, заступник головного лікаря по медичній частині

218. У населеному пункті, в якому переважають північні та північно-західні вітри (70 \% днів упродовж року), а південні вітри майже відсутні, обирається земельна ділянка під будівництво цементного комбінату II класу шкідливості, який за проектною документацією забруднюватиме атмосферне повітря пилом. З якого боку від населеного пункту найдоцільніше розташувати підприємство?

*** А) Південно- східного.**

- В) Східного.
- С) Західного.
- Д) Північно-західного.
- Е) Північного.

219. Дитячий дошкільний заклад знаходиться поблизу автомагістралі, вміст монооксиду вуглецю в повітрі якої перевищує ГДК у 3-4 рази. Що потрібно визначити у крові дітей з метою виявлення шкідливого впливу забруднення повітря?

*** А) Карбоксигемоглобін.**

В) Карбгемоглобін.

С) Метгемоглобін.

Д) Гемоглобін.

Е) Редукований гемоглобін.

220. Промислове підприємство забруднює атмосферне повітря населеного пункту сірчистим ангідридом. Якого негативного впливу на населення слід передусім очікувати?

*** А) Подразнювального.**

В) Канцерогенного.

С) Гепатотоксичного.

Д) Нефротоксичного.

Е) Фіброгенного.

221. На земельній ділянці лікарні 25\% площі зайнято будівлями, 60 \% - зеленими насадженнями і 15\% припадає на господарський двір і проїзди. В який спосіб необхідно покращати планування лікарняної ділянки?

*** А) Зменшити відсоток забудови.**

В) Зменшити відсоток озеленення.

С) Збільшити відсоток забудови.

Д) Збільшити відсоток озеленення.

Е) Зменшити відсоток що припадає на господарський двір і проїзди.

222. Бактеріологічна лабораторія обласної клінічної лікарні проводить щомісячний контроль якості достерилізаційної обробки та стерилізації інструментарію, застосовуючи зокрема проби з тест-індикаторами. Що контролюють за допомогою цих проб?

*** А) Температуру в автоклаві.**

- В) Загальне мікробне обсіменіння.
- С) Залишки крові.
- Д) Залишки мийного засобу.
- Е) Тиск в автоклаві.

223. Повний бокс інфекційного відділення має площу 22 м². На яку максимальну кількість ліжок він може бути розрахований ?

*** А) 1.**

- В) 2.
- С) 3.
- Д) 4.
- Е) 5.

224. У маніпуляційній світловий коефіцієнт, кут падіння світлових променів на робоче місце медсестри і кут отвору відповідають гігієнічним нормам, а коефіцієнт природної освітленості взимку недостатній. Що може бути основною причиною невідповідності між визначеними показниками природної освітленості ?

*** А) Вкриті памороззю вікна.**

- В) Недостатня площа вікон.
- С) Велика відстань робочого місця від вікна.
- Д) Затінення вікон протилежними будинками.
- Е) Велика площа маніпуляційної.

225. Акушерське відділення розташоване у триповерховій будівлі. Перший поверх займає обсерваційне відділення, другий – відділення фізіології вагітності, третій – відділення патології вагітності. Всі поверхи сполучаються каналами витяжної вентиляції. Якого перепланування вимагає акушерське відділення ?

*** А) Розташувати відділення патології вагітності на першому поверсі.**

- В) Розташування обсерваційного відділення на другому поверсі.
- С) Розташування відділення фізіології вагітності на третьому поверсі .
- Д) Усунення відділення патології вагітності.
- Е) Усунення обсерваційного відділення.

226. Електрозварник, 38 років, виписаний з клініки профзахворювань з діагнозом пиловий бронхіт 1 ст., фаза затихаючого загострення, ЛН 1 ст. і рекомендовано продовжити амбулаторне лікування з раціональним працевлаштуванням і видачею “профбюлетеня”. Хто має право оформити “профбюлетень”?

*** А) Лікарсько-консультативна комісія**

- В) Цеховий терапевт
- С) Районний профпатолог
- Д) Головний лікар МСЧ
- Е) Медико-соціальна експертна комісія

227. Хвора 32 років перенесла гостре професійне отруєння сірковуглецем. Протягом 5 років працює прядильницею на заводі штучного волокна. Із клініки профпатології виписана з значним покращенням. Яке експертне рішення щодо її працездатності слід прийняти?

*** А) Продовжити лікування в амбулаторних умовах з видачею профбюлетеня**

- В) Може продовжувати роботу в своїй професії
- С) Видати листок непрацездатності для продовження амбулаторного лікування
- Д) Направити на МСЕК для визначення \% втрати професійної працездатності
- Е) Направити на МСЕК для визначення групи інвалідності

228. Відомо, що основними завданнями медико-соціальних експертних комісій (МСЕК) є виявлення причин, встановлення груп інвалідності, надання трудових рекомендацій інвалідам. Яке завдання покладається на МСЕК, пов'язане з експертизою тимчасової втрати працездатності?

*** А) Санкціонування продовження листка непрацездатності для завершення лікування.**

- В) Виявлення та встановлення групи інвалідності.
- С) Трудові рекомендації.
- Д) Встановлення права на отримання соціальної допомоги.
- Е) Продовження листка непрацездатності.

229. Мікроклімат відповідного приміщення характеризується наступними його параметрами: температура повітря - 40°C; відносна вологість - 70\%; швидкість руху повітря - 0,1 м/с; радіаційна температура - 80-90°C. Позначте найбільш вірогідний патологічний стан організму, що може виникнути в даних мікрокліматичних умовах:

*** А) загальна гіпертермія (тепловий удар)**

- В) Зниження працездатності
- С) Зрушення фізіологічного стану в системі кровообігу
- Д) Зрушення фізіологічного стану з боку дихальної системи
- Е) Місцева гіпертермія

230. Для визначення впливу мікроклімату на функціональний стан організму досліджувались наступні фізіологічні показники напруження функцій органів і систем, які приймають участь в теплообмінних процесах: пульс, АТ, кількість дихань за хвилину, температура шкіри, величина потовиділення за хвилину, швидкість зорової та слухової реакцій. Назвіть показник, що найбільш об'єктивно відображає напруження процесів терморегуляції організму:

*** А) температура шкіри**

В) Пульс і АТ

С) Кількість дихальних актів за хвилину

Д) Потовиділення за хвилину

Е) Швидкість зорової та слухової реакції

231. Кратність перевищення ГДК токсичної речовини в атмосферному повітрі складає 100. Які зміни в стані здоров(я населення слід очікувати ?

*** А) гострі отруєння**

В) Виражені фізіологічні зрушення в органах та системах

С) Зростання специфічної та неспецифічної захворюваності

Д) Зміни у стані здоров(я по окремим функціональним показникам

Е) Смертельні отруєння серед дітей

232. Рівень шуму на робочому місці становить 121 дБа. Який психофізіологічний ефект є найбільш можливим у працюючих ?

*** А) ризик отримання акустичної травми**

В) Подразнююча дія

С) Втрата слуху

Д) Галопуючий перебіг хронічних захворювань

Е) Ризик підвищення виробничого травматизму

233. Військовий підрозділ після тривалого маршу зупинився на 3 доби для відпочинку поряд з населеним пунктом. За даними санітарно-епідеміологічної розвідки виявлено декілька джерел води. Необхідно вибрати джерело, яке найбільше відповідало б гігієнічним вимогам до питної води в польових умовах.

*** А) вода артезіанських свердловин**

В) Вода джерельна

С) Вода з річки

Д) Дощова вода

Е) Тала вода

234. На північній околиці населеного пункту розташований хімічний комбінат. Протягом року спостерігається така повторюваність вітрів: північний — 10 %, , східний — 20 %, , південний — 50%, , західний — 20 %, , . Назвіть найбільш оптимальне місце для розміщення земельної ділянки стаціонару медико-санітарної частини

*** А) На південь від хімічного комбінату**

В) На північ від хімічного комбінату

С) На схід від хімічного комбінату

Д) На захід від хімічного комбінату

Е) На території хімічного комбінату

235. При аналізі свіжості молока проводять пробу на редуктазу, на здатність зсідання. На основі якого з наведених показників можна ще встановити свіжість молока?

*** А) Кислотність.**

В) Густина

С) Сухий залишок

Д) Жирність

Е) Вміст сторонніх домішок

236. Дитячі ясла-сади проектується як в одному, так і декількох одно-двоповерхових будівлях, з'єднаних між собою закритими переходами. Виберіть, який з наведених принципів є основою планування будівлі дитячого дошкільного закладу?

*** А) Принцип групової ізоляції**

- В) Принцип незалежності
- С) Принцип вікового розподілу
- Д) Принцип статевого розподілу
- Е) Принцип статево-вікового розподілу

237. В кузнечно-прессовом цехе машиностроительного завода эквивалентный уровень звука превышает ПДУ на 12 дБА (II ст. вредности и опасности), температура воздуха превышает ПДВ на 6°C (II ст. вредности и опасности), содержание оксида углерода и оксида железа превышает ПДК в 1,5 раза (I ст. вредности и опасности). Дайте комплексную оценку условий и характера труда.

*** А) Вредные и опасные II степени**

- В) Вредные и опасные I степени
- С) Вредные и опасные III степени
- Д) Экстремальные
- Е) Допустимые

238. На рабочем месте сталевара санитарно гигиеническими исследованиями выявлено 4 химических производственных фактора I степени вредности и опасности, 2 психофизиологических II степени, 1 физический фактор III степени. Дайте комплексную оценку условий и характера труда.

*** А) Вредные и опасные III степени**

- В) Вредные и опасные I степени
- С) Вредные и опасные II степени
- Д) Экстремальные
- Е) Допустимые

239. Под влиянием производственной нагрузки горнорабочих отмечается стойкое снижение работоспособности, признаки заболеваний отсутствуют. Оцените условия и характер труда.

*** А) Вредные и опасные**

- В) Оптимальные
- С) Допустимые
- Д) Экстремальные
- Е) Недопустимые

240. При анализе результатов углубленных медицинских осмотров учащихся ПТУ выявлено, что распространенность патологии опорно-двигательного аппарата составляет 36,4 сл/100, нервной системы и органов чувств - 22,9 сл/100, сердечно-сосудистой системы - 11,6 сл/100, органов пищеварения - 9,8 сл/100. Какой фактор риска преобладает?

*** А) Неправильная рабочая поза**

- В) Нерациональное питание
- С) Чрезмерная двигательная активность
- Д) Неблагоприятные микроклиматические условия
- Е) Нерациональное расписание занятий

241. Рабочее место корректора типографии оборудовано письменным столом и креслом с регулируемыми параметрами сиденья и спинки. Рабочий день 8 часов. Уровень загрузки рабочего дня 96%. Развитие какой профессиональной патологии возможно у корректора ?

*** А) Миопия**

- В) Остеохондроз
- С) Координаторный невроз
- Д) Варикозное расширение вен
- Е) Ишемическая болезнь сердца

242. Рабочие-металлурги подвергаются воздействию нагревающего микроклимата. Какой вид тепловой профессиональной патологии можно прогнозировать у рабочих?

*** А) Перегрев**

- В) Термический ожог
- С) Катаракта
- Д) Облитерирующий эндартериит
- Е) Электроофтальмия

243. На химическом заводе произошло острое групповое отравление оксидами азота со смертельным исходом. Для расследования этого случая создана комиссия я. Кто должен возглавить комиссию по расследованию?

*** А) Представитель государственного надзора за охраной труда**

- В) Специалист по профпатологии органа управления здравоохранением
- С) Главный врач санитарно-эпидемиологической станции
- Д) Собственник (руководитель предприятия)
- Е) Представитель профсоюзной организации

244. Рабочие участка фасовки гормональных препаратов фармацевтического завода предъявляют жалобы на головную боль, слезотечение, першение в горле, кожный зуд, покраснение участков кожи на лице, шее, предплечьях, тошноту, общий дискомфорт. Какое действие характерно при таких жалобах)?

*** А) Аллергическое**

- В) Специфическое
- С) Токсическое
- Д) Раздражающее
- Е) Канцерогенное

245. Городская соматическая больница на 300 коек состоит из главного корпуса, в котором размещены терапевтическое и хирургическое отделения. В нескольких отдельных зданиях расположены родильное, детское и радиологическое отделения, соединенных с главным корпусом подземными и наземными крытыми переходами. Определите систему застройки больницы.

*** А) Централизованно-блочная**

- В) Централизованная
- С) Децентрализованная
- Д) Свободная
- Е) Смешанная

246. При аналізі режиму харчування студентів у санаторії-профілакторії виявлено, що калорійність сніданку складає 40% добового калоражу, обіду- 40% та вечері-20% добового калоражу відповідно. Що необхідно зробити для гігієнічної оптимізації режиму харчування студентів з переліку нижченаведеного?

*** А) Знизити калорійність сніданку**

- В) Знизити калорійність вечері
- С) Знизити калорійність обіду
- Д) Підвищити калорійність вечері
- Е) Підвищити калорійність сніданку

247. У жителей рабочего поселка, расположенного рядом с промышленным предприятием, участились случаи заболевания нервной и эндокринной систем, почек. В крови - снижение уровня сульфгидрильных групп. Причиной возникших патологий могло стать попадание в окружающую среду:

*** А) Ртуті**

- В) Кадмія
- С) Бора
- Д) Хрома
- Е) Свинца

248. Джерелом централізованого господарчо-питного водопостачання населеного пункту є міжпластовий захищений напірний водоносний горизонт. Вода з підвищеною мінералізацією (до 1,5 г/дм³, норма - 1,0 г/дм³) та вмістом хлоридів (700 мг/дм³, ГДК - 350 мг/дм³). Яка патологія може розвинути у населення при споживанні цієї води?

*** А) Гіпертонічна хвороба.**

- В) Нефрози.
- С) Ентероколіти.
- Д) Гастрити.
- Е) Жовчокам'яна хвороба.

249. Хворий знаходиться на стаціонарному лікуванні з діагнозом гострий холецистит. Харчується нерегулярно, віддає перевагу жирній та вуглеводистій їжі, вживає гострі приправи. Які з перелічених страв забороняється вживат хворому?

*** А) Макаронні вироби, боби.**

- В) Слизові і протерті супи.
- С) Омлет білковий паровий.
- Д) Солодкі фруктові соки.
- Е) Суфле із нежирних видів риби.

250. У місті для поліпшення якості питної води використовували методи очищення та знезаражування, . Який з наведених методів може використовуватись для знезаражування води на сучасних водогонах?

*** А) Озонування.**

- В) Коагуляція.
- С) Фільтрація.
- Д) Кіп'ятіння.
- Е) Дезактивація.

251. В повітря робочої зони авторемонтного заводу виділяються шкідливі речовини, які характеризуються ефектом однонаправленої дії: оксид вуглецю концентрації 10 мг/м³ (ГДК - 20 мг/м³) та діоксиду азоту в концентрації 1,0 мг/м³ (ГДК - 2 мг/м³). Оцініть рівень забруднення повітря робочої зони з урахуванням можливого ефекту сумації.

*** А) Не перевищує.**

В) Перевищує в 1,2 рази.

С) Перевищує в 2,2 рази.

Д) Перевищує в 1,4 рази.

Е) Перевищує в 2,5 рази.

252. Під час лабораторної діагностики груповогоспалаху ботулізму в місті у залишках продукту та біологічному матеріалі від хворих виявлено ботулотоксин типу Е. Приготування яких продуктів проведено з порушенням технологічних схем та режимів найбільш можливе?

*** А) Риба та рибопродукти.**

В) М'ясо та м'ясні продукти.

С) Продукти рослинного походження.

Д) Птиця та птицепродукти.

Е) Кондитерські вироби.

253. Серед дітей дитячого садка села вихователі помітили у багатьох розлади шлунково-кишкового тракту з частими проносами. При хімічному аналізі питної води виявлено (в мг/дм³): азоту амонійного - сліди, азоту нітритів - 0,002, азоту нітратів - 10, сульфатів - 900, заліза - 0,3, хлоридів - 240. Що свідчить про можливий вплив питної води на здоров'я дітей?

*** А) Вміст сульфатів у воді.**

В) Вміст азоту нітритів у воді.

С) Вміст азоту амонійного у воді.

Д) Вміст хлоридів у воді.

Е) Вміст азоту нітратів.

254. В прокатному цеху напруженість інфрачервоного випромінювання 2300 Вт/м². Робота важка (95 Вт). При дослідженні мікроклімату в теплий період року на робочих місцях отримані такі результати: температура повітря 35°C, відносна вологість 82%, швидкість руху повітря 0,08 м/с. Вентиляція відсутня. Які порушення в організмі робітників можливі в першу чергу в цих умовах?

*** А) Тепловий удар**

В) Гіпергідроз

С) Нефропатія

Д) Амнезія,

Е) Діарея

255. Хворий знаходиться на стаціонарному лікуванні з діагнозом гострий панкреатит. На третій день після скасування режиму голоду лікар дозволив хворому вживання:

*** А) Відвару шипшини**

В) Бульону з м'яса курки

С) М'ясні котлети

Д) Молоко парне

Е) Виноградний сік

256. У водія при клінічному обстеженні у сечі виявлено підвищений вміст кальцієвих солей фосфорної кислоти. До його раціону харчування входять житній та пшеничний хліб, макаронні вироби, вершкове масло, олія, картопляне пюре, молоко, сир, кава, чай, відвар шипшини, кисіль зі смородини. Енергоцінність раціону відповідає енерговитратам. Що потрібно обмежити у раціоні?

*** А) Молоко і сир**

В) Кисіль зі смородини

С) Макаронні вироби і хліб

Д) Відвар шипшини і кисіль

Е) Каву та чай

257. Жінка 60 років з нормальною масою тіла отримує з добовим раціоном 50 г білка, 70 г жиру, 300 г вуглеводів. У раціоні переважають зерно-бобові, достатньо овочів, але обмежена кількість молока і молочних продуктів, весною щоденно вживає щавель і ревінь. Ризиком якого захворювання для жінки у першу чергу може бути такий раціон?

*** А) Остеопорозу**

- В) Атеросклерозу
- С) Ожиріння
- Д) Гіпертонічної хвороби
- Е) Сечокам'яної хвороби

258. У шостому класі у четвер перший урок географія, а п'ятий - математика. Всього є 30 уроків за тиждень. перерви між уроками по 10 хв., після другого уроку - 30 хв. Яке порушення має місце у розкладі уроків?

*** А) Місце уроку математики у розкладі**

- В) Місце уроку географії у розкладі
- С) Число уроків протягом дня
- Д) Число уроків протягом тижня
- Е) Тривалість перерв

259. В дитячому дошкільному закладі проведено аналіз добового набору продуктів. Встановлено, що в склад меню входять: молоко, масло вершкове, м'ясо, гриби, риба. Який з перелічених продуктів необхідно вилучити з меню дитячого дошкільного закладу?

*** А) Гриби**

- В) Лимонну кислоту
- С) М'ясо
- Д) Масло вершкове
- Е) Молоко

260. Критеріями чого є наступний комплекс ознак: розміри тіла та органів, маса, осифікація скелету, прорізування зубів, розвиток залоз внутрішньої секреції, ступінь статевого розвитку?

*** А) Біологічного віку.**

- В) Харчового статусу.
- С) Генетичного розвитку.
- Д) Психічного розвитку.
- Е) Статевого розвитку.

261. При дефіциті якого вітаміну мають місце виснаження, швидка втома, скарги на поганий апетит, закреп, поліневрит, які спостерігаються при використанні в їжу тільки вищих сортів пшеничного хліба, макаронних виробів, цукру-рафінаду, полірованого рису, тощо?

*** А) Тіаміну**

- В) Рібофлавіну
- С) Ретінола ацетату
- Д) Кальциферолів
- Е) Нікотінової кислоти

262. Наявністю яких збудників в значних кількостях в харчових продуктах можуть бути викликані харчові токсикоінфекції?

*** А) Протей.**

- В) Стафілококів.
- С) Холерних вібріонів.
- Д) Збудників ботулізму.
- Е) Збудників дизентерії.

263. При санітарному обстеженні опікового відділення для дорослих було встановлено, що палати на 4 ліжка мають площу 28 м². Яка мінімальна площа палат повинна бути у цьому відділенні?

*** А) 40 м²**

В) 24 м²

С) 28 м²

Д) 30 м²

Е) 52 м²

264. До приймального відділення районної лікарні поступив малюк 5-ти років з симптомами: сильне пото- та слиновиділення, слъозотеча, профузний пронос, мозкові явища, запаморочення, сплутаність свідомості, збудливість, марення, галюцинації, хода сп'янілої людини. Встановлено, що малюк разом з батьками напередодні збирав гриби у лісі. Споживання яких грибів чи рослин викликало харчове отруєння?

*** А) Мухоморів**

В) Строчків

С) Несправжніх опеньок

Д) Беладони

Е) Блідої поганки

265. Через 1 годину після годування немовляти молочною сумішшю у дитини виникли наступні симптоми захворювання: ціаноз губ, слизових оболонок, нігтів, обличчя, потім приєдналася нудота, посилене слиновиділення, біль у надчеревній ділянці, блювання, пронос. Педіатр відмітив у дитини явища легенево-серцевої недостатності. В процесі розслідування встановлено, що молочна суміш приготовлена на воді, взятій із колодязя. Який попередній діагноз є підстави та установити лікарю?

*** А) Нітратно-нітритна інтоксикація**

- В) Харчова токсикоінфекція
- С) Стафілококовий токсикоз
- Д) Харчове отруєння хлорорганічними пестицидами
- Е) Харчове отруєння важкими металами

266. В результаті ветеринарного обстеження тварин та молочно-товарній фермі виявлено 20 корів з позитивною реакцією на туберкульоз. Дайте оцінку щодо можливості використання молока від таких тварин для харчування

*** А) Використовувати для харчування після пастеризації на місці при температурі 85°С протягом 30 хвилин**

- В) Використання для харчування без попередньої обробки, без обмежень
- С) Використання для годування телят
- Д) Технічна утилізація
- Е) Знищення

267. В бактеріальній лабораторії працюють з холерним вібрионом за умов дотримання всіх необхідних профілактичних заходів. До якого класу слід віднести умови праці лаборантів?

*** А) 4 клас – небезпечні**

- В) 3 клас – шкідливі
- С) 2 клас – допустимі
- Д) 1 клас – оптимальні
- Е) 5 клас – великі та напружені

268. У сталеварів, що працюють у приміщенні біля киснево-конверторного цеху, де діє потужний компресор, відмічаються астено-вегетативні порушення ознаки синдрому дихання, закладання та тиск в вухах, головний біль, тремор рук, відчуття загальної втоми. Які чинники виробничого середовища у першу чергу підлягають корекції для профілактики вказаних явищ?

*** А) Інфразвук**

- В) Електромагнітні поля
- С) Дискомфортний мікроклімат нагрівного типу
- Д) Пил
- Е) Підвищена загазованість повітря окисом вуглецю

269. Робітник цвяхового цеху 35 років, стаж у даному виробництві 10 років, працює в умовах високочастотного інтенсивного шуму. На черговому періодичному огляді виставлено діагноз: “Професійна тугоухість”. Що є підставою для такого діагнозу?

*** А) Дані аудіометрії та умов виробництва.**

- В) Стаж роботи у даному виробництві
- С) Характеристика шуму у даному виробництві
- Д) Результати дослідження показників ЦНС
- Е) Результати дослідження стану внутрішнього вуха

270. Проектом реконструкції центральної районної лікарні передбачається будівництво шкірно-венерологічного та онкологічного відділень. Яка система видалення відходів буде відповідати гігієнічним вимогам?

*** А) Збирання у герметичні ємкості з наступним спалюванням у спеціальній установці на території лікарні**

- В) Роздільний вивіз спеціальним транспортом на полігон побутових відходів
- С) Утилізація на сміттєспалювальному заводі
- Д) Попереднє знезаражування 5\% розчином хлорного вапна та поховання на полігоні побутових відходів (звалищі)
- Е) Сумісне видалення з загальнолікарняними твердими відходами

271. В результате углубленного медицинского осмотра курсантов военного училища у некоторых лиц выявлено нарушение зрения, конъюнктивит, сухость и шелушение кожи, пигментация и ломкость ногтей, ороговение кожи в области локтевых и коленных суставов. Для купирования подобных клинических проявлений в пищевом рационе, в первую очередь, следует увеличить содержание:

*** А) Моркови**

В) Гречневой крупы

С) Мяса

Д) Рыбы

Е) Отрубного хлеба

272. Проведенными исследованиями качества питьевой воды в городе установлено, что показатели органолептических свойств воды удовлетворительны, жесткость и фтор - не превышают, а нитраты и коли-титр - выше указанных величин в ГСанПиН "Вода питьевая". При употреблении указанной воды может быть:

*** А) Метгемоглобинемия**

В) Уролитиаз

С) Флюороз зубов

Д) Желчекаменная болезнь

Е) Неприятно пить

273. Изучали заболеваемость гинекологическими болезнями среди девочек СШ №10 по данным медицинского профилактического осмотра. Какой использован в данной ситуации вид профилактического осмотра?

*** А) целевой**

В) комплексный

С) плановый

Д) периодический

Е) предварительный

274. При подготовке и использовании формовочной смеси формовщики литейного цеха работают в условиях запыленности воздуха выше допустимой концентрации. Пыль, плохо растворимая в воде, мелко и среднедисперсная, электрозаряженная, обладает электропроводностью, полиморфная. Какие свойства пыли имеют решающее значение при возможном развитии пневмокониоза?

*** А) Дисперсность**

- В) Электрозаряженность
- С) Растворимость
- Д) Электропроводность
- Е) Форма пылинок

275. В рабочую зону шлифовальщика выделяется пыль. В цехе имеется общеобменная естественная и механическая вытяжная местная вентиляция. Рабочие используют респираторы для защиты органов дыхания, соблюдают режим труда и отдыха. Какие меры профилактики наиболее эффективно ограничивают попадание пыли в органы дыхания?

*** А) Местная вытяжная вентиляция**

- В) Общеобменная естественная вентиляция
- С) Общеобменная механическая вентиляция
- Д) Применение респираторов
- Е) Режим труда и отдыха

276. У рабочих литейного цеха металлургического завода, занятых преимущественно физическим трудом, периодически по окончании смены отмечаются судороги мышц плечевого пояса и икроножных мышц. Причиной развития судорог в этих условиях является:

*** А) Потеря жидкости путем потовыделения**

В) Потребление значительного количества жидкости

С) Значительное физическое напряжение

Д) Значительное нервно-эмоциональное напряжение

Е) Потеря жидкости с мочой

277. Студент проводить оцінку рівня шуму в цеху холодного штампування. За допомогою якого приладу він проводить це гігієнічне дослідження?

*** А) шумовібровимірювач**

В) Аналізатор спектру шуму

С) аудіотестер

Д) актинометр

Е) піранометр

278. На протязі тривалого часу проводиться вивчення тенденцій у змінах показників загальної смертності різних груп населення, які проживають на різних адміністративних територіях. Який із статистичних методів може бути використано з цією метою?

*** А) Аналіз динамічних рядів.**

В) Аналіз стандартизованих показників.

С) Кореляційно-регресивний аналіз.

Д) Оцінка вірогідності різниці показників.

Е) Аналіз рівнів відносних величин.

279. В палаті терапевтичного відділення необхідно провести аналіз рівня природного освітлення. Укажіть який прилад використовується для визначення рівня природного освітлення:

- * А) Люксметр**
- В) Анемометр
- С) Кататермометр
- Д) Актинометр
- Е) Психрометр

280. Під час проведення медичного обстеження учнів в школі проводили плантографію. Після аналізу відбитків стопи у 30 % учнів виявлена плоска стопа. Скільки відсотків складає перешеек плоскої стопи

- * А) 65 %**
- В) 30 %
- С) 50 %
- Д) 55 %
- Е) 45 %

281. Цеховий лікар формує для поглибленого спотереження групу осіб, що часто хворіють. При цьому він бере до уваги кількість етіологічно пов'язаних випадків захворювань з тимчасовою втратою працездатності протягом останнього року у кожного із робітників. Якою повинна бути ця кількість, щоб працівника віднесли до вказаної групи ?

- * А) 4 і більше**
- В) 1 і більше
- С) 2 і більше
- Д) 3 і більше
- Е) 6 і більше

282. Виробничі приміщення тепличного комбінату характеризуються такими параметрами мікроклімату: температура повітря 42оС, вологість - 98%, швидкість руху повітря - 0,05 м/с, температура огорожуючих поверхонь 15оС. Охарактеризуйте мікроклімат виробничих приміщень

*** А) перегрівний**

- В) комфортний
- С) охолоджуючий
- Д) дискомфортний
- Е) задовільний

283. При санітарно-ветеринарній експертизі коров'ячої туші було виявлено ураження фінами (2-3 фіни на 10 см²). Яка тактика відносно вживання м'яса?

*** А) Технічна утилізація всієї туші.**

- В) Дозволити реалізацію м'яса без обмежень.
- С) Використати тушу для виготовлення м'ясних консервів.
- Д) Знезараження шляхом проварювання.
- Е) Знезараження шляхом заморожування.

284. У хворого, працівника підприємства, ГРЗ ускладнилось гострим бронхітом. Лікується амбулаторно. Лікуючий лікар видав йому листок непрацездатності на 5 днів і продовжив ще на 5 днів. Стан здоров'я пацієнта такий, що не дозволяє йому приступити до роботи. Хто разом із лікуючим лікарем повинен продовжити листок непрацездатності цьому пацієнтові далі ?

*** А) завідувач відділення**

- В) головний лікар
- С) заступник головного лікаря з експертизи працездатності
- Д) заступник головного лікаря з медичної частини
- Е) лікарська консультативна комісія

285. За даними лабораторного контролю якості питної води з водогону отримані наступні результати: каламутність - 1,5 мг/м3, запах - 3 бали, присмак - металевий - 2 бали, колір - світло-жовтий, колірність - 20°, температура - 12 °С. Який з показників не відповідає гігієнічним вимогам?

*** А) Запах**

- В) Каламутність
- С) Колірність
- Д) Температура
- Е) Присмак

286. Робітник, що перебуває під диспансерним наглядом з приводу виразкової хвороби шлунку, звернувся в поточному році з загостренням даного захворювання в лютому, травні та вересні . Які статистично зареєструвати цей випадок?

*** А) Один статталон із знаком (-) при першому звертанні в поточному році.**

- В) Три статталони при кожному звертанні із знаком (-)
- С) Три талони амбулаторного пацієнта з кодом 2
- Д) Один талон амбулаторного пацієнта з кодом 2 і два талони із кодом 3
- Е) Один статталон при першому звертанні зі знаком (+) і два статталони із знаком (-)

287. При проведенні статистичного дослідження повноти звертань населення по медичну допомогу було опитано 300 мешканців району Д. Для збору інформації було розроблено спеціальну анкету. Який спосіб збору інформації використовувався дослідниками?

*** А) (Анамнестичний спосіб**

- В) Безпосередня реєстрація
- С) Безпосереднього огляду
- Д) Викопіювання
- Е) Безпосереднього огляду

288. У місті Н. з населенням 400000 чоловік в 2005 р. зареєстровано 5600 випадків смерті, в тому числі 3300 випадків від хвороби системи кровообігу, 730 випадків - від новоутворень. Який з нижче перелічених показників дозволить охарактеризувати питому вагу хвороб системи кровообігу серед всіх причин смерті в м.Н?

*** А) Екстенсивний показник**

- В) Інтенсивний показник
- С) Показник відносної інтенсивності
- Д) Показник наочності
- Е) Показник співвідношення

289. В районе N организуется сельская врачебная амбулатория. Врачи каких специальностей будут осуществлять прием больных.

*** А) Терапевт, стоматолог, педиатр, акушер- гинеколог**

- В) Терапевт, педиатр, невропатолог
- С) Педиатр, акушер-гинеколог, офтальмолог
- Д) Педиатр, терапевт, офтальмолог
- Е) Акушер-гинеколог, терапевт

290. На сільській лікарській дільниці померла дитина на першому місяці життя. З метою аналізу цієї ситуації серед іншого здійснили й експертну оцінку медичної документації. Записи в якому медичному документі оцінювались в першу чергу ?

*** А) Історія розвитку дитини**

- В) Історія розвитку новонародженого
- С) Карта профілактичних щеплень
- Д) Медична карта амбулаторного пацієнта
- Е) Медична карта дитини

291. Завідувач відділення стаціонару хоче провести експертну оцінку виконання лікарями-ординаторами медико-технологічних стандартів обслуговування пацієнтів. Яку документацію він повинен перевірити з цією метою?

- * А) Медичні карти стаціонарних хворих**
- В) Статистичні карти пацієнтів, що вибули із стаціонару
- С) Карти лікарських призначень
- Д) Журнал обліку оперативних втручань
- Е) Річний звіт лікувально-профілактичного закладу

292. Завідувач відділення жіночої консультації хоче провести експертну оцінку виконання лікарями медико-технологічних стандартів спостереження вагітних. Яку документацію він повинен перевірити з цією метою ?

- * А) Індивідуальні карти вагітних і породіль**
- В) Обмінні карти
- С) Медичні карти амбулаторних пацієнтів
- Д) Історії пологів
- Е) Історії розвитку новонароджених

293. На першому прийомі вагітної акушер-гінеколог дає їй направлення на консультацію до інших лікарів спеціалістів. У яких спеціалістів вона має обов'язково пройти огляд ?

- * А) Терапевта, стоматолога**
- В) Терапевта, ендокринолога
- С) Стоматолога, фтізіатра.
- Д) ЛОР-лікаря, окуліста
- Е) Стоматолога, кардіолога

294. Житель пунктового села, чоловік 50 років, після отриманої амбулаторно-поліклінічної допомоги в сільській лікарській амбулаторії з приводу пневмонії не одужав, хвороба ускладнилась ексудативним плевритом. В який заклад повинен бути скерований хворий сімейним лікарем для продовження надання допомоги?

*** А) Центральну районну лікарню**

В) Обласну лікарню

С) Фтизіо-пульмонологічний диспансер

Д) Міську лікарню

Е) Протитуберкульозний диспансер

295. На диспансерному обліку у терапевта поліклініки знаходиться чоловік, 59 років, хворий на гіпертонічну хворобу II ст. Хворий регулярно приймає інгібітори АПФ та антагоністи кальцію. З якою кратністю терапевт повинен оглядати хворого (окрім періодів загострення)?

*** А) 1 раз на 3 місяці**

В) 1 раз на 6 місяців

С) 1 раз на 4 місяці

Д) 1 раз на рік

Е) 1 раз на 9 місяців

296. За даними звіту стаціонару міської лікарні отримана інформація про кількість оперованих хворих, у тому числі про кількість померлих після операції. Який показник, що характеризує роботу стаціонару, можна розрахувати на підставі цих даних?

*** А) Післяопераційна летальність**

В) Летальність загальна

С) Показник пізньої госпіталізації від початку захворювання

Д) Післяопераційна смертність

Е) Стандартизована летальність