

ЗАВАНТАЖЕНО З САЙТУ ТЕСТУВАННЯ.УКР

Без категорії - база тестів 2004 року

Категорія: **Бази тестів українською мовою 2004 року**

Кількість запитань: **7**

1. Хвора В., 43 р., звернулася в хірургічний кабінет стоматологічної поліклініки для видалення 28 зуба. В якому положенні в кріслі повинна знаходитись пацієнтка і лікар біля пацієнтки при видаленні вищевказаного зуба?

*** А) Голова дещо запрокинута дозаду, верхня щелепа на рівні плечового поясу лікаря, лікар стоїть спереду і справа**

В) Голова дещо запрокинута дозаду, верхня щелепа на рівні ліктьового суглобу лікаря, лікар стоїть спереду і справа

С) Голова дещо запрокинута дозаду, верхня щелепа на рівні плечового поясу лікаря, лікар стоїть спереду і зліва

Д) Голова нахилена допереду і направо, верхня щелепа на рівні плечового поясу лікаря, лікар стоїть справа і ззаду

Е) Голова хворої розміщена вертикально, нижня щелепа на рівні ліктьового суглобу лікаря, лікар стоїть спереду і справа

2. Хворий П., 32 р., звернувся в хірургічний кабінет стоматологічної поліклініки для видалення 47 зуба. В якому положенні в кріслі повинен знаходитися пацієнт і лікар біля пацієнта при видаленні даного зуба ?

*** А) Крісло з пацієнтом опускається донизу, нижня щелепа на рівні ліктьового суглобу, лікар стоїть ззада і збоку від пацієнта**

В) Голова пацієнта запрокинута дозаду, нижня щелепа його на рівні ліктьового суглобу лікаря, лікар стоїть спереду

С) Голова повернута вправо, нижня щелепа на рівні ліктьового суглобу лікаря, лікар стоїть спереду

Д) Голова пацієнта вертикально, нижня щелепа на рівні плечового поясу лікаря, лікар стоїть ззаді і справа

Е) Голова нахилена допереду, нижня щелепа на рівні плечового поясу лікаря, лікар стоїть зліва і спереду пацієнта

3. Одним з шести ключів нормальної окклюзії за Ендрюсом є торк зубів. Дайте визначення терміну “торк зуба”

*** А) Вестибуло-оральний нахил коронкової частини зуба**

- В) Ротація зуба
- С) Поворот зуба навколо своєї вісі
- Д) Мезіо-дистальний нахил коронки зуба
- Е) Проміжки між зубами

4. Розвиток зачатків постійних зубів починається з:

*** А) Лобного та верхньощелепного відростка**

- В) Мезенхіми зубного сосочка
- С) Другої жаберної дуги
- Д) Першої жаберної дуги
- Е) Епітелію корневої піхви

5. Які апарати використовують для лікування глибокого прикусу з V-подібною формою щелепи в змінному періоді прикусу?

*** А) Аппарат Андресена**

- В) Аппарат Катца
- С) Аппарат Брюкля
- Д) Аппарат Осадчего
- Е) Аппарат Айзенберга

6. Травматичний відлом ? коронкової частини 21 та 31 зубів у 9 річної дівчини без оголення пульпи можна замінювати протезом:

*** А) Через 3 місяці**

- В) Відразу після травми
- С) Через 10 днів
- Д) Через 1 місяць
- Е) Через 1 рік

7. Який основний принцип лежить в основі класифікації патологічних прикусів за Бетельманом?

*** А) Ступінь розвитку щелеп**

В) Ступінь розвитку м'язів

С) Ключ оклюзії

Д) Диференціація елементів скронево-щелепного суглобу

Е) Міжоклюзійні контакти