

ЗАВАНТАЖЕНО З САЙТУ ТЕСТУВАННЯ.УКР

Нормальна анатомія: Анатомія опорно-рухового апарату

Категорія: **Нормальна та патологічна анатомія, топографічна анатомія з оперативною хірургією**

Кількість запитань: **1557**

1. Через судинну лакуну проходить:
2. Через м'язову лакуну проходить:
3. Через м'язову лакуну проходить:
4. Які частини розрізняють у клиновидній кістці?
5. Які борозни видно на внутрішній поверхні тім'яної кістки?
6. Клиновидна кістка належить до:
7. Як називається лінія, що відходить в боки від зовнішнього потиличного виступу?
8. Якими краями тім'яні кістки з'єднуються між собою?
9. М'яз, який не обмежує стегновий трикутник, це:
10. Передню стінку піхви прямого м'яза живота вище пупка утворюють:
11. Вкажіть стінки пахвинного каналу:
12. М'язи сідничної ділянки розміщені в:
13. Верхній носовий хід обмежений:
14. До задньої групи м'язів гомілки не належить такий м'яз як:
15. Дах порожнини носа складають:
16. Нижня стінка очної ямки утворена:
17. Верхню стінку очниці утворюють:

18. Лімфатичний вузол Пирогова-Розенмюллера знаходиться:
19. Наступна кістка не приймає участі в утворенні медіальної стінки орбіти:
20. Наступний м'яз не приймає участі у згинанні гомілки:
21. М'язи плеча поділяються на наступні групи:
22. Який з вказаних м'язів здійснює поворот плеча до середини, приведення його до тулуба і частково розгинає?
23. Який із зазначених м'язів здійснює поворот плеча назовні, приведення його до тулуба і частково розгинає?
24. Підберіть основний тип дії для підлопаткового м'яза, який він виконує у плечовому суглобі:
25. Підберіть основний тип дії для дельтоподібного м'яза, який він виконує у плечовому суглобі:
26. У судинній лакуні розташовуються наступні утворення:
27. Суглобові поверхні яких кісток приймають участь в утворенні Шопарова суглобу:
28. Суглоб Лісфранка утворюється:
29. Груднинна частина діафрагми починається:
30. Реброва частина діафрагми починається від внутрішньої поверхні:
31. Скільки фасцій є на шиї за Шовкуненком:
32. Розрізняють наступні основні групи м'язів стопи:

33. За медіальною кісточкою проходять сухожилки наступних м'язів:
34. Довгий згинач великого пальця стопи відносять до:
35. Підколінну ямку обмежують наступні м'язи:
36. Камбалоподібний м'яз відноситься до:
37. Поверхневу "гусячу лапку" утворюють сухожилки названих нижче м'язів:
38. Серед м'язів стегна виділяють наступні групи:
39. Стінки стегового каналу утворені:
40. Стегновий трикутник обмежують:
41. Згинання в колінному суглобі роблять наступні м'язи:
42. Стегно досередини обертають наступні м'язи:
43. До серединної групи підошовних м'язів стопи відносять наступні:
44. Стінками привідного каналу є:
45. Через малий сідничний отвір проходить названий нижче м'яз:
46. Через великий сідничний отвір проходить названий нижче м'яз:
47. Через м'язову затоку проходять:
48. У ліктьово-зап'ястковому каналі розташовуються:
49. У променево-зап'ястковому каналі розташовуються:
50. Ліктьову борозну передпліччя обмежують:

- 51. Серединну борозну передпліччя обмежують:**
- 52. Променеву борозну на передпліччі обмежують:**
- 53. М'язево-плечовий канал обмежують:**
- 54. Тристоронній отвір обмежують наступні м'язи:**
- 55. У пахвовій порожнині розрізняють наступні стінки:**
- 56. До великого горбика плечової кістки прикріплюються наступні м'язи:**
- 57. До передньої групи м'язів плеча відносяться наступні:**
- 58. Пахвинну зв'язку утворює наступний м'яз живота (його апоневроз):**
- 59. Вкажіть, який м'яз живота закінчується на гребені клубової кістки, білої лінії живота, лобковому зрощенні і лобковому горбику:**
- 60. Вмістом пахвинного каналу є:**
- 61. Глибокому кільцю пахвинного каналу на задній поверхні передньої черевної стінки відповідає:**
- 62. На передній черевній стінці в гіпогастральній частині розрізняють наступні ділянки:**
- 63. Розрізняють наступні групи м'язів живота:**
- 64. До аутохтонних м'язів грудей відносять:**
- 65. Межею між грудною та черевною порожнинами є:**
- 66. До м'язів, що утворюють “анатомічний букет”, відносять наступні:**

67. Наступні анатомічні утвори обмежують сонний трикутник:
68. Який м'яз шиї прикріплюється до скроневої кістки:
69. Який м'яз шиї прикріплюється до соскоподібного відростка:
70. Основним м'язом, що формує дно порожнини рота, є:
71. Які з перерахованих м'язів відносяться до жувальних?
72. Який з мімічних м'язів забезпечує міміку суму і смутку?
73. Який з перерахованих м'язів забезпечує широку посмішку?
74. Назвіть мімічний м'яз, що має фасцію:
75. Вкажіть м'язи, що піднімають нижню щелепу:
76. До підпотиличної групи м'язів відносять наступні:
77. М'язом, що згинає хребтовий стовбур допереду, є:
78. До хребта лопатку наближають наступні м'язи:
79. М'язом, що утримує голову вертикально, є наступний:
80. До гребінця малого горбика плечової кістки прикріплюються:
81. Фізіологічним поперечником м'яза називають:
82. Анатомічним поперечником м'яза називають:
83. До допоміжного апарату м'язів відносяться:
84. Яка зв'язка є ключем поперечного суглоба заплесна:

85. Які рухи можливі в колінному суглобі:
86. Який за формою є колінний суглоб:
87. Сухожилок якого м'яза проходить через порожнину плечового суглоба
88. Який за формою плечовий суглоб:
89. Який за функцією є кульшовий суглоб:
90. Чим досягається відповідність суглобних поверхонь у кульшовому суглобі:
91. Яким за формою є кульшовий суглоб:
92. До якого виду з'єднань відноситься лобковий симфіз:
93. Які рухи можливі в міжфалангових суглобах:
94. Який за формою є міжфаланговий суглоб:
95. Який за будовою є променевозап'ястковий суглоб:
96. Який за формою є ліктьовий суглоб:
97. Який за будовою є ліктьовий суглоб:
98. Сконево-нижньощелепний суглоб може бути віднесений до:
99. Схил черепа утворює зрощення:
100. З'єднання хребців в хребтовому стовбурі здійснюються за допомогою наступних з'єднань, крім:
101. Синхондрози підрозділяють на:

- 102. Синдесмози підрозділяються на:**
- 103. Розрізняють наступні неперервні з'єднання:**
- 104. Які за формою суглоби відносяться до багатоосьових:**
- 105. Які за формою суглоби відносяться до двоосьових:**
- 106. Які за формою суглоби відносяться до одноосьових суглобів:**
- 107. На які групи поділяють суглоби за функцією:**
- 108. Для комбінованих суглобів характерна наявність:**
- 109. Для комплексних суглобів характерна наявність:**
- 110. Для складних суглобів характерна наявність:**
- 111. Для простих суглобів характерна наявність:**
- 112. Для суглобів характерна наявність наступних ознак:**
- 113. Довжина черепа вимірюється:**
- 114. Брегма (краніометрична точка) розташована на:**
- 115. Стріловидний шов утворений з'єднанням:**
- 116. Середня черепна ямка утворена:**
- 117. Передня черепна яма утворена:**
- 118. Тверде піднебіння утворюють:**
- 119. На які групи поділяються черепа по черепному (головному) покажчику?**

- 120. Що називається черепним індексом (широтно-поздовнім показником)?**
- 121. Як сполучається крило-піднебінна ямка із середньою черепною ямкою?**
- 122. Як сполучається крило-піднебінна ямка із носовою порожниною?**
- 123. Які утворення відкриваються в нижній носовий хід:**
- 124. Які з нижчеперелічених утворень проходять через яремний отвір:**
- 125. Через овальний отвір проходить наступний нерв:**
- 126. Через круглий отвір проходить наступний нерв:**
- 127. Через верхню очноямкову щілину проходять наступні нерви:**
- 128. Внутрішня основа черепа має наступні відділи:**
- 129. Піднебінна кістка складається з наступних пластин:**
- 130. У верхній щелепі розрізняють наступні частини:**
- 131. У м'язово-трубному каналі містяться наступні канали:**
- 132. Вдавлення трійчастого нерва розташовується на:**
- 133. У піраміді скроневої частини розрізняють наступні поверхні:**
- 134. У тім'яній кістці розрізняють наступні краї:**
- 135. У потиличній кістці розрізняють наступні частини:**
- 136. На великих крилах клиноподібної кістки розташовуються наступні отвори:**
- 137. У клиноподібній кістці розрізняють наступні частини:**

- 138. Лобова кістка складається з наступних частин:**
- 139. Кістки стопи поділяють на наступні відділи:**
- 140. На задній поверхні тіла стегнової кістки розміщений наступний утвір:**
- 141. На клубовій кістці розрізняють наступні утворення:**
- 142. До кісток вільної нижньої кінцівки відносяться наступні:**
- 143. До кісток тазового пояса відносяться:**
- 144. До проксимального ряду кісток зап'ястка відносяться:**
- 145. На променевій кістці розрізняють наступні суглобові поверхні:**
- 146. На ліктьовій кістці розрізняють наступні апофізи:**
- 147. На ліктьовій кістці знаходяться наступні суглобні поверхні:**
- 148. Ключиця має наступні основні частини:**
- 149. На лопатці розрізняють наступні основні утвори:**
- 150. До кісток, що утворюють вільну верхню кінцівку, відносять:**
- 151. До кісток, що утворюють грудну клітку, відносяться:**
- 152. Груднина складається з наступних частин:**
- 153. На 1 ребрі розрізняють:**
- 154. У кожному ребрі розрізняють наступні основні частини:**
- 155. Третє ребро з'єднується з грудиною за допомогою:**

156. Крижову кістку поділяють на наступні основні частини:

157. Для всіх грудних хребців характерна наявність:

158. Для всіх шийних хребців характерні:

159. У кожному хребці розрізняють такі частини:

160. До кісток скелета тулуба відносяться:

161. У довгій кістці розрізняють наступні частини:

162. Термін “латеральний” означає:

163. Термін “медіальний” означає:

164. Фронтальною площиною називається:

165. “Сагітальною” площиною називається:

166. При проведенні анестезії в отвір нижньої щелепи у пацієнта виникла контрактура (обмежене відкривання рота). Який м'яз було пошкоджено при маніпуляції?

167. Хворий звернувся із скаргами на біль за кутом нижньої щелепи. Було діагностовано абсцес крило-щелепного простору. Між якими анатомічними утворами виник гнійний процес?

168. Лікарю-стоматологу для знеболення необхідно ввести анестетик у крилопіднебінну ямку і з ротової порожнини. В ділянці якого анатомічного утвору потрібно робити ін'єкцію?

169. Внаслідок травми виник запальний процес м'яких тканин між медіальним і латеральним криловидними м'язами. В який простір переміститься гній флегмони міжкриловидного простору при ускладненні?

170. У травмпункт поступив хворий, який не може розігнути передпліччя в ліктьовому суглобі. Який м'яз пошкоджений?

171. Під час бійки 20-літній чоловік одержав ножове поранення шиї з ушкодженням зовнішньої сонної артерії. Для тимчасової зупинки кровотечі ефективним методом є пальцеве притиснення загальної сонної артерії до поперечного відростка 6 шийного хребця. У якому трикутнику шиї потрібно здійснити пальцеве притиснення сонної артерії для зупинки кровотечі?

172. При множинних переломах ребер, опіках тулуба для профілактики травматичного шоку виконують ваго-симпатичну блокаду за Вишневським. При цьому вводять розчин новокаїну по задньому краю грудино-ключично-соскоподібного м'яза шиї вище місця перехресту її з зовнішньою яремною веною. У межах якого трикутника шиї виконують блокаду?

173. У хворого внаслідок неадекватного лікування запалення середнього вуха [мезотимпаніта] виникло гнійне запалення осередків соскоподібного відростка скроневої кістки [мастоїдит]. Гнійник прорвався у ложе грудино-ключично-соскоподібного м'яза. У межах якої фасції шиї локалізується патологічний процес.

174. У хворого карієсом нижнього лівого премоляра з'явилася припухлість шиї вище під'язикової кістки. Підвищилася температура, з'явилася слинотеча, скорочення жувальних м'язів (тризм), хворий не відкриває рот. Поставлено діагноз - флегмона дна ротової порожнини. Які м'язи будуть залучені в процес?

175. Хворий поступив у відділення щелепно-лицьової хірургії з вивихом скронево-нижньощелепного суглоба, у результаті чого було ушкоджено основна зв'язка суглоба. Назвіть цю зв'язку?

- 176. Пацієнт 18 років скаржиться на болі при вдиху та видиху. На R-грамі виявлено перелом кісток грудної клітки. Які з кісток патологічно змінені?**
- 177. Чоловік, 40 років, після автокатастрофи поступив у травматологічне відділення лікарні з переломом склепіння черепа. Які кістки травмовані?**
- 178. Після падіння хворий став скаржитись на неспроможність розігнути ногу у колінному суглобі. Які м'язи пошкоджено?**
- 179. У хворого внаслідок травми черепа порушена функція жувального м'язу. Де на рентгенограмі нижньої щелепи буде виявлена патологія?**
- 180. У хворого перелом та травма диску скронево-нижньощелепного суглобу. До якого типу належать суглоби із дисками?**
- 181. Яка кістка при травмі бічної поверхні черепа ймовірніше всього страждає?**
- 182. На R-грамі перелом кістки, яка знаходиться з латерального боку передпліччя. Яка кістка зламана?**
- 183. За рахунок яких м'язів утворюються характерні округлі контури ділянки проксимальної частини плеча:**
- 184. У новонародженого хлопчика голова нахилена вліво. При обстеженні виявлено, що при пологах пошкоджено м'яз шиї, який?**
- 185. Чоловік 42 років звернувся до медпункту з приводу різаної рани нижньої частини передньої поверхні плеча. Об'єктивно: затруднене згинання передпліччя. Які з названих м'язів ймовірно ушкоджені у хворого?**
- 186. Внаслідок травми черепа стався перелом клиновидної кістки в ділянці основи крилоподібного відростка. Вміст якого з названих каналів може бути пошкоджено?**

187. Трикутник шиї обмежений ззаду грудинно-ключично-соскоподібним м'язом, зверху-заднім черевцем двочеревцевого м'яза, спереду - верхнім черевцем лопатково-під'язикового м'яза. Назвіть цей трикутник.

188. Куди буде поширюватися крововилив, якщо травмована судина в ділянці яремного отвору?

189. Внаслідок пухлини гіпофіза при рентгенографії виявлено руйнування і збільшення ямки турецького сідла. Яка кісткова порожнина при цьому вражена?

190. Хворий не може підняти опущену нижню щелепу. Які м'язи не виконують своїх функцій?

191. 30-ти річний чоловік звернувся до стоматолога зі скаргою на розлади жування, у нього виникає біль при відтягуванні щелепи назад. Лікар встановив запалення одного з жувальних м'язів. Якого?

192. При обстеженні пацієнта 15 років виявлено, що після перенесеної щелепно-лицевої травми, він не може опустити донизу нижню щелепу. Пошкодження якого м'язу може бути причиною вказаної патології?

193. При обстеженні у хворого виявлено порушення функції змикання очної щілини. Пошкодження якого м'яза можна запідозрити?

194. Дуги сусідніх хребців переважно з'єднуються між собою за допомогою:

195. Унаслідок травми в ділянці вінцевого відростка нижньої щелепи у хворого спостерігається порушення зміщення нижньої щелепи назад. Ймовірність пошкодження якого м'яза існує?

196. У хворого виникають болі при жуванні, затруднене піднімання нижньої щелепи (при закриванні рота). Функція яких м'язів порушена?

- 197. У потерпілого праворуч визначається відрив ділянки кута нижньої щелепи, зсув відламка назад і догори. Яка зв'язка сприяє цьому зсуву?**
- 198. У боксера, що одержав удар в ділянку скронево-нижньощелепного суглоба, відбувся травматичний вивих. Зсув яких суглобових поверхонь вийде за межі фізіологічної норми?**
- 199. При обстеженні обличчя хворого відзначається, що правий кут рота зміщений у ліву сторону, права щока і губи притиснуті до зубів і ясен щелеп. Порушенням функції якого м'яза це викликано?**
- 200. В обстежуваного відзначається різке опущення кута рота ліворуч. Порушенням функції яких м'язів це викликано?**
- 201. Хворий скаржиться на болі при жуванні, особливо при висуванні нижньої щелепи вперед і зсуві її убік. Функція яких м'язів порушена?**
- 202. Після автомобільної катастрофи травмований не може робити нахили голови вперед та назад. Визначите в якому суглобі відбулися ушкодження?**
- 203. При травмі голови виникла тріщина в ділянці поперечного синуса. Яка частина потиличної кістки ушкоджена?**
- 204. У потерпілого травма верхньої щелепи, вибитий перший малий корінний зуб. Який відросток верхньої щелепи ушкоджений?**
- 205. У потерпілого травма верхньої щелепи з ушкодженням підочного отвору. Яка поверхня щелепи ушкоджена?**
- 206. Потерпілий одержав травму зовнішньої поверхні обличчя і скроневої області. Установлено перелом виличної дуги. Відростки яких кісток черепа ушкоджені?**

207. У результаті травми в потерпілого відбувся перелом у зовнішній нижній третині правої гомілки. У якій кістці нижньої кінцівки відбувся перелом?
208. Слабким місцем передньої стінки живота є пупкове кільце. Які елементи будови передньої стінки живота відсутні?
209. Після травми хворий не може відвести плече. Порушення функції яких м'язів може це спричинити?
210. У наслідок травми низу передньої стінки живота у хворої ушкоджена зв'язка, що знаходиться у пахвинному каналі. Яка це зв'язка?
211. За рахунок якого м'яза здійснюється супінація у плечовому суглобі?
212. При обстеженні пацієнта виявлено, що після перенесеної щелепно-лицьової травми він не може висунути нижчу щелепу допереду і змістити її в праву сторону. Параліч якого м'язу є причиною вказаної патології?
213. Хворого 45 років турбувала папілома в порожнині носа. Лікар встановив, що вона знаходиться на утворі, під яким відкривається слъозово-носова протока, це:
214. У юнака 18 років після вуличної бійки травмована бічна ділянка лиця. При огляді лікар встановив, що шкіра травмована, рана відкрита, гілка нижньої щелепи зламана, з жувальних м'язів залишився цілим тільки той, що не піднімає щелепу, це:
215. Який з нижченазваних м'язів прикріплюється до малого вертлюга стегнової кістки?
216. Який з нижченазваних м'язів прикріплюється до великого вертлюга стегнової кістки?

217. Всі нижченазвані м'язи відіграють важливу роль у згинанні гомілки, за винятком:
218. До якої з нижченазваної структури прикріплюється передній драбинчастий м'яз?
219. Плече згинається всіма нижченазваними м'язами, за винятком:
220. Сухожилок якого м'яза проходить у міжгорбковій борозні плечової кістки?
221. Які з нижченазваних м'язів супінують плече та відтягують капсулу плечового суглоба?
222. Виберіть основну функцію для підлопаткового м'яза, яку він виконує у плечовому суглобі?
223. Виберіть основну функцію для дельтоподібного м'яза, яку він виконує в плечовому суглобі при скороченні всього м'яза?
224. Всі нижченазвані м'язи відносяться до мімічних, за винятком:
225. Назвіть суглоб, в якому спостерігається більше 50 відсотків всіх травматичних вивихів?
226. Ліктьовий суглоб є прикладом суглоба
227. Драглисте ядро міжхребцевого диска не:
228. Кожна з нижченазваних структур відноситься до структурно-функціональної одиниці кістки, за винятком:
229. Всі наступні кістки складають дистальний ряд кісток зап'ястка, за винятком:

230. Всі наступні кістки утворюють присередню стінку орбіти, за винятком:
231. Всі наступні твердження відносно хребтового стовпа вірні, за винятком:
232. Всі наступні твердження відносно першого шийного хребця вірні за винятком:
233. У хворого встановлено запалення слизової оболонки лобової пазухи. В який з перелічених утворів буде прямувати запальна рідина?
234. У тенісиста діагностовано тендиніт (запалення сухожилка) одного з м'язів поясу верхньої кінцівки, що зумовлює тертя сухожилка об акроміальний відросток лопатки. Сухожилок якого м'яза уражений?
235. Який з нижченазваних м'язів не приймає участі в підніманні та опусканні нижньої щелепи?
236. Що відбувається під час ходіння в носі, на яку людина в даний момент спирається:
237. Який із перерахованих м'язів не прикріплюється до великогомілкової кістки:
238. Який із перерахованих м'язів прикріплюється до стегнової кістки:
239. Який із перерахованих м'язів приводить стегно:
240. Що характерно для великого сідничного м'яза:
241. Що характерно для двоголового м'яза стегна:
242. Що не є характерним для переднього великогомілкового м'яза:
243. Який із перерахованих м'язів не бере участі в згинанні колінного суглобу:

244. Який із перерахованих м'язів не бере участі у приведенні стегна:
245. Який із перерахованих м'язів не бере участі в забезпеченні рівноваги тіла:
246. Які з перерахованих м'язів не діють на п'ястково-фаланговий суглоб першого пальця:
247. Які з перерахованих м'язів прикріплюються до лопатки, плечової і ліктьової кісток:
248. Які м'язи беруть участь у відведенні плеча:
249. Які з перерахованих м'язів забезпечують розгинання в ліктьовому суглобі:
250. Які з перерахованих м'язів не прикріплюються до лопатки:
251. Які м'язи прикріплюються до малого горбка плечової кістки:
252. Який із м'язів прикріплюється до променевої кістки:
253. Який м'яз спини бере участь в опусканні ребер:
254. Які м'язи живота не прикріплюються до ребер:
255. Що утворює присередній кінець пахвинної зв'язки:
256. Що не характерно для прямого м'яза живота:
257. Який з поверхневих м'язів спини прикріплюється до кісток поясу верхньої кінцівки:
258. Який з перерахованих м'язів піднімає лопатку:
259. Який з перерахованих м'язів згинає плече:

260. Який з перерахованих м'язів не прикріплюється до лопатки:
261. Який м'яз належить до допоміжних дихальних м'язів:
262. Скренево-нижньощелепний суглоб за формою:
263. Верхня щелепа не приймає участі в утворенні:
264. В утворенні нижньої стінки порожнини носа приймає участь:
265. Верхньощелепна пазуха відкривається:
266. У верхній носовий хід відкривається:
267. Крилопіднебінна ямка не з'єднується:
268. В орбіту відкривається:
269. Гілка нижньої щелепи має:
270. В утворенні виличної дуги бере участь:
271. В утворенні кісткової перегородки порожнини носа бере участь:
272. На передній поверхні тіла верхньощелепної кістки знаходиться:
273. Тіло верхньої щелепи бере участь в утворенні:
274. Перпендикулярна пластинка решітчастої кістки бере участь в утворенні:
275. Нижня очноямкова щілина обмежена:
276. Верхня очноямкова щілина обмежена:
277. Лускоподібна частина скреневої кістки має:

- 278. Круглий, овальний і остистий отвори розташовані:**
- 279. Надперенісся знаходиться:**
- 280. Який отвір обмежують частини потиличної кістки:**
- 281. Яка із перерахованих кісток не утворює суглоб із надп'ярковою кісткою:**
- 282. Які частини стегнової кістки можна промацати:**
- 283. Маломілкува кістка проксимально з'єднується з:**
- 284. Які кістки мають тіло, головку та основу:**
- 285. Горбистість великомілкової кістки розміщена**
- 286. У дистальному відділі великомілкової кістки є відросток, який має назву:**
- 287. До повітряноносних кісток відносяться:**
- 288. Яка з перерахованих кісток має два виростки:**
- 289. Великий вертлюг розташований:**
- 290. Які ознаки характерні для жіночого таза:**
- 291. Тазова кістка утворюється з трьох кісток (у дорослої людини) шляхом наступного виду з'єднань:**
- 292. Яка з кісток має передню, задню та нижню сідничні лінії:**
- 293. Кісткова стінка великого таза утворена:**

294. При проведенні анестезії в отвір нижньої щелепи у пацієнта виникла контрактура (обмежене відкривання рота). Який м'яз було пошкоджено при маніпуляції?
295. Лікарю-стоматологу для знеболення необхідно ввести анестетик у крилопіднебінну ямку і з ротової порожнини. В ділянці якого анатомічного утвору потрібно робити ін'єкцію?
296. У травмпункт поступив хворий, який не може розігнути передпліччя в ліктьовому суглобі. Який м'яз пошкоджений?
297. Де лицевий канал вигинається утворюючи колінце лицевого каналу?
298. Де закінчується півканал м'яза натягача барабанної перетинки ?
299. Де закінчується півканал слухової труби ?
300. Де закінчується канал великого каменистого нерва ?
301. Де відкривається соскоподібний каналець ?
302. Де відкривається каналець барабанної струни ?
303. Де закінчуються сонно-барабанні каналці ?
304. Де закінчується м'язовотрубний канал ?
305. Де закінчується лицевий канал ?
306. Де закінчується сонний канал ?
307. Де починається водопровід присінка ?
308. Де починається мязово-трубний канал ?

309. Де починається лицевий канал ?
310. Де починається сонний канал ?
311. Де починається соскоподібний каналець ?
312. Де починається каналець барабанної струни ?
313. Де починаються сонно-барабанні каналці ?
314. Як називається латинською мовою тригранна кістка кисті ?
315. Як називається латинською мовою півмісяцева кістка кисті ?
316. Як називається латинською мовою човноподібна кістка кисті ?
317. Як називається латинською мовою вилична кістка ?
318. Як називається латинською мовою леміш ?
319. Як називається латинською мовою піднебінна кістка ?
320. Як називається латинською мовою нижня щелепа ?
321. Як називається латинською мовою верхня щелепа ?
322. Як називається латинською мовою скронева кістка ?
323. Як називається латинською мовою клиноподібна кістка ?
324. Як називається латинською мовою решітчаста кістка ?
325. Як називається латинською мовою лобова кістка ?
326. Як називається латинською мовою потилична кістка ?

327. Як називається латинською мовою тім`яна кістка ?
328. Серединний крижовий гребень утворюється в наслідок зрощення:
329. Бічний крижовий гребень утворюється в наслідок зрощення:
330. Присередній крижовий гребень утворюється в наслідок зрощення:
331. У яких хребців присутній реберний відросток ?
332. У яких хребців присутній додатковий відросток ?
333. У яких хребців присутній соскоподібний відросток ?
334. У яких хребців суглобові відростки розміщені у сагітальній площині ?
335. На яких грудних хребцях відсутні повні реберні ямки?
336. На яких грудних хребцях є по одній парній повній реберній ямці?
337. На яких грудних хребцях присутні лише верхні реберні пів'ямки?
338. На яких грудних хребцях присутні повні верхні реберні ямки для головок перших ребер і нижні пів'ямки?
339. На яких хребцях присутні реберні ямки поперечних відростків?
340. На яких хребцях присутні верхні і нижні реберні ямки?
341. На якому шийному хребці присутня латеральні маси?
342. На якому шийному хребці присутні передня і задня дуги?
343. На якому шийному хребці присутня верхівка зуба?

344. На якому шийному хребці присутній найдовший і нерозщеплений остистий відросток?
345. На якому шийному хребці присутній сонний горбок?
346. На якому шийному хребці присутні передня, задня, верхня, нижня суглобові поверхні?
347. На якому шийному хребці присутній зуб?
348. На якому шийному хребці присутня ямка зуба?
349. На якому ребрі відсутній гребінь на головці ребра?
350. На яких ребрах відсутній горбок ребра?
351. На якому ребрі хрящ ребра?
352. Де знаходиться горбистість переднього зубчастого м'яза?
353. Де знаходиться борозна підключичної артерії?
354. Де знаходиться борозна підключичної вени?
355. На якому ребрі присутній горбок переднього драбинчастого м'яза?
356. Які ребра не мають гребеня головки ребра?
357. Яке ребро не має гребеня головки ребра?
358. Які краї має тіло другого ребра?
359. Які поверхні має тіло п'ятого ребра?
360. Які поверхні має тіло 1 ребра?

361. Які краї має тіло 1 ребра?

362. До проксимального ряду кісток заплесна відносяться такі кістки:

363. Кістки стопи класифікуються на такі відділи:

364. Тіло малогомілкової кістки має такі поверхні:

365. Тіло малогомілкової кістки має такі краї:

366. Тіло великогомілкової кістки має такі краї:

367. Тіло великогомілкової кістки має такі поверхні:

368. До кісток гомілки відносять:

369. До кісток тазового поясу відносяться такі кістки:

370. Мала сіднича вирізка розташована на:

371. Затульний отвір обмежений такими кістками:

372. Велика сіднича вирізка розташована на:

373. У проксимальному ряді зап'ястка розташовані такі кістки:

374. У дистальному ряді зап'ястка розташовані такі кістки :

375. Тазова кістка зростається в одну в:

376. На тілі променевої кістки розрізняють такі поверхні:

377. На тілі ліктьової кістки розрізняють такі поверхні

378. На ліктьовій кістці розташована:

- 379. На променевій кістці розташована:**
- 380. Променева кістка по-латинськи називається:**
- 381. Ліктьова кістка по-латинськи називається:**
- 382. На задній поверхні дистального кінця плечової кістки розрізняють такі ямки:**
- 383. На передній поверхні дистального кінця плечової кістки розрізняють такі ямки:**
- 384. Плечова кістка по-латинськи називається:**
- 385. Ключиця по-латинськи називається:**
- 386. У лопатці розрізняють такі поверхні:**
- 387. У лопатці розрізняють такі краї:**
- 388. У лопатці розрізняють такі кути:**
- 389. Лопатка по-латинськи називається:**
- 390. До кісток плечового поясу відносяться:**
- 391. У крижовій кістці виділяють такі поверхні:**
- 392. Поперекові хребці по-латинськи називаються vertebrae:**
- 393. Шийні хребці по-латинськи називаються vertebrae:**
- 394. Скільки хребців утворює хребтовий стовп?**
- 395. У якому суглобі рухи відбуваються навколо 3-х осей?**

396. У якому суглобі рухи відбуваються навколо 2-х осей?

397. У якому суглобі рухи відбуваються навколо 1-ї осі?

398. У хворої М., 37р. в результаті попадання чужорідного тіла в дихальні шляхи виник кашель, а потім ядуха. Хворому була зроблена трахеотомія в ділянці шиї, яка обмежена верхнім черевцем *m. omohyoideus*, *m. sternocleidomastoideus* та серединною лінією шиї. В якому трикутнику шиї проведено хірургічне втручання?

399. У хворого діагностовано тріщину задньої поверхні тіла плечової кістки. Наявні симптоми ураження променевого нерва в ділянці *canalis humeromuscularis*. Чим обмежений цей канал?

400. До лікаря звернувся хворий із скаргами на болі в лівій половині шиї, які посилюються при рухах голови. Положення при якому болі не турбують - це нахил голови вліво, з поверненням обличчя вправо. Ураження якого м'яза спричиняє біль в даному випадку?

401. Дитина 7 років не може відвести плече підняти його до горизонтального рівня, до обличчя руку приводить лише тильною стороною при деякій абдукції плеча (за рахунок надостного м'яза) - рука "сурмача". Активна функція якого м'яза відсутня?

402. Молода людина під час активного підтягування на перекладині відчула різкий біль у спині. Об'єктивно: біль при спробах руху верхньою кінцівкою, обмеження функцій приведення та пронації. Розтягнення якого м'яза, найбільш імовірно, відбулося?

403. До травмпункту звернувся чоловік 45 років після побутової травми плеча. Об'єктивно: відсутні функції розгинання, приведення та пронації плеча. Пошкодження якого м'яза викликало такий стан?

404. Який з м'язів передньої групи плеча діє на два суглоби?

405. Чоловік 42 років звернувся до медпункту з приводу різаної рани нижньої частини передньої поверхні плеча. Об'єктивно: утруднене згинання передпліччя. Які з названих м'язів ймовірно ушкоджені в хворого?

406. Чоловік 35 р. у виробничих умовах отримав різану рану латерального краю долонної поверхні кисті. Виявлено обмеження відведення та згинання великого пальця кисті. Функція якого м'яза пошкоджена?

407. Чоловік 26 р., у виробничих умовах отримав травму верхньої третини плеча. При обстеженні на травмпункті пошкоджень кісток не виявлено. Відмічається відсутність активного розгинання передпліччя. Який м'яз імовірно все ще пошкоджений?

408. Хворому з пухлиною гортані показана ургентна операція - накладання трахеостоми (введення металевої трубки в трахею) Через який м'яз повинен проникнути хірург при здійсненні операції?

409. Хворий після травми скаржиться на болі на медіальній поверхні гомілки при згинанні стопи. Лікар повинен пам'ятати, що позаду malleolus medialis розташовані сухожилки наступних м'язів:

410. Хворий не може розвести пальці кисті. Функція яких м'язів порушена?

411. Хворий не може підняти опущену вниз нижню щелепу. Які м'язи не можуть виконати свої функції?

412. Відведення I, II, IV пальців кисті від III здійснюють

413. Хворий не може відвести від тулуба верхню кінцівку. Який м'яз не виконує своєї функції?

414. Хворий звернувся до терапевта зі скаргами на болі в грудній клітці при диханні, задишку, утрудненні кашльових рухів, гикавку. Які дихальні м'язи уражені?

415. Який з названих м'язів не виконує ролі допоміжного дихального?

416. Хворий з ножовим пораненням верхньо-латеральної ділянки плеча не може відвести руку до горизонтальної площини. Який із м'язів пошкоджено?

417. Хворий 45 років після травми правого плеча (внаслідок падіння) не може відвести праву руку до горизонтального рівня. Пошкодження якого з м'язів викликало вказане обмеження рухові?

418. У чоловіка 52-х років при піднятті надмірної ваги виникло грижове вип'ячування в пахвинній ділянці. Через який анатомічний отвір найімовірніше виникло грижове вип'ячування?

419. У хірургічне відділення доставлено чоловіка 35 років з гнійною раною на шиї попереду трахеї (у ділянці передвісцерального простору). Куди може розповсюджуватись інфекція, якщо хворому терміново не зроблять операцію?

420. Чотирьохсторонній отвір верхньої кінцівки обмежений зверху:

421. У хворої 45 років виявлено грижовий мішок, хід - через стегновий канал. Лікар шляхом обстеження визначив, що вихідним отвором грижі є :

422. У хворого на передній черевній стінці під шкірою лікар знайшов випинання. Лікар підозрює наявність грижі. У яких слабких місцях передньої черевної стінки можливе утворення таких гриж?

423. У хворого з ножовим пораненням стегна утруднене розгинання гомілки. Який із м'язів постраждав сильніше?

424. У хворого є коса пахвинна кила (грижа). Де знаходиться її вхідний отвір?

425. У хворого гнійний паротит ускладнився заглотковим абсцесом. За рахунок особливостей будови якого фасціального листка шиї це стало можливим?

426. У хворого 25 років з пахвинною грижею об'єктивно виявлено в межах поверхневого кільця лівого пахвинного каналу випинання м'якої консистенції, яку при підвищенні внутрішньочеревного тиску спускається в мошонку. Через яку ділянку передньої стінки живота випинається грижа?
427. У хворого - стегова кила (грижа). Яка структура не приймає участі в утворенні стегового кільця?
428. У травмпункт звернувся чоловік 45 р. після побутової травми плеча. При обстеженні встановлено, що відсутні функції розгинання, приведення та пронації плеча. Пошкодження якого м'яза викликало такий стан?
429. У травмованого глибоке поперечне поранення нижньої третини задньої поверхні гомілки. Тил стопи піднятий нагору. Яке сухожилля ушкоджене?
430. У травматологічне відділення звернувся чоловік 30 р. з різаною раною підшовної ділянки лівої стопи. У хворого обмежене піднімання латерального краю стопи. Функція якого м'яза імовірно всього порушена?
431. У результаті удару колесом мотоцикла в задню область середньої третини гомілки у постраждалого розрив глибоких кровоносних судин (утворилася велика гематома) та травмований нерв. У якому анатомічному утворі лежить ушкоджений судинно-нервовий пучок гомілки?
432. У потерпілого колото-різана рань нижнього відділу задньої стінки пахової ямки. Які м'язи ушкоджені при цьому?
433. Трикутник шиї обмежений ззаду грудинно-ключично-соскоподібним м'язом, зверху - заднім черевцем двочеревцевого м'яза, попереду - верхнім черевцем лопатково-під'язикового м'яза. Назвіть цей трикутник.
434. Рентгенологічно в пацієнта діагностовано перелом плечової кістки в ділянці міжгорбкової борозни. Сухожилок якого м'яза може бути травмований уламками кістки в першу чергу?

435. При падінні з висоти постраждалий вдарився передньою поверхнею плеча до твердого предмету. При огляді хірургом констатований розрив двоголового м'яза плеча. Які функції верхньої кінцівки будуть порушенні при вказаній травмі?

436. При обстеженні однорічного хлопчика виявлена правостороння пахвинна кила. Яка структура може сприяти цьому захворюванню?

437. Після опіку правої руки пацієнт не може розігнути мізинець. Про пошкодження якого м'яза можна думати?

438. При обстеженні миміки хворого виявлено, що він не може скласти губи трубочкою, не може свистіти, під час сміху кутки рота не піднімаються догори, ротова щілина розтягується в боки (поперечна посмішка). Пацієнт страждає на міопатію - спадкове захворювання із дистрофічним ураженням м'язів. На атрофію якого м'язу вказують дані симптоми?

439. Після травми хворий не може утримувати тіло у вертикальному положенні, не може піднятися навшпиньки. Функція якого м'яза порушена?

440. Після травми хворий не може розігнути руку в ліктьовому суглобі. Порушення функції якого основного м'язів може це визвати?

441. Після глибокого опіку верхньої частини ділянки плеча в пацієнта з'явилися скарги на неможливість відведення плеча. Про пошкодження якого м'язу слід думати в даному випадку?

442. Під час патологоанатомічного розтину в померлого виявлено гній у задньому середостінні. Через який простір поширився запальний процес, що був локалізований у передньому відділі шиї?

443. Під час виконання фізичних вправ у 15 річного учня раптово виникла біль у зоні кульшового суглоба при обертанні нижньої кінцівки всередину.

Травматолог виявив пошкодження сухожилка одного з м'язів, який може обертати кінцівку всередину. Який це м'яз?

444. Параніхій мізинця ускладнився флегмоною кисті та передпліччя. Гнійний процес поширився по:

445. Задньою стінкою піхви прямого м'яза живота є:

446. До травмпункту міської клінічної лікарні звернувся пацієнт зі скаргами на те, що після стрибка з висоти гомілка закидається вперед і не повертається у вихідне положення. Який діагноз можна виставити?

447. До травмпункту звернувся чоловік 45 років після побутової травми плеча. Об'єктивно: відсутні функції розгинання, приведення та пронації плеча. Пошкодження якого м'яза викликало такий стан?

448. До лікаря-педіатра звернулася мати з приводу того, що в її дитини віком 1 рік голова повернена в лівий бік. Який із м'язів шиї недорозвинений?

449. До лікаря звернулася мати одномісячної дитини з скаргами на те, що в дитини з'явився нахил голови в бік, а підборіддя повернуте в протилежну сторону. Назвіть м'яз, який зумовлює це явище?

450. До лікаря звернулася мати новонародженого, у якого було виявлено вроджену пахвинну килу. Пахвинний канал був настільки широкий, що внутрішні органи виходили в калитку. Показана операція ушивання задньої стінки пахвинного каналу. На якому анатомічному утворі проводиться маніпуляція?

451. До клініки потрапив хворий з пораненням м'яких тканин шиї та пошкодженням шийного вітрила "Ріше". Яка з фасцій шиї його утворює?

452. Дитина 7 років не може відвести плече і підняти його до горизонтального рівня, до обличчя руку приводити лише тильною стороною при деякій абдукції плеча (за рахунок надостного м'яза) - рука "сурмача". Активна функція якого м'яза відсутня?

453. Дитина 5 років, потрапила в тяжкому стані в інфекційний відділ клінічної лікарні з діагнозом дифтерії. Для запобігання ядухи дитині провели трахеотомію, встановлена канюля Люєра. У якому трикутнику шиї проведена дана операція?

454. Диригент оркестру не може дістати з кишені фрака носову хустинку. Який м'яз не виконує своєї функції?

455. 30 річний чоловік звернувся до стоматолога зі скаргою на розлади жування, у нього виникає біль при русі щелепи назад. Лікар встановив запалення одного з жувальних м'язів. Якого?

456. В ЛОР-відділення поступила хвора з діагнозом запального процесу у лобовій та верхньощелепній пазухах. В якій із зазначених ділянок буде виділятися ексудат із цих пазух?

457. У вагітної жінки 29р., лікар-акушер визначив розміри таза. За допомогою циркуля була виміряна відстань між двома верхніми передніми клубовими остями. Який розмір великого таза був визначений?

458. Хворий 25 років, звернувся до прийомного покою із скаргами на нежить та головний біль на протязі 4 днів. Після обстеження йому встановили діагноз О.О. фронтит. Крізь який носовий хід інфекція потрапила до лобної пазухи?

459. До медіальної групи м'язів стегна відноситься

460. До медіальної групи м'язів стегна відноситься:

461. При огляді носової порожнини лікар помітив витікання гною з лівого середнього носового ходу. Про запалення яких пазух можна думати у такому випадку?

462. У хворого з довготривалим запаленням слизової оболонки носової порожнини з'явилися симптоми ураження слизової оболонки основної пазухи (сфеноїдіт). Через яке утворення носової порожнини стало можливим розповсюдження інфекції?

463. У хворого з довготривалим запаленням слизової оболонки носової порожнини з'явилися симптоми ураження слизової оболонки лобової пазухи (фронтит). Через яке утворення носової порожнини стало можливим розповсюдження інфекції?

464. У хворого з довготривалим запаленням слизової оболонки носової порожнини з'явилися симптоми ураження слизової оболонки верхньощелепної пазухи (гайморит). Через яке утворення носової порожнини стало можливим розповсюдження інфекції?

465. На рентгенограмі таза у новонародженого визначаються три самостійні кістки, які з'єднані хрящем у ділянці кульшової западини. Які це кістки?

466. Яка анатомічна особливість сприяє утворенню гематом голови новонародженого при пологових травмах?

467. Чоловікові 50 років з розтрощеною внаслідок травми ступнею була зроблена її часткова ампутація шляхом дизартікуляції в поперечному суглобі заплесна. "Ключем" цього суглоба є:

468. Чоловіка 45 років доставлено в хірургічне відділення з різаною раною на медіальному краї передпліччя. Обстеження показало, що в хворого перерізано два м'язи передпліччя - ліктьовий згинач зап'ястка і ліктьовий розгинач зап'ястка. Які рухи не може виконувати хворий?

469. Хокеїст при падінні на коліна відчув різкий біль та хрускіт в області лівого колінного суглоба. При огляді виявлений сильний набряк в області лівого колінного суглоба та верхньої третини лівої гомілки, кровопідтік і біль передньої поверхні лівого колінного суглоба. Рухи в суглобі в повному об'ємі. Які кістки можуть бути пошкоджені

470. Хворий хлопчик 10 років доставлений у травмпункт лікарні з переломом кісток передпліччя. Дитина не може здійснити супінацію та пронацію передпліччя. У яких суглобах можливі ці рухи?

471. Хворий скаржиться на головний біль, утруднене дихання. Рентген підтвердив діагноз - фронтит (запалення лобової пазухи). У якому носовому ході при огляді порожнини носа можуть спостерігатись гнійні виділення?

472. Хворий потрапив у клініку з травмою черепа. При рентгенологічному обстеженні виявлено перелом основи черепа в ділянці канапа під'язикового нерва. Яку кістку черепа пошкоджено?

473. Хворий із гнійним правобічним запаленням середнього вуха доставлений у ЛОР-відділення. При огляді виявлена підшкірна флегмона в області соскоподібного відростка. Через яку стінку барабанної порожнини проникнув гній?

474. Футболіст на великій швидкості різко змінив напрямок руху і, упавши на коліно, пошкодив нижню кінцівку. Що найчастіше пошкоджується за цих умов?

475. У чоловіка похилого віку внаслідок падіння є перелом стегнової кістки. Вкажіть найпоширеніше місце перелому цієї кістки.

476. У хворого з анамнезу відомо, що в нього було запалення верхньощелепної пазухи. Через який відділ носової порожнини могла потрапити інфекція в лобну пазуху?

477. У хворого після травми коліна голінку у зігнутому під прямим кутом положенні можна переміщати вперед і назад подібно до висувної шухляди. Які зв'язки розірвані

478. У хворого необхідно зробити пункцію порожнини плеври. У якій частині міжреберного простору потрібно провести голку?

479. У хворого на гайморит порушено сполучення верхньо-щелепової пазухи з середнім носовим ходом. Який утвір у нормі забезпечує надходження повітря з носового ходу до гайморової пазухи?

480. У хворого із гнійним середнім отитом інфекція із барабанної порожнини поширилась на цибулину яремної вени з розвитком септичного стану. Витончення якої із стінок барабанної порожнини є анатомічною передумовою цього ускладнення?

481. До медіальної групи м'язів стегна відноситься:

482. До задньої групи м'язів стегна відносяться:

483. Через судинну лакуну проходить:

484. У хворого гостре запалення носо-слізного каналу. Відомо що після перенесеного грипу довгий час були виділення з носа. Із якого відділу носової порожнини могла потрапити інфекція у носо-слізний канал?

485. У хворого 45 років з підозрою на запалення оболонок мозку потрібно отримати спинномозкову рідину. Проведено діагностичну пункцію між дугами поперекових хребців (L3- L4). Через яку зв'язку повинна проникнути голка при пункції перед твердою мозковою оболонкою?

486. У хворого 28 років діагностовано гострий запальний процес слизової оболонки носо-слізної протоки. З якого відділу носової порожнини інфекція могла проникнути в носо-слізну протоку?

- 487. У результаті травми голови у потерпілого виявлене ушкодження правого виростка потиличної кісти. Яка частина потиличної кісти ушкоджена?**
- 488. У потерпілого визначається перелом в області внутрішньої поверхні лівого гомілковостопного суглоба. Де найімовірніше відбувся перелом?**
- 489. У потерпілого в автокатастрофі посттравматичний вивих плечового суглоба. Яка зв'язка ушкоджена?**
- 490. У новонародженого при першому годуванні виявлено витікання молока з носа. Який природжений дефект ротової порожнини може зумовлювати таке ускладнення?**
- 491. У дитини 3-ох років у передній ділянці волосяної частини голови виявлено прогинання кісток черепа. Які структури черепа новонародженого зумовлюють це явище?**
- 492. Чотирьохсторонній отвір верхньої кінцівки обмежений медіально:**
- 493. Рентгенологічно встановлено скупчення гною у правій верхньощелепній пазусі. У який носовий хід виділяється гній?**
- 494. При рентгенологічному обстеженні на знімку визначається вроджений розтвір правих ніжок дуг I-II грудних хребців. Що можна діагностувати в хворого?**
- 495. При переході вулиці людину вдарив автомобіль у лівий бік. У лікарні при огляді виявлено кровопідтік на лівій половині грудної клітки, різкий біль при пальпації, при спробі здавити грудну клітку відчувається хрускіт. Які кістки можуть бути пошкоджені**
- 496. При падінні на приведену до тулуба праву руку постраждалий відчув хрускіт та різкий біль у верхній третині правого плеча. Рухи в плечі неможливі, є деформація у верхній його третині. Які кістки можуть бути пошкоджені?**

497. При падінні на випрямлену руку чоловік отримав травму. М'язи плечового поясу напружені, різко видається плечовий відросток лопатки, під ключицею пальпується голівка плечової кістки. Який діагноз можна поставити?

498. При огляді травматологом жінки 45 років було встановлено пошкодження малого круглого м'яза плеча. Яка функція плечового суглоба порушена?

499. При огляді дитини 10 років педіатр виявив у грудному відділі вигин хребетного стовпа вліво. Який діагноз можна виставити пацієнту?

500. При гнійному отиті гній розповсюдився в комірки соскоподібного відростка та ускладнився менінгітом. У яку ямку черепа розповсюдився гній із барабанної порожнини

501. Після падіння з висоти у потерпілого діагностовано компресійний перелом поперекового хребця. При цьому різко збільшилася кривизна лордозу поперекового відділу хребта. Порушенням якої зв'язки може супроводжуватися така зміна кривизни хребта?

502. Після удару двох автомобілів в одного з водіїв відзначається деформація в середній третині лівої гомілки. З рани виступають кінці кістки тригранного форми, посилюється крововтрата. Які кістки можуть бути пошкоджені

503. Після травми ока виникло нагноєння м'яких тканин орбіти. Через який анатомічний утвір гнійний процес може поширитись у середню черепну ямку?

504. Після травми ока виникло нагноєння м'яких тканин орбіти. Через який анатомічний утвір гнійний процес може поширитись у крилопіднебінну ямку?

505. Після перенесеної черепно-мозкової травми і рентгенологічного обстеження виявлено перелом основи черепа. Лінія перелому проходить через остистий і круглий отвір. Яка кістка пошкоджена внаслідок травми?

506. Після падіння на вулиці в жінки 45 років ліва рука обвисла, рухи дуже болючі в ділянці плечового суглоба. Який попередній діагноз виставив після огляду лікар швидкої медичної допомоги?

507. Після невдалого стрибка з висоти спортсмен був доставлений у травмпункт зі скаргами на різкий біль та набряк в області правої стопи. При обстеженні права стопа в задній її третині різко болюча при пальпації, наявний кровопідтік на підошві, рухи в надп'яtkово-гомiлковому суглобі здійснюються у повному обсязі. Які кістки можуть бути пошкоджені

508. Після звільнення з під завалу в постраждалого відзначається затьмарення свідомості, багато підшкірних крововиливів на голові та шиї, дрібні рани на обличчі. У задньо-верхніх відділах голови скальпована рана та різка деформація контурів голови. Які кістки можуть бути пошкоджені?

509. Під час операції лікар маніпулює на медіальній стінці барабанної порожнини. Небезпека пошкодження якого каналу скроневої кістки виникає при цьому?

510. Під час пірнання хлопець вдарився головою в дно басейна. При огляді виявляється різкий біль у шиї, слабкість у руках, неможливість повернути голову. Які кістки можуть бути пошкоджені?

511. Під час ожеледиці жінка впала на витягнену руку і відчула різкий біль. З'явилася деформація у нижній третині правого передпліччя, набряк і обмеження рухів у правій кисті. Які кістки можуть бути пошкоджені?

512. Чотирьохсторонній отвір верхньої кінцівки обмежений латерально:

513. Що проходить через м'язову лакуну?

514. Педіатр оглянув дитину 11,5 місяців. Скарг немає. Дитина активна, тримає голову, сидить, стоїть у манежі. Які вигини хребтового стовпа сформувалися у дитини?

515. Лікар прогнозує можливість запалення клітковини орбіти при гнійному запаленні в ділянці іклової ямки. Через який утвір можливе поширення інфекції?

516. Запалення барабанної порожнини (гнійний отит) у хворого ускладнилося запаленням комірок соскоподібного відростка. Через яку стінку барабанної порожнини проникнув гній до комірок?

517. Жінка впала на відведену руку. Яка з кісток і де саме найчастіше ламається за цих умов?

518. Жінка 45 років після падіння з велосипеда звернулася в травматологічне відділення зі скаргами на біль, припухлість у плечового суглоба. Про перелом якої структури і якої кістки йде мова?

519. До травматолога звернувся пацієнт 60 років зі скаргами на загальну слабкість та болі в кістках. Лікар встановив ослаблення трофічної функції нервової системи. Яке захворювання кісткової тканини може бути при цьому?

520. Виконуючи гімнастичні вправи, дівчина впала на спину. Наступного дня вона стала відчувати різкий біль у місці удару при спробі сісти та ходінні. При огляді лікарем крижової області під шкірою в її нижній третині виявлено кровопідтік. Які кістки можуть бути пошкоджені?

521. Дитина 5 років поступила в ЛОР-відділення клінічної лікарні з діагнозом «гнійне запалення середнього вуха. Захворювання розпочалось із запалення носоглотки. Через який канал скроневої кістки інфекція потрапила у барабанну порожнину?

522. В лікарню поступив чоловік з травмою голови. Діагностовано перелом клиноподібної кістки в ділянці основи крилоподібного відростка. Вміст якого з названих каналів може бути пошкоджено?

- 523. Внаслідок пухлини гіпофіза при рентгенографії виявлено руйнування і збільшення ямки турецького сидла. Яка кісткова порожнина при цьому уражена?**
- 524. Будівник, упавши з висоти на лівий бік, відчув сильний біль у верхній третині лівого стегна. Стати на ліву ногу не може, рухи в лівій нижній кінцівці виконати не вдається. Посилюється набряк в області лівого кульшового суглоба та ознаки крововтрати. Які кістки можуть бути пошкоджені?**
- 525. Яка кістка скелету людини не є повітроносною?**
- 526. Яка кістка скелету людини не є плоскою?**
- 527. Яка кістка скелету людини не є довгими?**
- 528. Які кістки скелету людини не є трубчастими?**
- 529. Які кістки утворюють пояс нижньої кінцівки людини?**
- 530. Яка кістка не входить до складу скелету вільної верхньої кінцівки людини?**
- 531. Яка кістка входить до складу поясу верхніх кінцівок людини?**
- 532. Яка кістка входить до складу поясу верхніх кінцівок людини?**
- 533. З медіальної сторони стегновий трикутник обмежений:**
- 534. Приведення II, IV, V пальців кисті до III здійснюють:**
- 535. Ліктьова ямка медіально утворена:**
- 536. Ліктьова ямка латерально утворена:**
- 537. Дно ліктьової ямки утворює:**

- 538. В ліктьовому каналі зап'ястка проходять:**
- 539. В променевому каналі зап'ястка проходять:**
- 540. Від медіального надвиростка плечової кістки починається і закінчується долонним апоневрозом:**
- 541. Від латерального надвиростка плечової кістки починається:**
- 542. Від медіального надвиростка плечової кістки починається:**
- 543. Чотирьохсторонній отвір верхньої кінцівки обмежений знизу:**
- 544. Чим обмежений надгрушоподібний отвір?**
- 545. Трьохсторонній отвір верхньої кінцівки обмежений латерально**
- 546. Трьохсторонній отвір верхньої кінцівки обмежений знизу:**
- 547. Трьохсторонній отвір верхньої кінцівки обмежений зверху:**
- 548. Які стінки пахвової порожнини Вам відомі?**
- 549. До великого горбика плечової кістки прикріплюються:**
- 550. До передньої групи м'язів плеча відносяться:**
- 551. На які групи поділяються м'язи плеча?**
- 552. Який м'яз приводить і пронує руку?**
- 553. До передньої групи м'язів плеча відносяться:**
- 554. Які м'язи підіймають ребра?**

555. Які м'язи опускають ребра?

556. Всі названі нижче м'язи відносяться до задньої групи м'язів гомілки, за винятком:

557. Кожен з названих нижче м'язів відіграє роль у підошовному згинанні стопи, за винятком

558. Передню стінку піхви прямого м'язу живота нижче пупка утворюють:

559. Задню стінку піхви прямого м'язу живота нижче пупка утворюють:

560. Задню стінку піхви прямого м'язу живота вище пупка утворюють:

561. Передню стінку піхви прямого м'язу живота вище пупка утворюють:

562. Біла лінія живота утворена:

563. Пахвинна зв'язка утворена:

564. Всі названі органи покриті вісцеральним листком внутрішньощийної фасції шиї /за В.М. Шевкуненком/, за винятком:

565. Глибокому кільцю пахвинного каналу відповідає:

566. Верхня стінка пахвинного каналу утворена:

567. Задня стінка пахвинного каналу утворена:

568. Передня стінка пахвинного каналу утворена:

569. Нижня стінка пахвинного каналу утворена:

570. Всі названі пахвинні кільця не відносяться до пахвинного каналу, за винятком:

571. Передхребтова фасція шиї покриває всі названі нижче м'язи, за винятком:

572. Міжапоневротичний простір розміщений між поверхневим і глибоким листками власної фасції шиї відомий як:

573. Сухожилок якого м'яза проходить у міжгорбковій борозні?

574. Стегнова борозна обмежена з медіальної сторони?

575. Клубово-гребінна борозна обмежена з латеральної сторони?

576. Клубово-гребінна борозна обмежена з медіальної сторони?

577. Всі з названих нижче тверджень відносно стегового трикутника вірні, за винятком:

578. Передню стінку пахової порожнини утворює:

579. Медіальну стінку пахової порожнини утворює:

580. Латеральну стінку пахової порожнини утворює:

581. Який з названих нижче м'язів прикріплюється до медіальної клиноподібної кістки і основи першої плеснової кістки?

582. Який з нижченазваних м'язів прикріплюється до малого вертлюга стегової кістки?

583. Який з нижченазваних м'язів прикріплюється до великого вертлюга стегової кістки?

584. Всі нижченазвані м'язи відіграють важливу роль у згинанні гомілки, за винятком:

585. До якої з нижченазваної структури прикріплюється передній драбинчастий м'яз?
586. Плече згинається всіма нижченазваними м'язами, за винятком:
587. Сухожилок якого м'яза проходить у міжгорбковій борозні плечової кістки?
588. Які з нижченазваних м'язів супінують плече та відтягують капсулу плечового суглоба?
589. Виберіть основну функцію для підлопаткового м'яза, яку він виконує у плечовому суглобі?
590. Виберіть основну функцію для дельтоподібного м'яза, яку він виконує в плечовому суглобі при скороченні всього м'яза?
591. Які з нижченазваних м'язів приймають участь в підніманні нижньої щелепи?
592. Всі нижченазвані м'язи відносяться до м'язів, за винятком:
593. Назвіть суглоб в якому спостерігається більше 50 відсотків всіх травматичних вивихів?
594. Ліктьовий суглоб є прикладом суглоба
595. Дуги сусідніх хребців з'єднуються між собою за допомогою:
596. Для драглистого ядра міжхребцевого диска характерним є все, крім:
597. Всі наступні кістки складають дистальний ряд кісток зап'ястка, за винятком:
598. Всі наступні кістки утворюють присередню стінку орбіти, за винятком:

- 599. Всі наступні твердження відносно хребтового стовпа вірні, за винятком:**
- 600. Всі наступні твердження відносно першого шийного хребця вірні за винятком:**
- 601. Піднімання латерального краю стопи здійснює:**
- 602. Згинання в колінному суглобі здійснює:**
- 603. Відведення стегна здійснює?**
- 604. Отвори гомілково-підколінного каналу?**
- 605. Яка кістка входить до складу поясу верхніх кінцівок людини?**
- 606. Яка кістка входить до скелету вільної нижньої кінцівки людини?**
- 607. Яка анатомічна структура служить вихідним отвором стегового каналу?**
- 608. Спереду стінкою привідного каналу буде?**
- 609. Латеральною стінкою стегового каналу буде?**
- 610. Грижі спричиняють утворення стегового каналу, який обмежують наступні стінки:**
- 611. У якого з нижченазваних органів чи тканин не має кровоносних судин та нервів?**
- 612. За рахунок чого відбувається ріст кісток в довжину?**
- 613. Які кістки з'єднуються між собою в черепі людини?**
- 614. Єдина рухома кістка в черепі людини?**

615. Хто з стародавніх вчених вперше розробив класифікацію різних типів конституції людини?
616. Кого з стародавніх вчених звать "Батьком медицини"?
617. Звідки починаються м'язи грудного пояса (пояса верхньої кінцівки)?
618. До якої групи м'язів відноситься надостьовий м'яз (*m. supraspinatus*)?
619. До якої групи м'язів відноситься підлопатковий м'яз (*m. subscapularis*)?
620. Які м'язи розділяє дельтоподібно-грудна борозна (*sulcus deltoideopectoralis*)?
621. Куди прикріплюється дельтоподібний м'яз (*m. deltoideus*)?
622. Яка функція дельтоподібного м'яза (*m. deltoideus*) при знаходженні його рухомої точки (*punctum mobile*) на передньою краю латеральної третини ключиці?
623. Яка функція дельтоподібного м'яза (*m. deltoideus*) при знаходженні його рухомої точки (*punctum mobile*) на ості лопатки та прилеглої частини підостьової фасції?
624. Який м'яз розташовується поверхнево, безпосередньо під шкірою, покриває плечовий суглоб з латеральної сторони, спереду зверху та ззаду, утворюючи характерну округлість плеча?
625. До якої групи м'язів відноситься надостьовий м'яз (*m. supraspinatus*)?
626. Куди прикріплюється надостьовий м'яз (*m. supraspinatus*)?
627. На яких анатомічних утворах знаходиться рухома точка (*punctum mobile*) надостьового м'яза (*m. supraspinatus*)?

628. Як називається латинською мовою підостьовий м'яз?

629. Як називається українською мовою *m. infraspinatus*?

630. До якої групи м'язів відноситься підостьовий м'яз (*m. infraspinatus*)?

631. Як називається м'яз, який починається від стінки задньої поверхні лопатки нижче ості лопатки (підостьової ямки) та від одноіменної фасції?

632. Яка функція підостьового м'яза (*m. infraspinatus*) при знаходженні його точки фіксації (*punctum fixum*) в ділянці підостьової ямки лопатки та капсули плечового суглоба?

633. Як називається м'яз, який починається від бічного краю лопатки та від підостьової фасції?

634. На яких анатомічних утворах знаходиться точка фіксації (*punctum fixum*) малого круглого м'яза (*m. teres minor*)?

635. Волокна якого м'яза гомілки відвертають стопу?

636. На яких анатомічних утворах знаходиться рухома точка (*puncture mobile*) малого круглого м'яза (*m. teres minor*)?

637. Який м'яз відноситься до м'язів плечового поясу?

638. Який м'яз, пучки якого направляються вздовж бічного краю лопатки, перетинає з присередньої сторони плечову кістку нижче рівня її хірургічної шийки?

639. Яка функція великого круглого м'яза (*m. teres major*) при знаходженні його точки фіксації (*punctum fixum*) на гребені малого горбка плечової кістки дистальніше і дещо назад місця прикріплення сухожилка найширшого м'яза спини?

640. Яке топографічне розташування підлопаткового м'яза (*m. subscapularis*)?
641. Як називається м'яз, який прикріплюється до малого горбка і гребеня малого горбка плечової кістки?
642. Які м'язи прикріплюються до великого горбка плечової кістки?
643. На які відділи м'язи плеча розмежовуються пластинкою власної фасції плеча?
644. Які м'язи відносяться до переднього відділу плеча?
645. Як називається частина волокон кінцевого сухожилка двоголового м'яза, які дугоподібно загинаються присередньо і переходять у фасцію передпліччя?
646. Як називається м'яз, який знаходиться між надсуглубовим горбком лопатки, верхівкою дзьобоподібного відростка лопатки та горбистістю променевої кістки?
647. Яка функція двоголового м'яза плеча (*m. biceps brachii*) при знаходженні його рухомої точки (*punctum mobile*) на горбистості променевої кістки?
648. Як називається латинською мовою дзьобо-плечовий м'яз?
649. Яка функція дзьобо-плечового м'яза (*m. coracobrachialis*) при знаходженні його точки фіксації (*punctum fixum*) на гребені малого горбка плечової кістки, на рівні прикріплення сухожилка дельтоподібного м'яза?
650. Яка функція дзьобо-плечового м'яза (*m. coracobrachialis*) при знаходженні його рухомої точки (*punctum mobile*) на гребено-малого горбка плечової кістки, на рівні прикріплення сухожилка дельтоподібного м'яза?
651. Яка функція плечового м'яза (*m. brachialis*) при знаходженні його рухомої точки (*punctum mobile*) на горбистості ліктьової кістки?

652. Які головки має триголовий м'яз плеча (m. triceps brachii)?

653. Яка частина і якого м'яза починається сухожилковими і м'язовими пучками на зовнішній поверхні плечової кістки, між місцем прикріплення малого круглого м'яза - проксимально та борозною променевого нерва дистально, а також від задньої поверхні бічної міжм'язової перегородки?

654. Звідки починається довга головка триголового м'яза плеча (caput longum triceps brachii) ?

655. Частиною якої головки триголового м'яза плеча (m. triceps brachii) є суглобовий м'яз ліктя (t. articularis cubiti)?

656. Куди прикріплюється суглобовий м'яз ліктя (m. articularis cubiti)?

657. Як називається латинською мовою ліктьовий м'яз?

658. Як називається м'яз, який знаходиться між задньою поверхнею бічного надвиростка плечової кістки та бічною поверхнею ліктьового відростка і задньою поверхнею проксимальної частини ліктьової кістки?

659. Як називається латинською мовою плечо-променевий м'яз?

660. На яких анатомічних утворах знаходиться точка фіксації (punctum fixum) плечо-променевого м'яза (m. brachioradialis) ?

661. На яких анатомічних утворах знаходиться рухома точка (punctum mobile) плечо-променевого м'яза (m. brachioradialis)?

662. Як називається українською мовою m. pronator teres?

663. Куди прикріплюється круглий м'яз-привертач (m. pronator teres)?

664. Як називається м'яз, який знаходиться між присереднім над-виростком плечової кістки та основою II (частково III) п'ясткової кістки?
665. Яка функція променевого м'яза-згинача зап'ястка (*m. flexor carpi radialis*) при знаходженні його рухомої точки (*punctum mobile*) на основі II (частково III) п'ясткової кістки?
666. Як називається латинською мовою довгий долонний м'яз?
667. Який м'яз має коротке м'язове черевце веретеноподібної форми, яке на середині передпліччя переходить в плоский довгий сухожилок, який проходить на кисть над тримачем м'язів-згиначів (*retinaculum musculorum flexorum*) і вплітається в проксимальний відділ долонного апоневрозу (*aponeurosis palmaris*) ?
668. Де прикріплюється довгий малогомілковий м'яз?
669. Скільки груп м'язів підшви стопи розрізняють?
670. Яка функція довгого долонного м'яза (*m. palmaris longus*) при знаходженні його рухомої точки (*punctum mobile*) на проксимальному відділі долонного апоневрозу (*aponeurosis palmaris*)?
671. Які головки має ліктьовий м'яз-згинач зап'ястка (*m. flexor carpi ulnaris*) ?
672. Звідки починається ліктьова голівка ліктьового м'яза-згинача зап'ястка (*caput ulnare m. flexor carpi ulnaris*)?
673. Яке топографічне розташування поверхневого м'яза-згинача пальців (*m. flexor digitorum superficialis*) ?
674. Які головки має поверхневий м'яз-згинач пальців (*m. flexor digitorum superficialis*) ?

675. Куди прикріплюється поверхневий м'яз-згинач пальців (m. flexor digitorum superficialis) ?

676. Якого м'яза на рівні середини проксимальних фаланг розщеплюються на дві ніжки (надвоє), між якими проходять сухожилки глибокого м'яза-згинача пальців (m. flexor digitorum profundus)?

677. Сухожилки яких м'язів передпліччя утворюють перехрестя сухожилків (chiasma tendinum)?

678. До якої групи м'язів відноситься довгий м'яз-згинач великого пальця кисті (m. flexor pollicis longus) ?

679. Як називається латинською мовою квадратний м'яз-привертач?

680. Який м'яз топографічно розташовується під сухожилками згиначів пальців і зап'ястка на передній поверхні ліктьової променевої кісток та на міжкістковій перетинці в межах нижньої третини передпліччя?

681. Куди прикріплюється довгий променевий м'яз-розгинач зап'ястка (m. extensor carpi radialis longus)?

682. Як називається латинською мовою короткий променевий м'яз-розгинач зап'ястка?

683. Які м'язи розгинають кисть, а при одночасному скороченні разом з променевим м'язом-згиначем зап'ястка відводять кисть?

684. Як називається українською мовою M. extensor digitorum ?

685. Як називається латинською мовою м'яз-розгинач мізинця?

686. До якої групи м'язів відноситься м'яз-розгинач мізинця (m. extensor digiti minimi) ?

687. До якої групи м'язів відноситься ліктьовий м'яз-розгинач зап'ястка (m.extensor carpi ulnaris)?

688. Які голівки має ліктьовий м'яз-розгинач зап'ястка (m. extensor carpi ulnaris)?

689. Яка функція ліктьового м'яза-розгинача зап'ястка (m. extensor carpi ulnaris) при знаходженні його точки фіксації (punctum fixum) на бічному надвиростку плечової кістки та на верхньому відрізку заднього краю ліктьової кістки?

690. На яких анатомічних утворах знаходиться точка фіксації (punctum fixum) м'яза-відвертача (m. supinator)?

691. Звідки починається довгий відвідний м'яз великого пальця (m. abductor pollicis longus)?

692. Який м'яз топографічно знаходиться дистальніше довгого відвідного м'яза великого пальця (m. abductor pollicis longus), а сухожилок його проходить разом з сухожилком довгого відвідного м'яза великого пальця в одній синовіальній піхві під тримачем м'язів-розгиначів (retinaculum musculorum extensorum) ?

693. Куди прикріплюється короткий м'яз-розгинач великого пальця кисті (m.extensor pollicis brevis) ?

694. Як називається латинською мовою довгий м'яз-розгинач великого пальця кисті?

695. Який м'яз має вузьке, довге, веретеноподібне черевце, яке розташовується на дорсальній поверхні нижньої половини передпліччя, вкрите м'язом-розгиначем пальців. Дистально сухожилок проходить під тримачем м'язів-розгиначів (retinaculum musculorum extensorum) в загальній синовіальній піхві разом з сухожилками м'яза-розгинача пальців?

696. Яка функція м'яза-розгинача вказівного пальця (*m. extensor indicis*) при знаходженні його точки фіксації (*punctum fixum*) на задній поверхні дистальної третини тіла ліктьової кістки та на міжкісткової перетинці?
697. Як називається м'яз, який прикріплюється до променевої сторони основи проксимальної фаланги великого пальця та до бічного краю сухожилка довгого м'яза-розгинача великого пальця?
698. Який м'яз відводить великий палець кисті, дещо протиставляє його та бере участь в згинанні проксимальної фаланги?
699. Куди прикріплюється протиставний м'яз великого пальця (*m. opponens pollicis*) ?
700. Який м'яз топографічно лежить досередини від короткого відповідного м'яза великого пальця безпосередньо під шкірою, м'язові пучки утворюють дві головки (поверхневу та глибоку) ?
701. Які м'язи прикріплюються до медіальної клиноподібної кістки?
702. Скільки м'язів належить до м'язів тилу стопи?
703. Як називається м'яз, який починається від кістки-трапеції, трапецієподібної та головчастої кісток, основи І'ясткової кістки та від тримача м'язів-згиначів?
704. На яких анатомічних утворах знаходиться рухома точка (*punctum mobile*) короткого м'яза-згинача великого пальця (*m. flexor pollicis brevis*) ?
705. Який м'яз верхньої кінцівки має дві голови?
706. На яких анатомічних утворах знаходиться точка фіксації (*punctum fixum*) привідного м'яза великого пальця кисті (*muscul adductor pollicis*) ?
707. Куди прикріплюється короткий долонний м'яз (*m. palmaris brevis*) ?

708. Яка повна функція короткого долонного м'яза (m. palmaris brevis)?

709. Чим обмежений підгрушоподібний отвір?

710. Яка функція відвідного м'яза мізинця (m. abductor digiti minimi) при знаходженні його рухомої точки (punctum mobile) на ліктьовій стороні (краї) основи проксимальної фаланги мізинця і тильному апоневрозі V пальця?

711. На яких анатомічних утворах знаходиться точка фіксації (punctum fixum) протиставного м'яза мізинця (m. opponens digiti minimi) ?

712. Як називається латинською мовою червоподібні м'язи кисті?

713. Як називаються м'язи, які знаходяться між сухожилками глибокого м'яза-згинача пальців та тильною поверхнею основи проксимальних фаланг від вказівного пальця до мізинця?

714. Яка функція червоподібних м'язів кисті (mm. lumbricales manus) при знаходженні їх рухомої точки (punctum mobile) на тильній поверхні основи проксимальних фаланг від вказівного пальця до мізинця?

715. На яких анатомічних утворах знаходиться рухома точка (punctum mobile) долонних міжкісткових м'язів (mm. inteross palmares)?

716. Яка функція тильних міжкісткових м'язів кисті (mm. interossei dorsales manus) при знаходженні їх точки фіксації (punctum fixum) на обернених один до одного поверхнях I-V п'ясткових кісток?

717. Як називається анатомічний утвір, який оточує групи м'язів верхньої кінцівки (musculi membri superioris) ?

718. Якою фасцією вкритий дельтоподібний м'яз?

719. Яке топографічне розташування плечової фасції (fascia brachii)?

720. Який м'яз проходить через великий сідничий отвір
721. На скільки груп поділяються м'язи таза?
722. На які групи поділяються м'язи таза?
723. До внутрішніх м'язів тазу відносяться:
724. До зовнішніх м'язів тазу відносяться:
725. До зовнішніх м'язів тазу відносяться:
726. З яких частин складається клубово-поперековий м'яз?
727. Яка функція клубово-поперекового м'яза?
728. Куди прикріплюється внутрішній затульний м'яз?
729. Скільки є близнюкових м'язів?
730. Яка функція близнюкових м'язів?
731. Куди прикріплюється грушоподібний м'яз?
732. Яка функція грушоподібного м'яза?
733. На скільки шарів поділяються зовнішні м'язи тазу?
734. На які шари поділяються зовнішні м'язи тазу?
735. Скільки м'язів у поверхневому шарі зовнішніх м'язів тазу?
736. Який м'яз проходить через м'язову лакуну?
737. Які з названих м'язів розгинають стегно?

738. Які м'язи приводять стегно?
739. На скільки груп поділяються м'язи стегна?
740. На які групи поділяються м'язи стегна?
741. Які м'язи стегна відносяться до передньої групи?
742. Які м'язи стегна відносяться до задньої групи?
743. Скільки головок має двоголовий м'яз стегна?
744. Які м'язи стегна відносяться до медіальної групи?
745. Чим утворена «глибока гусяча лапка»?
746. Які м'язи привертають стегно?
747. Укажіть групу м'язів, які одночасно розгинають стегно і згинають гомілку?
748. Які м'язи гомілки виконують згинання у колінному суглобі?
749. Сухожилок якого м'яза утворює п'яткове сухожилля?
750. Які м'язи привертають стопу?
751. Які м'язи відвертають стопу?
752. Які м'язи стопи відводять II-IV пальці?
753. Які м'язи стопи приводять II-IV пальці?
754. Назвіть м'язи стопи, що згинають пальці:
755. Чим обмежена судинна лакуна?

- 756. Що є зовнішнім отвором стегового каналу?**
- 757. Що утворюється в поверхневому листку широкої фасції стегна?**
- 758. Чим утворена задня стінка стегового каналу?**
- 759. Чим обмежена м'язова лакуна?**
- 760. Що проходить через судинну лакуну?**
- 761. Чим обмежений стеговий трикутник?**
- 762. Скільки стінок виділяють у стеговому каналі?**
- 763. Які стінки виділяють у стеговому каналі?**
- 764. Стінками стегового кільця є:**
- 765. Де знаходиться вхідний отвір привідного каналу?**
- 766. Що сполучає привідний канал?**
- 767. Скільки є стінок привідного каналу?**
- 768. Які є стінки привідного каналу?**
- 769. Чим утворена медіальна стінка привідного каналу?**
- 770. Чим утворена латеральна стінка привідного каналу?**
- 771. Чим утворена передня стінка привідного каналу?**
- 772. В сухожиллі якого м'яза знаходиться нижній, вихідний отвір привідного каналу?**

773. Яку форму має підколінна ямка?

774. Скільки сторін розрізняють в підколінній ямці?

775. Чим обмежена підколінна ямка?

776. До каналів гомілки належать:

777. Які м'язи приймають участь в утворенні гомілково-підколінного каналу?

778. Чим утворена передня стінка гомілково-підколінного каналу?

779. Чим утворена задня стінка гомілково-підколінного каналу?

780. Скільки отворів має гомілково-підколінний канал?

781. Чим обмежений спереду верхній отвір гомілково-підколінного каналу?

782. Чим обмежений із заду верхній отвір гомілково-підколінного каналу?

783. Де знаходиться передній отвір гомілково-підколінного каналу?

784. Чим обмежений спереду нижній м'язово-малогомілковий канал?

785. Чим обмежений із заду нижній м'язово-малогомілковий канал?

786. Чим обмежений спереду верхній м'язово-малогомілковий канал?

787. Чим обмежений із заду верхній м'язово-малогомілковий канал?

788. Скільки борозен розрізняють на підшві стопи?

789. Які Ви знаєте борозни на підшві стопи?

790. Чим обмежена медіальна підшовна борозна?

- 791. Чим обмежена латеральна підшовна борозна?**
- 792. Які фасції відносяться до нижньої кінцівки?**
- 793. Які фасції відносяться до нижньої кінцівки?**
- 794. З яких пластинок складається широка фасція стегна?**
- 795. Чим закрита підшкірний розтвір?**
- 796. Скільки рогів має серповидний край широкої фасції?**
- 797. Скільки є міжм'язових перегородок на стегні?**
- 798. Які Ви знаєте міжм'язові перегородки на стегні?**
- 799. Для яких м'язів формує фасціальні піхви широка фасція стегна?**
- 800. Які групи м'язів охоплює фасція гомілки?**
- 801. Скільки міжм'язових перегородок утворює фасція гомілки?**
- 802. На скільки пластинок розділяється фасція гомілки?**
- 803. На які пластинки розділяється фасція гомілки?**
- 804. Сухожилля якого м'яза проходить у медіальному каналі тилу стопи?**
- 805. Сухожилля якого м'яза проходить у другому каналі тила стопи?**
- 806. Сухожилля якого м'яза проходить на передній поверхні гомілки?**
- 807. Що проходить у гомілково-підколінному каналі?**

808. Синовіальна піхва якого м'яза розташована під підпорою надп'яркової кістки?
809. Скільки кістково-фіброзних каналів є під утримувачами згиначів?
810. Що входить до складу грудної клітки?
811. Які ребра називаються справжніми?
812. Які ребра називаються несправжніми?
813. Які ребра називаються коливальними?
814. У що продовжується кісткова частина ребра допереду?
815. Ребро складається з:
816. На якому ребрі розміщений горбик драбинчастого м'яза?
817. На якому ребрі розміщена борозна підключичної артерії?
818. На якому ребрі розміщена борозна підключичної вени?
819. Яка частина ребра зчленовується з поперечним відростком відповідного хребця?
820. Яка частина ребра зчленовується з реберними ямками хребців?
821. На внутрішній поверхні ребра знизу проходить вздовж:
822. Які частини виділяють у груднині?
823. Яка латинська назва ребра?
824. Яка латинська назва груднини?

825. Які вирізки є на руків'ї груднини?
826. Яке ребро повністю зчленовується з руків'ям груднини?
827. Яке ребро частково зчленовується з руків'ям груднини?
828. Чим утворений кут груднини?
829. Чим обмежований верхній отвір грудної клітки?
830. Чим обмежований нижній отвір грудної клітки?
831. Реберною дугою називається:
832. Чим утворений підгрудинний кут?
833. Яка латинська назва лопатки?
834. Яка латинська назва ключиці?
835. Яка форма лопатки?
836. На якому рівні розміщена лопатка?
837. Які кути має лопатка?
838. Які поверхні має лопатка?
839. Як називається гребінь на задній поверхні лопатки?
840. Які відростки лопатки ви знаєте?
841. З чим з'єднується лопатка своєю суглобовою западиною?
842. Де розміщена ключиця?

843. Які частини розрізняють у ключиці?
844. Який край лопатки має вирізку лопатки?
845. Які краї має лопатка?
846. Як називається передня поверхня лопатки?
847. Які ямки розташовані біля ості лопатки?
848. На якій поверхні грудної клітки розташована лопатка?
849. Скільки кісток утворюють череп?
850. Скільки парних кісток входить до складу черепа?
851. Скільки непарних кісток входить до складу черепа?
852. Які відділи розрізняють у черепі?
853. Яка з перерахованих кісток належать до мозкового черепа?
854. Яка з перерахованих кісток належать до лицевого черепа?
855. Які частини розрізняють у лобній кістці?
856. Які вирізки є в надочному краї луски лобної кістки?
857. Який відросток має лобна кістка?
858. Яка ямка розміщена в ділянці латерального кута очної частини лобної кістки?
859. Яка ямка розміщена в ділянці медіального кута очної частини лобної кістки?

860. Які пазухи містяться в носовій частині лобної кістки?

861. З чим з'єднуються лобні пазухи?

862. Який отвір у потиличній кістці?

863. Які частини розрізняють у потиличній кістці?

864. З чим з'єднується спереду основна частина потиличної кістки?

865. Який горбик розміщений на нижній поверхні основної частини потиличної кістки?

866. Який канал проходить в основі потиличних виростків потиличної кістки?

867. Яка вирізка розташована збоку від потиличного виростка?

868. *Protuberancia occipitalis externa* це є:

869. *Protuberancia occipitalis interna* це є:

870. Які каркові лінії проходять на потиличній кістці?

871. Внутрішній потиличний виступ розташований:

872. Борозна якого венозного синуса твердої мозкової оболонки розташована на потиличній кістці?

873. Скількитім'яних кісток є у черепі?

874. Які відділи черепа утворюютьтім'яні кістки?

875. Скільки країв маєтім'яна кістка?

876. Які краї маєтім'яна кістка?

877. Скільки кутів має тім'яна кістка?

878. Які кути має тім'яна кістка?

879. Борозни яких венозних пазух є на тім'яній кістці?

880. Який горб розташований на зовнішній випуклій поверхні тім'яної кістки?

881. Які лінії розташовані на зовнішній випуклій поверхні тім'яної кістки?

882. Яка латинська назва тім'яної кістки?

883. Яка латинська назва лобної кістки?

884. Яка латинська назва потиличної кістки?

885. Піднебінна кістка містить всі утвори крім:

886. Скільки поверхонь має тіло клиновидної кістки?

887. Що розміщено на передній поверхні тіла клиновидної кістки?

888. Яка ямка розміщена у турецькому сідлі тіла клиновидної кістки?

889. Турецьке сідло тіла клиновидної кістки має:

890. Яка борозна проходить на бокових поверхнях тіла клиновидної кістки?

891. Що таке клиновидна пазуха?

892. З чим з'єднується клиновидна пазуха?

893. Які крила має клиновидна кістка?

894. Що міститься в основі малого крила клиновидної кістки?

- 895. Що розміщено між малим крилом і верхнім краєм великого крила клиновидної кістки?**
- 896. Які отвори є на мозковій поверхні великого крила клиновидної кістки?**
- 897. Яку стінку очниці утворює очноямкова поверхня великого крила клиновидної кістки?**
- 898. Скільки є криловидних відростків у клиновидної кістки?**
- 899. Які пластинки виділяють у криловидних відростках клиновидної кістки?**
- 900. Що міститься ззаду між пластинками криловидних відростків клиновидної кістки?**
- 901. Задній вільний край малого крила клиновидної кістки є межею між:**
- 902. Куди відкривається круглий отвір великого крила клиновидної кістки?**
- 903. Решітчаста кістка належить до:**
- 904. Решітчаста кістка бере участь у формуванні стінок:**
- 905. Які пластинки розрізняють у решітчастій кістці?**
- 906. Що розміщено по боках від перпендикулярної пластинки решітчастої кістки?**
- 907. Що розміщене над решітчастою пластинкою решітчастої кістки?**
- 908. Що розміщене до переду від півнячого гребеня решітчастої кістки?**
- 909. В утворенні якої структури бере участь перпендикулярна пластинки решітчастої кістки?**

- 910. Чим заповнені решітчасті комірки решітчастого лабіринту?**
- 911. Що розташовано на медіальній стороні решітчастого лабіринту?**
- 912. Що розташовано між верхньою і середньою носовими раковинами?**
- 913. Що розташовано під середньою носовою раковиною?**
- 914. Як називається відросток, що відходить від середньої носової раковини донизу і латерально?**
- 915. Де розміщений решітчастий міхурець?**
- 916. З чим сполучається середній носовий хід?**
- 917. Яка латинська назва решітчастої кістки?**
- 918. Яка латинська назва клиновидної кістки?**
- 919. Як називається латинською мовою скронева кістка?**
- 920. До яких кісток належить скронева кістка?**
- 921. До складу яких відділів черепа належить скронева кістка?**
- 922. Між якими кістками розташована скронева кістка?**
- 923. Що вміщує скронева кістка?**
- 924. З яких частин складається скронева кістка?**
- 925. Яка частина скроневої кістки має тригранну форму?**
- 926. Які частини має кам'яниста частина?**

927. Яка частина скроневої кістки переходить у соскоподібний відросток.
928. Яка частина піраміди скроневої кістки спрямована вперед і медіально?
929. Які поверхні має кам'яниста частина?
930. Які краї має кам'яниста частина?
931. Яка поверхня кам'янистої частини спрямована вперед і угору?
932. Передня поверхня кам'янистої частини переходить в:
933. Що відділяє луску від кам'янистої частини?
934. Де знаходиться кам'янисто-лускова щілина?
935. Вкажіть анатомічне утворення на передній поверхні піраміди скроневої кістки.
936. Вкажіть анатомічне утворення на передній поверхні піраміди скроневої кістки.
937. Вкажіть анатомічне утворення на передній поверхні піраміди скроневої кістки.
938. Вкажіть анатомічне утворення на передній поверхні піраміди скроневої кістки.
939. Вкажіть анатомічне утворення на передній поверхні піраміди скроневої кістки.
940. Вкажіть анатомічне утворення на передній поверхні піраміди скроневої кістки.

941. Вкажіть анатомічне утворення на передній поверхні піраміди скроневої кістки.

942. Вкажіть анатомічне утворення на передній поверхні піраміди скроневої кістки.

943. Вкажіть анатомічне утворення на передній поверхні піраміди скроневої кістки.

944. Які анатомічні утворення знаходяться на задній поверхні піраміди скроневої кістки?

945. Які анатомічні утворення знаходяться на задній поверхні піраміди скроневої кістки?

946. Які анатомічні утворення знаходяться на задній поверхні піраміди скроневої кістки?

947. Які анатомічні утворення знаходяться на задній поверхні піраміди скроневої кістки?

948. Які анатомічні утворення знаходяться на нижній поверхні піраміди скроневої кістки?

949. Які анатомічні утворення знаходяться на нижній поверхні піраміди скроневої кістки?

950. Які анатомічні утворення знаходяться на нижній поверхні піраміди скроневої кістки?

951. Які анатомічні утворення знаходяться на нижній поверхні піраміди скроневої кістки?

952. Які анатомічні утворення знаходяться на нижній поверхні піраміди скроневої кістки?

953. Які анатомічні утворення знаходяться на нижній поверхні піраміди скроневої кістки?

954. Де знаходиться отвір соскоподібного каналця?

955. Де знаходиться зовнішній отвір сонного каналу?

956. Де знаходиться внутрішній отвір сонного каналу?

957. Де починається канал лицевого нерва?

958. Де закінчується канал лицевого нерва?

959. Як називається латинською мовою верхня щелепа?

960. До яких кісток належить *maxilla* верхня щелепа?

961. Верхня щелепа має:

962. Які відростки має верхня щелепа?

963. Які відростки має верхня щелепа?

964. Які відростки має верхня щелепа?

965. Які відростки має верхня щелепа?

966. Які відростки має верхня щелепа?

967. Які відростки має верхня щелепа?

968. Які поверхні має тіло верхньої щелепи?

969. Які поверхні має тіло верхньої щелепи?
970. Які поверхні має тіло верхньої щелепи?
971. Які поверхні має тіло верхньої щелепи?
972. Які поверхні має тіло верхньої щелепи?
973. Які поверхні має тіло верхньої щелепи?
974. Яка кістка містить гайморову пазуху?
975. На якій поверхні верхньої щелепи є верхньощелепний розтвір?
976. На якій поверхні знаходиться горб верхньої щелепи?
977. На якій поверхні верхньої щелепи знаходиться слъзова борозна?
978. На якій поверхні верхньої щелепи знаходиться решітчастий гребінь?
979. На якій поверхні верхньої щелепи знаходяться коміркові підвищення?
980. На якій поверхні верхньої щелепи знаходиться підочноямкова борозна?
981. Скільки зубних комірок є на верхній щелепі?
982. Піднебінний відросток верхньої щелепи містить:
983. Піднебінний відросток верхньої щелепи містить:
984. Комірковий відросток верхньої щелепи містить:
985. Комірковий відросток верхньої щелепи містить:
986. Як називається латинською мовою піднебінна кістка?

987. До складу яких структур входить піднебінна кістка?
988. До складу яких структур входить піднебінна кістка?
989. До складу яких структур входить піднебінна кістка?
990. До складу яких структур входить піднебінна кістка?
991. До складу яких структур входить піднебінна кістка?
992. З яких частин складається піднебінна кістка?
993. З яких частин складається піднебінна кістка?
994. Перпендикулярна пластинка піднебінної кістки містить всі утвори крім:
995. Піднебінна кістка містить наступні відростки:
996. Які кістки утворюють кісткове піднебіння?
997. Як називається латинською мовою носова кістка?
998. Які кістки утворюють кісткову спинку носа?
999. З якою кісткою з'єднується носова кістка зверху?
1000. З якою кісткою з'єднується носова кістка ззовні?
1001. Як називається латинською мовою слъозова кістка?
1002. З якою кісткою з'єднується слъозова кістка медіально?
1003. З якою кісткою з'єднується слъозова кістка спереду?
1004. З якою кісткою з'єднується слъозова кістка ззаду?

1005. З якою кісткою з'єднується слъозова кістка угорі?
1006. Як називається латинською мовою вилична кістка?
1007. Які поверхні має os zygomaticum ?
1008. Які поверхні має os zygomaticum ?
1009. Які поверхні має os zygomaticum ?
1010. Які поверхні має os zygomaticum ?
1011. Які поверхні має os zygomaticum ?
1012. Які відростки має os zygomaticum ?
1013. Які відростки має os zygomaticum ?
1014. Як називається латинською мовою нижня носова раковина?
1015. Які носові раковини є окремими утвореннями?
1016. Які носові ходи ви знаєте?
1017. Як називається латинською мовою леміш?
1018. З якою кісткою з'єднується vomer спереду?
1019. З якою кісткою з'єднується vomer вгорі?
1020. З якою кісткою з'єднується vomer внизу?
1021. З якою кісткою з'єднується vomer заднім краєм?
1022. Як називається латинською мовою нижня щелепа?

1023. З якою кісткою з'єднується mandibula?
1024. Які частини має нижня щелепа?
1025. На тілі нижньої щелепи розрізняють:
1026. На тілі нижньої щелепи розрізняють:
1027. На тілі нижньої щелепи розрізняють:
1028. На тілі нижньої щелепи розрізняють:
1029. На тілі нижньої щелепи розрізняють:
1030. Скільки зубних комірок містить нижня щелепа?
1031. Скільки гілок містить нижня щелепа?
1032. Які відростки містить нижня щелепа?
1033. Які відростки містить нижня щелепа?
1034. Як називається латинською мовою під'язикова кістка?
1035. Які частини має os hyoideum?
1036. До складу склепіння черепа відносяться:
1037. До складу склепіння черепа відносяться:
1038. До складу склепіння черепа відносяться:
1039. До складу склепіння черепа відносяться:
1040. До складу склепіння черепа відносяться:

- 1041. До складу склепіння черепа відносяться:**
- 1042. У ділянці склепіння розрізняють:**
- 1043. У ділянці склепіння розрізняють:**
- 1044. У ділянці склепіння розрізняють:**
- 1045. У ділянці склепіння розрізняють:**
- 1046. На які відділи поділяють череп?**
- 1047. На які відділи поділяють череп?**
- 1048. Які кістки входять у склад мозкового черепа?**
- 1049. Які кістки входять у склад мозкового черепа?**
- 1050. Які кістки входять у склад мозкового черепа?**
- 1051. Які кістки входять у склад мозкового черепа?**
- 1052. Які кістки входять у склад лицевого черепа?**
- 1053. Які кістки входять у склад лицевого черепа?**
- 1054. Які кістки входять у склад лицевого черепа?**
- 1055. Які кістки входять у склад лицевого черепа?**
- 1056. Які кістки входять у склад лицевого черепа?**
- 1057. Які кістки входять у склад лицевого черепа?**
- 1058. Які кістки входять у склад лицевого черепа?**

1059. На скільки відділів розділяють внутрішню основу черепа?
1060. Якими кістками утворена передня черепна ямка?
1061. Якими кістками утворена передня черепна ямка?
1062. Якими кістками утворена передня черепна ямка?
1063. Якими кістками утворена передня черепна ямка?
1064. Якими кістками утворена середня черепна ямка?
1065. Якими кістками утворена середня черепна ямка?
1066. Якими кістками утворена задня черепна ямка?
1067. Якими кістками утворена задня черепна ямка?
1068. Чим утворене кісткове піднебіння?
1069. Чим утворене кісткове піднебіння?
1070. Як називається латинською мовою скронева ямка?
1071. Як називається латинською мовою крилопіднебінна ямка?
1072. Як називається латинською мовою підскронева ямка?
1073. Які анатомічні утворення формують стінки крило піднебінної ямки?
1074. Який отвір сполучає крилопіднебінну ямку з порожниною носа?
1075. Як називається латинською мовою очна ямка?
1076. Скільки стінок має очна ямка?

1077. Які кістки беруть участь в утворенні нижньої стінки очної ямки?
1078. Які кістки беруть участь в утворенні нижньої стінки очної ямки?
1079. Які кістки беруть участь в утворенні нижньої стінки очної ямки?
1080. Які кістки беруть участь в утворенні нижньої стінки очної ямки?
1081. Які кістки беруть участь в утворенні нижньої стінки очної ямки?
1082. Які кістки беруть участь в утворенні нижньої стінки очної ямки?
1083. Які кістки беруть участь в утворенні нижньої стінки очної ямки?
1084. Які кістки беруть участь в утворенні медіальної стінки очної ямки?
1085. Які кістки беруть участь в утворенні медіальної стінки очної ямки?
1086. Які кістки беруть участь в утворенні медіальної стінки очної ямки?
1087. Які кістки беруть участь в утворенні медіальної стінки очної ямки?
1088. Які кістки беруть участь в утворенні медіальної стінки очної ямки?
1089. Які кістки беруть участь в утворенні верхньої стінки очної ямки?
1090. Які кістки беруть участь в утворенні верхньої стінки очної ямки?
1091. Які отвори є в стінках очної ямки?
1092. Які отвори є в стінках очної ямки?
1093. Які отвори є в стінках очної ямки?
1094. Які отвори є в стінках очної ямки?

- 1095. Які отвори є в стінках очної ямки?**
- 1096. Які кістки беруть участь в утворенні кісткової перегородки носа?**
- 1097. Які кістки беруть участь в утворенні кісткової перегородки носа?**
- 1098. Які кістки беруть участь в утворенні латеральної стінки порожнини носа?**
- 1099. Які кістки беруть участь в утворенні латеральної стінки порожнини носа?**
- 1100. Які кістки утворюють кісткове піднебіння?**
- 1101. Які кістки утворюють кісткове піднебіння?**
- 1102. Вкажіть кістки, що беруть участь у формуванні мозкового черепа.**
- 1103. Вкажіть ознаки черепа новонародженого.**
- 1104. Вкажіть ознаки черепа новонародженого.**
- 1105. Вкажіть ознаки чоловічого черепа.**
- 1106. Вкажіть ознаки чоловічого черепа.**
- 1107. У скільки разів мозковий череп новонародженого переважає лицевий?**
- 1108. До якого віку заростає переднє тім'ячко?**
- 1109. До якого віку заростає заднє тім'ячко?**
- 1110. До якого віку заростає клиноподібне тім'ячко?**
- 1111. До якого віку заростає соскоподібне тім'ячко?**
- 1112. Вкажіть відділ вільної частини верхньої кінцівки.**

1113. Вкажіть відділ вільної частини верхньої кінцівки.
1114. Вкажіть відділ вільної частини верхньої кінцівки.
1115. Як називається латинською мовою плечова кістка?
1116. До яких кісток належить *numerus*?
1117. Плечова кістка має:
1118. Вкажіть анатомічне утворення на проксимальному кінці плечової кістки.
1119. Вкажіть анатомічне утворення на проксимальному кінці плечової кістки.
1120. Вкажіть анатомічне утворення на проксимальному кінці плечової кістки.
1121. Вкажіть анатомічне утворення на проксимальному кінці плечової кістки.
1122. Вкажіть анатомічне утворення на проксимальному кінці плечової кістки.
1123. Вкажіть анатомічне утворення на проксимальному кінці плечової кістки.
1124. Вкажіть анатомічне утворення на дистальному кінці плечової кістки.
1125. Вкажіть анатомічне утворення на дистальному кінці плечової кістки.
1126. Вкажіть анатомічне утворення на дистальному кінці плечової кістки.
1127. Вкажіть анатомічне утворення на дистальному кінці плечової кістки.
1128. Вкажіть анатомічне утворення на дистальному кінці плечової кістки.
1129. Які кістки утворюють скелет передпліччя?
1130. Які кістки утворюють скелет передпліччя?

- 1131. Вкажіть анатомічні утворення на проксимальному кінці ліктьової кістки?**
- 1132. Вкажіть анатомічні утворення на проксимальному кінці ліктьової кістки?**
- 1133. Вкажіть анатомічні утворення на проксимальному кінці ліктьової кістки?**
- 1134. Вкажіть анатомічні утворення на проксимальному кінці ліктьової кістки?**
- 1135. Вкажіть анатомічні утворення на дистальному кінці ліктьової кістки?**
- 1136. Вкажіть анатомічні утворення на дистальному кінці ліктьової кістки?**
- 1137. Вкажіть анатомічні утворення на проксимальному кінці променевої кістки?**
- 1138. Вкажіть анатомічні утворення на проксимальному кінці променевої кістки?**
- 1139. Вкажіть анатомічні утворення на проксимальному кінці променевої кістки?**
- 1140. Вкажіть анатомічні утворення на проксимальному кінці променевої кістки?**
- 1141. Вкажіть анатомічні утворення на дистальному кінці променевої кістки?**
- 1142. Вкажіть анатомічні утворення на дистальному кінці променевої кістки?**
- 1143. Які частини виділяють в скелеті кисті?**
- 1144. Які з перерахованих кісток входять в дистальний ряд кісток зап'ястя?**
- 1145. Які з перерахованих кісток входять в дистальний ряд кісток зап'ястя?**
- 1146. Вкажіть частини п'ясткових кісток.**
- 1147. Скільки фаланг мають пальці?**
- 1148. Який анатомічний утвір розташований на кінці кінцевої фаланги пальця?**

1149. В якій площині перепилюється кістка підчас ампутації?

1150. Виконуючи гімнастичні вправи, дівчина впала на крижі. Наступного дня вона стала відчувати різкий біль у місці удару при спробі сісти та ходіння. При огляді лікарем крижової ділянки під шкірою в її нижній третині виявлено кровопідтік. Які кістки можуть бути пошкоджені?

1151. До травматолога звернувся пацієнт 60 років зі скаргами на загальну слабкість та болі в кістках. Лікар встановив ослаблення трофічної функції нервової системи. Яке захворювання кісткової тканини може бути при цьому?

1152. Обстеження дитяти 11,5 місяців. Дитя розвинене нормально, рухи активні, може стояти. Які вигини хребетного стовпа сформувалися?

1153. Опік поширюється від нижньої третини плеча до променево-зап'яткового суглобу. Які ділянки тіла уражені опіком?

1154. Педіатр оглянув дитину 11,5 місяців. Скарг немає. Дитина активна, тримає голову, сидить, стоїть у манжеті. Які вигини хребтового стовпа сформувалися у дитини?

1155. Під час ДТП тулуб потерпілого перебував у зігнутому стані. Перелом якої частини хребця є найбільш вірогідним?

1156. Під час ДТП тулуб потерпілого перебував у зігнутому стані. Перелом якого відділу хребта є найбільш вірогідним?

1157. Під час ДТП тулуб потерпілого перебував у розігнутому стані. Перелом якої частини хребця є найбільш вірогідним?

1158. Під час пірнання хлопець вдарився головою в дно басейна. При огляді виявляється різкий біль у шиї, слабкість у руках, неможливість повернути голову. Які кістки можуть бути пошкоджені?

- 1159. При ДТП під час удару ззаду шия потерпілого перебувала у розігнутому стані. Пошкодження яких частин шийних хребців є найбільш вірогідною?**
- 1160. При огляді грудної клітки потерпілого біля краю грудини справа виявлено гематому. Якій анатомічній лінії відповідає локалізація цієї гематоми?**
- 1161. При рентгенологічному обстеженні на знімку визначається вроджений розтвір правих ніжок дуг I-II грудних хребців. Що можна діагностувати в хворого?**
- 1162. У людини під час травми порушився процес росту кістки в товщину. За рахунок яких анатомічних структур наші кістки ростуть в товщину?**
- 1163. У людини під час травми порушився процес росту кістки в довжину. За рахунок яких анатомічних структур наші кістки ростуть в довжину?**
- 1164. У потерпілого поранення в області шиї. Кровотеча із загальної сонної артерії. До якого анатомічного утворення потрібно притиснути артерію, аби зупинити кровотечу?**
- 1165. У спортсмена під час падіння порушилися рухи навколо фронтальної осі. Які рухи здійснюються навколо фронтальної осі?**
- 1166. У спортсмена під час падіння порушилися рухи навколо сагітальної осі. Які рухи здійснюються навколо сагітальної осі?**
- 1167. У хворого на рівні пупка по linea axillaris media виявлено рану. В якій ділянці живота розташовується ця рана?**
- 1168. Чоловік 35 років звернувся до лікаря з болями в бічній частині стегна. Як на латинській мові називається бічний?**
- 1169. Чоловік 35 років звернувся до лікаря з болями в нижній частині живота. Як на латинській мові називається нижній?**

1170. Чоловік 35 років звернувся до лікаря з болями у верхній частині гомілки. Як на латинській мові називається верхній?

1171. Якими особливостями будови можна пояснити так звані компресійні переломи тіл хребців?

1172. Які травми можна попередити, застосувавши підголівники на спинках автомобільних крісел?

1173. В лікарню поступив чоловік з травмою голови. Діагностовано перелом клиноподібної кістки в ділянці основи клиноподібного відростка. Вміст якого з названих каналів може бути пошкоджено?

1174. В результаті кулевого поранення були пошкоджені коливні ребра. Які ребра називаються коливними?

1175. В результаті кулевого поранення були пошкоджені справжні ребра. Які ребра називаються справжніми?

1176. В результаті падіння з висоти, чоловік 45 років пошкодив ребро, на якому міститься горбик драбинчастого м'яза. На якому ребрі знаходиться горбик переднього драбинчастого м'яза?

1177. Внаслідок пухлини гіпофіза при рентгенографії виявлено руйнування і збільшення ямки турецького сідла. Яка кісткова порожнина при цьому уражена?

1178. Жінка 45 років після падіння з велосипеда звернулася в травматологічне відділення зі скаргами на біль, припухлість у дельтоподібній ділянці. Про перелом якої структури і якої кістки йде мова?

1179. Жінка впала на відведену руку. Яка з кісток і де саме найчастіше ламається за цих умов?

1180. На рентгенограмі перелом кістки, що знаходиться на латеральній стороні передпліччя. Яка кістка зламана?

1181. Під час ожеледиці жінка впала на витягнуту руку і відчула різкий біль. З`явилася деформація у нижній третині правого передпліччя, набряк і обмеження рухів у правій кисті. Які кістки можуть бути пошкоджені?

1182. Під час проходження медкомісії у пацієнта 25 років був виявлений патологічний тип грудної клітки. При цьому поперечні розміри були зменшені, а грудина сильно виступала вперед. Визначте тип грудної клітки.

1183. Після звільнення з під завалу в постраждалого відзначається затьмарення свідомості, багато підшкірних крововиливів на голові та шиї, дрібні рани на обличчі. У задньо-верхніх відділах голови скальпована рана та різка деформація контурів голови. Які кістки можуть бути пошкоджені?

1184. Після падіння на вулиці в жінки 45 років ліва рука обвисла, рухи дуже болючі в ділянці плечового суглоба. Який попередній діагноз виставив після огляду лікар швидкої медичної допомоги?

1185. Після перенесеної черепно-мозкової травми і рентгенологічного обстеження виявлено перелом основи черепа. Лінія перелому проходить через остистий і круглий отвір. Яка кістка пошкоджена внаслідок травми?

1186. При падінні на приведену до тулуба праву руку постраждалий відчув хрускіт та різкий біль у верхній третині правого плеча. Рухи в плечі неможливі, є деформація у верхній його третині. Які кістки можуть бути пошкоджені?

1187. При переході вулиці дитину вдарив автомобіль у лівий бік. У лікарні при огляді виявлено кровопідтік на лівій половині грудної клітки, різкий біль при пальпації, при спробі здавити грудну клітку відчувається хрускіт. Які кістки можуть бути пошкоджені?

1188. При травмі потиличної ділянки визначається тріщина в області поперечного синуса. Яка частина потиличної кістки пошкоджена?

1189. У пацієнта при огляді в клініці був виявлений патологічний тип грудної клітки. При цій аномалії мечовидний відросток був сильно зміщений назад, утворюючи поглиблення в нижній частині передньої грудної стінки. Визначте тип аномалії.

1190. У пацієнта при огляді в клініці був виявлений патологічний тип грудної клітки. При цьому ребра займали більш горизонтальне положення (у нормі близько 45 градусів) передньо-задні розміри грудної клітки приблизно дорівнюють її поперечному розміру. Визначте тип грудної клітки.

1191. У потерпілого при травмі потиличної кістки пошкоджений сигмовидний синус. Яка частина кістки пошкоджена?

1192. У результаті травми голови у потерпілого виявлене ушкодження правого виростка потиличної кістки. Яка частина потиличної кістки ушкоджена?

1193. У результаті травми голови у потерпілого виявлене ушкодження правого виростка потиличної кістки. Яка частина потиличної кістки ушкоджена?

1194. У хворого необхідно зробити пункцію порожнини плеври. У якій частині міжреберного простору потрібно провести голку?

1195. У хворого перелом променевої кістки за типом «зеленої вітки». Яка частина кістки при цьому не постраждала?

1196. У чоловіка під час падіння з висоти були травмовані несправжні ребра. Які ребра називаються несправжніми?

1197. Унаслідок травми черепа стався перелом клиновидної кістки в області підстави крилоподібного відростка. Вміст якого з названих каналів може бути пошкоджено?

1198. Хворий доставлений в клініку з переломом плечової кістки. У якому місці швидше за все, сталося пошкодження?

1199. Хворий при ДТП отримав травму в області рукоятки грудини. Наголошується при пальпації хворобливість, припухлість. Пошкодження яких ребер з перерахованих можливо?

1200. Дитина 3-х років поступила в клініку з діагнозом «гнійний отит». Куди найлегше може гній із барабанної порожнини?

1201. Дитина 5 років поступила в ЛОР-відділення клінічної лікарні з діагнозом «гнійне запалення середнього вуха (тимпаніт)». Захворювання розпочалось із запалення носоглотки. Через який канал скроневої кістки інфекція потрапила у барабанну порожнину?

1202. Запалення барабанної порожнини у хворого ускладнилося запалення комірок соскоподібного відростка. Через яку стіну барабанної порожнини проникнув гній до комірок?

1203. Лікар прогнозує можливість запалення клітковини орбіти при гнійному запаленні в ділянці іклової ямки. Через який утвір можливе поширення інфекції?

1204. Під час змагань спортсмен отримав удар в спинку носа, де відмічається значний крововилив, припухлість та різка болючість при пальпації. Яка із кісток лицевого черепа при цьому найчастіше ушкоджується?

1205. Під час операції лікар маніпулює на внутрішній стінці барабанної порожнини. Небезпека пошкодження якого каналу скроневої кістки виникає при цьому?

1206. Під час операції на нижній поверхні скроневої кістці хірург може пошкодити утворення, які розташовані попереду від яремної ямки. Порушення якого каналу можливе при невдалих рухах хірурга?

1207. Під час травми голови виникло пошкодження заднього гострого кута великих крил клиновидної кісті, виникла значна кровотеча. Пошкодження якого отвору клиноподібної кісті привело до кровотечі?

1208. Пострадавший отримав травму зовнішньої поверхні особи і скроневої області. Встановлений перелом скуластої дуги. Відростки яких кісток черепа пошкоджені?

1209. При важких травмах голови відмічається виділення крові з вух. Чим це пояснюється?

1210. При гнійних отитах доводиться роздовбувати комірки соскоподібного відростка у межах так званого трикутника Щипо. На якій поверхні цього відростка розташовується заданий трикутник?

1211. При травмі голови в ділянці скроневої кісті виник відрив її луски. Який канал скроневої кісті найімовірніше пошкоджений?

1212. При травмі голови у потерпілого пошкоджена піраміда скроневої кісті. Лінія перелому пройшла перпендикулярно осі піраміди, латеральніше внутрішнього слухового отвору. Який канал скроневої кісті найімовірніше пошкоджений?

1213. При ушкодженні луски скроневої кістки уламки її внутрішньої пластинки можуть поранити судини твердої мозкової оболонки. Як ще називають цю пластинку?

1214. Рентгенологічно встановлено скупчення гною у правій верхньощелепній пазусі. У який носовий хід виділяється гній?

- 1215. У дитяти 8 років, госпіталізованого з приводу травми нижньої щелепи, у відділенні щелепно-лицьової хірургії при рентгенологічному обстеженні виявили в ділянці підборіддя хрящову перемичку, яка сполучає дві симетричні половини нижньої щелепи. У якому віці в нормі зростаються дві половини нижньої щелепи?**
- 1216. У потерпілого травма верхньої щелепи з пошкодженням підчонамкового отвору. Яка поверхня щелепи пошкоджена?**
- 1217. У потерпілого травма верхньої щелепи, вибитий перший малий корінний зуб. Який відросток верхньої щелепи пошкоджений?**
- 1218. У хворого фронтит. З анамнезу відомо, що в нього було запалення верхньощелепної пазухи. Через який відділ носової порожнини могла потрапити інфекція в лобну пазуху?**
- 1219. Унаслідок пухлинного процесу в гіпофізі при рентгенографії виявлено руйнування і збільшення ямки турецького сідла. Яка порожнина при цьому уражена?**
- 1220. Хворий із гнійним правобічним запаленням середнього вуха доставлений у ЛОР-відділення. При огляді виявлена підшкірна флегмона в області соскоподібного відростка. Через яку стінку барабанної порожнини проникнув гній?**
- 1221. Хворі часто відчують пульсуючий шум у вухах. Наявність яких анатомічних утворів у черепі це може пояснити?**
- 1222. Хворому Р. 57 років при видаленні нижнього моляра була проведена мандибулярна анестезія. Зникнення чутливості нижньої щелепи не відбулося. Яке анатомічне утворення нижньої щелепи перешкодило проникненню анестетика в нерв?**

1223. Хворому, з діагностичною метою, наказана задня риноскопія (задній огляд) порожнини носа, в якій виявлені викривлення задньої частини носової перегородки. Яка кістка викривлена?

1224. В хворого 28-ми років діагностовано гострий запальний процес слизової оболонки носослізної протоки. З анамнезу відомо, що після перенесеного грипу протягом 10-ти днів були виділення з носа. З якого відділу носової порожнини інфекція могла потрапити в носослізну протоку?

1225. Для вправлення вивиху нижньої щелепи необхідно відвести її донизу. Яка анатомічна структура зумовлює таку дію?

1226. Лікар діагностував гнійно-запальний процес в крилопіднебінній ямці. У яку анатомічну ділянку поширення гнійної інфекції найменш можливо?

1227. Лікареві-стоматологові для знеболення необхідно ввести анестетик в крилопіднебінну ямку з ротової порожнини. У ділянці якого анатомічного утворення потрібно робити ін'єкцію?

1228. Після простуди у хворого виникли болі у інфраорбітальній ділянці та гнійні виділення з носа. В які з порожнин лицевого черепа у даному випадку може скупчуватись гній?

1229. При важких травмах черепа особливу увагу звертають на рентгенограму його основи, зроблену в боковій проекції. На контури якого анатомічного утвору слід звернути особливу увагу?

1230. При гнійному отиті пошкоджена верхня стінка барабанної порожнини. У яку ямку черепа поширився гній з барабанної порожнини?

1231. При переломо-вивихах у шийному відділі хребта застосовують витягання за анатомічні утвори мозкового черепа. Які з цих утворів можна використати?

1232. Травматолог кладе свої великі пальці, обернуті марлею на жувальні поверхні нижніх молярів хворого, другими пальцями захоплює нижній край нижньої щелепи і сильно тягне її до низу, а підборіддя в цей час повертає вгору. Потім щелепа відводиться назад. Що лікує травматолог?

1233. При патологічних пологах у жінки виникла розбіжність лобкових кісток. Який вигляд з'єднання кісток постраждав?

1234. У хворого 69 років при гнійній інфекції носової порожнини виник абсцес лобової частини мозку. Лікар встановив, що найбільш вірогідна дорога поширення інфекції в передню черепну ямку з носової порожнини була\:

1235. У хворого запальний процес в області привушної слинної залози. Яким чином запальний процес може проникнути в крилоподібно-піднебінну ямку?

1236. У хворого із закритою черепно-мозковою травмою на рентгенограмі видно лінія перелому підстави черепа, яка проходить через f. spinosum і f. rotundum. Яка кість пошкоджена?

1237. У хворого риніт, який ускладнився кон'юнктивітом. По якій дорозі найшвидше сталося поширення інфекції.

1238. У хворого спостерігається запалення клиновидної пазухи. Куди відкривається її апертура?

1239. У хворого травма зведення черепа. Які синуси можуть бути пошкоджені?

1240. Ударом тупого предмета переламано склепіння черепа в тім'яній ділянці. Які з пластинок тім'яної кістки найбільше ушкоджуються?

1241. Хворий 44 років страждаючою хронічним синуситом звернувся до лікаря із скаргами на погіршення зору і обмеження рухливості правого ока. При рентгенівському дослідженні була виявлена деформація нижньої стінки правої очної ямки. Який параназальний синус найімовірніше уражений?

1242. Хворий 45 років госпіталізований із загрозою поширення запального процесу з тім'яної ділянки в порожнину черепа. Крізь яке анатомічне утворення можливе це поширення?

1243. Хворий 45 років госпіталізований із загрозою поширення запального процесу з ділянки позаду вушної раковини в порожнину черепа. Крізь яке анатомічне утворення можливе це поширення?

1244. Хворий госпіталізований у зв'язку з небезпекою поширення запального процесу з потиличної області в порожнину черепа. Крізь яке анатомічне утворення можливо це поширення?

1245. Хворому поставлений діагноз: правосторонній мастоїдит. Вкажіть найбільш вірогідне джерело поширення гнійно-запального процесу у вічка сосковидного відростка.

1246. Чоловік 35 років звернувся до стоматолога із скаргами на порушення рухливості нижньої щелепи після травми. Хворий не може їсти, розмовляти із-за болю в ділянці скронево-нижньощелепного суглоба. Пальпація болюча. Який кістковий утвір найімовірніше пошкоджений:

1247. Чоловік, 40 років, після автокатастрофи поступив в травматологічне відділення лікарні з переломом зведення черепа. Які кістки складають зведення черепа?

1248. Яремний отвір розташований на нижній поверхні черепа. Через нього проходять нерви і велика венозна судина. У яку порожнину черепи буде поширено кровотеча, якщо судина буде пошкоджена в ділянці отвору?

1249. Будівник, упавши з висоти на лівий бік, відчув сильний біль у верхній третині лівого стегна. Стати а ліву ногу не може, рухи в лівій нижній кінцівці виконати не вдається. Посилюється набряк в області лівого кульшового суглоба та ознаки крововтрати. Які кістки можуть бути пошкоджені?

1250. В результаті травми у потерпілого стався перелом в зовнішній нижній третині правої гомілки. У якій кістці стався перелом?

1251. В якому віці після народження на рентгенограмі стає помітною голівка стегнової кістки?

1252. На другий день після важких пологів жінка скаржиться на біль у ділянці лона, який значно посилюється при ходьбі. В якому місці тазу можна очікувати патологічні зміни?

1253. На рентгенограмі таза у новонародженого визначаються три самостійні кістки, які з'єднані хрящем у ділянці кульшової западини. Які це кістки?

1254. Після невдалого стрибка з висоти спортсмен був доставлений у травмпункт зі скаргами на різкий біль та набряк в області правої стопи. При обстеженні права стопа в задній її третині різко болюча при пальпації, наявний кровопідтік на підшві, рухи в надп'яtkово-гомілковому суглобі здійснюються у повному обсязі. Які кістки можуть бути пошкоджені?

1255. При падінні маленького дитяти було травмовано переднє тім'ячко. Який вигляд з'єднання кісток черепа випробував патологічні зміни?

1256. При падінні маленької дитини було травмовано переднє тім'ячко. Який вигляд з'єднання кісток черепа отримав патологічні зміни?

1257. Сталося ДТП, після якого у жінки 30 років спостерігається припухлість і хворобливість при пальпації в області передньої частини тазової кістки. Яка з кісток тазу пошкоджена?

1258. У деяких народів Африки у дітей практично не зустрічається дисплазія кульшового суглоба. Які традиції догляду за дітьми цьому сприяють?

1259. У спортсмена під час падіння порушилися рухи навколо фронтальної осі. Які рухи здійснюються навколо фронтальної осі?

1260. У спортсмена під час падіння порушилися рухи навколо сагітальної осі. Які рухи здійснюються навколо сагітальної осі?

1261. У спортсмена під час тренування пошкодився один із основних компонентів суглоба. Які анатомічні структури належать до основних компонентів суглоба?

1262. У спортсмена під час тренування пошкодився один із основних компонентів суглоба. Які анатомічні структури належать до основних компонентів суглоба?

1263. У спортсмена під час тренування пошкодився один із основних компонентів суглоба. Які анатомічні структури належать до основних компонентів суглоба?

1264. У спортсмена під час тренування пошкодився один із основних компонентів суглоба. Які анатомічні структури належать до основних компонентів суглоба?

1265. У чоловіка 70 років унаслідок падіння стався перелом стегнової кістки. Яке найбільш поширене місце перелому цієї кістки в даному віці?

1266. У чоловіка похилого віку внаслідок падіння є перелом стегнової кістки. Вкажіть найпоширеніше місце перелому цієї кістки.

1267. Хворий звільнений з-під завалу землі. Скарги на болі в ділянці крижів справа. Який анатомічний утвір найбільш вірогідно може бути ушкоджений?

1268. Які середні величини шийково-діафізарного кута стегнової кістки у нормі?

1269. В результаті вогнепального поранення зруйнована голівка променевої кістки. Хірург змушений був видалити осколки голівки променевої кістки і обривки зв'язок. Які зв'язки при цьому були видалені?

1270. Внаслідок травми стався повний відрив грудинного кінця ключиці. Які зв'язки при цьому розірвалися?

1271. Дитяті біля 2-х років. Мати звернулася до педіатра зі скаргою на виявлення м'якого місця на склепінні черепа. Яке із тім'ячок не заросло до цього часу

1272. Для вправлення вивиху нижньої щелепи необхідно відвести її донизу. Яка анатомічна структура зумовлює таку дію?

1273. На рентгенограмі травмованого визначається пошкодження поперекового відділу хребетного стовпа. Які анатомічні утворення, що сполучають з'єднують тіла хребців, залучені в процес?

1274. Під час операції на хребетному стовпі хворому видалили дуги хребців і зв'язки, що з'єднують їх. Назвіть ці зв'язки.

1275. Після перелому дистальних третин кісток передпліччя, який виник внаслідок падіння на витягнуті руки, у хворого обмежилися рухи у променево-зап'ястковому суглобі. Які рухи, властиві цьому суглобу, слід відновити шляхом тривалих тренувань?

1276. При падінні маленької дитини було травмовано переднє тім'ячко. Який вид з'єднання кісток черепа зазнав патологічних змін?

1277. При падінні на випрямлену руку пацієнт отримав травму. М'язи плечового поясу напружені, різко видається плечовий відросток лопатки, під ключицею пальпується голівка головки плечової кістки. Який діагноз можна поставити?

1278. При рентгенологічному обстеженні у пацієнта була виявлена кила міжхребцевого диска грудного відділу хребетного стовпа. Який вид з'єднання між хребцями патологічно змінився?

1279. При судово-медичній експертизі на трупі було виявлено скручування хребта між 1 поперековим і XII грудним хребцем. Остистий відросток XII грудного хребця знаходився над поперечним відростком I поперекового. Які зв'язки при цьому розірвалися?

1280. Травматолог кладе великі пальці, огорнуті марлею, на жувальні поверхні нижніх молярів хворого, другими пальцями захоплює нижній край нижньої щелепи і сильно тягне її донизу, а підборіддя в цей час повертає угору. Потім щелепа відводиться назад. Що лікує травматолог?

1281. У дитини 5 років визначається незарощення великого тім'ячка. Чи є це нормою а якщо ні, то які терміни його зарощування

1282. У потерпілого вивих у плечовому суглобі. Зсув яких суглобових поверхонь вийде за межі фізіологічної норми?

1283. У потерпілого при огляді спостерігається виступання груднинного кінця ключиці. Які зв'язки пошкоджені?

1284. У разі вертикального падіння з висоти стався компресійний перелом поперекового хребця, який ускладнився збільшенням кривизни лордозу цього відділу хребетного стовпа. Порушення цілісності якої зв'язки може привести до таких змін кривизни хребта?

1285. У травмованого двобічний вивих у скронево-нижньощелепному суглобі. Які зв'язки можуть бути пошкоджені?

1286. Хлопчик 10 років доставлений у травмпункт лікарні з переломом кісток передпліччя. Дитина не може здійснити супінацію і пронацію передпліччя. У яких суглобах можливі ці рухи?

1287. Циркулярною пилою випадково були пошкоджені м'які тканини між горохоподібною і човникоподібною кістками. Які зв'язки при цьому могли бути пошкоджені?

1288. Дитина 6-ти років внаслідок падіння на гострий предмет, отримала травму м'яких тканин між мало-і великогомілковою кісткою. Який вид з'єднання пошкоджений?

1289. Лижник, спускаючись з крутого схилу гори, не зміг вчасно загальмувати і при _____ гомілці впав на зігнутий правий колінний суглоб. З гострим болем госпіталізований у травматологічне відділення. Для розривів яких структур характерний подібний механізм травми?

1290. На операції з приводу перелому стегнової кістки при розкритті суглобової порожнини виявлена кров. Яка із зв'язок тазостегнового суглоба пошкоджена?

1291. На рентгенограмі тазу видно, що всі 3 частини тазової кістки розділено проміжками, які відповідають невидимому на рентгенограмі хрящу. Для якого віку вони характерні?

1292. Під час футбольного матчу гравець отримав травму колінного суглоба. На рентгенівському знімку виявлено перелом кістки, яка лежить в товщі сухожилля чотириголового м'яза стегна. До якої з із перерахованих груп кісток належить ця кістка?

1293. Під час бігу згори пацієнт оступився і пошкодив зв'язки гомілковостопного суглобу. При огляді виявилися болючість та припухлість під медіальною кісточкою. Яка зв'язка найімовірніше пошкоджена?

1294. Поклавши хворого на спину і зігнувши його травмовану ногу на 100-120°, при розслабленні м'язів цієї кінцівки лікар перевіряв симптом "висувного ящика". Він намагався зсунути гомілку травмованої ноги до переду та до задку відносно стегна, зафіксувавши при цьому стопу. Виявлено патологічний зсув зміщення гомілки до задку. Це свідчить про розрив зв'язки:

1295. При медичному обстеженні у військкоматі у юнака виявлено плоскостопість. Із слабкістю яких структур це пов'язано?

1296. При патологічних пологах у жінки виявлено розходження лобкових кісток. Який вид з'єднання кісток постраждав?

1297. При стрибку в довжину у момент приземлення спортсмен відчув сильний біль в тазостегнових суглобах. Постраждалий не в змозі розгинати стегна. Діагностовано розтягнення зв'язок тазостегнових суглобів. Які зв'язки пошкоджені?

1298. У реанімаційне відділення поступив чоловік 45 років з із пораненням ділянки шиї у межах трикутника, який обмежений позаду латеральним краєм m. trapezius. У межах якого трикутника шиї виконуватиметься операція?

1299. Спортсмен-легкоатлет доставлений в клініку зі скаргами на сильні болі в та неможливість рухів в колінному суглобі. Рентгенологічно перелому кісток не виявили. Про ушкодження яких внутрішньосуглобових утворень можна думати?

1300. Спускаючись з гори, гірськолижник впав і травмував правий колінний суглоб. При обстеженні патологічна рухливість гомілки в латеральний бік. Про ушкодження яких зв'язок колінного суглобу можна думати?

1301. Туберкульозним процесом зруйнована зв'язка голівки стегна. Яке ускладнення загрожує хворому, якщо хірургічне лікування не буде своєчасно проведено?

1302. У деяких народів дуже рідко трапляється дисплазія кульшового суглобу. До цього приводить:

1303. В наслідок травми низу передньої стінки живота у хворої ушкоджена зв'язка, що знаходиться у пахвинному каналі. Яка це зв'язка?

1304. У постраждалого при обстеженні виявлено, що гомілка висувається вперед. Які зв'язка колінного суглоба пошкоджені?

1305. У хворого цукровим діабетом розвинулася волога гангрена стопи. Йому показана ампутація в ділянці поперечного суглоба передплесна (суглоба Шопара). Яку ключову зв'язку повинні перетинати хірурги для вичленування в даному суглобі?

1306. У спортсменів нерідко спостерігається пошкодження менісків колінного суглобу. При якому механізмі травми це може статися

1307. Футболіст на великій швидкості різко змінив напрямок руху і, упавши на коліно, пошкодив нижню кінцівку. Що найчастіше пошкоджується за цих умов?

1308. Хірургові необхідно видалити частину травмованої стопи по лінії Лісфранкова суглоба. Яку зв'язку необхідно пересікти?

1309. Чоловік 45 років, впавши на праве коліно, відчув різкий біль в суглобі. При огляді: сильний набряк на передній поверхні колінного суглобу. Яка кістка пошкоджена?

1310. Чоловікові 50 років з розтрощеною внаслідок травми ступнею була зроблена її часткова ампутація шляхом дизартікуляції в поперечному суглобі заплесна. “Ключем” цього суглоба є\:

1311. Яку форму має верхня поверхня менісків колінного суглоба (facies superior menisci art. genus), якому анатомічному утвору вона відповідає?

1312. Яку форму має нижня поверхня менісків колінного суглоба (facies inferior menisci art. genus), якому анатомічному утвору вона відповідає?

1313. В період пологів у жінки розвинулися явища, характерні для діафрагмальної кили. Вкажіть найбільш слабе місце діафрагми, де можливе утворення кил в наслідок підвищення внутрішньочеревного тиску.

1314. Диригент оркестру не може дістати із задньої кишені штанів носову хустинку. Який м'яз не виконує своєї функції?

1315. Молода людина унаслідок підтягування на перекладині відчула різкий біль у м'язах спини. При обстеженні спостерігається біль при спробах рухів верхньою кінцівкою, обмеження приведення і розгинання плеча, обертання плеча досередина. Ушкодження якого м'яза сталося найімовірніше?

1316. Після крововиливу в мозок у постраждалого розвинулись явища паралічу окремих м'язів спини. При цьому порушилася функція розгинання поперекового відділу хребта. Які м'язи постраждали ?

1317. У пацієнта при рухах у хребетному стовпі виникає біль по ходу одного з м'язів тулуба тієї ж сторони. Запалення якого м'яза (міозит) спостерігається?

1318. Через який отвір пахвинного каналу (Пупарта) (canalis inguinalis (Poupartii)) з черевної порожнини у вищеназваний канал входить сім'яний канатик або кругла зв'язка матки?

1319. Який край трапецієподібного м'яза (musculus trapezius) утворює медіальну межу аускультативного трикутника?

1320. Який м'яз топографічно розташований поверхнево на бічній стінці живота?

1321. Який м'яз, прикріплюючись до ребер при фіксованих руках, розширює грудну клітку?

1322. Які анатомічні утвори зовнішніх і внутрішніх косих м'язів живота (mm. obliquus externus et internus abdominis) та поперечних м'язів живота (mm. transversi abdominis) беруть участь у формуванні піхви прямого м'яза живота?

1323. Які групи глибоких (аутохтонних) м'язів спини (musculi dorsi profundii) знаходяться в жолобах між остистими і поперечними відростками (processus spinosus et transversus) та кутами ребер (angulus costae)?

1324. До лікаря звернулася мати півторалітнього хлопчика, у якого виявлена вроджена пахова кила. Пахвинний канал розширений, частина кишечника знаходиться в калитці. Необхідна операція пластики пахвинного каналу. Які структури утворюють передню стінку цього каналу?

1325. Під час проведення операції з приводу пахової кили хірург розітнув апоневроз зовнішнього косого м'яза живота. Визначите, якою стінкою пахового каналу він є?

1326. При виконанні операції видалення віддалення пухлин::При виконанні операції видалення віддалення пухлини на язикові хірургові необхідно виділити m.hyoglossus, яка займає позичає всю площу trig, linguale (Пирогова) Яка структура утворює корд межу цього трикутника ззаду і знизу?

1327. При обробці фрезою великого корінного зуба стоматолог інструментом, що зірвався, глибоко ранив щоку, пошкодивши при цьому не тільки слизову оболонку, але й м'яз. Який?

1328. У новонародженого хлопчика діагностовано вроджена пахова кила. Про незрощення якої анатомічної структури йде мова?

1329. У пацієнта поранення передньої черевної стінки з ушкодженням шкіри, підшкірної клітковини, поверхневої фасції, апоневрозів бокових м'язів живота, прямого м'яза живота поперечної фасції, очеревини. У якій ділянці живота сталося поранення?

1330. У постраждалого від електротравми в області шиї сформувався патологічний нахил голови у бік пошкодження у поєднанні з поворотом голови в протилежну сторону. Який м'яз шиї піддався рубцевим змінам?

1331. У реанімаційне відділення поступив чоловік 35 років із пораненням задньої ділянки шиї (regio nuchae). Який із м'язів тіла займає цю ділянку?

1332. У хворого 20 років діагностовано перелом вінцевого відростка нижньої щелепи зі зміщенням. Який м'яз змістив відросток паросток?

1333. У хворого 40 років внаслідок ножового поранення шиї почалася кровотеча із спільної сонної артерії, яка проходить в сонному трикутнику у складі судинно-нервового пучка. Які структури формують цей пучок?

1334. У хворого М., 37 років, в результаті попадання стороннього тіла в дихальні шляхи виник кашель, а потім задуха. Хворому зроблена трахеотомія в ділянці шиї, яка обмежена верхнім черевцем m. omohyoideus, m. sternocleidomastoideus і середньою лінією шиї. У якому трикутнику шиї проведено хірургічне втручання?

1335. У хворого виявлено порушення зімкнення повік. Пошкодження якого м'яза можна запідозрити?

1336. У чоловіка 52 років при підніманні надмірної ваги виникає килове випинання у правій надлобковій ділянці. В якому анатомічному утворенні найімовірніше виникло килове випинання?

1337. У якій послідовності розтинають пласти м'язів передньої стінки живота при апендектомії?

1338. Хворий 47 років поступив у хірургічне відділення з діагнозом пахвинна кила. При оперативному втручанні хірург проводить пластику задньої стінки пахвинного. Якими анатомічними утвореннями вона утворена:

1339. Хворий звернувся до лікаря із скаргами на болі в надчеревній ділянці, пов'язані з пухлиноподібним випинанням. Встановлено діагноз -кила. Назвіть слабе місце надчеревної ділянки у даному випадку.

1340. Хворий не може підняти опущену нижню щелепу. Які м'язи не виконують свої функції?

1341. Хворий не може скласти губи трубочкою, а ротова щілина розтягується у боки(поперечна усмішка). На атрофію якого м'яза вказують дані симптоми?

1342. Хворий скаржиться на болі в горлі, утруднення ковтання, підвищення температури тіла до 39,50 С°. При огляді лікар встанови діагноз: глотковий абсцес. У який міжфасціальний простір може поширитися гнійне запалення?

1343. Хірургові необхідно провести ревізію черевної порожнини, для чого необхідно розкрити передню черевну стінку. У якій частині черевної стінки можна провести самий безкровний розріз?

1344. Чоловік 25 років отримав ножове поранення шиї з із ушкодженням зовнішньої сонної артерії. Для тимчасової зупинки кровотечі ефективним методом є пальцьове притиснення спільної сонної артерії до поперечного відростка шостого шийного хребця. У якому трикутнику шиї це здійснюється?

1345. Жінка 45 років під час автомобільної катастрофи пошкодила верхню третину плеча. При обстеженні ушкодження кісток не виявлено. Неможливе активне розгинання передпліччя. Який м'яз пошкоджений?

1346. На рентгенограмі виявлений осколковий перелом підсуглобового горбка лопатки. Сухожилля якого м'яза, яке кріпиться зміцнює я в цьому місці, було пошкоджене?

1347. Отримавши травму плеча в ділянці великого горбика плечової кістки хворий скаржиться на неможливість обертання плеча назовні. Ушкодження яких м'язів у хворого?

1348. Пароніхій мізинця ускладнився флегмоною кисті і передпліччя. Гнійний процес розповсюджувався по:

1349. Перелом променевої кістки знаходиться нижче місця прикріплення круглого м'яза-пронатора. Куди зміщений проксимальний відламок?

- 1350. Плечолопатковий періартрит може виявитися тендинітом (запаленням сухожилля) подостьового м'яза. Яка функція кінцівки буде порушена?**
- 1351. Плечолопатковий періартрит може виявлятися тендинітом (запаленням сухожилля) підлопаткового м'яза. Яка функція кінцівки буде при цьому порушена?**
- 1352. При внутрішньовенному введенні препаратів, ін'єкцію найчастіше роблять в серединну ліктьову вену, оскільки вона малорухлива в результаті фіксації її м'якими тканинами. Чим вона фіксована в ліктьовій ямці?**
- 1353. При падінні в лісі юнак сильно ударився передпліччям об гострий сук. При огляді хірургом встановлено проникаюче поранення нижньої третини передпліччя. Постраждалий не може здійснити поворот кисті досередини. Який м'яз ушкоджений?**
- 1354. При падінні у постраждалого стався відкритий перелом кісток передпліччя. Кістковими осколками пошкоджені м'язи передньої групи передпліччя. Які порушення виникнуть у функції променезап'ясткового суглоба при виключенні із з роботи вказаної групи м'язів?**
- 1355. При перев'язці пахвової артерії хірург визначив гілку, яка проходить через тристоронній отвір. Чим обмежений тристоронній отвір?**
- 1356. У зв'язку з травмою плеча у постраждалого порушена функція задньої групи м'язів. Порушення яких рухів мають бути при роботі ліктьового суглоба?**
- 1357. У постраждалого вогнепальне поранення передньої стінки пахвової ямки. Які м'язи можуть бути пошкоджені при цьому?**
- 1358. У травматологічне відділення поступив чоловік 35 років з травмою лівої кисті. При огляді виявлено: різану рану долонної поверхні лівої кисті ; всі фаланги II - V пальців не згинаються. Які м'язи пошкоджені?**

1359. У травматологічний пункт поступив чоловік 36 років з травмою правої кисті. При огляді встановлено \: різана рана долонної поверхні правої кисті, дистальні фаланги II-V пальців не згинаються. Які м'язи пошкоджені?

1360. У травматологічний пункт поступив чоловік 38 років з травмою правої кисті. При огляді встановлено: різана рана в ділянці підвищення великого пальця правої кисті; дистальна фаланга I пальця не згинається. Який м'яз пошкоджений?

1361. У травматологічний пункт поступив чоловік 40 років з травмою лівої кисті. При огляді встановлено: різана рана тильної поверхні великого пальця, проксимальна фаланга великого пальця не розгинається. Який м'яз пошкоджений?

1362. У травматологічний пункт поступив чоловік 40 років з травмою правої кисті. При огляді встановлено: різана рана тильної поверхні правої кисті в ділянці великого пальця, дистальна фаланга великого пальця не розгинається. Який м'яз пошкоджений?

1363. У хворого вивих у плечовому суглобі із зміщенням голівки плечової кістки до переду. Сухожилля якого м'яза може бути пошкоджене?

1364. У хворого діагностовано перелом діяфізу плечової кістки. Є симптоми пошкодження променевого нерва в ділянці *canalis humeromuscularis*. Чим обмежений цей канал?

1365. У хворого після того, як вона наколола голкою мізинець лівої кисті , на другий день з'явилися гіперемія і набряк, які потім поширилися на кисть і дистальні відділи передпліччя. Пошкодження якої синовіальної піхви кисті сталося?

1366. Хворий 45 років після травми правого плеча (внаслідок падіння) не може відвести праву руку до горизонтального рівня. Ушкодження якого з м'язів спричинило вказане обмеження рухів?

- 1367. Циркулярною пилою робітник глибоко поранив передню поверхню правого плеча. Пошкоджені м'язи. На які м'язи хірург повинен накласти шви?**
- 1368. В санпропускник доставлений чоловік із різаною раною підошви правої стопи. У постраждалого обмежене піднімання латерального краю стопи. При обробці в рані виявлено ушкодження сухожилка м'яза. Який м'яз пошкоджений?**
- 1369. В результаті запалення сідничого нерва наступило ускладнення у вигляді паралічу задньої групи м'язів стегна. Які рухи нижньої кінцівки виявились неможливими?**
- 1370. Внаслідок аварії у постраждалого виникли сильний біль і набряк передньої поверхні гомілки; тильне згинання стопи утруднене. Функція якого із наведених м'язів постраждала?**
- 1371. Краєм скла, що впало, у хворого на тильній поверхні стопи нанесена глибока різана рана. Сухожилля яких м'язів можуть постраждати при даній травмі?**
- 1372. Під час операції з приводу стегнової киля була зачеплена латеральна стінка внутрішнього стегового кільця. Яке анатомічне утворення пошкоджене?**
- 1373. Під час фінальної гри баскетболіст пошкодив праву гомілку. Внаслідок чого стало неможливо згинати праву стопу. Про ушкодження якого сухожилля йде мова?**
- 1374. Після кульового поранення нижньої третини стегна постраждалий не може розігнути гомілку. Який м'яз пошкоджений?**
- 1375. Після падіння хворий став скаржитися на неможливість розігнути ногу в колінному суглобі. Які м'язи пошкоджені?**

- 1376. Після травми хворий скаржиться на різкий біль в ділянці гомілковостопного суглоба і неможливість підняти на кінчики пальців стопи. Сухожилля якого м'яза пошкоджене?**
- 1377. При закритій травмі живота порушилася функція згинання стегна в тазостегновому суглобі. Який м'яз постраждав при вказаних обставинах?**
- 1378. При обстеженні хворому був поставлений діагноз: підколінна флегмона. В анамнезі хворий отримав укушену рану в ділянці передньої поверхні верхньої третини стегна. По якому каналу інфекція поширилася у підколінну ямку?**
- 1379. При ударі в ділянку сідниць хворий не в змозі відводити стегно. Які м'язи могли ушкодитись?**
- 1380. У спортсмена виник біль по ходу сідничого нерва унаслідок внаслідок здавлення його м'язом, який проходить через великий сідничий отвір. Який м'яз був травмований під час фізичних вправ?**
- 1381. У спортсмена розрив ахілового сухожилля. Визначите, який м'яз пошкоджений.**
- 1382. У травмпункт міської клінічної лікарні звернувся пацієнт із скаргами на те, що після стрибка з висоти гомілка закидається допереду і не повертається у вихідне положення. Який діагноз можна поставити?**
- 1383. У хворого 30 років в ділянці стегового трикутника визначається припухлість і біль, які з'явилися після підняття важкого предмету. Про утворення якої кили слід думати?**
- 1384. У хворого виявили перелом медіальної кісточки та ушкодження сухожиль м'язів гомілки. Сухожилля яких м'язів постраждали?**
- 1385. У хворого різана рана задньої поверхні стегна, він не може зігнути гомілку. Які м'язи пошкоджені?**

1386. У чоловіка глибока рубана рана стопи в ділянці тильної поверхні першої плеснової кістки. Які м'язи постраждали при травмі?

1387. Унаслідок внаслідок перелому великогомілкової кістки і була пошкоджена передня група м'язів гомілки. Функція якого м'яза може бути порушена?

1388. Хворий 55 років госпіталізований з із травмою медіальної групи м'язів стегна. Які види рухів не зможе робити чинити хворий?

1389. Хворому поставлено діагноз: стегова кила. Через яке анатомічне утворення вона виходить з із черевної порожнини?

1390. Після зіткнення двох автомобілів у одного з водіїв відзначається деформація у середній третині лівої гомілки, сильний біль, особливо при спробі рухати лівою гомілкою. З рани виступають кінці кістки тригранного січення, посилюється крововтрата. Яка кістка може бути пошкоджена?

1391. Чоловік 45 років в наслідок травми на виробництві пошкодив задню ділянку лівого ліктьового суглоба. Об'єктивно: утруднене розгинання передпліччя. Які м'язи найімовірніше усього ушкоджені?

1392. Після звільнення з під завалу у постраждалого відзначається затемнення свідомості, багато підшкірних крововиливів на голові та шиї, дрібні рани на обличчі. У задньо-верхніх відділах голови скальпована рана та різка деформація контурів голови. Які кістки можуть бути пошкоджені?

1393. Після травми ока виникло нагноєння м'яких тканин орбіти. Через який анатомічний утвір гнійний процес може поширитись у середню черепну ямку?

1394. Рентгенологічно у пацієнта діагностовано перелом плечової кістки в ділянці міжгорбкової борозни. Сухожилок якого м'яза може бути травмований уламками кістки в першу чергу?

1395. Чоловік 42 років звернувся до медпункту з приводу різаної рани нижньої частини передньої поверхні плеча. Об'єктивно: утруднене згинання передпліччя. Які з названих м'язів ймовірно ушкоджені у хворого?

1396. Внаслідок пухлини гіпофіза при рентгенографії виявлено руйнування і збільшення ямки турецького сідла. Яка кісткова порожнина при цьому вражена?

1397. Лікар прогнозує можливість запалення клітковини орбіти при гнійному запаленні в ділянці підочномкового отвору. Через яке з утворень можливе поширення інфекції?

1398. В реанімаційне відділення поступив хворий з тяжким отруєнням. Для проведення комплексу лікування необхідно виконати катетеризацію та введення лікарських речовин до підключичної вени. У якому топографічному утворенні вона знаходиться?

1399. У хворого на гайморит порушено сполучення верхньощелепної біляносової пазухи з середнім носовим ходом. Який утвір в нормі забезпечує надходження повітря з носового ходу до гайморової пазухи?

1400. Після травми хворий не може утримувати тіло у вертикальному положенні, не може підняти навшпиньки. Функція якого м'яза порушена?

1401. Параніхій мізинця ускладнився флегмоною кисті та передпліччя. Нагнійний процес поширився по:

1402. У пацієнта перелом плечової кістки на межі середньої та нижньої третини, з частковою втратою функції згинання передпліччя. Порушення функцій якого м'язу викликало це ушкодження?

1403. При падінні з висоти постраждалий вдарився передньою поверхнею плеча об виступаючий твердий предмет. При огляді хірургом констатований розрив двоголового м'яза плеча. Які функції верхньої кінцівки будуть порушені при вказаній травмі двоголового м'яза?

1404. Під час прийому їжі у новонародженої дитини спостерігається закидання молока у носову порожнину. Вкажіть на можливу причину виникнення цього порушення.

1405. У хворого кривошия. Який м'яз шиї уражений?

1406. На рентгенограмі таза видно, що всі три частини кульшової кістки відокремлені проміжками, які відповідають невидимому на рентгенограмах хрящу. Для якого віку це характерно?

1407. У хворого атрофія м'язів на передній поверхні голінки. Які це м'язи?

1408. Хворий звернувся до лікаря з пораненням проксимальної фаланги пальця, яка ускладнилася флегмоною долоні. Гній заповнив спільну синовіальну піхву для згиначів, в якій лежать сухожилки поверхневого та глибокого згиначів пальців. На якому пальці було ушкодження проксимальної фаланги?

1409. При проведенні трахеотомії у хворого 45 років, який потрапив в реанімаційне відділення лікарні з набряком гортані, була випадково перерізана яремна венозна дуга, яка лежить у:

1410. Трикутник шиї обмежений ззаду грудинноключичнососковидним м'язом, зверху-заднім черевцем двочеревцевого м'яза, з переду - верхнім черевцем лопатково-під'язикового м'яза. Назвіть цей трикутник.

1411. За рахунок пухлини гіпофіза при рентгенографії виявлено руйнування і збільшення ямки турецького сідла. Яка кісткова порожнина при цьому вражена?

1412. В зв'язку з наявністю злоякісної пухлини на язика, хворому слід його видалити. В якому місці легко знайти язикову артерію і перев'язати її?

1413. У хворого необхідно зробити пункцію порожнини плеври. В якій частині міжреберного простору провести голку?

1414. В клініку доставлено хворого, у якого при обстеженні носової порожнини виявлено скопичення гною у нижньому носовому ході. Звідки надходить гній?

1415. Після травми хворий не може розігнути руку у ліктьовому суглобові. Порушення функції якого основного м'язів може це визвати?

1416. Внаслідок травми у хворого спостерігається різний діаметр зіниць (анізокорія). Діяльність якого м'яза блоковано?

1417. Запалення барабанної порожнини (гнійний отит) у хворого ускладнилося запалення комірок соскоподібного відростка. Через яку стінку барабанної порожнини проникнув гній до комірок?

1418. При травмі в області тазу у хворого на рентгенологічному знімку виявлено некроз головки стегнової кістки. Яка з перерахованих зв'язок кульшового суглобу була пошкоджена під час травми?

1419. У хворого після травми коліна гомілку у зігнутому під прямим кутом положенні можна зміщувати вперед і назад подібно до висувної шухляди. Які зв'язки розірвані?

1420. Під час виконання фізичних вправ у 15 річного учня раптово виникла біль в зоні кульшового суглоба при обертанні нижньої кінцівки всередину. Який м'яз ушкоджений?

1421. 30 річний чоловік звернувся до стоматолога зі скаргою на розлади жування, у нього виникає біль при відтягуванні щелепи назад. Лікар встановив запалення одного з жувальних м'язів. Якого?

1422. Хворий 45 років після травми правого плеча (внаслідок падіння) не може відвести праву руку до горизонтального рівня. Пошкодження якого з м'язів викликало вказане обмеження руху ?

1423. У хворого 45-ти років з підозрою на запалення оболонок мозку потрібно було отримати спинномозкову рідину. Зроблено діагностичну пункцію між дугами поперекових хребців (L3-L4). Через яку зв'язку повинна проникнути голка під час пункції?

1424. Дитина, 5 років, потрапила в тяжкому стані в інфекційний відділ клінічної лікарні з діагнозом дифтерії. Для запобігання ядухи дитині провели трахеотомію, В якому трикутнику шиї проведена дана операція ?

1425. Хворий скаржиться на головний біль, утруднене дихання. Рентген підтвердив діагноз - фронтит (запалення лобової пазухи). В якому носовому ході при огляді порожнини носа можуть спостерігатись гнійні виділення?

1426. Після перенесеної черепно-мозкової травми і рентгенологічного обстеження виявлено перелом основи черепа. Лінія перелому проходить через остистий і круглий отвори. Яка кістка пошкоджена внаслідок травми?

1427. Хворий не може розвести пальці кисті. Функція яких м'язів порушена?

1428. У хворого з ножовим пораненням стегна утруднене розгинання гомілки. Який із м'язів постраждав сильніше?

1429. Хворий з ножовим пораненням верхньолатеральної ділянки плеча не може відвести руку до горизонтальної площини. Який із м'язів пошкоджено?

1430. Хворий потрапив у клініку з травмою черепа. При рентгенологічному обстеженні виявлено перелом основи черепа в ділянці каналу під'язикового нерва. Яку кістку черепа пошкоджено?

1431. Під час обстеження пацієнта ЛОР лікар діагностував запалення верхньощелепних пазух. В якому носовому ході під час риноскопії був виявлений гній?

1432. Після травми ока виникло нагноєння м'яких тканин орбіти. Через який анатомічний утвір гнійний процес може поширитись у крилопіднебінну ямку?

1433. До лікаря педіатра звернулася мати с приводу того, що у її дитини віком 1 рік голова повернена в лівий бік. Який із м'язів шиї недорозвинений?

1434. У хворого 28 років, діагностовано гострий запальний процес слизової оболонки носо-сльозової протоки. З анамнезу стало відомо, що після перенесеного грипу протягом 10-ти днів були виділення із носа. З якого відділу носової порожнини інфекція могла проникнути у носо-сльозову протоку?

1435. У чоловіка похилого віку внаслідок падіння стався перелом стегнової кістки. Вкажіть найпоширеніше місце перелому цієї кістки.

1436. При дослідженні хворого лікар визначив, що його язик не рухається вперед (не висувається з рота). Який м'яз пошкоджений?

1437. Під час прийому їжі у новонародженої дитини спостерігається закидання молока у носову порожнину. Вкажіть на можливу причину виникнення цього порушення.

1438. При падінні з висоти постраждалий вдарився передньою поверхнею плеча об виступаючий твердий предмет. При огляді хірургом констатований розрив двоголового м'яза плеча. Які функції верхньої кінцівки будуть порушенні при вказаній травмі?

1439. При вертикальному падінні з висоти у потерпілого діагностований компресійний перелом поперекового хребця. При цьому різко збільшилася кривизна лордозу поперекового відділу хребта. Порушенням якої зв'язки може супроводжуватися така зміна кривизни хребта?

- 1440. Після глибокого опіку верхньої частини ділянки плеча у пацієнта з'явилися скарги на неможливість відведення плеча. Про пошкодження якого м'язу слід думати у даному випадку?**
- 1441. Під час фінальної гри баскетболіст пошкодив праву гомілку, внаслідок чого стало неможливо згинати праву стопу. Лікар команди встановив, що пошкоджено сухожилок. Сухожилок якого м'язу пошкоджено?**
- 1442. Чоловік 26 р., у виробничих умовах отримав травму верхньої третини плеча. При обстеженні на травмпункті пошкоджень кісток не виявлено. Відмічається відсутність активного розгинання передпліччя. Який м'яз імовірноше всього пошкоджений?**
- 1443. Чоловік у виробничих умовах отримав різану рану латерального краю долонної поверхні кисті. Виявлено обмеження відведення великого пальця кисті. Функція якого м'яза пошкоджена?**
- 1444. В травматологічне відділення звернувся чоловік 30 р. з різаною раною підшовної ділянки лівої стопи. У хворого обмежене піднімання латерального краю стопи. Функція якого м'яза імовірноше всього порушена?**
- 1445. При огляді травматологом жінки 45 років було встановлено пошкодження малого круглого м'яза плеча. Яка функція плечового суглоба порушена?**
- 1446. У хворого внутрішньосуглобовий перелом шийки стегнової кістки. Спостерігається асиметрія головки. Яка структура пошкодження?**
- 1447. У хворого гостре запалення носослізного каналу. Відомо, що після перенесеного грипу довгий час були виділення з носа. Із якого відділу носової порожнини могла потрапити інфекція в носослізний канал?**
- 1448. Хворому з пухлиною гортані показана ургентна операція - накладання трахеостоми (введення металічної трубки в трахею) Який м'яз повинен розітнути хірург при здійсненні операції?**

1449. Дитина 3-х років поступила в клініку з діагнозом: отит. Є вірогідність розповсюдження гною із барабанної порожнини через задню стінку. Куди найвірогідніше може потрапити гній?

1450. Дитина 5 років поступила в лор- відділення клінічної лікарні з діагнозом: гнійне запалення середнього вуха . Захворювання розпочалось з запалення носоглотки. Через який канал скроневої кістки інфекція потрапила в барабанну порожнину ?

1451. При обстеженні миміки хворого виявлено, що він не може скласти губи трубочкою, не може свистіти, під час сміху кутки рота не піднімаються догори, ротова щілина розтягується в боки (поперечна посмішка). Пацієнт страждає на міопатію - спадкове захворювання із дистрофічним ураженням м'язів. На атрофію якого м'язу вказують дані симптоми?

1452. В травмпункт звернувся чоловік 45 р. після побутової травми плеча. При обстеженні встановлено, що відсутні функції розгинання, приведення та пронації плеча. Пошкодження якого м'яза викликало такий стан?

1453. У клініку доставлена дитина 8 років з різаною раною підшви правої ноги. При хірургічній обробці виявлена глибока рана з розтином сухожилля м'яза на підшовній поверхні, ближче до латерального краю стопи. У хворого обмежене підняття латерального краю стопи. Функція якого м'яза, ймовірно усього, порушена?

1454. Рентгенологічно встановлено затемнення в області у верхньощелепній пазусі справа, що свідчить про наявність гною. У який носовий хід буде виділятися патологічна рідина?

1455. Запалення барабанної порожнини (гнійний отит) у хворого ускладнилося запаленням комірок соскоподібного відростка. Через яку стінку барабанної порожнини міг проникнути гній до комірок?

1456. У хворого виступає лопаткова ость. Які м'язи атрофовані ?

1457. У хворого глибока різана рана на задній поверхні плеча в середній його третині. Про ушкодження якого м'яза у нього можна думати?

1458. Чоловік 30 років звернувся до стоматолога зі скаргою на розлади жування, у нього виникає біль при відтягуванні щелепи назад. Запалення якого з жувальних м'язів найвірогідніше встановить лікар?

1459. У хворого ускладнення нежиті. Рентгенологічно встановлено скупчення гною у верхньощелепній пазусі зліва. У який носовий хід виділяється гній?

1460. Хворий скаржиться на головний біль, утруднене дихання. Рентген підтвердив діагноз - фронтит (запалення лобової пазухи). В якому носовому ході при огляді порожнини носа можуть спостерігатись гнійні виділення?

1461. Хворий не може розвести пальці кисті. Функція яких м'язів порушена?

1462. У хворого з ножовим пораненням стегна утруднене розгинання гомілки. Який із м'язів постраждав сильніше?

1463. У чоловіка 70 років внаслідок падіння стався перелом стегнової кістки. Яке найпоширеніше місце перелому цієї кістки у даному віці?

1464. При огляді хворого лікар помітив асиметрію його лица. Больний не може нахилити лоб, підняти брови, свиснути, закрити повністю очі, оскалити зуби. Функція яких м'язів порушена?

1465. У новонародженого є дефект у вигляді середньої тріщини нижньої щелепи. Несращення яких відростків призводить до таких аномалій розвитку?

1466. Внаслідок побутової травми у хворого 34 років мало місце обмежене згинання середніх фаланг 2-5 пальців кисті, а разом з ними і самих пальців. Функція яких м'язів ймовірно порушена?

1467. Хворий 28 років порізав склом передню поверхню передпліччя на 2 см нижче ліктьового суглоба, він не здатний обертати кисть досередини. Функція якого м'яза ймовірноше усього порушена?

1468. У хірургічну клініку доставлений чоловік 29 років з рваною раною правої сідничної ділянки. При обстеженні виявлена глибока рана з пошкодженням м'язів. У положенні, лежачи на животі, хворий не може підвести праву ногу, тобто утруднене розгинання стегна. Функція якого м'яза ймовірноше усього, пошкоджена?

1469. На прийом до лікаря була доставлена дівчинка 3 років, яка страждає викривленням шиї. За останні півроку це стало особливо помітним. При обстеженні дитини визначено, що голова нахилена в праву сторону, вухо наближене до плеча, а підборіддя до грудини. На R-грамі в шийному відділі хребта змін не виявлено. Функція якого м'яза, ймовірноше усього, пошкоджена?

1470. До травматологічного відділення був доставлений хворий з пошкодженням передньої поверхні лівого стегна нижньої третини. При обстеженні виявлена рана розміром 1,5 x 3 см, яка розташована поперечно відносно стегна на 2 см вище наколінника. У рані добре визначалось пошкоджене сухожилля м'яза. У хворого сильно обмежене розгинання гомілки. Функція якого м'яза, ймовірноше усього, порушена?

1471. При обстеженні миміки хлопчика виявлено, що він не може скласти губи трубочкою, не може задути свічку, під час сміху кутки рота не піднімаються догори, а ротова щілина розтягується в боки (поперечна посмішка). На атрофію якого м'язу вказують дані симптоми?

1472. У дитини 8 років із гнійним середнім отитом інфекція із барабанної порожнини поширилась на цибулину яремної вени. Таке ускладнення розвивається за умови витончення однієї із стінок барабанної порожнини. Аномалія якої стінки має місце?

1473. На рентгенограмі тазу видно всі три частини тазової кістки, відокремлені широкими проміжками, що відповідають невидимому на рентгенограмах хрящу. Про який вік суб'єкта можна говорити?

1474. Чоловік 25 років звернувся із скаргами на патологічні рухи в колінному суглобі - передньо-заднє зміщення гомілки відносно стегна (так званий симптом "висувної шухляди"), що з'явилися після травми. -. Які зв'язки колінного суглобу пошкоджено?

1475. Дитина 7 років не може відвести плече і підняти його до горизонтального рівня, до обличчя руку приводить лише тильною стороною, при деякій абдукції плеча за рахунок надосного м'язу - рука "сурмача". Активна функція якого м'язу відсутня?

1476. В яку порожнину черепа буде поширюватися крововилив, якщо зруйнована венозна судина в області яремного отвору?

1477. У пацієнта спостерігається обмеження обсягу відведення у плечовому суглобі (менше, ніж 50 %). Функція якого м'язу порушена?

1478. У хворого гнійне запалення клиноподібної пазухи. В яку частину носової порожнини витікає гній?

1479. В травматологічне відділення поступив хлопчик 10 років із травмою правого стегна. На рентгенограмі не виявлено перелому стегнової кістки, але видно темні проміжки на її проксимальному і дистальному кінцях. Що це?

1480. Після травми в ділянці колінного суглоба у хворого спостерігається симптом " висувної шухляди " передньо-заднє зміщення гомілки відносно стегна. Які зв'язки пошкоджено?

1481. У нейрохірургічне відділення поступив 54-річний чоловік із скаргами на відсутність чутливості шкіри нижньої повіки, латеральної поверхні зовнішнього носа, верхньої губи. Лікар при огляді встановлює запалення другої гілки трійчастого нерва. Через який отвір виходить із черепа ця гілка?

1482. На рентгенограмі таза видно, що всі три частини кульшової кістки відокремлені проміжками, які відповідають невидимому на рентгенограмах хрящу. Для якого віку це характерно?

1483. У потерпілого травма м'яких тканин та тім'яних кісток в ділянці їх з'єднання між собою, яка супроводжується сильною кровотечею. Яке судинне утворення пошкоджене?

1484. У травматологічне відділення поступив чоловік 35 років з травмою лівої кисті. При огляді встановлено: різана рана долонної поверхні лівої кисті; середні фаланги II - V пальців не згинаються. Які м'язи пошкоджені?

1485. У травматологічний пункт поступив чоловік 38 років з травмою правої кисті. При огляді встановлено: різана рана в ділянці підвищення великого пальця правої кисті; дистальна фаланга I пальця не згинається. Який м'яз пошкоджено?

1486. У хворого з невритом стегового нерва порушено згинання стегна та розгинання гомілки у колінному суглобі. Функція якого м'яза при цьому порушена?

1487. Після травми хворий не може розігнути руку у ліктьовому суглобі. Порушення функції якого м'яза може це викликати?

1488. У хворого затруднені рухи кисті. Встановлено запалення спільної синовіальної піхви м'язів-згиначів. З анамнезу відомо, що хворий тиждень тому отримав колоту травму пальця. Який з пальців найбільш вірогідно був ушкоджений?

1489. Внаслідок аварії у постраждалого сильна болісність і набряк передньої поверхні гомілки, тильне згинання ступні утруднене. Функція якого з названих м'язів гомілки вірогідно постраждала?

1490. У хворого очна щілина праворуч помітно більша ніж ліва. Функція якого з мімічних м'язів порушена?

1491. Хворий 30 років, із запаленням пульпи 2-го верхнього моляра, звернувся до лікаря зі скаргами на головний біль та слизові виділення з носа. Після огляду йому встановили діагноз - пульпіт, ускладнений синуситом. До якої з пазух потрапила інфекція від кореня зуба?

1492. У хворої 37 років в результаті попадання чужорідного тіла в дихальні шляхи виник кашель, а потім ядуха. Хворому була зроблена трахеотомія в ділянці шиї, яка обмежена верхнім черевцем *m. omohyoideus*, *m. sternocleidomastoideus* та серединною лінією шиї. В якому трикутнику шиї проведено хірургічне втручання?

1493. У вагітної жінки 29 р., лікар-акушер визначив розміри таза. За допомогою циркуля була виміряна відстань між двома верхніми передніми клубовими остями. Який розмір великого таза був визначений?

1494. До лікаря звернувся хворий із скаргами на болі в лівій половині шиї, які посилюються при рухах голови. Положення при якому болі не турбують - це нахил голови вліво, з поверненням обличчя вправо. Ураження якого м'яза спричиняє біль в даному випадку?

1495. Під час обстеження, у хворого виявлено абсцес крило-піднебінної ямки. Куди може розповсюдитись інфекція при несвоєчасному наданні медичної допомоги?

1496. У потерпілого травма колінного суглоба з розтрощенням наколінника. Сухожилок якого м'яза стегна може бути пошкоджено при даній травмі?

1497. Під час підготовки до змагань гімнаст отримав травму з вивихом у плечовому суглобі. Сухожилок якого м'яза плеча проходить всередині порожнини вищезазначеного суглоба і може бути пошкодженим?

1498. Після травми хворий не може розігнути руку в ліктьовому суглобі. Порушення функцій якого з основних м'язів може це спричинити?

1499. У пацієнта діагностовано компресійний перелом поперекового хребця. При цьому різко збільшилась кривизна лордозу поперекового відділу хребта. З ушкодженням якої зв'язки може супроводжуватись така зміна кривизни хребтового стовпа?

1500. Хворий поступив у хірургічне відділення з діагнозом пахвинна кила. При оперативному втручанні хірург проводить пластику задньої стінки пахвинного каналу. Чим вона утворена?

1501. До реанімаційного відділення поступив чоловік з пораненням задньої ділянки шиї (regio nuchae). Який з м'язів тіла займає цю ділянку?

1502. При огляді 6-місячної дитини лікар виявив не закрите заднє тім'ячко. В якому віці воно закривається при нормальному розвитку дитини?

1503. Жінка похилого віку, госпіталізована з скаргами на різкий біль, набряк в ділянці правого кульшового суглобу, що з'явилася після падіння. При огляді: стегно приведенне всередину, рухи в кульшовому суглобі порушені. Перелом, якої кістки або її частині визначив лікар?

1504. При оперативному підході до щитоподібної залози з поперечного (комірцевого) доступу відкривається міжапоневротичний надгруднинний простір. Ушкодження якого анатомічного утворення, що знаходиться в цьому просторі, є небезпечним?

1505. При травмі в області тазу у хворого на рентгенологічному знімку виявлено некроз головки стегнової кістки. Яка з перерахованих зв'язок кульшового суглобу була пошкоджена під час травми?

1506. У хворого після травми коліна гомілку у зігнутому під прямим кутом положенні можна зміщувати вперед і назад подібно до висувної шухляди. Які зв'язки розірвані?

1507. 30 річний чоловік звернувся до стоматолога зі скаргою на розлади жування, у нього виникає біль при відтягуванні щелепи назад. Лікар встановив запалення одного з жувальних м'язів. Якого?

1508. Хворий 45 років після травми правого плеча (внаслідок падіння) не може відвести праву руку до горизонтального рівня. Пошкодження якого з м'язів викликало вказане

1509. Дитина, 5 років, потрапила в тяжкому стані в інфекційний відділ клінічної лікарні з діагнозом дифтерії. Для запобігання ядухи дитині провели трахеотомію, В якому трикутнику шиї проведена дана операція?

1510. Хворий скаржиться на головний біль, утруднене дихання. Рентген підтвердив діагноз - фронтит (запалення лобової пазухи). В якому носовому ході при огляді порожнини носа можуть спостерігатись гнійні виділення?

1511. Після перенесеної черепно-мозкової травми і рентгенологічного обстеження виявлено перелом основи черепа. Лінія перелому проходить через остистий і круглий отвори. Яка кістка пошкоджена внаслідок травми?

1512. Хворий не може розвести пальці кисті. Функція яких м'язів порушена?

1513. У хворого з ножовим пораненням стегна утруднене розгинання гомілки. Який із м'язів постраждав сильніше?

1514. Хворий з ножовим пораненням верхньолатеральної ділянки плеча не може відвести руку до горизонтальної площини. Який із м'язів пошкоджено?

1515. Хворий потрапив у клініку з травмою черепа. При рентгенологічному обстеженні виявлено перелом основи черепа в ділянці каналу під'язикового нерва. Яку кістку

1516. Під час обстеження пацієнта ЛОР лікар діагностував запалення верхньощелепних пазух. В якому носовому ході під час риноскопії був виявлений гній?

1517. Після травми ока виникло нагноєння м'яких тканин орбіти. Через який анатомічний утвір гнійний процес може поширитись у крилопіднебінну ямку?

1518. До лікаря педіатра звернулася мати з приводу того, що у її дитини віком 1 рік голова повернена в лівий бік. Який із м'язів шиї недорозвинений?

1519. У хворого 28 років, діагностовано гострий запальний процес слизової оболонки носо-сльозової протоки. З анамнезу стало відомо, що після перенесеного грипу протягом 10-ти днів були виділення із носа. З якого відділу носової порожнини інфекція могла проникнути у носо-сльозову протоку ?

1520. У чоловіка похилого віку внаслідок падіння стався перелом стегнової кістки. Вкажіть найпоширеніше місце перелому цієї кістки.

1521. При дослідженні хворого лікар визначив, що його язик не рухається вперед (не висувається з рота). Який м'яз пошкоджений?

1522. Під час прийому їжі у новонародженої дитини спостерігається закидання молока у носову порожнину. Вкажіть на можливу причину виникнення цього порушення.

1523. При падінні з висоти постраждалий вдарився передньою поверхнею плеча об виступаючий твердий предмет. При огляді хірургом констатований розрив двоголового м'яза плеча. Які функції верхньої кінцівки будуть порушенні при вказаній травмі?

1524. Хворий 28 років порізав склом передню поверхню передпліччя на 2 см нижче ліктьового суглоба, він не здатний обертати кисть досередини. Функція якого м'яза ймовірно усього порушена?

1525. При вертикальному падінні з висоти у потерпілого діагностований компресійний перелом поперекового хребця. При цьому різко збільшилася кривизна лордозу поперекового відділу хребта. Порушенням якої зв'язки може супроводжуватися така зміна кривизни хребта?

1526. Після глибокого опіку верхньої частини ділянки плеча у пацієнта з'явилися скарги на неможливість відведення плеча. Про пошкодження якого м'яза слід думати у даному випадку?

1527. Під час фінальної гри баскетболіст пошкодив праву гомілку, внаслідок чого стало неможливо згинати праву стопу. Лікар команди встановив, що пошкоджено сухожилок. Сухожилок якого м'яза пошкоджено?

1528. Чоловік 26 р., у виробничих умовах отримав травму верхньої третини плеча. При обстеженні на травмпункті пошкоджень кісток не виявлено. Відмічається відсутність активного розгинання передпліччя. Який м'яз імовірно всього пошкоджений?

1529. Чоловік у виробничих умовах отримав різану рану латерального краю долонної поверхні кисті. Виявлено обмеження відведення великого пальця кисті. Функція якого м'яза пошкоджена?

1530. В травматологічне відділення звернувся чоловік 30 р. з різаною раною підшовної ділянки лівої стопи. У хворого обмежене піднімання латерального краю стопи. Функція якого м'яза імовірно всього порушена?

1531. При огляді травматологом жінки 45 років було встановлено пошкодження малого

1532. У хворого внутрішньосуглобовий перелом шийки стегнової кістки. Спостерігається асиметрія головки. Яка структура пошкодження?

1533. У хворого гостре запалення носослізного каналу Відомо що після перенесеного грипу довгий час були виділення з носа. Із якого відділу носової порожнини могла потрапити інфекція в носослізний канал?

1534. Хворому з пухлиною гортані показана ургентна операція - накладання трахеостоми (введення металічної трубки в трахею) Який м'яз повинен розітнути хірург при здійсненні операції?

1535. Дитина 5 років поступила в Лор- відділення клінічної лікарні з діагнозом: гнійне запалення середнього вуха . Захворювання розпочалось з запалення носоглотки. Через який канал скроневої кістки інфекція потрапила в барабанну порожнину?

1536. При обстеженні миміки хворого виявлено, що він не може скласти губи трубочкою, не може свистіти, під час сміху кутки рота не піднімаються догори, ротова щілина розтягується в боки (поперечна посмішка). Пацієнт страждає на міопатію - спадкове захворювання із дистрофічним ураженням м'язів. На атрофію якого м'язу вказують дані симптоми?

1537. В травмпункт звернувся чоловік 45 р. після побутової травми плеча. При обстеженні встановлено, що відсутні функції розгинання, приведення та пронації плеча. Пошкодження якого м'язу викликало такий стан?

1538. У клініку доставлена дитина 8 років з різаною раною підшви правої ноги. При хірургічній обробці виявлена глибока рана з розтином сухожилля м'яза на підшовній поверхні, ближче до латерального краю стопи. У хворого обмежене підняття латерального краю стопи. Функція якого м'яза, ймовірно усього, порушена?

1539. Рентгенологічно встановлено затемнення в області у верхньощелепній пазусі справа, що свідчить про наявність гною. У який носовий хід буде виділятися патологічна рідина?

1540. Запалення барабанної порожнини (гнійний отит) у хворого ускладнилося запаленням комірок соскоподібного відростка. Через яку стінку барабанної порожнини міг проникнути гній до комірок?

1541. Хворий скаржиться на головний біль, утруднене дихання. Рентген підтвердив діагноз - фронтит (запалення лобової пазухи). В якому носовому ході при огляді порожнини носа можуть спостерігатись гнійні виділення?

1542. Хворий не може розвести пальці кисті. Функція яких м'язів порушена?

1543. У хворого з ножовим пораненням стегна утруднене розгинання гомілки. Який із м'язів постраждав сильніше?

1544. Внаслідок побутової травми у хворого 34 років мало місце обмежене згинання середніх фаланг 2-5 пальців кисті, а разом з ними і самих пальців. Функція яких м'язів ймовірно усього порушена?

1545. У хірургічну клініку доставлений чоловік 29 років з рваною раною правої сідничної ділянки. При обстеженні виявлена глибока рана з пошкодженням м'язів. У положенні, лежачи на животі, хворий не може підвести праву ногу, тобто утруднене розгинання стегна. Функція якого м'яза ймовірно усього, пошкоджена?

1546. На прийом до лікаря була доставлена дівчинка 3 років, яка страждає викривленням шиї. За останні півроку це стало особливо помітним. При обстеженні дитини визначено, що голова нахилена в праву сторону, вухо наближене до плеча, а підборіддя до грудини. На R-грамі в шийному відділі хребта змін не виявлено. Функція якого м'яза, ймовірно усього, пошкоджена?

1547. До травматологічного відділення був доставлений хворий з пошкодженням передньої поверхні лівого стегна нижньої третини. При обстеженні виявлена рана розміром 1,5 x 3 см, яка розташована поперечно відносно стегна на 2 см вище наколінника. У рані добре визначалось пошкоджене сухожилля м'яза. У хворого сильно обмежене розгинання гомілки. Функція якого м'яза, ймовірно, порушена?

1548. При обстеженні миміки хлопчика виявлено, що він не може скласти губи трубочкою, не може задути свічку, під час сміху кутки рота не піднімаються догори, а ротова щілина розтягується в боки (поперечна посмішка). На атрофію якого м'язу вказують дані симптоми?

1549. У дитини 8 років із гнійним середнім отитом інфекція із барабанної порожнини поширилась на цибулину яремної вени. Таке ускладнення розвивається за умови витончення однієї із стінок барабанної порожнини. Аномалія якої стінки має місце?

1550. На рентгенограмі тазу видно всі три частини тазової кістки, відокремлені широкими проміжками, що відповідають невидимому на рентгенограмах хрящу. Про який вік суб'єкта можна говорити?

1551. Чоловік 25 років звернувся із скаргами на патологічні рухи в колінному суглобі - передньо-заднє зміщення гомілки відносно стегна (так званий симптом "висувної шухляди"), що з'явилися після травми. Які зв'язки колінного суглобу пошкоджені?

1552. Дитина 7 років не може відвести плече і підняти його до горизонтального рівня, до обличчя руку приводить лише тильною стороною, при деякій абдукції плеча за рахунок надосного м'язу - рука "сурмача". Активна функція якого м'язу відсутня?

1553. В яку порожнину черепа буде поширюватися крововилив, якщо зруйнована венозна судина в області яремного отвору?

- 1554. У пацієнта спостерігається обмеження обсягу відведення у плечовому суглобі менше, ніж 50. Функція якого м'язу порушена?**
- 1555. В травматологічне відділення поступив хлопчик 10 років із травмою правого стегна. На рентгенограмі не виявлено перелому стегнової кістки, але видно темні проміжки на її проксимальному і дистальному кінцях. Що це?**
- 1556. Після травми в ділянці колінного суглоба у хворого спостерігається симптом “ висувної шухляди “ пердньо-заднє зміщення гомілки відносно стегна. Які зв'язки пошкоджено?**
- 1557. У чоловіка 70 років внаслідок падіння стався перелом стегнової кістки. Яке найпоширеніше місце перелому цієї кістки у даному віці?**