

ЗАВАНТАЖЕНО З САЙТУ ТЕСТУВАННЯ.УКР

Топографічна анатомія: Вступ. Оперативна хірургія та топографічна анатомія голови та шиї, ділянок і органів грудної порожнини, порожнини живота

Категорія: **Нормальна та патологічна анатомія, топографічна анатомія з
оперативною хірургією**

Кількість запитань: **478**

- 1. Задньою межею області підпідборіддя є**
- 2. Зовнішньою межею області підпідборіддя є**
- 3. В якому шарі склепіння черепа гематома має форму кістки**
- 4. В якому шарі склепіння черепа гематома має розлитий характер**
- 5. Які хірургічні голки найоптимальніше використовувати для зшивання нервових стовбурів:**
- 6. Які з наведених способів зупинки кровотечі є тимчасовими:**
- 7. Які з наведених способів зупинки кровотечі є кінцевим:**
- 8. При зав'язуванні простого (жіночого) лігатурного вузла проводиться перекручування кінців лігатури. При використанні якого прийому утвориться простий вузол:**
- 9. Які з наведених способів зупинки кровотечі є тимчасовими:**
- 10. Які з наведених тканин розводять чотиризубими гострими гачками:**
- 11. Скільки класичних позицій скальпеля використовують під час операції:**
- 12. Передньо-верхньою межею області підпідборіддя є**
- 13. Які з наведених технічних прийомів повинні використовуватися при розтині шкіри:**
- 14. Які значення кута нахилу осі операційної дії вважаються найбільш оптимальними для проведення операції:**
- 15. При зав'язуванні хірургічною лігатурою вузла проводиться перекручування лігатури. При використанні якого прийому сформується хірургічний вузол:**

16. Які класичні позиції скальпеля використовуються під час оперативного втручання:
17. В якому шарі склепіння черепа гематома локалізована у вигляді гулі:
18. Де частіше застосовують затискач Мікуліча:
19. Що вивчає топографічна анатомія:
20. Що таке скелетотопія:
21. Яким інструментом витягують голку з тканин при накладанні швів
22. Що таке голотопія:
23. Яким рухом кисті просувається голка через тканини при накладанні шва:
24. Вкажіть вид місцевої анестезії:
25. Вкажіть вид провідникової анестезії:
26. Вказати чому кровотеча з синусів твердої мозкової оболонки не має тенденції до самовільної зупинки:
27. Яку з названих тканин можна захоплювати хірургічним пінцетом:
28. Де доцільніше застосовувати атравматичні голки:
29. Пошкодження якої судини найчастіше спостерігається при травмах скроневої ділянки:
30. Який інструмент використовується для відокремлення окістя від плоских кісток при операції?
31. Які з наведених тканин захоплюються хірургічними пінцетами:

32. Яку назву має кровоспинний затискач з прямими щічками і зубчиками на кінцях:
33. Які з наведених тканин захоплюють анатомічним пінцетом:
34. При народженні у доношеної дитини встановлено незарощене переднє (велике) тім'ячко. Які його розміри вказують на доношеність та нормальний розвиток дитини.
35. У хворого з відкритим непроникаючим пораненням голови відмічається скальпована рана лобної ділянки без ушкодження кісток. Які шари склепіння черепа входять до складу скальпованого клаптя:
36. На які відділи ділять ділянку голови?
37. Вкажіть правильну передню межу лобно-тім'яно-потиличної ділянки голови:
38. Вкажіть задню межу лобно-тім'яно-потиличної ділянки голови:
39. Вкажіть бокову межу лобно-тім'яно-потиличної ділянки:
40. З яких структур і як утворюється атерома?
41. З якими структурами пов'язані стінки судин підшкірно-жирової клітковини?
42. Між якими структурами локалізований сухожилковий шолом?
43. Які судини знаходяться в підапоневротичній жировій клітковині лобно-тім'яно-потиличної ділянки голови:
44. Де локалізована диплоетична речовина:
45. Яка шкіра в лобно-тім'яно потиличній ділянці голови?
46. Які артерії кровопостачають потиличну ділянку лицевого відділу голови:

47. Назвіть джерело потиличної артерії:
48. Скільки ярусів вен локалізовано в лобно-тім'яно-потиличній ділянці:
49. Де локалізований I ярус венозної системи лобно-тім'яно-потиличної ділянки голови:
50. Де локалізований 2-й ярус венозної системи лобно-тім'яно-потиличної ділянки?
51. В якому напрямку здійснюється венозний відтік крові по емісарних венах:
52. До яких нервів відноситься вушно-скроневи́й нерв?
53. Де локалізований вушно-скроневи́й нерв?
54. Дайте характеристику діплоетичної речовини у новонароджених:
55. Вкажіть товщину кісток черепа у новонароджених:
56. В якій жировій клітковині склепіння черепа знаходяться сухожильні перетинки?
57. Вкажіть джерело очної артерії
58. Вкажіть джерело надблокової артерії:
59. Вкажіть джерело поверхневої скроневої артерії:
60. Вкажіть джерело передніх вушних артерій
61. Вкажіть джерело глибоких скроневи́х артерій:
62. Вкажіть джерело середніх скроневи́х артерій

63. Куди в основному впадає поверхнева скронева вена?
64. В якому шарі склепіння черепа локалізована поверхнева скронева артерія?
65. Як правильно виконати кінцеву зупинку кровотечі з судин підшкірно-жирової клітковини?
66. Як правильно виконати кінцеву зупинку кровотечі з кісток черепа?
67. Вкажіть джерело вилично-очної артерії
68. Як здійснити кінцеву зупинку кровотечі з оболонкових артерій:
69. Як здійснити кінцеву зупинку кровотечі з кісток черепа?
70. Вкажіть джерело задньої вушної артерії :
71. Як здійснити кінцеву зупинку кровотечі з кісток черепа?
72. Який хід мають судини склепіння черепа?
73. В кого найкраще виражені диплоетичні вени:
74. Яку основну небезпеку мають широкі венозні зв'язки між трьома ярусами вен голови?
75. Якими венами з'єднуються між собою венозні яруси?
76. Вкажіть, гілкою якого нерва є лобний нерв?
77. Який нерв інервує лобне черевце потилично-лобового м'яза?
78. Вкажіть гілкою якого нерва є малий потиличний нерв?
79. Гілкою якого нерва є великий потиличний нерв:

80. Гілкою якого нерва є задній вушний нерв?
81. В які лімфовузли здійснюється лімфо відтік від лобної ділянки склепіння черепа?
82. В які лімфовузли здійснюється лімфовідтік від тім'яної ділянки склепіння черепа?
83. Вкажіть проникаючу рану черепа
84. Як з'єднують м'які тканини склепіння черепа при їх пошкодженні?
85. Чому зяють судини при пошкодженні м'яких тканин склепіння черепа?
86. Які структури є похідними сухожильного шолома склепіння черепа?
87. Які рани частіше виникають при пошкодженні м'яких покривів склепіння черепа?
88. Як з'єднане окістя з кістками склепіння черепа
89. Яке ускладнення може виникнути при масивних видаленнях окістя:
90. Яку основну функцію для кісток здійснює окістя?
91. Де локалізовані субперіостальні гематоми та абсцеси?
92. Яку форму мають зовнішня та внутрішня пластинки кісток склепіння черепа?
93. Чому при травмах склепіння черепа частіше пошкоджується внутрішня пластинка кісток?
94. Які структури локалізовані в губчастій речовині кісток склепіння черепа?

95. Де і для чого використовується лямінектом при оперативних втручаннях на черепі?
96. Яке співвідношення довжини кінців нитки, закладеної в голку при накладанні вузлового шва, правильне:
97. Яким хірургічним інструментом найкраще роз'єднувати м'язи:
98. Які інструменти застосовуються для з'єднання тканин?
99. Чому шкіру не рекомендують роз'єднувати ножицями?
100. Який затискач краще використати для захоплення пошкодженої судини при кровотечі:
101. Фізіологічний розчин якої температури необхідно використати для зупинки капілярної кровотечі з пошкодженого м'яза?
102. Які ускладнення виникають при з'єднанні неоднорідних тканин:
103. Вкажіть найкращий метод кінцевої зупинки кровотечі з сагітального синуса твердої мозкової оболонки:
104. Які анатомічні структури проходять через зоровий канал основи черепа?
105. Де може утворитися абсцес при хронічному нагноєнні середнього вуха при руйнуванні дазу барабанної порожнини?
106. Назвіть анатомічні утвори, що проходять через круглий отвір внутрішньої основи черепа?
107. Де локалізований сліпий отвір:
108. При пошкодженні якого нерва виникає аносмія різного ступеня?

- 109. Утвором якої структури є пах іонові грануляції**
- 110. Між якими структурами локалізований рваний отвір внутрішньої основи черепа**
- 111. Куди відкривається канал внутрішньої сонної артерії?**
- 112. Який нерв проходить через овальний отвір внутрішньої основи черепа**
- 113. Вкажіть анатомічну структуру, що проходить через остистий отвір основи черепа:**
- 114. Вкажіть правильність захоплення судин затискачем у підшкірній клітковині склепіння черепа при тимчасовій зупинці кровотечі:**
- 115. Який з наведених інструментів рекомендується використовувати для тимчасової зупинки кровотечі з судин внутрішніх органів?**
- 116. Чим відрізняється кровоспинний затискач "москіт" від затискача Кохера?**
- 117. Яку назву має кровоспинний затискач з прямими або зігнутими кінцями і наявними на них поперечними насічками**
- 118. Назвіть складові внутрішньої основи черепа**
- 119. Вказати елементи головного мозку, що формують венозні пазухи**
- 120. Вкажіть місце локалізації нижнього сагітального синуса:**
- 121. Назвати складові середньої черепномозкової ямки:**
- 122. Вкажіть складові задньої черепної ямки**
- 123. Яка пазуха виносить кров з черепної коробки?**

- 124. Вкажіть пазуху твердої мозкової оболонки, що безпосередньо зв'язана з венозною системою лиця:**
- 125. Назвіть судину, що проходить в середині печеристого синуса**
- 126. Вкажіть, де локалізована середня оболонкова артерія:**
- 127. В якій частині порожнини черепа тверда мозкова оболонка пухко???
Прилягає до кісток черепа і де можливі утворення епідуральних гематом?**
- 128. Які з перерахованих матеріалів найкраще застосовувати для закриття дефекту твердої мозкової оболонки під час первинної хірургічної обробки проникаючих поранень черепа?**
- 129. Вкажіть локалізацію верхнього сагітального синуса**
- 130. Вкажіть локалізацію прямого синуса:**
- 131. Вкажіть місце локалізації поперечного синуса:**
- 132. Який з наведених методів застосовується для зупинки кровотечі з судин мозку:**
- 133. Який з наведених методів можна застосовувати для зупинки кровотечі з верхнього сагітального синуса:**
- 134. Пошкодження якої судини є най більш небезпечним при травмі скроневої ділянки хребта?**
- 135. При пошкодженні якої структури може виникнути підшкірна емфізема та пневмоторакс?**
- 136. Якими анатомічними утворами середня черепна ямка основи черепа відмежована від задньої?**

137. Яка судина локалізована в печеристому синусі?
138. Який з перерахованих нервів локалізований в стінці печеристого синуса?
139. Який нерв локалізований в стінці печеристого синуса?
140. Який нерв локалізований в стінці печеристої пазухи:
141. Який з перерахованих вище нервів локалізований в стінці печеристої пазухи:
142. Скільки відсотків крові надходить до мозку через хребтові артерії:
143. Через які отвори спинномозкова рідина з 4-го шлуночка головного мозку поширюється в під павутинну порожнину головного мозку:
144. Які структури з'єднує отвір Можанді в головному мозку:
145. Якою анатомічною структурою продукується спинномозкова рідина:
146. Який з перерахованих нижче нервів інервує тверду мозкову оболонку:
147. Вкажіть причину збіжної косоокості:
148. Які з названих утворів проходять через великий потиличний отвір черепа?
149. Вкажіть, які з наведених нижче утворів проходять через остистий отвір основи черепа?
150. Які з наведених нижче анатомічних утворів проходять через великий потиличний отвір черепа?
151. Які з наведених нижче анатомічних утворів проходять через великий потиличний отвір черепа?

- 152. Які наведені нижче анатомічні структури проходять через передній відділ яремного отвору?**
- 153. Назвати синус твердої мозкової оболонки, що безпосередньо зв'язаний з венозною системою лиця:**
- 154. В якому місці за схемою Кронлейна розміщена задня гілка середньої оболонкової артерії:**
- 155. В якому місці за схемою Кронлейна-Брюсової розміщена середня мозкова артерія:**
- 156. Яку структуру може пошкодити хірург при трепанації соско видного відростка, порушивши передню межу трикутника Шипо:**
- 157. Яку назву має трепанація черепа за автором при якій окремо викроюється шкірно-апоневротичній клапоть з широкою основою з наступним скальпуванням його і випилюванням окремого окісно-кіткового клаптя на ніжці**
- 158. Вкажіть, в якому місці найкраще визначити локалізацію лицевої артерії на боковій ділянці обличчя:**
- 159. Назвіть найхарактернішу рису лицевої артерії:**
- 160. Вкажіть характерну рису лицевої вени:**
- 161. Вкажіть особливості кровопостачання щічної ділянки:**
- 162. Вкажіть характерну рису лицевої вени:**
- 163. До якої групи м'язів бокової ділянки обличчя відноситься скроневи м'яз?**
- 164. Вкажіть характеристику жувальних м'язів:**

- 165. Вкажіть характерну рису мімічних м'язів обличчя:**
- 166. При трепанації соско видного відростка хірург вийшов за задню межу трикутника Шипо. Яку структуру міг пошкодити хірург::**
- 167. Назвіть характерну рису жувальних м'язів бокової ділянки обличчя:**
- 168. До якої групи м'язів бокової ділянки обличчя відноситься медіальний крилоподібний м'яз?**
- 169. Вкажіть, куди може розповсюдитись гнійний процес при гнійному паротиті:**
- 170. Яка із названих анатомічних структур проходить у товщі привушної залози:**
- 171. Вкажіть, куди може розповсюдитись гнійний процес при гнійному паротиті:**
- 172. Вкажіть, яка з перерахованих анатомічних структур локалізована в товщі привушної залози:**
- 173. Вкажіть, яка з перерахованих анатомічних структур локалізована в товщі привушної залози:**
- 174. Яке ускладнення може виникнути при гнійному паротиті:**
- 175. Яке ускладнення може виникнути при гнійному паротиті:**
- 176. В якій з перерахованих ділянок голови локалізований міжфасціальний клітковинний скронево-криловидний проміжок:**
- 177. В якій з перерахованих ділянок голови локалізований міжфасціальний клітковинний міжкриловидний проміжок:**
- 178. Куди відкривається вивідна протока привушної залози:**
- 179. Де локалізована вивідна протока привушної залози в боковій ділянці лица:**

180. Який з перерахованих нервів бокової ділянки обличчя є чутливим:
181. Вкажіть, куди відкривається клиновидна пазуха:
182. Вкажіть, куди відкривається лобова пазуха:
183. Вкажіть, куди відкривається верхньощелепна гайморова пазуха:
184. Вкажіть, куди відкриваються передні комірки решітчастої кістки:
185. Вкажіть, куди відкриваються середні комірки решітчастої кістки:
186. Вкажіть, куди відкриваються задні комірки решітчастої кістки:
187. Вкажіть, який напрям розрізів м'яких тканин черепа дозволяє уникнути пошкодження великих судин і нервів:
188. Дайте визначення, що таке гайморит:
189. Порушення цілості якої оболонки при травмі черепа дає затікання крові у ліквор:
190. Вкажіть нерв, при пошкодженні якого порушується чутливість шкіри лиця:
191. Вкажіть артерії при злитті яких формується основна артерія:
192. При обстеженні хворого виявлено порушення функції колового м'яза ока. При пошкодженні якого нерва виникає вказаний стан:
193. Назвіть вену, яка з'єднує кутову вену та печеристий синус твердої мозкової оболонки:
194. Як називається запальний процес у лобній пазусі?
195. Вкажіть, як називається запальний процес у верхньощелепній пазусі?

196. За медичною допомогою звернувся хворий, який двоє діб тому потрапив в автомобільну аварію і отримав травму голови. Об'єктивно: в області склепіння черепа визначається неглибока різана рана, шкіра навколо голови набрякла, в невеликій кількості - серозне відокремлюване. Була проведена первинна хірургічна обробка. По якому типу протікатимуть запальні процеси в підшкірно-жировій клітковині лобно-тім'яно-потиличної області?

197. Хворому з прогресуючим набряком мозку, що розвинувся в результаті травми правої скроневої області, за життєвими свідченнями була виконана декомпресивна трепанація резекції черепа. Чим закривають рану після декомпресивної трепанації резекції черепа?

198. У хворого обширна скальпована рана в області склепіння черепа з ознаками забруднення. Вкажіть, які ділянки виділяють в межах склепіння черепа?

199. У потерпілого в ДТП - скальпована рана в області склепіння черепа. Проводиться первинна хірургічна обробка. Які шари склепіння черепа входять в клопот при скальпованій рані?

200. У хворого рана м'яких тканин склепіння черепа, кровоточить. В якому шарі м'яких тканин знаходяться судинно-нервові утворення лобно-тім'яно-потиличної області?

201. У потерпілого - різана рана в тім'яній області справа, рясна кровотеча. Вкажіть особливості судин поверхневого шару лобно-тім'яно-потиличної області?

202. У хворого - абсцес в тім'яній області зліва. Хірург проводить розкриття гнійника. Які розрізи на склепінні черепа є анатомічно обгрунтованими і менш травматичними?

203. Який нерв може бути пошкоджений під час резекції щитовидної залози?

204. Вкажіть місце, де визначають "френікус-симптом"?
205. Вкажіть, де проводять вкол голки при виконанні шийної вагосимпатичної блокади за О. В. Вишневським?
206. Назвіть допущену помилку при розтині трахеї, коли після введення трахеостомічної канюлі, дихання не відновлюється?
207. Назвіть інструмент, який використовується для розширення рани трахеї при трахеостомії?
208. Вкажіть, які відділи щитовидної залози зберігають при субтотальній субфасціальній резекції за О. В. Ніколаєвим?
209. По відношенню до якого анатомічного утворення розрізняють верхню, середню і нижню трахеостомії?
210. Флегмони якого клітковинного простору шиї можуть ускладнитися заднім медіастенітом?
211. Гілки яких нервів виходять на рівні середини заднього краю грудино-ключично-соскоподібного м'яза?
212. Перерахуйте елементи основного судинно-нервового пучка латерального трикутника шиї.
213. Назвіть місце найбільш частого впадання грудної лімфатичної протоки
214. Яка перша гілка підключичної артерії відходить донизу в драбинчасто-хребетному трикутнику?
215. Чим обмежений сонний трикутник зверху?
216. Яка артерія проходить через ложе піднижньощелепної слинної залози?

- 217. З чим сполучається щілина основного судинно-нервового пучка медіального трикутника шиї?**
- 218. Яка фасція шиї переважно утворює піхву для основного судинно-нервового пучка медіального трикутника шиї?**
- 219. Які трикутники складають надпід'язикову ділянку?**
- 220. Куди можуть розповсюджуватися гнійні процеси з ретровісцерального клітковинного простору?**
- 221. Назвіть межі піднижньощелепного трикутника?**
- 222. Назвіть основний судинно-нервовий пучок медіального трикутника шиї?**
- 223. Який м'яз є дном трикутника М. І. Пирогова?**
- 224. Між якими фасціями шиї розташовується міжапоневротичний надгрудинний клітковинний простір?**
- 225. Який орган прилягає до задньої стінки трахеї?**
- 226. Гілками якої судини є верхні щитовидні артерії?**
- 227. Від якої судини починаються нижні щитовидні артерії?**
- 228. Яка фасція шиї, головним чином, утворює піхву для основного судинно-нервового пучка латерального трикутника шиї?**
- 229. На рівні яких кілець трахеї розташовується перешийок щитовидної залози у дітей?**
- 230. Яка фасція шиї утворює фасціальну піхву щитовидної залози?**
- 231. Де розташовується венозний кут?**

232. Назвіть рівень біфуркації загальної сонної артерії, що найбільш часто зустрічається?
233. Які нерви розташовуються в переддрабинчастому проміжку?
234. На які області розділяється передня область шиї?
235. Для яких м'язів друга фасція шиї (за В.М. Шевкуненком) утворює фасціальну піхву?
236. Назвіть першу гілку зовнішньої сонної артерії?
237. Вкажіть місце розташування на шиї лівого поворотного гортанного нерва?
238. Для яких слинних залоз друга фасція шиї (за В.М. Шевкуненком) утворює капсулу?
239. Чим обмежений драбинчасто-хребетний трикутник знизу?
240. Яка судина перетинає в косо-вертикальному напрямі піхву грудино-ключично-соскоподібного м'яза?
241. Під якою фасцією розташовується шийний симпатичний стовбур?
242. В межах якої області латерального трикутника шиї проходить 3-я фасція шиї?
243. Чим обмежений латеральний трикутник шиї?
244. Яка вена розташовується в переддрабинчастому проміжку?
245. Який нерв проходить по передній поверхні переднього драбинчастого м'яза?

246. Назвіть першу гілку підключичної артерії, що відходить догори в драбинчасто-хребетному трикутнику?
247. Чим обмежений міждрабинчастий проміжок?
248. Яка артерія проходить між пучками плечового сплетення в латеральному трикутнику шиї?
249. Які вени утворюють венозний кут М. І. Пирогова?
250. Назвіть трикутники, розташовані в межах внутрішнього шийного трикутника?
251. Які зони найбільшої небезпеки пошкодження поворотного нерва існують при операціях на щитовидній залозі?
252. Як називаються 2-а і 4-а фасції шиї за В.М. Шевкуненком? А. власна і внутрішньо шийна В. ключично-лопаткова, власна С. внутрішньошийна, ключично-лопаткова D. передхребетна, поверхнева Е. власна і передхребетна
253. При раку язика одними з перших уражаються наступні лімфатичні вузли:
254. Назвіть трикутники, розташовані в межах зовнішнього шийного трикутника?
255. Як називається 3 і 5-а фасції за В.М. Шевкуненком?
256. Назвіть скелетотопію глотки?
257. Яка фасція по класифікації В.М. Шевкуненка ділить анатомічно шию на передній і задній відділи?
258. Що відноситься до особливостей 4-ої фасції?

- 259. У якому клітковинному просторі знаходиться непарне венозне сплетення щитовидної залози?**
- 260. Який клітковинний простір шиї сполучається з переднім середостінням?**
- 261. Який клітковинний простір шиї сполучається із заднім середостінням?**
- 262. Які фасції (за В. М. Шевкуненком) зустрічаються в трапецієвидно-лопатковому трикутнику?**
- 263. Які фасції по класифікації В. М. Шевкуненка необхідно розітнути при доступі до зовнішньої сонної артерії в сонному трикутнику?**
- 264. Які фасції по класифікації В. М. Шевкуненка необхідно розітнути в трахеально-лопатковому трикутнику при проведенні трахеостомії?**
- 265. При оголенні язикової артерії, які фасції (за В. М. Шевкуненком) необхідно розітнути в піднижньощелепному трикутнику?**
- 266. Який елемент розташовується медіальніше в основному судинно-нервовому пучку медіального трикутника шиї?**
- 267. Який елемент розташовується латеральніше в основному судинно-нервовому пучку латерального трикутника шиї?**
- 268. За якими ознаками відрізняють в операційній рані зовнішню сонну артерію від внутрішньої?**
- 269. Гілкою якої артерії є язикова артерія?**
- 270. Для оголення якої артерії використовують як орієнтир трикутник М. І. Пирогова?**

- 271. За якими ознаками симпатичний стовбур відрізняють від блукаючого нерва?**
- 272. Яким прийомом слід користуватися для одночасної блокади шийного симпатичного стовбура і блукаючого нерва?**
- 273. Як називається глибокий міжм'язовий проміжок, що містить стовбури плечового сплетення і поперечну артерію шиї?**
- 274. Вкажіть необхідні положення хворого для проведення трахеостомії?**
- 275. Які анатомічні орієнтири повинні бути суміщені в області шиї при проведенні розрізу при трахеостомії точно по середній лінії?**
- 276. Конікотомія проводиться на рівні А. вище за під'язикову кістку В. між першим кільцем трахеї і перснеподібним хрящем С. між перснеподібним і щитовидними хрящами D. між під'язиковою кісткою і щитовидним хрящем між першим кільцем трахеї і щитовидним хрящем**
- 277. ортань розташовується на рівні:**
- 278. При інтубації трахеї трубкою Карленса її дистальний кінець повинен знаходитися:**
- 279. При двосторонньому перетині поворотного нерва спостерігається:**
- 280. Іннервація каротидного синуса включає нерви**
- 281. Гілки зовнішньої сонної артерії включають:**
- 282. Ліва підключична артерія відходить:**
- 283. Підключичні вени розташовані:**

284. Грудна лімфатична протока впадає в ліву яремну вену на рівні
285. Відносно внутрішньої яремної вени все правильно, за виключенням:
286. Зовнішня яремна вена:
287. Які симптоми, що виникають при блокаді зірчастого ганглія, відносяться до синдрому Горнера?
288. Орієнтиром для пункції підключичної вени надключичним доступом є:
289. Ускладненнями при пункції лівої підключичної вени можуть бути:
290. Шийне сплетення
291. Яке з тверджень не вірне щодо гортані і пов'язаних з нею структур
292. Яку поверхню щитовидної залози виділяють як «зону хірургічного ризику»?
293. Як виконують перев'язку гілок щитовидних артерій при струмектомії?
294. Які ускладнення може викликати пошкодження зовнішньої гілки верхнього гортанного нерва, що проходить в безпосередній близькості від верхньої щитовидної артерії?
295. Чим виявляється двостороннє пошкодження поворотного гортанного нерва при струмектомії?
296. На якому рівні розташовується верхня пара паращитовидних залоз?
297. На якому рівні розташовується нижня пара паращитовидних залоз?
298. Які поряд розташовані анатомічні елементи утрудняють ідентифікацію білящитовидних залоз?

- 299. Чим небезпечне проведення розрізу для розтину флегмони шиї поблизу краю нижньої щелепи?**
- 300. Який доступ слід використовувати для розтину і дренування піднижньощелепного абсцесу?**
- 301. Які особливості методики розтину флегмон шиї зумовлює вірогідність виключення пошкодження кровоносних судин і краєвої гілки нижньої щелепи лицьового нерва?**
- 302. У чому полягають особливості хірургічної техніки при розтині паравазальної флегмони переднього відділу шиї?**
- 303. У чому найбільша небезпека грубих хірургічних маніпуляцій в глибині рани при розтині ретротрахеальної або ретроезофагеальної флегмони?**
- 304. Ворота гортані утворені:**
- 305. Поворотні нерви іннервують:**
- 306. В області глотково-стравохідного переходу розташовані:**
- 307. Глотка іннервується:**
- 308. Іннервація гортані здійснюється:**
- 309. У стравоході виявляється фізіологічних звужень:**
- 310. Слизова оболонка стравоходу покрита:**
- 311. Довжина стравоходу у дорослої людини рівна:**
- 312. У чутливій іннервації зіву бере участь:**
- 313. Під слизистою оболонкою дна грушовидної кишені глотки проходить:**

- 314. Частіше зустрічаються дивертикули стравоходу:**
- 315. У навкологлотковому просторі розташована крупна артеріальна судина. Це:**
- 316. "Pir" стравоходу розташований на рівні:**
- 317. Вкажіть куди найчастіше проривається гній із ложа підщелепної залози?**
- 318. Вкажіть передню межу трикутника М. І. Пирогова:**
- 319. Де локалізована a.thyroidea ima ?**
- 320. Де знаходиться місце пальцевого притискання лицевої артерії**
- 321. Скільки довгих (основних) гілок відходить від зовнішньої сонної артерії**
- 322. Скільки фасцій виділяють на шиї**
- 323. Які основні функції фасцій шиї**
- 324. Скільки трикутників виділяють в латеральній та медіальній ділянці шиї**
- 325. Яка з кісток є орієнтиром для проведення вагосимпатичної блокади**
- 326. На якому рівні проектується місце біфуркації загальної сонної артерії**
- 327. На якому місці ділянки шиї притискається підключична артерія для тимчасової зупинки кровотечі**
- 328. Вкажіть проекцію діафрагмального нерва на передньо-бокову ділянку шиї**
- 329. Від якого сплетіння відходять діафрагмальні нерви**

- 330. Що сприяє з'явненню вен шиї та виникненню повітряної емболії при їх пораненні**
- 331. Вкажіть, скільки фасцій шиї виділяють згідно класифікації за Шевкуненком**
- 332. Що входить до складу рефлексогенної зони шиї, яка знаходиться в ділянці ділення загальної сонної артерії**
- 333. Основні ознаки правильно проведеної ваго-симпатичної блокади**
- 334. Чим анатомічно обґрунтована можливість одночасного дихання і смоктання у дітей**
- 335. Скільки артерій кровопостачають в нормі щитоподібну залозу**
- 336. З яких прошарків складається стінка стравоходу в шийному відділі**
- 337. Яка фасція покриває щитоподібну та паращитоподібні залози**
- 338. В яку сторону у шийному відділі змінює свій хід стравохід**
- 339. Вкажіть, від яких анатомічних утворень бере початок зовнішній косий м'яз живота.**
- 340. . Вкажіть можливу кількість сухожильних перемичок, які переривають волокна прямого м'язу живота.**
- 341. . Вкажіть, яке анатомічне утворення формують складки очеревина, що йде від бічних поверхонь сечового міхура до пупка.**
- 342. Вкажіть, які нерви беруть участь в іннервації передньо-бічної стінки живота?**

343. Вкажіть чим утворена нижня стінка пахвинного каналу у здорових людей.
344. Вкажіть, якими анатомічними утвореннями обмежений зовнішній отвір пахвинного каналу.
345. Які анатомічні утворення захоплюють в перший ряд швів, здійснюючи пластику пахвового каналу за Кімбаровським?
346. Які анатомічні утворення підшивають до пупартової зв'язки позаду сім'яного канатика, здійснюючи пластику пахвового каналу за Бассіні?
347. Який метод застосовують при невеликій пупковій грижі?
348. Найбільш оптимальним способом операції з приводу прямої пахвинної грижі є:
349. Чому не можна розтинати защемляюче кільце до розтину гризового мішка?
350. Вкажіть напрям волокон зовнішнього косого м'язу живота.
351. Які анатомічні утворення складають передню стінку піхви прямого м'язу живота на рівні ребер?
352. Вкажіть, які анатомічні утворення формують латеральну пупкову складку очеревини.
353. Вкажіть, між якими анатомічними утвореннями передньо-бічної стінки живота проходять міжреберні нерви?
354. Вкажіть чим утворена задня стінка пахвинного каналу у здорових людей.
355. Вкажіть, яке анатомічне утворення входить до складу сім'яного канатика.

- 356. Які анатомічні утворення захоплюють в перший ряд швів, здійснюючи пластику пахвинного каналу за Мартіновим?**
- 357. У якому шарі передньої черевної стінки розташовують сім'яний канатик при виконанні завершального етапу операції за Постемпським?**
- 358. Найбільш оптимальним способом операції з приводу рецидивної прямої пахової грижі у хворих старше 60 років є:**
- 359. Найбільш оптимальним способом операції з приводу пупкової грижі є:**
- 360. Назвіть грижові ворота при прямій пахвинній грижі?**
- 361. Апоневроз якого м'яза утворює пахвинну зв'язку?**
- 362. Які анатомічні утворення складають задню стінку піхви прямого м'яза живота на 2—5 см нижче за пупок?**
- 363. Якими анатомічними утвореннями обмежена надміхурова ямка?**
- 364. На якому рівні білої лінії серединна лапаротомія супроводжується розтинном піхви прямого м'язу живота?**
- 365. Вкажіть верхню межу пахвинної ділянки.**
- 366. Вкажіть, який нерв лежить на поверхні сім'яного канатика в паховому каналі.**
- 367. Яку стінку пахвинного каналу зміцнюють, здійснюючи його пластику за Бассіні?**
- 368. До яких анатомічних утворень підшивають внутрішню косий і поперечний м'язи живота, здійснюючи пластику грижових воріт при прямих пахвинних грижах за Бассіні?**

369. Найбільш оптимальним способом операції з приводу косої пахвинної грижі у чоловіків у віці 30 років є:

370. Найбільш рідкісним видом гриж є:

371. Назвіть грижові ворота при пупковій грижі?

372. Вкажіть, до яких анатомічних утворень прикріплюється зовнішній косий м'яз живота.

373. Які анатомічні утворення складають передню стінку піхви прямого м'яза живота в нижньому її відділі?

374. Якими анатомічними утвореннями обмежена медіальна пахвинна ямка?

375. На якому рівні біла лінія живота є найширшою?

376. Яким анатомічним утвором сформоване зовнішнє кільце пахвинного каналу?

377. Назвіть зовнішню межу пупкової ділянки.

378. Назвіть нижньо-латеральну межу пахвинної ділянки?

379. До яких анатомічних утворень підшивають пахвинну зв'язку, здійснюючи пластику грижових воріт при косій пахвинній грижі за Мартиновим?

380. Дублікатуру з яких утворів формують при пластиці пахвинного каналу за Мартиновим?:

381. Чим утворений грижовий мішок при грижах передньобочкової стінки живота:

382. Які грижі частіше ущемляються у жінок?

383. Вкажіть, від яких анатомічних утворень бере початок внутрішній косий м'яз живота.

384. Які анатомічні утворення складають задню стінку піхви прямого м'язу живота у нижньому її відділі?

385. Якими анатомічними утвореннями обмежена латеральна пахвинна ямка?

386. Який анатомічний утвір локалізований в ділянці пупка.

387. Вкажіть, через який анатомічний утвір на задній поверхні черевної стінки виходить гризовий мішок при косій пахвовій грижі.

388. Яку стінку пахвинного каналу зміцнюють здійснюючи його пластику за Бобровим?

389. Яку стінку пахвинного каналу зміцнюють при його пластиці за Жираром?

390. Назвіть гризові ворота при косій пахвинній грижі?

391. Вкажіть, який з наведених анатомічних утворів проходить через пахвинний канал у чоловіків?:

392. Який з наведених анатомічних утворів проходить через пахвинний канал у жінок?

393. Який з наведених анатомічних утворів проходить через пахвинний канал у жінок?

394. На якому рівні м'язові пучки внутрішнього косого м'яза живота переходять в сухожильні?

395. Які анатомічні утворення складають задню стінку піхви прямого м'язу живота в нижньому її відділі?

396. Сухожилля якого м'яза живота формує лінію Спінгеля.
397. Вкажіть вени, які з'єднують підшкірні вени пупкової ділянки та вену воріт печінки?
398. Вкажіть розташування елементів сім'яного канатика по відношенню до гризового мішка при косій пахвинній грижі.
399. Яку стінку пахвинного каналу зміцнюють при його пластиці за Жірааром?
400. Що означає термін "голова медузи"?
401. Вкажіть гризові ворота при вродженій пахвинній грижі?
402. Наявність якого компоненту відрізняє ковзну грижу від звичайної?
403. Наявність якого анатомічного утвору відрізняє вроджену пахвинну грижу від звичайної є:
404. Яка з ознак є найбільш достовірною при нежиттєздатності защемленої петлі кишки?
405. Вкажіть, від яких анатомічних утворень бере початок поперечний м'яз живота?
406. Який з вказаних нервів інервує парієтальний листок очеревини?
407. чим кровопостачається передня черевни стінка ?
408. Вкажіть анатомічні утворення передньої стінки пахового каналу у здорових людей.
409. Вкажіть, через яку пахвинну ямку на внутрішній поверхні черевної стінки виходить гризовий мішок при прямій паховій грижі.

410. Яку стінку пахвинного каналу зміцнюють при його пластиці за Жираром?
411. Вкажіть латеральну межу передньо-бокової стінки живота
412. Який з анатомічних утворів входить до нижньої межі передньо-бокової стінки живота?
413. На підставі чого виділяють серед гриж ковзні грижі?
414. Якою структурою сформований грижевий мішок при вродженій пахвинній грижі?
415. Найбільш оптимальним розташуванням сім'яного канатика при зміцненні задньої стінки пахового каналу під час операції з приводу пахової грижі є:
416. Де локалізований дивертикул Меккеля?
417. Вкажіть, від яких анатомічних утворень бере початок прямий м'яз живота.
418. Вкажіть, які анатомічні утворення формують складку очеревини, що йде від верхівки сечового міхура до пупка.
419. Яка артерія йде разом з сім'яним канатиком ?
420. Вкажіть анатомічні утворення верхньої стінки пахового каналу у здорових людей.
421. Вкажіть, яка з вказаних артерій кровопостачає передню стінку живота?
422. Яку стінку пахового каналу зміцнюють при його пластиці за Жіраком—Спасокукоцьким?
423. Які структури можна пошкодити при пластиці пахвинного каналу?
424. Найбільш важливою характеристикою ковзної грижі є:

425. Найбільш оптимальним способом операції з приводу прямої пахової грижі у чоловіків у віці молодше 30 років є:

426. Найбільш оптимальним розташуванням сім'яного канатика при зміцненні передньої стінки пахового каналу під час операції з приводу пахової грижі є:

427. Назвіть грижеві ворота при грижах білої лінії живота

428. Вкажить локалізацію дивертикула Меккеля?

429. Для огляду задньої стінки шлунку хірург розітнув передню стінку сальникової сумки. Які утворення складають передню стінку сальникової сумки?

430. При проведенні операції на органах порожнини живота хірург виконав верхньосерединну лапаротомію. Яке утворення було розітнуте хірургом останнім перед входженням в порожнину живота?

431. Для видалення частини шлунку, хірург виконав мобілізацію органа по великій кривизні. В якій зв'язці шлунку були перев'язані судини?

432. При проведенні ревізії черевної порожнини було знайдено пошкодження бокової стінки сліпої кишки, проникаюче в інший орган. Як називається дане пошкодження?

433. При обстеженні хворого з проникаючим пораненням порожнини живота хірург знайшов поєднане пошкодження 12-типалої кишки і підшлункової залози. Який відділ підшлункової залози міг бути пошкоджений.

434. При підозрі на розрив шлунка хірургом була проведена ревізія органу від його початкового до вихідного відділу. Який відділ шлунку був обстежений в останню чергу?

435. Під час операції резекції шлунку, хірург провів мобілізацію частини шлунку, що видаляється. Які артерії були перев'язані хірургом по малій кривизні шлунка?

436. Як у більшості випадків жовчний міхур покритий очервиною?

437. При оперативному доступі до вмісту сальникової сумки хірургом був проведений розтин шлунково-ободової зв'язки. Гілки яких артерій, розташованих в зв'язці, були при цьому перев'язані і перетнуті?

438. Для ревізії сальникової сумки і огляду задньої стінки шлунку хірург проклав доступ через передню стінку сальникової сумки в найбільш безпечному для її розтину ділянці. Через яку частину сальникової сумки можна прокласти доступ до неї найбільш безпечно?

439. Під час видалення жовчного міхура виникла сильна кровотеча з його печінкового ложа, яку хірург зупинив шляхом перетискання печінково-дванадцятипалої зв'язки в області сальникового отвору. Яка артеріальна судина при цьому була здавлена?

440. В хірургічне відділення поступив хворий з підозрою на внутрішньочеревну кровотечу внаслідок тупої травми живота. При діагностичній пункції черевної порожнини кров не була виявлена. При лапаротомії діагностований розрив селезінки і проведено її видалення. Яка особливість селезінки зумовила діагностику її розриву?

441. При ревізії черевної порожнини хірург відмежував нижній поверх від верхнього за рахунок утворення, що покриває зверху кишечник і прикріплюється до великої кривизни шлунку. Яке з перерахованих утворень могло бути використане?

442. В післяопераційному періоді у хворого з проривною виразкою передньої стінки шлунку виникло ускладнення - піддіафрагмальний абсцес. Який простір черевної порожнини необхідно досліджувати і дреновати в першу чергу?

443. У хворого з раком підшлункової залози виникла механічна жовтяниця. Де локалізована пухлина?
444. При виконанні ретроградної холецистектомії хірург відшукав і перев'язав артерію міхура в трикутнику Кало. Які анатомічні утвори були використані хірургом для відшукування внутрішньої стінки трикутника Кало?
445. При проведенні ревізії верхнього поверху черевної порожнини з приводу калькульозного холецистити хірург виявив зрощення між тілом жовчного міхура і прилеглими органами і діагностував міжорганний свищ жовчного міхура. Про пошкодження якого анатомічного утворення необхідно думати в першу чергу при діагностиці свища тіла жовчного міхура?
446. Під час резекції підшлункової залози помилково була перев'язана і перетнута загальна печінкова артерія. Виконання пластики артерії було утруднене. Хірург закінчив операцію розраховуючи на відновлення басейну кровопостачання артерії через анастомози. Яка артерія є основним анастомозом для кровопостачання підшлункової залози?
447. Під час операції резекції тонкої кишки і накладення співустя по типу "кінець в кінець" хірург провів перитонізацію накладенням швів Пирогова-Ламбера. Як можна класифікувати шов Пирогова-Ламбера?
448. При накладенні ентеро-ентероанастомоза хірург сформував внутрішні губи анастомозу послідовним накладенням вузлового серо-серозного, потім безперервного наскрізного шва. Який шов використовував хірург на внутрішній стінці анастомозу?
449. Під час операції виявлено пошкодження стінки тонкої кишки і ухвалено рішення про проведення її резекції. На якій відстані від ділянки некрозу накладають кишкові зажими при резекції кишки?

450. Хірургом за показами була виконана клиновидна резекція тонкої кишки з накладанням міжкишкового анастомозу по типу "бік в бік". Які шви частіше використовуються при формуванні кукси тонкої кишки.

451. Хірургом була виконана резекція частини тонкої і товстої кишки з накладанням міжкишкового анастомозу "кінець в бік". Які покази до накладання цього анастомозу?

452. Під час операції хірургом була проведена ревізія верхнього поверху черевної порожнини для визначення особливостей відношення до очеревини його органів. Які органи верхнього поверху черевної порожнини розташовуються інтраперитонеально?

453. При виконанні резекції шлунку для забезпечення свободи маніпуляцій в області стравохідно-шлункового переходу і мобілізації шлунку хірург розітнув деякі зв'язки печінки. Які власні зв'язки печінки обмежують рухливість органа в черевній порожнині?

454. Хворому з кровотечею виразки була виконана резекція шлунку Більрот-1. Яким способом була відновлена прохідність кишкової трубки?

455. При виконанні резекції шлунку по Більрот-2 для створення гастроентероанастомозу у верхній поверх була піднята петля тонкої кишки. Які ознаки дозволяють відрізнити частини тонкої кишки від товстої?

456. При проведенні антеградної холецистектомії виникла сильна кровотеча з ложа жовчного міхура, для тимчасової зупинки якої хірург провів пальцеве здавлення lig. hepatoduodenale. Які судини, що знаходяться в цій зв'язці, перетиснув хірург для тимчасової зупинки кровотечі?

457. Хворому з гострим опіком стравоходу була виконана гастростомія за Вітцелем. Який з наведених оперативних прийомів визначає суть операції?

458. У хворого з пухлиною пілоричного відділу була виконана резекція шлунку Більтрот-2 в модифікації Гофмейстера-Фінстерера. Накладанням якого виду анастомозу закінчилася операція?

459. Під час проведення резекції шлунку Більтрот-2 перед накладанням анастомозу хірург виконав формування кукси дванадцятипалої кишки способом Морнігена. В чому особливість техніки формування кукси дванадцятипалої кишки способом Морнігана?

460. При виконанні ревізії черевної порожнини під час операції холецистектомії були знайдені численні спайки на вісцеральній поверхні печінки. Прийнято рішення проводити операцію антеградним способом. З якого етапу була почата операція?

461. Під час ревізії черевної порожнини грижового мішка в правій клубовій області хірург знайшов порожнистий м'язовий орган стінка якого одночасно була стінкою грижового мішка, на передній поверхні якого визначалася вільна м'язова стрічка і незначна кількість жирових відростків. Яке з перерахованих утворень могло бути вмістом грижового мішка?

462. При проведенні середньо-серединної лапаротомії після розкриття очеревини в операційній рані була знайдена петля кишки, покрита очеревиною з усіх боків, до якої прикріплюється великий сальник. Яке з перерахованих утворень це могло бути?

463. Під час операції за показами була видалена права половина поперечно-ободової кишки. Яка артерія, що кровопостачає кишку, була при цьому перев'язана?

464. Під час ревізії черевної порожнини хірург використовував прийом Губарева для відшукування привідної петлі тонкої кишки. Який орієнтир був використаний при цьому?

465. При операції з приводу високої кишкової непрохідності діагностована внутрішня грижа живота, грижові ворота якої були розташовані у бік лівого брижового синуса. Яка з кишень очеревини стала місцем формування грижі?

466. Під час ревізії черевної порожнини хірург разом з великим сальником змістив вгору ділянку кишки, яка перешкоджала огляду нижнього поверху черевної порожнини. Який відділ кишки був зміщений хірургом, якщо при відведенні великого сальника він характеризувався сірим кольором, а на передній поверхні розташовувалися рідкі жирові відростки у вигляді "підвісок" і візуалізувалася м'язова стрічка?

467. При проведенні операції резекції шлунку по Більрот-2, хірург підняв у верхній поверх порожнини петлю тонкої кишки. Який орієнтир був використаний для відшукування привідної петлі?

468. В післяопераційному періоді у хворого виникло ускладнення - розвинувся піддіафрагмальний абсцес. Яке утворення черевної порожнини сприяло попаданню інфекції в піддіафрагмальний простір?

469. Під час операції з приводу пухлини товстої кишки було проведено видалення лівої половини товстої кишки. Яка судина при цьому була перев'язана і перетнута?

470. Хворому була проведена субтотальна резекція шлунка. Яка з названих артерії шлунка при цьому залишилась?

471. При проведенні холецистектомії хірург відшукав трикутник Калло. Для чого служить орієнтиром трикутник Калло?

472. Для профілактики ускладнень хірург відновив прохідність ШКТ. Який із способів відновлення безперервності шлунково-кишкового тракту є найбільш фізіологічним?

473. Для ушивання передньої стінки анастомозу хірург використовував обвивний шов. Хто запропонував кишковий обвивний шов?

474. При ревізії черевної порожнини у хворого був знайдений інтактний червоподібний відросток. Був запідозрений дивертикуліт і відшуканий дивертикул Меккеля. Де розташовується кишковий дивертикул Меккеля?

475. При проведенні холецистектомії був прокладений оперативний доступ паралельно правій підреберній дузі. Який з перерахованих розрізів був призначений для доступів до печінки і жовчних шляхів?

476. Хірург завершує апендектомію. Яким швом проводять занурення кукси червоподібного відростка. А. швом Альберта;

477. Для тимчасової зупинки кровотечі з пошкодженої печінки було проведено пальцеве здавлення судин в її зв'язці. Судини і нерви, що йдуть до печінки розташовуються між листками:

478. У хворого порушення венозного відтоку. Венозний відтік від печінки здійснюється в: