

ЗАВАНТАЖЕНО З САЙТУ ТЕСТУВАННЯ.УКР

Нефрологія

Категорія: **Внутрішня медицина**

Кількість запитань: **498**

- 1. Які структури нефрону переважно ушкоджуються при ГНН:**
- 2. Які структури нефрону переважно ушкоджуються при ГНН:**
- 3. Що не відноситься до ускладнень гострого гломерулонефриту ?**
- 4. Які основні причини аренальної ГНН:**
- 5. Для якого захворювання є характерною транзиторна олігурія?**
- 6. Які основні причини постренальної ГНН:**
- 7. За наявності анурії першочергово:**
- 8. Які класифікаційні групи ГНН Ви знаєте:**
- 9. Вкажіть відповідну форму дисфункції об'ємрегулюючої функції нирок?**
- 10. Коли частіше спостерігається селективна протеїнурія?**
- 11. Вкажіть відповідну форму дисфункції іонорегулюючої функції нирок?**
- 12. При диференційній діагностиці амілоїдозу нирок з хронічним гломерулонефритом вирішальне значення має:**
- 13. Основна клінічна ознака нефротичного синдрому при амілоїдозі нирок:**
- 14. Провідною ознакою нефротичного синдрому при амілоїдозі нирок є:**
- 15. Які методи лікування доцільні при синдромі Гудпасчера?**
- 16. Які фактори найчастіше сприяють розвитку гострого пієлонефриту?**
- 17. Чи показане проведення програмного гемодіалізу при гострій нирковій недостатності?**

- 18. Яка швидкість клубочкової фільтрації відповідає ХХН II стадії?**
- 19. Лікування хворих на амілоїдоз нирок препаратами амінохінолінового ряду показано:**
- 20. При амілоїдозі нирок тривалість лікування колхіцином становить:**
- 21. Лікування амілоїдозу включає заходи все, крім:**
- 22. Які антибактеріальні препарати абсолютно протипоказані в олігурічний стадії ГНН:**
- 23. При вторинному амілоїдозі прогноз, головним чином, визначається ураженням:**
- 24. Біопсія яких двох органів при амілоїдозі є найбільш інформативними на ранніх стадіях?**
- 25. Преренальними причинами гострої ниркової недостатності можуть бути, за виключенням:**
- 26. Визначення якого з показників найбільш інформативне для виявлення нефротичного синдрому при амілоїдозі нирок?**
- 27. В який час рекомендується брати сечу для загального аналізу при підозрі на амілоїдоз нирок?**
- 28. Для виявлення амілоїду в біоптаті необхідне:**
- 29. Для діагностики вторинного амілоїдозу найбільше значення має:**
- 30. Для яких захворювань є характерним розвиток вторинного амілоїдозу?**
- 31. Амілоїдоз нирок найчастіше призводить до:**

32. Яке з наведених тверджень є вірним для амілоїдозу?
33. Амілоїд - це:
34. Для нефротичної стадії амілоїдозу нирок найбільш характерними є:
35. Які ознаки з наведених є найбільш характерними для амілоїдозу нирок?
36. Вкажіть вид грибів, які займають провідне місце в розвитку тубуло-інтерстиціального нефриту?
37. Які структури нирки переважно втягуються в патологічний процес при інтерстиціальному нефриті?
38. Вкажіть характерні морфологічні особливості аналгетичної нефропатії?
39. Які морфологічні ознаки не характерні для гострого інтерстиціального нефриту?
40. Які морфологічні ознаки не характерні для хронічного інтерстиціального нефриту?
41. Що таке тубуло-інтерстиціальний нефрит?
42. Які етіологічні фактори гострого інтерстиціального нефриту зустрічаються найрідше?
43. Для лікування амілоїдозу колхіцин призначають в дозі :
44. Який із запропонованих критеріїв є найважливішим для діагностики нефротичного синдрому у хворого з амілоїдозом нирок?
45. Які клінічні прояви характерні для гострого інтерстиціального нефриту?

46. Які заходи не застосовують для лікування гострого інтерстиціального нефриту?
47. Для лікування набряків при нефротичному синдромі слід призначити:
48. Тип успадкування при спадковому амілоїдозі
49. Вторинному амілоїдозі передують наявність у сироватці крові
50. При старечому амілоїдозі найчастіше уражаються всі перераховані органи, крім:
51. Нефротичний синдром при амілоїдозі:
52. Яке судження щодо амілоїдозу є неправильним?
53. Який варіант ураження нирок є паранеопластичною нефропатією?
54. Який клінічний прояв не є обов'язковим для амілоїдозу?
55. Які зміни в сечі не характерні для нефротичного синдрому при амілоїдозі нирок?
56. Які зміни з боку білкового складу крові спостерігаються при амілоїдозі нирок?
57. Які найчастіші ускладнення ГНН:
58. Амілоїдоз нирок може спостерігатися при: 1. ревматоїдному артриті; 2. періодичній хворобі; 3. туберкульозі; 4. бронхоектатичній хворобі.
59. Нефротичний синдром може спостерігатися при: 1. амілоїдозі; 2. системному червоному вівчаку; 3. діабетичній нефропатії; 4. геморагічному васкуліті Шенлейна - Геноха.

60. До зниження клубочкової фільтрації може призвести лікування :
61. Вторинний амілоїдоз може розвиватися при: 1. ревматоїдному артриті; 2. псоріатичному артриті; 3. пухлинах; 4. бронхоектазах.
62. Для діагностики амілоїдозу нирок більш інформативне гістологічне дослідження :
63. Яке захворювання найбільш часто ускладнюється амілоїдозом ?
64. Амілоїдоз може сприяти:
65. ?Чим пояснюється гіперазотемія при хронічній нирковій недостатності?
66. Якими ранніми симптомами характеризується хронічна ниркова недостатність?
67. Який діагностичний тест є найбільш достовірним при хронічній нирковій недостатності в початковій її стадії?
68. Що розуміють під терміном "олігурія"?
69. Назвіть лабораторні зміни, що не зустрічаються при хронічній нирковій недостатності:
70. Який з наведених нижче сечогінних препаратів є засобом вибору при ХНН III-IV ступеня?
71. При хронічній нирковій недостатності в початковій стадії (за класифікацією П. Пелешука) рекомендується дієта з обмеженням кількості білка до:
72. Які патологічні процеси являються головною безпосередньою причиною ХНН?

- 73. Що характеризує відносну ХНН від абсолютної:**
- 74. Що характеризує гостру ниркову недостатність?**
- 75. Які абсолютні показники для гемодіалізу при ниркових захворюваннях?**
- 76. Які основні властивості дієти при ХГН без ХНН?**
- 77. Найбільш частою причиною значного підвищення рівня калія в сироватці крові є:**
- 78. Хвора діабетом II типу, лікує інфекцію сечовидільної системи. Вона доставлена у відділення швидкої допомоги із сплутаною свідомістю і рівнем цукру в крові 1,92 ммоль/л .Які ліки вона найбільш вірогідно приймає?**
- 79. Найбільш частою причиною зупинки серця у хворих з нирковою недостатністю є:**
- 80. Вкажіть життєвонебезпечні рівні гіпокаліємії, що потребують корекції:**
- 81. Вкажіть життєвонебезпечні рівні гіперкаліємії, що потребують корекції:**
- 82. Вкажіть ЕКГ-ознаки гіпокаліємії:**
- 83. Вкажіть ЕКГ-ознаки гіперкаліємії:**
- 84. Вкажіть життєвонебезпечні рівні бікарбонату сироватки, що потребують ургентної корекції:**
- 85. Які клініко-лабораторні прояви характерні для гострої ниркової недостатності?**
- 86. Чи можливий розвиток гострої ниркової недостатності у хворих на гломерулонефрит з мінімальними змінами?**

87. Азотемія обумовлена накопиченням в крові всіх нижчеперелічених продуктів, крім:

88. Морфологічні зміни в нирках при гострій нирковій недостатності різного генезу представлені в основному:

89. Медикаментозна проба для діагностики феохромоцитом передбачає швидке внутрішньовенне введення під час гіпертонічного кризу одного з нижчеперелічених препаратів, за виключенням:

90. Які з нижчеперелічених станів можуть приводити до розвитку гострої ниркової недостатності ?

91. Які патологічні зміни виявляються в нирках при гострій нирковій недостатності, обумовленій крововтратою?

92. Чи є артеріальна гіпертензія обов'язковою ознакою гострої ниркової недостатності?

93. До ренальних причин гострої ниркової недостатності можна віднести, за виключенням:

94. Яка причина постренальної гострої ниркової недостатності?

95. Що з переліченого є причиною розвитку преренальної гострої ниркової недостатності?

96. Що з переліченого є причиною розвитку преренальної гострої ниркової недостатності?

97. Що з переліченого є причиною розвитку преренальної гострої ниркової недостатності?

98. Що з переліченого є причиною розвитку інтраренальної гострої ниркової недостатності?
99. Що з переліченого є причиною розвитку інтраренальної гострої ниркової недостатності?
100. Що з переліченого є причиною розвитку постренальної гострої ниркової недостатності?
101. Що з переліченого є причиною розвитку обтураційної гострої ниркової недостатності?
102. Що з переліченого є причиною розвитку гострого некрозу канальців?
103. Що з переліченого є причиною розвитку гострого некрозу канальців?
104. Які методи дослідження допомагають верифікувати гостру ниркову недостатність?
105. Що Ви розумієте під гострою нирковою недостатністю:
106. Які основні причини прerenальної ГНН:
107. Які основні причини ренальної ГНН:
108. Назвіть основний критерій, який відрізняє органічну і функціональну ГНН:
109. Які стадії гострої ниркової недостатності Ви знаєте:
110. Які основні причини ГНН у підлітків:
111. Яка перша ознака дозволяє лікареві запідозрити розвиток ГНН:
112. Яке з перелічених положень не вірне щодо ГНН?

- 113. Причинами розвитку ГНН можуть бути слідуючі, окрім:**
- 114. Який розлад гомеостазу не характерний для ГНН?**
- 115. Що найбільш характерне при аналізі периферійної крові у хворих з ГНН?**
- 116. Абсолютними показаннями до гемодіалізу в періоді олігоанурії ГНН являються всі перелічені, крім:**
- 117. Етіологічними чинниками гемолітико-уремічного синдрому можуть бути всі перелічені, крім:**
- 118. Гемолітико-уремічний синдром частіше розвивається:**
- 119. Для гемолітико-уремічного синдрому характерне все перелічене, крім:**
- 120. Для продромального періоду гемолітико-уремічного синдрому характерне все перелічене, крім:**
- 121. Клініка розгорнутих проявів гемолітико-уремічного синдрому характеризується слідуючими ознаками, крім:**
- 122. Лікування гемолітико-уремічного синдрому включає все перелічене, крім:**
- 123. Що являється вирішальним в лікуванні пацієнтів з гемолітико-уремічним синдромом?**
- 124. Які ознаки гіпергідратації при підтриманні балансу рідини у хворих з ГНН:**
- 125. Які найнебезпечніші для життя ускладнення гіперкаліємії:**
- 126. Який електроліт є антагоністом калію:**
- 127. Які препарати слід призначити для корекції гіперкаліємії:**

- 128. З якого розрахунку переважно використовують розчини кальцію для корекції гіперкаліємії:**
- 129. Яку дозу натрію гідрокарбонату слід використовувати для корекції метаболічного ацидозу:**
- 130. Які клініко-лабораторні показники є показанням до діалізу при ГНН:**
- 131. Вкажіть показання до гемотрансфузії в початковій олігоанурічній стадії ГНН:**
- 132. Вкажіть співвідношення креатинину і сечовини при формуванні ХНН:**
- 133. Які препарати крові і в якій дозі призначаються з метою заміщення при анемії на фоні ГНН:**
- 134. Які найефективніші методи лікування ГНН:**
- 135. Який лікувальний комплекс призначається в поліурічній стадії ГНН:**
- 136. Яким антибактеріальним препаратам слід віддавати перевагу в олігоанурічній стадії ГНН:**
- 137. Закінчення функціональної ГНН:**
- 138. Якими ранніми ознаками характеризується хронічна ниркова недостатність?**
- 139. Який діагностичний тест є найбільш достовірним при хронічній нирковій недостатності в початковій стадії?**
- 140. Який з наведених сечогінних препаратів є препаратом вибору при Ш-1У ступені хронічної ниркової недостатності?**

- 141. При хронічній нирковій недостатності 1 ступеня рекомендується дієта з обмеженням кількості білка до:**
- 142. Основними причинами злоякісної артеріальної гіпертензії при хронічній нирковій недостатності є:**
- 143. Яка з наведених змін органів дихання є найбільш характерною для Ш-ІУ ступеня хронічної ниркової недостатності?**
- 144. Основною причиною розвитку анемії при хронічній нирковій недостатності є:**
- 145. Яка з наведених змін органів дихання є найбільш характерною для Ш-ІУ ступеня хронічної ниркової недостатності?**
- 146. Для хронічної ниркової недостатності характерні всі наведені анемії,крім:**
- 147. Де в нормі утворюється вітамін Д-3?**
- 148. Де в нормі утворюється 1,25-дегідроксикальциферол (1,25(ОН)2-Д3)-активний метаболіт вітаміну Д3?**
- 149. Вкажіть основні регулятори фосфорно-кальцієвого обміну?**
- 150. Вітамін Д3 та його метаболіти попереджують гіпокальціємію та забезпечують мінералізацію кістяка. Вкажіть ниркові механізми виконання цієї функції?**
- 151. Вкажіть чинники, які посилюють секрецію паратиреоїдного гормону за умови хронічної ниркової недостатності?**
- 152. Вкажіть відповідну форму дисфункції осморегулюючої функції нирок?**

153. Вкажіть відповідну форму дисфункції порушенню кислотно-лужної рівноваги?
154. Вкажіть відповідну форму дисфункції метаболічній функції нирок?
155. Вкажіть відповідну форму дисфункції інкреторній функції нирок?
156. Вкажіть відповідну форму дисфункції екскреторній функції нирок?
157. Знайдіть нормальні значення концентрації в плазмі крові натрію (ммоль/л)?
158. Знайдіть нормальні значення концентрації в плазмі крові калію (ммоль/л)?
159. Знайдіть нормальні значення концентрації в плазмі крові кальцію (ммоль/л)?
160. Знайдіть нормальні значення концентрації в плазмі крові магнію (ммоль/л)?
161. Знайдіть нормальні значення концентрації в плазмі крові хлору (ммоль/л)?
162. Знайдіть нормальні значення концентрації в плазмі крові бікарбонату (ммоль/л)?
163. Знайдіть нормальні значення концентрації в плазмі крові фосфату (ммоль/л)?
164. Знайдіть нормальні значення концентрації в плазмі крові сульфату (ммоль/л)?
165. Знайдіть нормальні значення концентрації в плазмі крові сечовини (ммоль/л)?
166. При хронічній нирковій недостатності зменшується утворення кальцитріолу. Яке з перелічених патофізіологічних порушень виникає?

- 167. При хронічній нирковій недостатності зменшується утворення кальцитріолу. Яке з перелічених патофізіологічних порушень виникає?**
- 168. Що є причиною фіброзної остеодистрофії при хронічній нирковій недостатності?**
- 169. Що є основною причиною остеомалачії при хронічній нирковій недостатності?**
- 170. Вкажіть характеристики анемії, що розвивається при хронічній нирковій недостатності:**
- 171. Які зміни паращитовидних залоз характерні для важкої хронічної ниркової недостатності?**
- 172. Вкажіть рівень кальцію в крові при термінальній нирковій недостатності:**
- 173. Вкажіть особливості рівнів паратиреоїдного гормону в крові при важкій нирковій недостатності:**
- 174. Вкажіть особливості рівнів магнію в крові при важкій нирковій недостатності:**
- 175. Вкажіть особливості рівнів фосфатів в крові при важкій хронічній нирковій недостатності:**
- 176. Яке вживання білку повинно бути у хворих з хронічною нирковою недостатністю?**
- 177. Чим керуються при виборі вмісту білку в їжі у хворих з хронічною нирковою недостатністю?**
- 178. Призначення яких солей протипоказане хворим з хронічною нирковою недостатністю?**

- 179. Які порушення у хворих з ХНН покращуються при проведенні гемодіалізу чи перитонеального діалізу?**
- 180. Які рівні креатиніну сироватки крові служать підставою для проведення гемодіалізу?**
- 181. Який рівень креатинінемії є показанням для консервативного лікування хронічної ниркової недостатності?**
- 182. Людям похилого віку з ХНН, що потребують діалізу, яким варіантам його слід надати перевагу?**
- 183. Якому варіанту діалізу слід надавати перевагу у хворих з ХНН за наявності серцевої недостатності?**
- 184. Якому варіанту діалізу слід надавати перевагу у хворих з ХНН за наявності геморагічного синдрому?**
- 185. Визначення яких основних параметрів необхідне для виявлення ступеню тканинної сумісності донора і реципієнта трансплантованої нирки?**
- 186. Які фактори відіграють провідну роль в генезі анемії при ХНН:**
- 187. Які з нижчеперелічених лікарських препаратів застосовуються для імуносупресивної терапії у хворих які перенесли трансплантацію нирки?**
- 188. Якими з нижчеперелічених методів дослідження не користуються для оцінки стану ниркового трансплантату?**
- 189. Частота яких захворювань не збільшується у пацієнтів, що перенесли трансплантацію нирки?**
- 190. При якому захворюванні будуть виявлятися в сечі клітини Штернгеймера-Мальбіна?**

- 191. Які механізми дії осмотичних діуретиків?**
- 192. Аналіз сечі за Нечипоренком - це:**
- 193. Аналіз сечі за Каковським-Аддісом - це:**
- 194. Провідний шлях інфікування нирок в разі гострого пієлонефриту:**
- 195. Гранично припустима кількість лейкоцитів сечі при проведенні проби за Нечипоренком становить:**
- 196. Гранично припустима кількість еритроцитів сечі при проведенні проби за Нечипоренком становить:**
- 197. Гранична кількість бактерій в 1 мл сечі, що відображає рівень істинної бактеріурії, становить:**
- 198. Що розуміють під терміном "поліурія"?**
- 199. Аналіз сечі за Зимницьким - це:**
- 200. Мінімально припустимі коливання відносної густини сечі в аналізі за Зимницьким (добовий діурез 1200 мл, максимальна відносна густина 1020):**
- 201. Що розуміють під терміном "гіпостенурія"?**
- 202. В нормі мінімально припустиме співвідношення денного і нічного діурезу становить:**
- 203. Що розуміють під терміном «полакурія»**
- 204. Що розуміють під терміном "дизурія"?**
- 205. Етіологічними і патогенетичними факторами хронічного пієлонефриту не є:**

- 206. Які ураження нирок не передують розвитку хронічного пієлонефриту?**
- 207. Який шлях розповсюдження інфекції має найменше значення при первинному пієлонефриті?**
- 208. Який шлях розповсюдження інфекції має головне значення для вторинного пієлонефриту?**
- 209. Які порушення сечовипускання, сечовиділення не зустрічаються при хронічному пієлонефриті в період загострення?**
- 210. Які клінічні ознаки мають диференційно-діагностичне значення при загостренні хронічного пієлонефриту на відміну від циститу чи уретриту?**
- 211. Який лабораторний метод дослідження дозволяє диференціювати лейкоцитурію внаслідок уретриту від лейкоцитурії ниркового походження?**
- 212. Які зміни в сечі є найбільш характерними для первинного хронічного пієлонефриту без ХНН?**
- 213. Для якого з наведених нижче захворювань (без ХНН) є найбільш характерним наявність у сечі активних лейкоцитів?**
- 214. Для якого захворювання найбільш характерною є гіпостенурія при відсутності ХНН?**
- 215. Який лабораторний метод дослідження дозволяє диференціювати лейкоцитурію внаслідок уретриту від лейкоцитурії ниркового походження?**
- 216. Які зміни в сечі є найбільш характерними для первинного хронічного пієлонефриту без ХНН?**
- 217. Назвіть етіологічні фактори хронічного пієлонефриту:**

- 218. В основі патогенезу хронічного пієлонефриту лежить:**
- 219. Первинний хронічний пієлонефрит - це:**
- 220. Вторинний хронічний пієлонефрит - це:**
- 221. Які з наведених змін сечі є найбільш характерними для первинного хронічного пієлонефриту?**
- 222. Які з наведених препаратів є засобами етіопатогенетичної терапії хронічного пієлонефриту?**
- 223. Який шлях розповсюдження інфекції не зустрічається при первинному пієлонефриті?**
- 224. Які рівні клубочкової фільтрації при хронічній нирковій недостатності служать підставою для проведення гемодіалізу?**
- 225. Які зміни в сечі є найбільш характерними для первинно-хронічного пієлонефриту без порушення функції нирок?**
- 226. Яка з наведених комбінацій клінічних симптомів є найбільш характерною для первинного хронічного пієлонефриту з симптоматичною гіпертензією в фазі загострення?**
- 227. Які результати інфузійної екскреторної урографії є найбільш характерними для вторинного хронічного пієлонефриту?**
- 228. Яке порушення сечовипускання і сечовиділення найчастіше зустрічається при хронічному пієлонефриті в фазі загострення?**
- 229. В основі патогенезу хронічного пієлонефриту лежить:**
- 230. Преднізолоновий тест проводиться для діагностики:**

- 231. Які з перелічених мікроорганізмів відіграють провідну роль в розвитку 'висхідного' пієлонефриту?**
- 232. Вкажіть фактори, які призводять до розвитку пієлонефриту?**
- 233. Які інструментальні дослідження НЕ використовуються для діагностики інфекції сечових шляхів?**
- 234. Який рівень добової протеїнурії пересічно спостерігається при пієлонефриті (гострому та хронічному)?**
- 235. Які циліндри характерні для пієлонефриту?**
- 236. Вкажіть ниркові структури, які НЕ втягуються в патологічний процес в разі гострого пієлонефриту:**
- 237. Вкажіть характер ураження ниркової тканини за умови гострого пієлонефриту?**
- 238. Які клітинні елементи переважають в ділянках запалення ниркової тканини на пізніх етапах гострого пієлонефриту?**
- 239. Який шлях введення антибіотиків переважає на початковому етапі лікування гострого пієлонефриту?**
- 240. Які фактори сприяють розвитку хронічного пієлонефриту?**
- 241. Вкажіть захворювання , за умови якого вже на ранніх етапах стадії ХНН (креатинін 0,2-0,3 ммоль/л) розвивається поліурія, дегідратація, гіперкаліємія, ацидоз:**
- 242. Які зміни концентраційної здатності нирок притаманні хронічному пієлонефриту?**

- 243. Вкажіть ниркові структури які останніми ушкоджуються при хронічному пієлонефриті:**
- 244. Що являє собою апостематозний нефрит?**
- 245. Що являє собою паранефрит?**
- 246. Що являє собою перинефрит?**
- 247. Що являє собою піонефроз?**
- 248. Чи характерна значна гематурія для циститу?**
- 249. Чи характерна значна тривала гематурія для гострого пієлонефриту?**
- 250. Чи можливе існування безсимптомної бактеріурії?**
- 251. В разі яких із нижчеперелічених захворювань визначається позитивний симптом Пастернацького?**
- 252. Які препарати відносяться до уроантисептиків?**
- 253. Чи існують специфічні клінічні ознаки ксантогрануломатозного пієлонефриту?**
- 254. Який з нижчеперелічених методів діагностики найбільш інформативний для ксантогрануломатозного пієлонефриту?**
- 255. Який найефективніший метод лікування ксантогрануломатозного пієлонефриту?**
- 256. Провідний шлях інфікування нирок в разі гострого пієлонефриту?**
- 257. Вкажіть фактори, які не впливають на розвиток гострого пієлонефриту?**

258. Яка клінічна ознака не характерна для гострого пієлонефриту?
259. Вкажіть гнійні ускладнення гострого пієлонефриту?
260. Які фактори протидіють розвитку інфекції сечовивідних шляхів?
261. Чим обумовлена форнікальна кровотеча?
262. Яка локалізія болю характерна для пієлонефриту?
263. Про що свідчить наявність в сечі людини клітин ниркового епітелію?
264. Яка з рентгенологічних ознак є характерною для вторинного хронічного пієлонефриту?
265. Що таке бактеріурія?
266. Зміни в сечі при гострому нефриті:
267. При якому захворюванні нирок відмічається в сечі протеїнурія, циліндрурія, лейкоцитурія, бактерійурія:
268. Аускультативні дані серця у хворого при гострому нефриті:
269. Які зміни в сечі характерні для хронічного пієлонефриту:
270. Чим характеризуються набряки при гострому нефриті:
271. Чим характеризується гіпертонічна форма хронічного нефриту:
272. Чим характеризуються латентна форма хронічного нефриту:
273. Яке походження змінених еритроцитів в сечі:
274. При яких із перелічених захворювань може бути лейкоцитурія:

275. Кількість білка в сечі при сечовому синдромі:

276. Головними клінічними ознаками ураження канальців являються наступні, крім:

277. Протеїнурія - це виділення білку в сечі в кількості більше, ніж:

278. Як правильно визначити ступінь протеїнурії?

279. Як правильно визначити ступінь протеїнурії?

280. Що розуміють під терміном «дизурія»?

281. ЩД. 1, представляє собою аналіз сечі за Нечипоренко? Визначення кількості лейкоцитів, еритроцитів і циліндрів, виділених з сечею.

282. Про що свідчить наявність зернистих, воскоподібних циліндрів

283. Хворий 47 років з перебігом хвороби, за клініко-лабораторними характеристиками схожої на хронічний пієлонефрит. Який з наведених методів є найінформативнішим для підтвердження вірогідного діагнозу?

284. Хворий 47 років з перебігом хвороби, за клініко-лабораторними характеристиками схожої на хронічний пієлонефрит. Який з наведених станів є найменш характерним для даного захворювання?

285. Хворий 47 років з перебігом хвороби, за клініко-лабораторними характеристиками схожої на хронічний пієлонефрит. Які з наведених груп препаратів показані для лікування даного хворого?

286. Хворий 67 років госпіталізований з симптомами уремії. Яке порушення електролітного обміну за результатами обстеження найвірогідніше?

287. Хворий 67 років госпіталізований з симптомами уремії. Який з наведених груп препаратів є засобом вибору для лікування артеріальної гіпертензії?
288. Хворий 67 років госпіталізований з симптомами уремії. Який з наведених сечогінних препаратів є препаратом вибору в цьому клінічному випадку?
289. Чоловік 35 років хворий на хронічний пієлонефрит. Сечовина крові 7,5 ммоль/л, креатинін крові - 0,128 ммоль/л. За пробою Зимницького - гіпоізостенурія. Яка з функцій нирок у даного хворого постраждала найбільше?
290. Для якого захворювання є найбільш характерним наведений аналіз сечі: світло-жовта, нейтральна, ВГ 1006, білок 0,33г/л, лейкоцити 20-30 в полі зору, еритроцити 1-3 в полі зору, циліндри гіалінові 0-1-2- в препараті, бактерії - багато?
291. Для якого захворювання є найбільш характерним наведений аналіз сечі за Нечипоренком: еритроцити $0,5 = 10^6$ /мл, лейкоцити $12,0 = 10^6$ /мл
292. Для якого захворювання є найбільш характерним наведений аналіз сечі: відносна густина 1010, білок 0,033г/л, еритроцити 0-1 в полі зору, лейкоцити 16-20 в полі зору?
293. Хворий 55 років з гострим пієлонефритом на тлі сечо-кам'яної хвороби. Який комплекс досліджень Ви вважаєте першочерговим?
294. Хвора 35 років на хронічний пієлонефрит в фазі загострення. Вірогідний результат 3-склянкової проби у цієї хворої:
295. Хвора 35 років на хронічний пієлонефрит в фазі загострення. Для оцінки стану концентраційної функції нирок хворої потрібно призначити:
296. Хворий 56 років на хронічний пієлонефрит з симптоматичною артеріальною гіпертензією. Основною причиною артеріальної гіпертензії є:

- 297. Хворий 56 років з клініко-лабораторними ознаками хронічного пієлонефриту. Який з наведених методів є найінформативнішим для верифікації діагнозу?**
- 298. Всі види діуретиків , за винятком калійзберігаючих можуть викликати гіпокаліємію. Яким з перелічених механізмів пояснюється підвищення секреції калія?**
- 299. Всі види діуретиків , за винятком калійзберігаючих можуть викликати гіпокаліємію. Яким з перелічених механізмів пояснюється підвищення секреції калія?**
- 300. 32-річна жінка спрямована до нефролога для оцінки гематурії, яка виявлена в трьох аналізах сечі та супроводжується протеїнурією до 1 г/добу. Який Ви оберете підхід для оцінки гематурії у цієї хворої?**
- 301. 27-річна жінка з клініко-лабораторними ознаками системного червоного вовчака та ураженням нирок. Які обстеження необхідно провести для верифікації діагнозу?**
- 302. 27-річна жінка з клініко-лабораторними ознаками системного червоного вовчака та ураженням нирок Що може підтвердити діагноз люпус-нефриту?**
- 303. В приймальне відділення доставлена 30-літня жінка з зупинкою серця. В анамнезі у пацієнтки ниркова недостатність , їй проводять гемодіаліз. Які з препаратів найменш недоцільний в даній ситуації?**
- 304. Який кістозний утвір на УЗД є ознакою пієлонефриту?**
- 305. 263. Яка аномалія розвитку нирок приводить до порушення пасажу сечі?**
- 306. Яке рентгенологічне обстеження є найбільш інформативними для діагностики пієлонефриту?**

- 307. При якому варіанті пієлонефриту є інформативною оглядова рентгенографія?**
- 308. Який тип ренограми спостерігається при хронічному пієлонефриті?**
- 309. Який найчастіший шлях проникнення інфекції в нирку у хворих з хронічним пієлонефритом?**
- 310. Згідно якого обстеження підбирається антибактеріальна терапія для лікування хронічного пієлонефриту?**
- 311. Які ускладнення можуть виникнути при ретроградній пієлографії?**
- 312. Бактеріємічний шок виникає як ускладнення:**
- 313. Нехарактерним для гострого пієлонефриту є:**
- 314. У якому віці найчастіше спостерігається пієлонефрит у жінок?**
- 315. Що відіграє основну роль у поширенні інфекції при уриногенному (висхідному) пієлонефриті?**
- 316. Коли при пієлонефриті маса нирки зменшується?**
- 317. З якого міроприємства починається лікування вторинного гострого пієлонефриту?**
- 318. Ознакою паранефриту при рентгеноскопії грудної клітки є:**
- 319. При паранефриті роблять екскреторну урографію:**
- 320. При гнійному паранефриті показана:**
- 321. Яка причина протеїнурії при нефротичному синдромі?**

322. Що переважає в сечовому осаді при гострому гломерулонефриті?
323. Що є причиною гіпопротеїнемії при хронічному гломерулонефриті?
324. Які білки переважно втрачаються у хворих з нефротичним синдромом?
325. Що має значення в розвитку набряків при гломерулонефриті?
326. Які зміни електролітів крові характерні для нефротичного синдрому?
327. При якому захворюванні нирок може виникнути еклампсія?
328. Які прояви не характерні для ниркової еклампсії?
329. Які дієтичні фактори можуть спровокувати приступ ниркової еклампсії?
330. Які передвісники не характерні для ниркової еклампсії?
331. Яким мікроорганізмом зумовлений розвиток гострого гломерулонефриту?
332. Які захворювання не передують розвитку гострого гломерулонефриту?
333. Яка тріада симптомів характерна для гострого гломерулонефриту?
334. Які макроскопічні зміни сечі можуть бути при гострому гломерулонефриті?
335. Який з наведених симптомів найчастіше зустрічається при гострому гломерулонефриті при відсутності ГНН?
336. Empty question
337. Проявом якого процесу є озноб при пієлонефриті?
338. При якій формі пієлонефриту маса нирки збільшується?

- 339. Найбільш характерний фактор для виникнення первинного пієлонефриту:**
- 340. Морфологічні прояви апостематозного пієлонефриту найбільше виражені:**
- 341. Найчастіше збудником гострого пієлонефриту є:**
- 342. Пієлонефрит,- це є захворювання:**
- 343. Якою є тривалість антибактеріальної терапії при гострому серозному пієлонефриті?**
- 344. Найчастішим ускладненням при гострому пієлонефриті є:**
- 345. Який з наведених нижче факторів викликає зменшення клубочкової фільтрації нижче 80 мл/хв?**
- 346. Швидкість клубочкової фільтрації за кліренсом ендogenous креатиніну в нормі становить:**
- 347. За допомогою якого з наведених нижче методів дослідження визначається швидкість клубочкової фільтрації?**
- 348. Який з наведених нижче показників є характерним для нефротичного синдрому?**
- 349. Який з наведених нижче показників не є характерним для нефротичного синдрому?**
- 350. Для якого синдрому є характерною сукупність ознак: набряки, висока протеїнурія, гіпопротеїнемія, диспротеїнемія, гіперліпідемія?**
- 351. Які фактори не призводять до розвитку набряків при нефротичному синдромі?**

- 352. Назвіть головну причину гіпопротеїнемії при нефротичному синдромі:**
- 353. Які зміни білкового складу крові є характерними для нефротичного синдрому?**
- 354. Для яких захворювань не є характерним розвиток нефротичного синдрому?**
- 355. Для якого захворювання, що наведені нижче, є характерним розвиток нефротичного синдрому?**
- 356. Який з наведених симптомів найчастіше зустрічається при гострому гломерулонефриті при відсутності гострої ниркової недостатності?**
- 357. Консервативна санація вогнищ інфекції в ротовій порожнині при гострому гломерулонефриті показана**
- 358. Преренальними причинами гострої ниркової недостатності можуть бути всі, за виключенням:**
- 359. Якому морфологічному типу гломерулонефриту відповідає гістологічна картина біоптата нирки в якій виявляють проліферацію ендотелію капілярів клубочка, збільшення його розмірів?**
- 360. Які з наведених ознак практично завжди зустрічаються при гострому гломерулонефриті?**
- 361. Які антибактеріальні препарати рекомендується застосовувати при гострому гломерулонефриті?**
- 362. Які з наведених тверджень є вірними щодо гострого гломерулонефриту?**
- 363. Через який час хворого на гострий гломерулонефрит можна зняти з диспансерного нагляду за умови збереження нормальних клініко-лабораторних показників?**

- 364. Навіть причину гематурії при гострому гломерулонефриті:**
- 365. Яка лабораторна ознака характерна для гострого гломерулонефриту?**
- 366. Вміст білка в їжі хворого на гострий гломерулонефрит повинен бути:**
- 367. Навіть основний фактор, що сприяє переходу гострого гломерулонефриту в хронічний?**
- 368. Основні причини протеїнурії при гострому гломерулонефриті:**
- 369. Назвіть одну з наведених причин гіпертензивного синдрому при гострому гломерулонефриті:**
- 370. В патогенезі хронічного гломерулонефриту провідну роль відіграють:**
- 371. Який з наведених стероїдних препаратів найбільш доцільно використовувати при лікуванні хронічного гломерулонефриту?**
- 372. Яке з наведених тверджень є вірним щодо Ig-A нефропатії?**
- 373. При хронічному гломерулонефриті протеїнурія обумовлена:**
- 374. Що відрізняє есенціальну гіпертензію з ураженням нирок від гіпертензивної стадії хронічного гломерулонефриту?**
- 375. Що є характерним для ниркового варіанту гіпертонічної хвороби на відміну від гіпертензивної стадії хронічного гломерулонефриту?**
- 376. Яке з наведених тверджень є цілком вірним для хронічного гломерулонефриту?**
- 377. Які мікроорганізми можуть відігравати роль етіологічного чинника при гострому гломерулонефриті?**

- 378. Які стрептококи переважно грають роль етіологічного фактора при гострому постстрептококовому гломерулонефриті?**
- 379. Який з патогенетичних механізмів є провідним при гострому гломерулонефриті?**
- 380. Чи характерне збільшення циркулюючих імунних комплексів при класичному варіанті гострого гломерулонефриту?**
- 381. Чи характерне збільшення рівнів продуктів деградації фібрину/фібриногену в сечі для класичного варіанта гострого гломерулонефриту?**
- 382. Вкажіть основні механізми патогенезу гломерулярних пошкоджень при гострому гломерулонефриті:**
- 383. Які провідні фактори розвитку артеріальної гіпертензії у хворих на гострий гломерулонефрит при класичному варіанті?**
- 384. Які провідні фактори розвитку недостатності кровообігу у хворих на гострий гломерулонефрит в класичному варіанті?**
- 385. Які особливості внутрішньосудинного об'єму при класичному варіанті гострого гломерулонефриту?**
- 386. Які особливості екскреції калію при класичному варіанті гострого гломерулонефриту?**
- 387. Чи характерний розвиток ретинопатії при класичному варіанті гострого гломерулонефриту?**
- 388. Які рівні добової протеїнурії пересічно виявляються при класичному варіанті гострого гломерулонефриту?**

- 389. Чи характерне суттєве зниження об'ємного кровообігу при класичному варіанті гострого гломерулонефриту?**
- 390. Чи порушується концентраційна здатність нирок при класичному варіанті гострого гломерулонефриту?**
- 391. Вкажіть особливості фільтраційної фракції при класичному варіанті гострого гломерулонефриту?**
- 392. Вкажіть захворювання, при яких протипоказана пункційна біопсія нирки:**
- 393. Які розміри клубочків при класичному варіанті гострого гломерулонефриту?**
- 394. Які морфологічні зміни в клубочках спостерігаються на світлооптичному рівні при гострому гломерулонефриті?**
- 395. Які електронно-мікроскопічні ознаки спостерігаються в клубочках при гострому гломерулонефриті?**
- 396. Чи характерне відкладення імуноглобулінів і фракцій комплементу в капілярній стінці та в мезангії при класичному варіанті гострого гломерулонефриту?**
- 397. Підвищення чутливості хворих на гломерулонефрит до імуносупресивної терапії можливо при:**
- 398. Санаторно-курортне лікування гострого гломерулонефриту показане на курортах:**
- 399. При якому морфологічному типі гломерулонефриту найчастіші і найглибші тубуло-інтерстиціальні зміни?**

- 400. Які механізми процесу гемокоагуляції відіграють роль в патоморфозі гломерулонефриту?**
- 401. Які фактори впливають на вибір місця санаторно-курортного лікування гломерулонефриту?**
- 402. Які сечовивідні препарати показані як засіб ургентної терапії хворим на класичний варіант гострого гломерулонефриту при розвитку кардіальної астми?**
- 403. Чи показане вживання глюкокортикоїдів хворим з класичним варіантом гострого гломерулонефриту?**
- 404. Які клітини беруть участь у формуванні півмісяців при швидкопрогресуючому гломерулонефриті?**
- 405. Розвиток яких небезпечних для життя ускладнень можливий при швидкопрогресуючому гломерулонефриті?**
- 406. Які з нижченаведених ознак у хворих на гломерулонефрит складають синдром підгострої (швидкопрогресуючої) ниркової недостатності?**
- 407. При яких захворюваннях не може розвинути синдром швидкопрогресуючої ниркової недостатності?**
- 408. Які морфологічні ознаки характерні для первинного швидкопрогресуючого (підгострого) гломерулонефриту?**
- 409. Які медикаментозні та еферентні методи лікування можуть бути використані при швидкопрогресуючому (підгострому) гломерулонефриті?**
- 410. Які імунологічні механізми є провідними в розвитку синдрому Гудпасчера?**
- 411. Які клітини беруть участь у формуванні півмісяців при синдромі Гудпасчера?**

412. Яка швидкість клубочкової фільтрації відповідає ХХН III стадії?
413. Яка швидкість клубочкової фільтрації відповідає ХХН IV стадії?
414. Яка швидкість клубочкової фільтрації відповідає ХХН V стадії?
415. Чим пояснюється гіперазотемія при хронічній нирковій недостатності?
416. Якими ранніми симптомами характеризується хронічна ниркова недостатність?
417. Що розуміють під терміном "олігурія"?
418. Назвіть лабораторні зміни, що не зустрічаються при хронічній нирковій недостатності:
419. Який з наведених нижче сечогінних препаратів є засобом вибору при ХНН III-IV ступеня?
420. Які патологічні процеси являються головною безпосередньою причиною ХНН?
421. При загибелі якої кількості нефронів виникають клінічні прояви хронічної ниркової недостатності?
422. Найбільш частою причиною значного підвищення рівня калію в сироватці крові є:
423. Найбільш частою причиною зупинки серця у хворих з нирковою недостатністю є:
424. Вкажіть життєвонебезпечні рівні гіперкаліємії, що потребують корекції:
425. До протипоказів до лікування гемодіалізом належить все, крім:

426. Яка швидкість клубочкової фільтрації є показанням початку лікування ХНН гемодіалізом?

427. До факторів, що прискорюють початок лікування ГД у пацієнтів з ХХН - IV стадією належить все, крім:

428. До факторів, що прискорюють початок лікування ГД у пацієнтів з ХХН IV стадії належить все, крім:

429. Вкажіть ЕКГ-ознаки гіперкаліємії:

430. Вкажіть життєвонебезпечні рівні бікарбонату сироватки, що потребують ургентної корекції:

431. Які клініко-лабораторні прояви характерні для гострої ниркової недостатності?

432. Морфологічні зміни в нирках при гострій нирковій недостатності різного генезу представлені в основному:

433. Які з нижчеперелічених станів можуть приводити до розвитку гострої ниркової недостатності ?

434. Що належить до преренальних причин гострої ниркової недостатності

435. Які патологічні зміни виявляються в нирках при гострій нирковій недостатності, обумовленій крововтратою?

436. До ренальних причин гострої ниркової недостатності можна віднести всі, за виключенням:

437. Яка причина постренальної гострої ниркової недостатності?

- 438. Що з переліченого є причиною розвитку преренальної гострої ниркової недостатності?**
- 439. Що з переліченого є причиною розвитку преренальної гострої ниркової недостатності?**
- 440. Що з переліченого є причиною розвитку преренальної гострої ниркової недостатності?**
- 441. Що з переліченого є причиною розвитку гострого некрозу канальців?**
- 442. Що з переліченого є причиною розвитку гострого некрозу канальців?**
- 443. Які методи дослідження допомагають верифікувати гостру ниркову недостатність?**
- 444. Що Ви розумієте під гострою нирковою недостатністю:**
- 445. Які основні причини преренальної ГНН:**
- 446. Які основні причини ренальної ГНН:**
- 447. Які структури нефрону переважно ушкоджуються при гострій нирковій недостатності?**
- 448. Які основні причини постренальної ГНН:**
- 449. Причинами розвитку ГНН можуть бути наступні, окрім:**
- 450. Який розлад гомеостазу не характерний для ГНН?**
- 451. Що найбільш характерне при аналізі периферійної крові у хворих з ГНН?**
- 452. Які найнебезпечніші для життя ускладнення гіперкаліємії при ХНН?**

- 453. Який електроліт є антагоністом калію:**
- 454. Які препарати слід призначити для корекції гіперкаліємії:**
- 455. Які антибактеріальні препарати абсолютно протипоказані в олігурічний стадії ГНН?**
- 456. Які найчастіші ускладнення ГНН:**
- 457. Яким антибактеріальним препаратам слід віддавати перевагу в олігоанурічний стадії ГНН?**
- 458. Чим закінчується функціональна ГНН:**
- 459. Якими ранніми ознаками характеризується хронічна ниркова недостатність?**
- 460. Яка з наведених змін органів дихання є найбільш характерною для Ш-IV ступеня хронічної ниркової недостатності?**
- 461. Основною причиною розвитку анемії при хронічній нирковій недостатності є:**
- 462. Яка з наведених змін органів дихання є найбільш характерною для Ш-IV ступеня хронічної ниркової недостатності?**
- 463. Де в нормі утворюється вітамін Д-3?**
- 464. Вкажіть основні регулятори фосфорно-кальцієвого обміну?**
- 465. Вкажіть чинники, які посилюють секрецію паратиреоїдного гормону за умови хронічної ниркової недостатності?**
- 466. Вкажіть відповідну форму дисфункції об'ємрегулюючої функції нирок?**

467. Вкажіть відповідну форму дисфункції іонорегулюючої функції нирок?
468. Вкажіть відповідну форму дисфункції порушенню кислотно-лужної рівноваги?
469. Вкажіть відповідну форму дисфункції метаболічній функції нирок?
470. Вкажіть відповідну форму дисфункції інкреторній функції нирок?
471. Вкажіть відповідну форму дисфункції екскреторній функції нирок?
472. Знайдіть нормальні значення концентрації в плазмі крові натрію (ммоль/л)?
473. Знайдіть нормальні значення концентрації в плазмі крові калію (ммоль/л)?
474. Знайдіть нормальні значення концентрації в плазмі крові кальцію (ммоль/л)?
475. Знайдіть нормальні значення концентрації в плазмі крові магнію (ммоль/л)?
476. Знайдіть нормальні значення концентрації в плазмі крові хлору (ммоль/л)?
477. Знайдіть нормальні значення концентрації в плазмі крові бікарбонату (ммоль/л)?
478. Знайдіть нормальні значення концентрації в плазмі крові фосфату (ммоль/л)?
479. Знайдіть нормальні значення концентрації в плазмі крові сульфату (ммоль/л)?
480. Знайдіть нормальні значення концентрації в плазмі крові сечовини (ммоль/л)?

- 481. При хронічній нирковій недостатності зменшується утворення кальцитріолу. Яке з перелічених патофізіологічних порушень виникає?**
- 482. При хронічній нирковій недостатності зменшується утворення кальцитріолу. Яке з перелічених патофізіологічних порушень виникає?**
- 483. Що є основною причиною остеомалачії при хронічній нирковій недостатності?**
- 484. Вкажіть характеристики анемії, що розвивається при хронічній нирковій недостатності:**
- 485. Які зміни паращитовидних залоз характерні для важкої хронічної ниркової недостатності?**
- 486. Вкажіть рівень кальцію в крові при термінальній нирковій недостатності:**
- 487. Вкажіть особливості рівнів паратиреоїдного гормону в крові при важкій нирковій недостатності:**
- 488. Вкажіть особливості рівнів магнію в крові при важкій нирковій недостатності:**
- 489. Яке вживання білку повинно бути у хворих з хронічною нирковою недостатністю?**
- 490. Чим керуються при виборі вмісту білку в їжі у хворих з хронічною нирковою недостатністю?**
- 491. Призначення яких солей протипоказане хворим з хронічною нирковою недостатністю?**
- 492. Які порушення у хворих з ХНН покращуються при проведенні гемодіалізу чи перитонеального діалізу?**

- 493. Які рівні креатиніну сироватки крові служать підставою для проведення гемодіалізу?**
- 494. Людям похилого віку з ХНН, що потребують діалізу, яким варіантам його слід надати перевагу?**
- 495. Якому варіанту діалізу слід надавати перевагу у хворих з ХНН за наявності геморагічного синдрому?**
- 496. Які фактори відіграють провідну роль в генезі анемії при ХНН:**
- 497. Які з нижчеперелічених лікарських препаратів застосовуються для імуносупресивної терапії у хворих які перенесли трансплантацію нирки?**
- 498. Якими з нижчеперелічених методів дослідження не користуються для оцінки стану ниркового трансплантату?**