

ЗАВАНТАЖЕНО З САЙТУ ТЕСТУВАННЯ.УКР

Ендокринологія

Категорія: **Внутрішня медицина**

Кількість запитань: **677**

- 1. Острівці Лангенганса НЕ продукують:**
- 2. Яка з ознак є ведучою у хворих з феохромоцитомою?**
- 3. Цукровий діабет 2 типу характеризується:**
- 4. Назвіть стадію діабетичної ретинопатії:**
- 5. Який з гормонів шлунково - кишковому тракту приймає найважливішу участь в регуляції секреції інсуліну?**
- 6. В патогенезі інсулінорезистентності найважливішу роль відіграють:**
- 7. Який з гормонів найбільше пригнічує секрецію інсуліну?**
- 8. Хвора на дифузний токсичний зоб, тіреотоксикоз важкого ступеня, отримує мерказоліл по 40 мг на добу. Поступово з'явилися брадикардія, слабкість, сонливість. Визначте тактику подальшого лікування.**
- 9. При дефіциті інсуліну найбільш активуються процеси:**
- 10. Найбільш імовірною причиною сліпоти у хворого, що довгостроково страждає цукровим діабетом, є:**
- 11. Найважливішою ознакою функціональних стадій нижніх кінцівок є:**
- 12. Який з перерахованих препаратів найбільш активує поглинання глюкози периферійними тканинами?**
- 13. Яке з нижчеперахованих обстежень найбільш ефективно при оцінці тривалої компенсації цукрового діабету?**
- 14. Які гормони відносять до білкових за їх хімічною структурою?**

- 15. Дія інсуліну на вуглеводний обмін характеризується всіма нижче перерахованими ознаками, окрім:**
- 16. Найбільш вірогідною причиною стійкої тахікардії у хворих на цукровий діабет 1 типу є:**
- 17. В процесі біосинтезу інсуліну відіграють найважливішу роль іони:**
- 18. Найбільш вірогідною причиною стійкої тахікардії у хворих на цукровий діабет 1 типу є:**
- 19. Який основний механізм цукровознижуючої дії бігуанідів?**
- 20. Який основний механізм цукровознижуючої дії бігуанідів?**
- 21. Головне показання для призначення лікування цукровознижуючими сульфаніламідними препаратами:**
- 22. Який вид лікування доцільніший при цукровому діабеті вагітних?**
- 23. Які з перерахованих ускладнень можуть бути викликані прийманням терапевтичних доз сульфаніламідних цукрознижуючих препаратів?**
- 24. Основним протипоказанням для призначення бігуанідів хворим на цукровий діабет є?**
- 25. Основним протипоказанням для призначення цукрознижуючих сульфаніламідних препаратів є:**
- 26. Додання прордуктів, що містять клітковину до дієти хворих цукровим діабетом сприяє:**
- 27. Інсулінорезистентність може спостерігатись у всіх нижче перерахованих випадках, окрім:**

- 28. Найбільш вірогідним антигеном HLA - системи, з котрим пов'язана генетична схильність до розвитку діабету 1 типу є:**
- 29. Котрий із перерахованих антигенів HLA - системи є захисним у відношенні розвитку цукрового діабету:**
- 30. Факторами ризику розвитку цукрового діабету 2 типу є:**
- 31. Що є головним фізіологічним стимулятором секреції інсуліну?**
- 32. Яка середня добова потреба здорової дорослої людини в інсуліні?**
- 33. Яка основна патофізіологічна відмінність цукрового діабету 1 типу від діабету 2 типу?**
- 34. Яка основна патофізіологічна відмінність цукрового діабету 2 типу від діабету 1 типу?**
- 35. Які з перерахованих факторів можуть впливати на результати перорального тесту толерантності до глюкози?**
- 36. Що стоїть на першому місці в розвитку синдрому хронічного передозування інсуліну?**
- 37. Який з перерахованих препаратів раціональніше призначити при наявності геморагій на очному дні при діабетичній ретинопатії?**
- 38. Який вид дієти показаний для хворих із 1 та 2 ступінню діабетичної нефропатії?**
- 39. Найбільш характерним симптомом діабетичної дистальної полінейропатії ніг є:**

- 40. Який із сечогінних засобів найбільш раціонально призначити хворому з діабетичною кардіопатією і недостатністю кровообігу?**
- 41. Які з перерахованих препаратів показані при лікуванні дистальної діабетичної нейропатії?**
- 42. Який з перерахованих препаратів найбільш ефективний при діабетичному гепатозі?**
- 43. Який гіпотензивний препарат є засобом вибору в лікуванні діабетичної нефропатії?**
- 44. Які препарати доцільні при лікуванні діабетичної ентеропатії?**
- 45. Який із показників відображає функціональний стан ostrivtsevoogo aparatu у хворого, що приймає інсулін?**
- 46. Яка орієнтовна добова доза інсуліну в розрахунку на 1 кг маси тіла у хворого з вперше виявленим цукровим діабетом при наявності кетоацидозу?**
- 47. Яка орієнтовна добова доза інсуліну в розрахунку на 1 кг маси тіла у дитини з вперше виявленим цукровим діабетом при відсутності кетоацидозу?**
- 48. Які препарати раціональніше призначити хворому на цукровий діабет при наявності тахікардії і гіпертензії?**
- 49. Фізіологічні дози глюкагону викликають:**
- 50. При якому ендокринному захворюванні можливий розвиток негазового ацидозу?**
- 51. Які із продуктів найбільш багатих калієм можна рекомендувати хворим на цукровий діабет?**

- 52. Рівень постпрандіальної глікемії при компенсації цукрового діабету не повинен перевищувати:**
- 53. Як правило імпотенція у хворого на цукровий діабет є результатом:**
- 54. Який з гормонів відіграє найважливішу роль в патогенезі діабетичних ангіопатій?**
- 55. Вкажіть найважливіші патогенетичні фактори розвитку діабетичної ангіопатії:**
- 56. В патогенезі розвитку діабетичної стопи мають значення такі фактори, як:**
- 57. Для яких тканин найбільш характерна висока активність сорбітолового шляху обміну глюкози?**
- 58. Який з показників глікемії найбільш інформативний при проведенні орального тесту толерантності до вуглеводів?**
- 59. Діабетична нейропатія може проявлятися:**
- 60. Назвіть характерні для цукрового діабету ураження шкіри:**
- 61. Ягодам яких рослин властива цукрознижуюча дія?**
- 62. Лабораторними ознаками вираженої діабетичної нефропатії є:**
- 63. Непроліферативна діабетична ретинопатія характеризується наявністю:**
- 64. Для молочно - кислої коми найбільш характерною клінічною ознакою є:**
- 65. Яка дієта показана хворому в стані діабетичного кетоацидозу?**
- 66. Які з приведених препаратів використовуються при лікуванні діабетичної кетоацидотичної коми?**

67. Який з препаратів поряд з інсуліном слід призначити в першу чергу при лікуванні гіперосмолярної коми?
68. Яка з лабораторних ознак найбільш характерна для лактацидозу?
69. До основних причин розвитку цукрового діабету не відноситься:
70. Який із патогенетичних механізмів характерний для цукрового діабету:
71. Інсулін регулює метаболізм в таких органах чи тканинах:
72. "Кетонові тіла" є джерелом енергії для таких органів:
73. Гіперглікемія під впливом глюкокортикоїдів виникає завдяки таким факторам, крім:
74. До гормонів, що справляють термінову гіперглікемічну дію, належить:
75. Гіперглікемічна дія адреналіну пов'язана з такими ефектами, крім:
76. Гіперглікемічна дія глюкагону пов'язана з такими ефектами, крім:
77. Стійкість концентрації глюкози в крові забезпечується в основному такими механізмами, крім:
78. Острівці Лангенганса продукують такі гормони, крім:
79. Фізіологічним регулятором синтезу та секреції інсуліну є такий чинник:
80. Вкажіть, що не відноситься до основних типів цукрового діабету:
81. Який показник використовують для оцінки компенсації цукрового діабету?
82. Розвиток стероїдного діабету зумовлений такими причинами:

- 83. Усі нижчеперечислені механізми характеризують інсулінорезистентність, крім:**
- 84. Який перебіг цукрового діабету ви знаєте?**
- 85. Що не відноситься до критеріїв компенсації цукрового діабету:**
- 86. Про який ступінь важкості можна думати, коли у хворого на цукровий діабет рівень глікемії натще - 6,8 ммоль/л, аглюкозурія, креатинінемія - 0,36 ммоль/л?**
- 87. Цукровий діабет 1 типу рідко характеризується:**
- 88. Оцініть результати тесту толерантності до глюкози: натще 5,8 ммоль/л, через 1 год - 12,5 ммоль/л, через 2 год - 10,8 ммоль/л.**
- 89. Оцініть результати тесту толерантності до глюкози: натще 6,8 ммоль/л, через 1 год - 14,2 ммоль/л, через 2 год - 11,4 ммоль/л.**
- 90. Визначте, коли проведення тесту толерантності до глюкози не рекомендоване:**
- 91. Назвіть фактор, що не впливає на результати тесту толерантності до глюкози:**
- 92. Назвіть фактор, який не впливає на результати тесту толерантності до глюкози:**
- 93. Лабораторною ознакою декомпенсованого діабету є:**
- 94. Хворі на цукровий діабет 2 типу як правило:**
- 95. Концентрація глюкози в плазмі крові здорової людини знаходиться в таких межах:**

96. До перебігу інфаркту міокарда у хворих на цукровий діабет не належить:
97. Що характерно для діабетичної автономної кардіопатії?:
98. Яке ураження серця не характерне для цукрового діабету:
99. Яке ускладнення не характерне для діабетичної вісцеральної нейропатії:
100. Вкажіть, якої стадії діабетичної ангіопатії нижніх кінцівок немає в класифікації:
101. Вкажіть, яка ознака не характерна для діабетичної ретинопатії:
102. Назвіть стадію діабетичної нефропатії за Mogensen:
103. До стадій діабетичної макро- та мікро-ангіопатії нижніх кінцівок не відноситься:
104. Вкажіть, які ознаки не характерні для діабетичної нефропатії:
105. Вкажіть, які ознаки не характерні для діабетичної ангіопатії нижніх кінцівок:
106. Назвіть, яка з перелічених ознак цукрового діабету не є прямим протипоказанням для вагітності:
107. Початкові явища ретинопатії хворий діабетом відчуває за такою симптоматикою:
108. Розвитку кетоацидозу та кетоацидотичної коми сприяють вказані фактори, крім:
109. Який з перерахованих заходів необхідний для виведення з гіпоглікемічної коми?

110. Для діабетичного кетоацидозу характерні такі прояви, крім:
111. Який з перелічених механізмів не бере участь у патогенезі діабетичної кетоацидотичної коми?
112. Який із перерахованих симптомів не дає змоги відрізнити діабетичний кетоацидоз з клінікою “гострого живота” від справжнього “гострого живота”?
113. Який з перерахованих симптомів не характерний для гіперосмолярної коми:
114. Який з перерахованих механізмів не бере участі в патогенезі гіпоглікемічної коми?
115. Який із вказаних симптомів не характерний для гіпоглікемії?
116. Який із показників не є ознакою стійкої ремісії тиреотоксикозу?
117. Який із вказаних факторів не може сприяти розвитку гіперлактатацидемічної коми у хворих на цукровий діабет?
118. Лікуючи діабетичний кетоацидоз, застосовують:
119. Гіпоглікемія настає:
120. Хворий Г., має зріст 160 см, масу тіла 100 кг. Цукровий діабет виявлено вперше. Глікемія натще 8,5 ммоль/л. Яка терапія показана?
121. У хворого Б., виявлено діабетичну нефропатію IV ступеня. Який з цукрознижуючих пероральних препаратів краще застосовувати в даному випадку?
122. Всі з нижчеперерахованих принципів характеризують дієтотерапію цукрового діабету, крім:

- 123. Який з перерахованих методів є обов'язковим при терапії всіх клінічних форм цукрового діабету?**
- 124. Усі вказані рослини мають гіпоглікемізуючу дію, крім:**
- 125. Для цукрознижуючих сульфаніламідів властиві всі вказані механізми дії, крім:**
- 126. Який із цукрознижуючих пероральних препаратів можна застосовувати при ушкодженні нирок у хворих із цукровим діабетом?**
- 127. Яке із перерахованих ускладнень лікування бігуанідами є найбільш грізним та небезпечним?**
- 128. Хлібна одиниця відповідає:**
- 129. При яких станах у хворих на цукровий діабет протипоказане призначення цукрознижуючих сульфаніламідів?**
- 130. У яких хворих може відбутися нормалізація рівня глікемії без специфічного лікування?**
- 131. Хворі діабетом з надміром ваги повинні дотримуватись такої дієти:**
- 132. В харчуванні хворих діабетом позитивний вплив має:**
- 133. Які з продуктів сприяють швидкому підвищенню рівня глюкози в крові?**
- 134. У хворого кетоацидоз. Який варіант інсулінотерапії найбільш раціональний?**
- 135. Який з нижчеперечислених методів розрахунку характеризує орієнтовну добову дозу інсуліну при вперше виявленому цукровому діабеті без кетоацидозу?**

- 136. Який з препаратів можна застосувати хворим на діабет, не боячись метаболічних ускладнень**
- 137. При якому з перелічених станів у хворих на цукровий діабет не показано лікування інсуліном?**
- 138. Який інсулін за своїми характеристиками близький до інсуліну “Хумодар Б”?**
- 139. Ускладненнями інсулінотерапії можуть бути всі нищеперераховані, крім?**
- 140. Які з перелічених лікувальних заходів не доцільні при лікуванні препроліферативної діабетичної ретинопатії?**
- 141. Вказати, при яких з перелічених клінічних формах цукрового діабету показано санаторно-курортне лікування?**
- 142. Які з перелічених професій не протипоказані для хворих цукровим діабетом середнього та важкого ступеня важкості?**
- 143. Інсулін для щоденного вжитку повинен зберігатися:**
- 144. Що повинна робити хвора цукровим діабетом за вагітності?**
- 145. Що найважливіше при догляді за ногами хворим цукровим діабетом?**
- 146. Маса щитоподібної залози дорослого (в грамах):**
- 147. За хімічним складом гормони щитоподібної залози є:**
- 148. Яке з вказаних аліментарних порушень може приводити до патології щитоподібної залози?**
- 149. Біологічна дія тиреоїдних гормонів зводиться до таких ефектів, крім:**

150. Гормоном щитоподібної залози є:

151. Вкажіть гормон, який містить в своєму складі йод:

152. Визначте, який з перерахованих патогенетичних механізмів лежить в основі порушення функції серцево-судинної системи при дифузному токсичному зобі:

153. Який з перерахованих клінічних проявів не характерний для ДТЗ в осіб похилого віку:

154. Який з перерахованих клінічних проявів не характерний для ДТЗ у дітей:

155. Щоденна потреба в йоді, необхідному для біосинтезу тиреоїдних гормонів, становить:

156. Яка із вказаних функціональних проб не характеризує ДТЗ?

157. Яка із перерахованих ознак не характерна для трийодтиронінового тиреотоксикозу?

158. Який із вказаних станів не є показанням до хірургічного лікування токсичного зобу?

159. Усі вказані препарати гальмують перетворення тироксину в трийодтиронін, крім:

160. Яка із названих змін не пов'язана з надлишком тиреоїдних гормонів?

161. Яка із названих змін серцево-судинної системи не зумовлена надлишком тиреоїдних гормонів при ДТЗ?

162. Назвіть, що не відноситься до ЕКГ-ознак ДТЗ:

- 163. Назвіть, що не відноситься до порушення інших ендокринних функцій при дифузному токсичному зобі:**
- 164. Який препарат не застосовується для лікування тиреотоксичного кризу?**
- 165. Який із перерахованих факторів сприяє розвитку вторинного гіпотиреозу?**
- 166. Назвіть ознаки, які не характеризують вроджений гіпотиреоз:**
- 167. Який захід не рекомендований для лікування гіпотиреоїдної коми:**
- 168. У лікуванні гіпохромної анемії при гіпотиреозі найбільш суттєвим є:**
- 169. При нестачі тиреоїдних гормонів не виникає такий патологічний стан:**
- 170. До комбінованих тиреоїдних препаратів належать:**
- 171. Тиреоїдні гормони показані за таких станів:**
- 172. З якими захворюваннями не проводять диференціальну діагностику гіпотиреозу?**
- 173. Вкажіть, що не характерно для гіпотиреозу:**
- 174. Які порушення шлунково-кишкового тракту не характерні для гіпотиреозу?**
- 175. У хворих з аутоімунним тиреоїдитом низький ризик розвитку такого захворювання:**
- 176. Яка із перерахованих ознак не асоціюється з аутоімунною поліендокринопатією?**
- 177. Призначте лікування еутиреоїдного зобу у вагітних.**
- 178. Способи контролю за ефективністю лікування простого еутиреоїдного зобу:**

- 179. Яка тактика лікування простого еутиреоїдного зобу в ендемічних зонах?**
- 180. Яка ознака не характерна для підгострого тиреоїдиту:**
- 181. Вкажіть засіб, необхідний для лікування підгострого тиреоїдиту:**
- 182. Визначте ознаку, яка не характерна для підгострого тиреоїдиту:**
- 183. Визначте основну ознаку гіпертрофічної форми аутоімунного тиреоїдиту:**
- 184. З яким захворюванням не диференціюють гіпертрофічну форму аутоімунного тиреоїдиту?**
- 185. Для ендемічного зобу не характерно:**
- 186. Вкажіть ознаку, яка НЕ характерна для гострого тиреоїдиту:**
- 187. У хворого із судомним синдромом рівень кальцію крові 1,6 ммоль/л, фосфору 2,1 ммоль/л. Проба з реактивом Сульковича від'ємна. Ваш попередній діагноз.**
- 188. Підвищення вмісту кальцію в крові відбувається завдяки таким ефектам, крім:**
- 189. Проба Зимницького дозволяє виявити симптом цукрового діабету:**
- 190. Вкажіть ознаку, яка не характерна для ідіопатичного гіпаратиреозу:**
- 191. Вкажіть лабораторний тест, який не характерний для первинного гіперпаратиреозу:**
- 192. Назвіть засіб, який не рекомендується для лікування гіпаратиреозу:**
- 193. Вкажіть препарат, який не застосовується при лікуванні гіперкальціємічного кризу:**

194. При гіперпаратиреозі не спостерігається:
195. При яких захворюваннях не спостерігається вторинний гіперпаратиреоз:
196. Гіперкальціємія може розвинутих при застосування усіх перерахованих препаратів, крім:
197. Назвіть ознаку, яка не характерна для гіперпаратиреозу:
198. Назвіть клінічну форму гіперпаратиреозу:
199. Вкажіть фактор, який не приводить до гіпокальціємії:
200. Вкажіть захворювання, з яким треба проводити диференційну діагностику гіперпаратиреозу:
201. Для хвороби Аддісона характерні усі нижчеперераховані симптоми, крім:
202. Який із засобів є препаратом вибору при хворобі Аддісона?
203. Який із тестів є найбільш надійним для діагностики хвороби Аддісона?
204. Епізодичні гіпоглікемії характерні для таких захворювань:
205. Для феохромоцитом не характерно:
206. Які ендокринні захворювання не супроводжуються втратою ваги?
207. До клініко - лабораторних проявів феохромоцитомної кризи не відносяться:
208. Водно - мінеральний обмін в організмі регулюється таким гормоном:
209. До гормонів, котрі регулюють мінеральний обмін, належить:
210. Гормонами коркового шару наднирників є усі нижчеперераховані, крім:

211. Мінералокортикоїди сприяють:

212. Які метаболіти адреналіну виділяються з сечею?

213. Гіпоглікемія у хворого цукровим діабетом не може бути викликана:

214. Що не відноситься до показів для проведення тесту толерантності до глюкози ?

215. Із перерахованих препаратів погіршення протікання цукрового діабету не викликають:

216. Не характерними клінічними проявами тиреотоксикозу являються:

217. Сцинтиграфія служить основним методом виявлення:

218. Найбільш інформативним методом для виявлення раку щитоподібної залози являється:

219. Характерним ускладненням після застосування мерказолілу в лікуванні тиреотоксикозу являється:

220. У хворі 17 років відмічається поліурія з низькою питомою вагою сечі. Після проведення теста з обмеженням рідини величина питомої маси сечі не змінилась. Найбільш ймовірно, що у хворі:

221. Тиреотоксичний синдром не зустрічається при:

222. Найбільш ймовірною причиною сліпоти у хворого, довготривало страждаючого цукровим діабетом, являється:

223. Всі твердження по відношенню тиреотоксичного кризу являються вірними, за виключенням наступного:

- 224. Для підтвердження діагнозу первинного гіпотиреозу найбільш інформативним є:**
- 225. Хворий 30 років, що хворіє цукровим діабетом I типу, знайдений в коматозному стані через 3 години після введення інсуліну. Який захід необхідно виконати в першу чергу?**
- 226. При виявленні у пацієнта глюкозурії в першу чергу необхідно:**
- 227. Відносно цукрового діабету I типу несправедливе твердження:**
- 228. Чим зумовлена полідипсія у хворих на цукровий діабет?**
- 229. Для визначення стану концентраційної функції нирок необхідно зробити:**
- 230. Найбільш важливим фактором регуляції секреції інсуліну являється рівень в крові:**
- 231. Для цукрового діабету характерні:**
- 232. Для цукрового діабету характерним є ураження:**
- 233. Яке дослідження найбільш інформативне для діагностики цукрового діабету?**
- 234. Першими клінічними ознаками цукрового діабету являються:**
- 235. Про наявність цукрового діабету свідчать:**
- 236. Діабетична кома частіше за все обумовлюється:**
- 237. Для цукрового діабету характерними є:**
- 238. Цукровий діабет 2 типу частіше зустрічається у віці:**

- 239. При цукровому діабеті частіше всього зустрічається кома:**
- 240. Одним із початкових симптомів цукрового діабету являється:**
- 241. Ознакою гіпоглікемічної коми являється:**
- 242. Регуляторами синтезу та секреції інсуліну є такі фактори:**
- 243. Назвіть, що не відноситься до основних причин розвитку цукрового діабету:**
- 244. При обстеженні підлітка виявлено глюкозурію - 2 г/л, глікемію 4,5 ммоль/л. Ваш попередній діагноз?**
- 245. Які методи можуть бути використані для оцінки компенсації цукрового діабету в амбулаторних умовах?**
- 246. Оцініть результати тесту толерантності до глюкози: натще 5,7 ммоль/л, через 1 год. - 12,5 ммоль/л, через 2 год - 8,4 ммоль/л.**
- 247. Оцініть результати тесту толерантності до глюкози: натще 7,0 ммоль/л, через 1 год - 13,2 ммоль/л, через 2 год - 11,2 ммоль/л.**
- 248. Який з перелічених заходів по виведенню з діабетичної кетоацидемічної коми повинен бути початим на догоспітальному етапі?**
- 249. Коли можлива тривала ремісія діабету?**
- 250. Який з перелічених механізмів не бере участь в патогенезі гіпоглікемічної коми?**
- 251. Хворі діабетом з надміром ваги повинні:**
- 252. В харчуванні хворих діабетом:**

253. Які з продуктів сприяють швидкому росту глюкози в крові?
254. У хворого кетоацидоз. Цукор крові 28 ммоль/л. Яка схема інсулінотерапії найбільш раціональна?
255. Який із препаратів можна застосувати у хворих на діабет, не боячись метаболічних ускладнень?
256. Який з нижчеперерахованих методів розрахунку характеризує орієнтовну добову дозу інсуліну при вперше виявленому цукровому діабеті 1-го типу без кетоацидозу?
257. При якому з перерахованих станів у хворих на цукровий діабет не показане лікування інсуліном?
258. Який інсулін за своїми характеристиками близький до інсуліну “Хумодар Б”?
259. Ускладненнями інсулінотерапії можуть бути всі нижчеперераховані, крім:
260. Які з перерахованих лікувальних заходів не доцільні при лікуванні препроліферативної діабетичної ретинопатії?
261. Кращим тестом для діагностики синдрому Кушинга є:
262. Для якого із зазначених захворювань характерний значно підвищений рівень кортикотропіну в плазмі крові?
263. До проявів синдрому Кушинга належить усе перераховане, крім:
264. Назвіть захворювання, яке не супроводжується гіпертензією:
265. Глюкокортикоїди здатні проявляти анаболічну дію в таких органах і тканинах:

- 266. Для біологічної дії кортизолу характерні такі ефекти, крім:**
- 267. Який із вказаних гормонів належить до стероїдних:**
- 268. Глюкокортикоїди справляють катаболічну дію в усіх перерахованих тканинах та органах, крім:**
- 269. Глюкокортикоїди проявляють гіперглікемічну дію завдяки таким ефектам, крім:**
- 270. До глюкокортикоїдів належать такі гормони, крім:**
- 271. До біологічної дії кортизолу не належить:**
- 272. Вкажіть, що не є симптомом гіпоталамічного ожиріння:**
- 273. Назвіть засіб, який не використовують для лікування аліментарно-конституційного ожиріння:**
- 274. Назвіть засіб, який не використовується для лікування гіпоталамічного ожиріння:**
- 275. Базофільними клітинами гіпофізу продукуються такі гормони, крім:**
- 276. Ацидофільними клітинами аденогіпофізу продукується такий гормон:**
- 277. До аденогіпофізу відносять:**
- 278. Корковим шаром наднирників продукується такий гормон:**
- 279. Вкажіть залозу, котра регулюється аденогіпофізом:**
- 280. Визначають такі типи впливу гормонів на організм, крім:**

- 281. Який з перерахованих симптомів не характерний для гіпоталамічного ожиріння:**
- 282. Для післяпологового пангіпопітуїтаризму характерні усі перераховані клінічні ознаки, крім:**
- 283. Яких з симптомів відсутній при гіпопітуїтаризмі:**
- 284. Схуднення характерне для усіх перерахованих ендокринних захворювань, крім:**
- 285. Для феохромоцитом не характерно**
- 286. Вкажіть правильні розміри турецького сідла у дорослих:**
- 287. Анатомофізіологічно гіпофіз складається з :**
- 288. Аденогіпофіз продукує такі гормони, крім:**
- 289. За будовою гормони гіпофізу є:**
- 290. Соматотропін справляє така біологічна дія, крім:**
- 291. Соматотропіну притаманна така біологічна дія, крім:**
- 292. Для діагностики акромегалії можуть бути використані усі зазначені дослідження, крім:**
- 293. Акромегалію характеризують усі з зазначених симптомів, крім:**
- 294. Найкращим медикаментозним методом лікування акромегалії є:**
- 295. Для гіпофізарного нанізму характерні усі вказані клінічні ознаки, крім:**

296. Зменшення фізичної сили характерне для усіх перерахованих ендокринних захворювань, крім:
297. Яке із вказаних захворювань супроводжується захриплістю голосу:
298. Для надлишкового виділення антидіуретичного гормону характерним є усе із зазначеного, крім:
299. Яка із вказаних ознак не характерна для нецукрового діабету:
300. Антидіуретичний гормон продукується:
301. Низький зріст зумовлюється такими причинами, крім:
302. Що з наступного характерно для хворого з синдромом Клайнфельтера:
303. Гірсутизм є ознакою усіх перерахованих ендокринних захворювань, крім:
304. Поняття “вірилізація” не включає в себе:
305. Збільшення вмісту андрогенів в крові жінок може бути зумовлено такими причинами, крім:
306. Передчасне статеве дозрівання настає за таких захворювань, крім:
307. Для індукції статевого розвитку у хлопчиків застосовують:
308. Про затримку соматостатевого розвитку у хлопчиків говорять у випадку, коли:
309. Назвіть основну ознаку адреногенітального синдрому:
310. Назвіть, яка з перчислених хвороб не супроводжується гінекомастією

- 311. Який з перерахованих лікувальних засобів не показаний при клімактеричному синдромі?**
- 312. Вкажіть, що не відноситься до діагностичних ознак синдрому тестикулярної фемінізації:**
- 313. Виберіть засіб, який не показаний для лікування затримки статевого розвитку у хлопчиків до 14 років:**
- 314. Вкажіть, що не відноситься до основних симптомів синдрому Шершевського -Тернера:**
- 315. Вкажіть що не відноситься до основних симптомів синдрому Штейна-Левенталя:**
- 316. Показанням до комбінованого (естрогени + гестагени) гормонального лікування клімактеричного синдрому є наявність:**
- 317. Клімактеричний синдром може виникати у жінок:**
- 318. Який з препаратів слід призначати хворим клімактеричним синдромом при наявності симптомів вегетодистонії з перевагою парасимпатикотонії?**
- 319. Котрий із препаратів слід призначити хворим клімактеричним синдромом при наявності симптомів вегетодистонії по симпатoadреналовому типу?**
- 320. Укажіть найважливішу ознаку клімактеричного ангіоневрозу:**
- 321. Які найбільш часті етіологічні чинники розвитку акромегалії**
- 322. Які із симптомів не властиві для нецукрового діабету?**
- 323. З якими захворюваннями слід проводити диференційну діагностику нецукрового діабету?**

- 324. Які функціональні проби використовують в діагностиці нецукрового діабету?**
- 325. Які лікарські препарати доцільно використовувати для лікування нецукрового діабету?**
- 326. Яка можлива побічна дія аналогів антидіуретичного гормону?**
- 327. Які клінічні ознаки найбільше характерні для синдрому неадекватної продукції вазопресину?**
- 328. Для синдрому неадекватної секреції антидіуретичного гормону характерні всі ознаки, окрім:**
- 329. Ускладнення, що спостерігаються при лікуванні хворих на нецукровий діабет за допомогою адіурекрину:**
- 330. Для синдрому Сільвестріні - Корди не характерна наявність:**
- 331. Які найчастіші ознаки аліментарно - конституційного ожиріння?**
- 332. Які біохімічні показники крові найбільш характерні для хвороби Симмондса?**
- 333. Які складові синдрому Пехкранца - Бабінського - Фреліха?**
- 334. Синдром Моріака характеризується усіма ознаками, окрім:**
- 335. Які із етіологічних чинників лежать в основі первинного гіперпаратирозу?**
- 336. Які органи та системи найчастіше вражаються при гіперпаратирозі?**
- 337. Які із захворювань можуть маскувати прояви гіперкальціємії у хворих первинним гіперпаратиреозом?**

- 338. При яких ендокринних захворюваннях не спостерігається гіперкальціємія?**
- 339. При якій патології кісткової тканини проба з індометацином буде позитивною?**
- 340. При якій патології кісткової тканини проба з преднізолоном буде позитивною?**
- 341. Зниження рівня кальцію в сироватці крові при проведенні проби з преднізолоном буде спостерігатись при:**
- 342. При яких захворюваннях, наведених нижче, рівень кальцію в сироватці крові може бути підвищеним?**
- 343. Які із показників є найбільш показовими в діагностиці гіперпаратирозу?**
- 344. Які фактори впливають на швидкість синтезу вітаміну Д в організмі?**
- 345. З якими захворюваннями слід диференціювати гіперпаратироз?**
- 346. Які із причин можуть призвати до розвитку гіпокальціємії?**
- 347. Які групи м'язів найчастіше включаються в судомний синдром у хворих з гіпопаратирозом?**
- 348. Які препарати слід використати при розвитку гіпопаратироїдної титанії ?**
- 349. Які препарати використовують у лікуванні гіпопаратирозу?**
- 350. Які із зазначених гормонів впливають на обмін кальцію в організмі?**
- 351. Які компоненти не входять до множинного ендокринного аденоматозу 1 типу (синдром Вермера)?**

352. Які компоненти не входять до множинного ендокринного аденоматозу типу 2-а (синдром Сіппла)?

353. Які клінічні ознаки відрізняють ниркову форму гіперпаратирозу від сечово - кам'яної хвороби нирок?

354. Які із перелічених симптомів найчастіше спостерігаються при гіперкальціємічному кризі?

355. На основі яких показників можна відрізнити кишечну форму вторинного гіперпаратирозу?

356. Із перелічених форм захворювання відмітити ту, яка немає відношення до гіперпаратирозу:

357. Які захворювання супроводжуються раннім розвитком катаракти?

358. Які клінічні ознаки характерні для синдрому Олбрайта (псевдогіпопаратирозу)?

359. У якому вигляді найчастіше зустрічається ураження очей при гіперпаратиреозі?

360. Які біохімічні показники крові слід враховувати одночасно при визначенні концентрації кальцію в крові?

361. Які із означених гормонів стимулюють утворення активної форми вітаміну Д?

362. Зміни яких біохімічних показників крові можуть впливати на трактування результатів визначення рівня кальцію в крові?

363. Які із перелічених органів являються головними органами - мішенями для дії вітаміну Д?

- 364. Як впливають тироїдні гормони на обмін кальцію в організмі?**
- 365. Які із перелічених симптомів не характерні для кандидоендокринного синдрому (МЕДАС)?**
- 366. Чим обумовлений розвиток ниркової остеодистрофії?**
- 367. Які із препаратів вибору використовують при лікуванні вітамін - Д - резистентних станів?**
- 368. Чим зумовлений розвиток гіперкальціємії у хворих, які змушені тривалий час знаходитись на постільному режимі?**
- 369. Які лабораторні показники характерні для вторинного гіпотиреозу?**
- 370. Яка безпосередня дія тиротропіну?**
- 371. Які дослідження проводять для диференційної діагностики первинного та вторинного гіпогонадизму?**
- 372. З якими захворюваннями слід проводити диференційну діагностику синдрому Пархона?**
- 373. Для діагностики яких захворювань найбільш інформативне визначення активності поглинання J-131 щитовидною залозою?**
- 374. Поглинання J-131 щитовидною залозою через 2 год. - 26%, через 4 год. - 14%, через 24 год. - 8%. Який це тип кривої?**
- 375. Який з йодомістких гормонів щитовидної залози є гормонально неактивним?**
- 376. Які ускладнення спостерігаються при лікуванні тиреостатиками групи імідазолу?**

- 377. Який із вказаних видів порушень ритму найбільш характерний для дифузного токсичного зобу?**
- 378. При підгострому тироїдиті з клінікою вираженого тиротоксикозу найбільш раціональне призначення:**
- 379. Які із перерахованих методів дослідження є найбільш інформативними в діагностиці нейроендокринної офтальмопатії?**
- 380. У хворої з маніакально - депресивним психозом на фоні його лікування виявлено зоб. З яким із препаратів, що приймала хвора, це може бути пов'язано?**
- 381. Які найбільш характерні порушення з боку імунної системи при дифузному токсичному зобі?**
- 382. Назвіть найважливіше показання для призначення глюкокортикоїдів при лікуванні аутоімунного тироїдиту:**
- 383. Яка найважливіша ознака глюкозидної інтоксикації при лікуванні тиротоксичного серця?**
- 384. Найбільш оптимальний строк оперативного лікування дифузного токсичного зобу на фоні вагітності:**
- 385. Апатична форма тиротоксикозу характеризується наявністю:**
- 386. Усі нижче перелічені хвороби мають аутоімунне походження, окрім:**
- 387. На основі якого дослідження можна диференціювати ендемічний зоб від спорадичного?**
- 388. Найбільш інформативним дослідженням при вузловому зобі є:**

- 389. Який з критеріїв найбільш адекватний в корекції дози тиреоїдних гормонів при лікуванні зобу Хашимото?**
- 390. При прогресуванні тиротоксичній офтальмопатії у хворого з компенсованим тиротоксикозом на фоні приймання мерказолілу в першу чергу слід:**
- 391. Головна фармакологічна дія мерказолілу:**
- 392. Який найважливіший патогенетичний механізм лежить в основі порушень функції органів кровообігу при дифузному токсичному зобі?**
- 393. Які з перерахованих патогенетичних механізмів лежать в основі збільшення щитовидної залози при дифузному токсичному зобі?**
- 394. Важливою особливістю клінічного прояву дифузного токсичного зобу у дітей є:**
- 395. Який час ахілового рефлексу свідчить на користь клінічної форми гіпотиреозу?**
- 396. Найважливіша особливість структури ультразвукового зображення щитовидної залози при аутоімунному тироїдиті:**
- 397. Особливість ультразвукового зображення кисти в щитовидній залозі:**
- 398. Яка максимальна протяжність дії тироксину після його відміни?**
- 399. Найчастіша причина розвитку раннього післяопераційного гіпотиреозу:**
- 400. В якій з вікових груп щитовидна залоза найбільш уразлива до руйнуючої дії радіації?**
- 401. Хворим, які знаходяться в гіпотиреоїдній комі протипоказано:**

- 402. Головний механізм антитиреоїдного ефекту глюкокортикоїдів характеризується:**
- 403. З якою з пухлин найчастіше поєднується вузловий зоб?**
- 404. Який з видів дистопії щитовидної залози зустрічаються найчастіше?**
- 405. Негативна дія бета - адреноблокаторів на плід у хворих дифузним токсичним зобом обумовлена:**
- 406. Який артеріальний тиск найбільш характерний для неускладненої форми дифузного токсичного зобу?**
- 407. Який із препаратів найбільш ефективний при лікуванні безпліддя у хворих гіпотиреозом?**
- 408. Який з органів людини, окрім щитовидної залози, найактивніше накопичує йод?**
- 409. Чим характеризується так званий "гірський зоб"?**
- 410. має схильність до формування вузлів**
- 411. Для гіпотиреозу характерна наявність симптомів:**
- 412. Дефіцит тироїдних гормонів призводить до порушення:**
- 413. Які лікарські препарати повинні вводитись в першу чергу при лікуванні гіпотиреоїдної коми?**
- 414. У хворого дифузним токсичним зобом на фоні лікування виникла гіпертермія і біль в горлі. З яким із препаратів це може бути пов'язане?**

- 415. У хворого на фоні лікування дифузного токсичного зобу виникли риніт і кон'юнктивіт. З яким із препаратів це може бути пов'язано?**
- 416. Найбільш характерною ознакою епіфізарного дисгенезу є:**
- 417. Передозування тиреоїдних гормонів супроводжується:**
- 418. Які невідкладні стани можуть виникати при дифузному токсичному зобі?**
- 419. В якому віці найчастіше зустрічається гіпотиреоз?**
- 420. Гіпертиреоз у дитячому віці може спостерігатись при більшості наведених патологічних станів, окрім:**
- 421. Які із периферійних гормонів найбільш адекватно відображають адекватність замісної терапії при лікуванні гіпотиреозу?**
- 422. Подавлення периферійної конверсії T4 в T3 поз'язане з призначенням всіх лікарських препаратів, окрім:**
- 423. Молода жінка захворіла тиротоксикозом в 3 триместрі вагітності. Найбільш доцільне лікування в даному випадку:**
- 424. Які обстеження слід провести у хворої, прооперованої в зв'язку з тиротоксикозом, якщо в неї спостерігається субнормальний рівень тироксину у сироватці крові?**
- 425. Яку форму передчасного статевого розвитку слід вважати справжньою?**
- 426. Яку форму передчасного статевого розвитку відносять до несправжнього?**
- 427. Під впливом яких факторів проходить диференціювання вольфових протоків в період ембріогенезу?**

- 428. Які структури формуються із Мюллерового протоку?**
- 429. Які структури формуються із Вольфового протоку?**
- 430. Під впливом яких факторів відбувається розвиток статевого бугорка з формуванням зовнішніх статевих органів по чоловічому типу у плода з каріотипом ХУ?**
- 431. Під впливом яких факторів відбувається розвиток статевого бугорка з формуванням зовнішніх статевих органів по жіночому типу?**
- 432. Дія андрогенів на плід жіночої статі після 14 неділей внутрішньоутробного розвитку призводить до:**
- 433. При народженні дитини з проміжною будовою зовнішніх статевих органів потрібно невідкладно визначити:**
- 434. Які із гормональних порушень характерні при синдромі Клайнфельтера?**
- 435. Для хворих з синдромом Клайнфельтера характерні клінічні ознаки, за виключенням:**
- 436. Клінічна характеристика синдрому Шершевського - Тернера має всі нижче наведені ознаки, окрім:**
- 437. В лікуванні синдрому Шершевського - Тернера використовують:**
- 438. Із приведених нижче груп препаратів в лікуванні синдрому Шершевського - Тернера не використовують:**
- 439. Чим обумовлений розвиток гінекомастії у осіб з первинним гіпогонадізмом?**
- 440. Які із перелічених препаратів доцільно використовувати для лікування пубертатної гінекомастії?**

- 441. Під впливом яких гормонів стимулюється ріст молочних залоз осіб чоловічої статі в період пубертації?**
- 442. Чим обумовлена резистентність до інсуліну у хворих з синдромом Штейн-Левенталя?**
- 443. У 14-літнього хлопчика спостерігається двохстороння гінекомастія. Це може бути при:**
- 444. При проведенні диференційної діагностики гінекомастії у підлітка необхідно провести:**
- 445. Що обумовлює поняття генетична стать?**
- 446. Які гормони за хімічною структурою відносяться до стероїдів?**
- 447. Яку дію, крім впливу на функцію кори наднирників, має кортикотропін?**
- 448. Які клінічні прояви недостатності соматотропіну?**
- 449. Які клінічні прояви недостатності кортикотропіну?**
- 450. Характерна картина оксісупраренограми при хворобі Іценко -Кушинга:**
- 451. Для вторинного гіпокортицизму на відміну від первинного найбільш характерним є:**
- 452. В які години доби спостерігається найвищий рівень кортикостероїдів в крові?**
- 453. Які із гормонів переважно виробляються в клубочковій зоні кори наднирників?**

454. Яку з проб необхідно провести для діагностики первинного гіпокортицизму?
455. Які гормони виробляються в пучковій зоні кори наднирника?
456. Які статеві стероїди переважно утворюються в наднирниках дорослих осіб чоловічої статі?
457. Виключіть патогенетичний механізм, що не приймає участі у розвитку остеопорозу при гіперкортицизмі:
458. Що лежить в основі розвитку гіпотензивного стану при хворобі Аддісона?
459. Котрий з клінічних симптомів не характерний для гіпоглікемії?
460. Після проведення транесфеноїдальної аденомектомії хворому з хворобою Іценка - Кушинга йому слід призначати:
461. Діагноз недостатності 21 - гідроксилази у хворого з адрено-генітальним синдромом підтверджується всіма указаними показниками окрім:
462. Із приведених клінічних ознак гіпоренімічного гіпоальдостеронізму не є характерною:
463. Які із клінічних ознак не характерні для хромаффіном?
464. Який із препаратів використовують в якості патогенетичного засобу при лікуванні хвороби Іценка-Кушинга?
465. Вкажіть ранні лабораторні ознаки системного остеопорозу у хворих з легкою формою хвороби Іценка- Кушинга:
466. Для молочно - кислої коми найбільш характерною клінічною ознакою є:

- 467. Яка дієта показана хворому в стані діабетичного кетоацидозу?**
- 468. Які з приведених препаратів використовуються при лікуванні діабетичної кетоацидотичної коми?**
- 469. Який з препаратів слід призначити в першу при лікуванні гіперосмолярної коми?**
- 470. Яка з лабораторних ознак найбільш характерна для лактацидозу?**
- 471. Критеріями цукрового діабету за результатами тесту толерантності до глюкози (після вживання 75 г глюкози) є такі:**
- 472. Найбільш характерним симптомом діабетичної дистальної полінейропатії ніг є:**
- 473. Який із показників відображає функціональний стан острівцевого апарату у хворого, що приймає інсулін?**
- 474. Фізіологічні дози глюкагону викликають:**
- 475. При якому ендокринному захворюванні можливий розвиток негазового ацидозу?**
- 476. Для цукрового діабету типу 1 характерна така ознака:**
- 477. Вкажіть особливості клінічного перебігу, властиві цукровому діабету типу 2:**
- 478. У патогенезі цукрового діабету типу 2 провідне значення належить таким факторам:**
- 479. Для встановлення діагнозу цукрового діабету типу 2 важливим є проведення такого дослідження:**

- 480. Для профілактики цукрового діабету типу 2 необхідно дотримуватися такого принципу:**
- 481. До діабетичних гаплотипів належать такі HLA:**
- 482. До генетичних факторів, які реалізують цукровий діабет типу 1, належать:**
- 483. До генетичних факторів, які реалізують цукровий діабет типу 1, не належать:**
- 484. Діагноз цукрового діабету в дітей та підлітків базується на таких показниках:**
- 485. Для діагнозу цукрового діабету в дітей та підлітків не характерно:**
- 486. Цукровий діабет у дітей необхідно диференціювати з таким патологічним станом:**
- 487. Визначіть ліки, які можуть спричинити виникнення коматозних станів при цукровому діабеті:**
- 488. Визначіть термін настання діабетичної кетоацидотичної коми:**
- 489. Визначіть термін настання гіпоглікемії:**
- 490. Визначіть симптоми, характерні для декомпенсованого цукрового діабету з високим вмістом глюкози:**
- 491. Визначіть дії хворого на цукровий діабет при раптовому запамороченні, тремтінні тіла, підвищеній пітливості, серцебиття:**
- 492. Укажіть добову потребу в йоді для дорослої людини:**
- 493. Оберіть найбільш доступний метод визначення тяжкості йододефіциту:**

- 494. Визначіть препарати вибору при лікуванні йододефіцитного зоба:**
- 495. Визначіть найбільш інформативний показник гіпотиреозу**
- 496. Визначіть, які з нижчеперерахованих речовин, що синтезуються в щитоподібній залозі, є гормонально активними**
- 497. Яке захворювання або синдром пов'язаний з такими даними лабораторного обстеження : зниження рівня трийодтироніну та тироксину в крові, підвищення рівня тиреотропіну?**
- 498. Визначіть найбільш чутливий індикатор первинного гіпотиреозу:**
- 499. Визначіть найчастішу причину первинного гіпотиреозу:**
- 500. Визначіть причину тиреотоксикозу при підгострому тиреоїдиті:**
- 501. Визначіть, концентрація якої речовини в крові регулює функцію прищитоподібних залоз:**
- 502. Визначіть стан, який може бути причиною судомного синдрому:**
- 503. Визначіть патологічний стан або захворювання, яке може бути причиною гіперкальціємії:**
- 504. Визначіть препарат, який містить найбільшу кількість кальцію в 1 г солі:**
- 505. Визначіть, який з нижченаведених показників характерний для нецукрового діабету:**
- 506. Визначіть ендокринне захворювання, які супроводжуються ожирінням:**
- 507. Назвіть симптоми, які характерні для гіпоталамічного ожиріння:**
- 508. Визначіть патологічний стан, зумовлений недостатністю соматотропіну:**

- 509. Назвіть ознаки, характерні для хвороби Іценка-Кушинга:**
- 510. Визначіть ендокринне захворювання, яке супроводжується гірсутизмом:**
- 511. Визначіть гормони мозкового шару надниркових залоз:**
- 512. За біохімічною структурою андрогени належать до такої групи:**
- 513. Визначіть ендокринне захворювання, яке завжди супроводжується зменшенням маси тіла:**
- 514. Визначіть, які клітини в організмі жінки синтезують естрогени:**
- 515. Визначіть синдром, для якого характерний каріотип 45 XO:**
- 516. Визначіть каріотип, властивий синдрому тестикулярної фемінізації:**
- 517. Визначіть причину розвитку патологічних змін у період клімаксу:**
- 518. Назвати гормон жирової тканини:**
- 519. Визначіть клас ожиріння у хворого з індексом маси тіла 33 кг/м²:**
- 520. Визначіть рівень глюкози капілярної крові натще та через 2 год після навантаження глюкозою (75 г), за якими можна встановити порушену толерантність до глюкози:**
- 521. Визначіть ендокринне захворювання, для якого характерний специфічний тип діабету:**
- 522. Всі твердження у відношенні тиреотоксического кризу є вірними, за винятком:**
- 523. При виявленні в пацієнта глюкозурії в першу чергу необхідно:**

524. Причиною тиреотоксикозу слугувати не може:

525. Яка з ознак не притаманна для тиреотоксичної аденоми:

526. Який метод найбільш інформативний для діагностики тиреотоксичної аденоми:

527. Які ознаки не характерні для вторинного тиреотоксикозу:

528. Яка з ознак не характерна для апатетичної форми тиреотоксикозу:

529. Які з перерахованих ознак не характерні для тиреотоксичного кризу:

530. Який метод є найбільш ефективним при лікуванні ендокринної офтальмопатії:

531. Яке захворювання з перерахованих не супроводжується типовою клінікою тиреотоксикозу:

532. Що з перерахованого не використовується у лікуванні хворих на ДТЗ:

533. Активним гормоном щитоподібної залози є:

534. Гіперфункція щитоподібної залози характерна для:

535. Не характерними клінічними проявами тиреотоксикозу є :

536. Сцинтиграфія служить основним методом виявлення:

537. Характерним ускладненням після застосування мерказоліла в лікуванні тиреотоксикозу є:

538. У хворий 17 років відзначається поліурія з низькою питомою вагою сечі. Після проведення тесту з обмеженням рідини величина питомої ваги сечі не змінилася. Найбільше імовірно, що у хворой:

539. Тиреотоксичний синдром не може зустрічатися при:

540. Хвора 40 років скаржиться на мерзлякуватість, сонливість, запори. При об'єктивному дослідженні виявлене збільшення щитовидної залози й запідозрений первинний гіпотиреоз. Для підтвердження даного діагнозу найбільше інформативно:

541. Хворий С. 28 років, що страждає цукровим діабетом I типу, виявлений у коматозному стані через 3 години після введення інсуліну. Який захід необхідно виконати в першу чергу?

542. Щодо цукрового діабету I типу справедливо все, крім:

543. ?Яке лікування показане хворим на синдром Іценко - Кушинга?

544. Які існують методи лікування хвороби Іценко-Кушинга?

545. Чим зумовлена наявність багряно-червоних полос при хворобі Іценко-Кушинга?

546. Надлишок глюкокортикоїдів при хворобі Іценко-Кушинга не приводить до:

547. Визначте, які з перерахованих факторів слід віднести до етіологічних при хворобі Іценко-Кушинга?

548. Які симптоми не свідчать про зростаючу важкість захворювання при хворобі Аддісона?

549. Який з препаратів може мати глю - і мінералокортикоїдну активність одночасно?

550. При наднирниковій комі спостерігається:

551. Секреція інсуліну в першу чергу регулюється:

552. В якому органі інактивується найбільша частина інсуліну?
553. Скільки інсуліну виробляється у здорової людини за добу
554. Скільки амінокислотних залишків міститься в одній молекулі інсуліну?
555. З якою метою визначають рівень С - пептиду у хворих на цукровий діабет?
556. З якою метою визначають рівень фруктозаміну у хворих на цукровий діабет?
557. При якому із наведених захворювань розвиток цукрового діабету є сумнівним?
558. Для встановлення діагнозу цукрового діабету типу 2 важливим є проведення такого дослідження:
559. Відносно цукрового діабету 1 типу несправедливим є твердження:
560. Яка клінічна ознака виникає першою у хворих на цукровий діабет?
561. Назвіть НЕ характерні для цукрового діабету ураження шкіри:
562. Що лежить в основі розвитку діабетичної остеоартропатії?
563. Що може бути ускладненням цукрового діабету?
564. Яке твердження, що стосується перебігу інфаркту міокарда у хворих на цукровий діабет порівняно з не діабетиками є НЕвірним?
565. Що НЕ є ускладненням цукрового діабету?
566. Яке дообстеження слід провести хворому на цукровий діабет з метою виявлення перших стадій діабетичної нефропатії?

- 567. Яке дообстеження слід провести хворому на цукровий діабет з метою виявлення перших стадій діабетичної нефропатії?**
- 568. Яке лікування показане при наявності трофічних виразок на ступнях при цукровому діабеті?**
- 569. Яке лікування показане при діабетичній ангіопатії нижніх кінцівок?**
- 570. Діагноз цукрового діабету за результатами тесту толерантності до глюкози (після вживання 75 г глюкози) слід поставити у випадку:**
- 571. Діагноз порушення толерантності до глюкози за результатами тесту толерантності до глюкози (після вживання 75 г глюкози) слід поставити у випадку:**
- 572. Діагноз порушення глікемії натще за результатами тесту толерантності до глюкози (після вживання 75 г глюкози) слід поставити у випадку:**
- 573. Діагноз відсутності порушення вуглеводного обміну за результатами тесту толерантності до глюкози (після вживання 75 г глюкози) слід поставити у випадку:**
- 574. Яке з перерахованих ускладнень цукрового діабету відноситься до мікроангіопатій?**
- 575. Яке з перерахованих ускладнень цукрового діабету НЕ відноситься до мікроангіопатій?**
- 576. Які середники для профілактики прогресування перших стадій діабетичної нефропатії найкраще використати для хворого на цукровий діабет:**
- 577. Найбільш характерним симптомом діабетичної дистальної полінейропатії ніг є:**

578. Який симптом НЕ є характерним для діабетичної дистальної полінейропатії ніг є:

579. Який з наведених станів/захворювань НЕ відноситься до автономної нейропатії при цукровому діабеті?

580. У хворого на цукровий діабет виявлено нетримання сечі та арефлексію детрузора. Про яке ускладнення цукрового діабету у нього можна думати?

581. Які очні краплі слід призначати для зниження офтальмотонусу у хворих на цукровий діабет з наявністю глаукоми?

582. З якою метою використовують інсулінові помпи ?

583. Що відноситься до ознак хвороби Аддісона?

584. Ознаками первинного гіпокортицизму є:

585. До ознак первинного гіпокортицизму відносять:

586. Хвороба Аддісона характеризується:

587. Найбільш частою причиною первинного гіпокортицизму є:

588. Що не є характерним для змін з боку шкіри та слизових у хворих на первинний гіпокортицизм?

589. Що є характерним для змін з боку шкіри та слизових у хворих на первинний гіпокортицизм?

590. Яка з наступних клінічних ознак не характерна для хворих з хронічним первинним гіпокортицизмом?

- 591. Яка з наступних ознак беззаперечно свідчить про первинний характер недостатності надниркових залоз?**
- 592. До ознак первинного гіпокортицизму не відноситься:**
- 593. Яке з тверджень, що стосуються гіперпігментації при хворобі Аддісона є невірним?**
- 594. Яке з тверджень про дієтотерапію у хворих на хворобу Аддісона є вірним?**
- 595. Яке з тверджень про дієтотерапію у хворих на хворобу Аддісона є вірним?**
- 596. Для лікування артеріальної гіпотензії у хворих з первинним гіпокортицизмом слід призначити:**
- 597. Ваша тактика у разі потреби хірургічного втручання у хворого з хронічною наднирковою недостатністю?**
- 598. Що не відноситься до ознак пердозування глюко - та мінералокортикоїдів у хворих з гіпокортицизмом:**
- 599. Яку з проб необхідно провести для діагностики первинного гіпокортицизму?**
- 600. Який із тестів є найбільш надійним для діагностики хвороби Аддісона?**
- 601. Для вторинного гіпокортицизму на відміну від первинного найбільш характерним є:**
- 602. В які години доби спостерігається найвищий рівень кортикостероїдів в крові?**
- 603. Що лежить в основі розвитку гіпотензивного стану при хворобі Аддісона?**

- 604. Для якого захворювання характерний симптом „брудних ліктів»?**
- 605. Яке дообстеження з нижче перерахованих слід провести хворому при підозрі первинної надниркової недостатності ?**
- 606. Для хвороби Аддісона характерні усі нижче перераховані симптоми, крім:**
- 607. Який із засобів є препаратом вибору при хворобі Аддісона?**
- 608. Які зміни найбільш характерні для первинної хронічної надниркової недостатності ?**
- 609. Який симптом характерний для первинної надниркової недостатності?**
- 610. Яка ознака притаманна наднирковій недостатності?**
- 611. Який симптом характерний для надниркової недостатності ?**
- 612. Який симптом характерний для первинної надниркової недостатності ?**
- 613. Яка ознака з перерахованих характерна для первинної надниркової недостатності ?**
- 614. Який прояв характерний для первинної надниркової недостатності?**
- 615. Найбільш часта причина гіперкортицизму:**
- 616. Яка з пухлин не приводить до розвитку гіперкортицизму?**
- 617. До найбільш частих причин ендогенного гіперкортицизму відноситься:**
- 618. Хворому з кушингоїдним виглядом і кровохарканням провели великий дексаметазоновий тест. Отримали незначне зниження рівня кортизолу. Найбільш ймовірним діагнозом у даного хворого є:**

619. Хворий К., 50 років, курець зі стажем, скаржиться на періодичне кровохаркання. При обстеженні виявлено диспластичне ожиріння, гіпертензію, підвищений рівень АКТГ. під час великого дексаметазонового тесту рівень кортизолу не змінився. Найбільш ймовірним діагнозом у даного хворого є:
620. Хворому з кушингоїдним виглядом і артеріальною гіпертензією було проведено великий дексаметазоновий тест. Рівень кортизолу знизився вдвічі. Про яке захворювання можна думати?
621. До диференціально - діагностичної відмінності між ектопічною АКТГ - продукуючою пухлиною та кортикостеромою слід віднести наявність:
622. До клінічних ознак синдрому Іценка - Кушинга не відносять:
623. У хворих на синдром Іценка - Кушинга не спостерігається:
624. Для первинного гіперкортицизму не є характерним:
625. Де локалізується патологічний процес у хворих з синдромом Іценка - Кушинга?
626. Де локалізується патологічний процес у хворих з хворобою Іценка - Кушинга?
627. Які із клінічних ознак не характерні для хромафіном?
628. До якої групи препаратів належить препарат фентоламін?
629. Які зміни шкіри характерні для хворого на феохромоцитому?
630. Які ефективні методи лікування феохромоцитоми Ви знаєте?
631. До клініко - лабораторних проявів феохромоцитомної кризи не відносяться:

632. З метою діагностики феохромоцитом в сечі визначають рівень:
633. Для діагностики феохромоцитом важливим є:
634. З метою топічної діагностики феохромоцитом використовують радіоізотопне сканування з:
635. Яка з ознак не характерна для феохромоцитом?
636. Для феохромоцитом не є характерним:
637. У хворого 36 років :має місце пароксизмальне підвищення артеріального тиску до 210/120 мм рт.ст. Яка з ознак може свідчити та користь феохромоцитом?
638. Яка з ознак не характерна для артеріальної гіпертензії при феохромоцитомі?
639. Характерна картина оксісупраренограми при хворобі Іценка -Кушинга:
640. Вкажіть ранні лабораторні ознаки системного остеопорозу у хворих з легкою формою хвороби Іценка- Кушинга:
641. Кращим тестом для діагностики синдрому Кушинга є:
642. Для якого із зазначених захворювань найбільш характерний значно підвищений рівень кортикотропіну в плазмі крові?
643. До проявів синдрому Іценка-Кушинга належить усе перераховане, крім:
644. Для первинного гіперальдостеронізму характерно:
645. Найбільш частою причиною первинного гіперальдостеронізму є:

646. Поставте попередній діагноз хворому 25 - років з артеріальною гіпертензією, у якого при обстеженні виявлено: рівень натрію - 145 ммоль/л, калію - 1,8 ммоль/л
647. Яке з тверджень про синдром Конна є невірним?
648. Первинний гіперальдостеронізм не характеризується:
649. Для первинного гіперальдостеронізму не є характерним:
650. Які зміни не характерні для первинного гіперальдостеронізму?
651. Для синдрому Конна не характерно:
652. У хворих на первинний гіперальдостеронізм не спостерігається:
653. Первинний гіперальдостеронізм сприяє:
654. Для синдрому Кона не характерна:
655. До діагностичних критеріїв первинного гіперальдостеронізму не входить:
656. При надлишку альдостерону спостерігається:
657. У хворих з первинним гіперальдостеронізмом не спостерігається:
658. Для первинного гіперальдостеронізму не характерно:
659. Із приведених клінічних ознак синдрому Конна не є характерною:
660. Яка з форм адреногенітального синдрому (природжена гіперплазія кори надниркових залоз) зустрічається найбільш часто?
661. Які форми відносяться до адреногенітального синдрому (природжена гіперплазія кори надниркових залоз) з дефіцитом 21 - гідроксилази?

- 662. Яка з пухлин не відноситься до гормонально активних пухлин кори надниркових залоз?**
- 663. Яка з пухлин не відноситься до гормонально активних пухлин кори надниркових залоз?**
- 664. Яка з пухлин відноситься до гормонально активних пухлин мозкового шару надниркових залоз?**
- 665. Яка з пухлин секретує переважно андрогени?**
- 666. Яка з пухлин продукує мінералокортикоїди?**
- 667. Яка з пухлин секретує естрогени?**
- 668. Яка з пухлин секретує адреналін?**
- 669. Яка з пухлин секретує норадреналін?**
- 670. Яка з пухлин секретує переважно глюкокортикоїди?**
- 671. Яка з пухлин проявляється типовим симптомокомплексом гіперкортицизму?**
- 672. Яка з пухлин проявляється вірильним синдромом?**
- 673. Фемінізуючи пухлина надниркових залоз це:**
- 674. Первинний гіперальдостеронізм спричиняє:**
- 675. У вагітної діагностовано феохромоцитому. Яке лікування найбільш доцільне:**
- 676. У діагностиці феохромоцитоми найбільш доцільним є:**
- 677. Найбільш частою причиною АКТГ – продукуючої ектопічної пухлини є:**