

ЗАВАНТАЖЕНО З САЙТУ ТЕСТУВАННЯ.УКР

Лікарська рецептура. Фармакологія засобів, що впливають на нервову систему

Категорія: **Фармакологія**

Кількість запитань: **1146**

1. Що означає рецептурне скорочення sol.?
2. Що означає рецептурне скорочення ас.?
3. Що означає скорочення аа?
4. Що таке лікарський збір?
5. Що таке лікарські збори?
6. Що таке рецепт?
7. Якими з перерахованих нижче властивостей не володіє пірацетам?
8. В якому співвідношенні беруть сировину й воду при виготовленні відварів?
9. Виберіть тверду лікарську форму для внутрішнього та зовнішнього використання, до складу якої входять сухі, сипучі, рівномірно подрібнені речовини?
10. Який відсоток преднізолонової мазі, в 50 грамах якої міститься 0,5 грама преднізолону?
11. В якому діапазоні може коливатись маса дозованих порошків рослинного походження для внутрішнього використання?
12. Вкажіть ступені подрібнення порошків , що наведені в ДФУ:
13. Який відсоток від загального об'єму мікстури може становити сироп?
14. В яких випадках до пасти додається порошкоподібний конституенс?
15. В яких межах коливається маса вагінальних свічок?
16. В яких межах коливається маса ректальних свічок?

17. В якому діапазоні може коливатись маса дозованих порошків синтетичного походження для внутрішнього використання?
18. В якому діапазоні може коливатись маса недозованих порошків?
19. Вкажіть лікарський засіб, виписування, відпуск, облік, зберігання і контроль за використанням якого відбувається по особливим правилам безпеки і включений в Список А (Venena) згідно вимог фармакопеї:
20. Вкажіть масу дозованого порошку для внутрішнього вживання:
21. Вкажіть тверду лікарську форму для внутрішнього та зовнішнього використання, до складу якої входять сухі, сипучі, рівномірно подрібнені речовини?
22. Вкажіть у якому співвідношенні фармацевт повинен приготувати мазеву основу для приготування очної мазі на вазелін-ланоліновій основі.
23. Вкажіть формоутворюючу речовину для виготовлення супозиторіїв?
24. Вказати формоутворюючі речовини для ректальних свічок
25. Розчини для інекцій готують на:
26. Вказати скільки відсотків слизового вивару необхідно додати до мікстури, якщо до складу входить речовина з вираженими подразнюючими властивостями.
27. До аптеки звернувся пацієнт, якому потрібно приготувати камфорну мазь. Якої концентрації мазь повинен приготувати фармацевт , керуючись вимогами нормативних документів?
28. До яких лікарських форм належать лініменти?

29. До якої лікарської форми відносять драже?
30. До якої лікарської форми відносять емульсії?
31. До якої лікарської форми відносять збір?
32. До якої лікарської форми відносять мазі?
33. До якої лікарської форми відносять новогаленові препарати?
34. До якої лікарської форми відносять пасту?
35. До якої лікарської форми відносять порошки?
36. До якої лікарської форми відносять присипку?
37. До якої лікарської форми відносять супозиторії?
38. До якої лікарської форми відносять таблетки?
39. З яких частин рослин готують відвари?
40. З яких частин рослин готують настої?
41. Лікарські речовини, які мають неприємний смак, запах, шкідливо впливають на зуби або мають подразнюючу дію виписують у:
42. Лікарські форми для ін'єкцій повинні бути:
43. Лінімент - це:
44. На відміну від розчинів для зовнішнього використання розчини для ін'єкцій готують на:

45. На рецептурному бланку якої форми виписують наркотичні лікарські засоби у чистому вигляді або в суміші з індиферентними речовинами
46. Назвіть рідкі лікарські форми, які дозуються ложками
47. Назвіть наповнювач для дозованих порошків
48. Назвіть наповнювач для недозованих порошків (присипок)
49. Настоя з блювотного кореня готують з розрахунку:
50. Настоя з трави мишатника готують з розрахунку:
51. Паста - це:
52. Позначте лікарські форми, які готуються в аптеці за рецептом лікаря
53. Позначте масу дозованого порошку для внутрішнього вживання:
54. Позначте тверду лікарську форму, яку отримують шляхом пресування лікарських речовин або лікарських та допоміжних речовин і переважно призначають всередину.
55. При якій патології віддають перевагу аерозолям?
56. Розчини для ін'єкцій готують на:
57. У розчинах для ін'єкцій використовують:
58. У якій лікарській формі виписують лікарські речовини, які мають неприємний смак, запах, шкідливо впливають на зуби або мають подразнюючу дію?

59. У якій лікарській формі виписують лікарські речовини, які мають неприємний смак, запах, шкідливо впливають на зуби або мають подразнюючу дію?
60. Фармацевтичне підприємство виготовляє порошки різного призначення. Вкажіть ступені подрібнення порошоків , що наведені в ДФУ:
61. Форма випуску лікарських засобів, яка найкращим чином відповідає меті застосування і найбільш вигідна для використання з лікувальною і профілактичною метою?
62. Що таке лікарський збір?
63. Що таке лікарські збори?
64. Як основу при виготовленні лініментів використовують
65. Як основу при виготовленні мазей використовують
66. ? Як називається лікарський засіб після відповідної технологічної обробки у відповідності з правилами фармації?
67. Як називається форма випуску лікарських засобів, яка найкращим чином відповідає меті застосування і найбільш вигідна для використання з лікувальною і профілактичною метою?
68. Як називається частина рецепта, що йде після позначення “Rp”.?
69. Як називаються лікарські форми, які готуються в аптеці за рецептом лікаря
70. Яка маса очної мазі:
71. Яка маса очної мазі:

- 72. Який відсоток преднізолонової мазі, в 100 грамах якої міститься 0,5 грама преднізолону?**
- 73. Який відсоток слизового вивару необхідно додати до мікстури, якщо до складу входить речовина з вираженими подразнюючими властивостями.**
- 74. Який емульгатор застосовують при виготовленні масляних емульсій:**
- 75. Який з перерахованих препаратів належить до наркотичних лікарських засобів, які виписуються на рецептурних бланках форми №3**
- 76. Який нормативно-технологічний документ встановлює вимоги до лікарського засобу, його упаковки, умов і терміну зберігання та методів контролю його якості?**
- 77. Який правовий акт містить загальні вимоги до лікарських засобів, фармакопейні статті, а також методики контролю (фізико-хімічні, хімічні, біологічні) якості лікарських засобів?**
- 78. Яким терміном позначається необхідність негайного відпуску хворому ліків**
- 79. Які бланки використовуються для виписування лікарських засобів і виробів медичного призначення для потреб лікувально-профілактичних установ:**
- 80. Які лікарські форми призначаються краплями всередину?**
- 81. Які препарати виготовляють як стійкі витяжки з рослинної сировини максимально очищені від баластних речовин**
- 82. Які препарати отримують шляхом простої витяжки з рослинної сировини за допомогою води, спирту або ефіру? Вони містять діючі баластні речовини.**
- 83. Які речовини використовують в якості формоутворюючої речовини для виготовлення супозиторіїв?**

84. Які розчинники використовуються в розчинах для ін'єкцій?
85. Яку кількість олії взяв фармацевт ,для приготував 150,0 емульсії.,якщо лікар не зазначив в рецепті
86. Яку назву отримав лікарський засіб, що відновлює порушену функцію?
87. Яку речовину використовують для виготовлення мазей поверхневої дії?
88. Яку речовину використовують для виготовлення стійких мазей, що можуть зберігатися тривалий час?
89. Яку форму мають ректальні свічки?
90. Вкажіть формоутворюючу речовину для ректальних свічок
91. Вкажіть, який відсоток від загального об'єму мікстури може становити сироп
92. Вкажіть, в якому співвідношенні беруть сировину й воду при виготовленні настоїв із сильнодіючих рослин?
93. Вкажіть, до якої лікарської форми відносять таблетки
94. Вкажіть, до якої лікарської форми відносять порошки
95. Вкажіть, до якої лікарської форми відносять присипку
96. Вкажіть, до якої лікарської форми відносять супозиторії
97. Вкажіть, до якої лікарської форми відносять збір.
98. Вкажіть, до якої лікарської форми відносять мазі.
99. Вкажіть, до якої лікарської форми відносять настоянки.

100. Вкажіть, до якої лікарської форми відносять новогаленові препарати
101. Вкажіть, до якої лікарської форми відносять пасту
102. Вкажіть, до якої лікарської форми належать мікстури.
103. Вкажіть, скільки відсотків слизового вивару необхідно додати до мікстури, якщо до складу входить речовина з вираженими подразнюючими властивостями.
104. Вказати назву лікарських форм, які готуються в аптеці за рецептом лікаря
105. Вказати назву частини рецепта, що йде після позначення “Rp”.
106. Вкажіть, який відсоток слизового вивару необхідно додати до мікстури, якщо до складу входить речовина з вираженими подразнюючими властивостями.
107. Вказати термін, яким позначається необхідність негайного відпуску хворому ліків
108. Вказати, яку форму мають ректальні свічки
109. До якої лікарської форми відносять мікстури?
110. До якої лікарської форми відносять настоянки?
111. З метою поліпшення смаку, запаху мікстури додають інші речовини корегуючої дії. Здебільшого це сиропи. Який відсоток від загального об'єму мікстури може становити сироп?
112. Зазначити, в якому співвідношенні беруть сировину й воду при виготовленні відварів?

113. Зазначити, скільки відсотків слизового вивару необхідно додати до мікстури, якщо до складу входить речовина з вираженими подразнюючими властивостями.
114. Зазначте тверду лікарську форму, яку отримують шляхом пресування лікарських речовин або лікарських та допоміжних речовин і переважно призначають всередину.
115. Зазначте, в якому співвідношенні беруть сировину й воду при виготовленні настоїв із сильнодіючих рослин?
116. Зазначте, до якої лікарської форми відносять драже.
117. Зазначте, до якої лікарської форми відносять емульсії.
118. Зазначте, до якої лікарської форми відносять лініменти.
119. Зазначте, з яких частин рослин готують вивари.
120. Зазначте, з яких частин рослин готують настої.
121. Зазначте, лікарський засіб, виписування, відпуск, облік, зберігання і контроль за використанням якого відбувається по особливим правилам безпеки і включений в Список А (Venena) згідно вимог фармакопеї:
122. В розчинах для ін'єкцій використовують:
123. Магістральні форми виготовляють в
124. Розчини для ін'єкцій, на відміну від розчинів для зовнішнього використання, готують на:
125. На якому рецептурному бланку виписують наркотичні лікарські засоби у чистому вигляді або в суміші з індиферентними речовинами

126. Назвати емульгатор застосовують при виготовленні масляних емульсій:

127. Назвати наповнювачі для дозованих порошків:

128. Назвіть рідкі лікарські форми, які дозуються ложками

129. Назвіть наповнювач для дозованих порошків

130. Назвіть наповнювач для недозованих порошків (присипок)

131. Назвіть тверду лікарську форму для внутрішнього та зовнішнього використання, до складу якої входять сухі, сипучі, рівномірно подрібнені речовини?

132. Називати форму випуску лікарських засобів, яка найкращим чином відповідає меті застосування і найбільш вигідна для використання з лікувальною і профілактичною метою

133. Паста - це:

134. Позначте тверду лікарську форму, яку отримують шляхом пресування лікарських речовин або лікарських та допоміжних речовин і переважно призначають всередину.

135. При захворюванні яких органів надають перевагу аерозолям?

136. При якій патології віддають перевагу аерозолям

137. Розчини для ін'єкцій готують на:

138. У розчинах для ін'єкцій використовують:

- 139. У якій лікарській формі виписують лікарські речовини, які мають неприємний смак, запах, шкідливо впливають на зуби або мають подразнюючу дію?**
- 140. Що використовують для виготовлення мазей поверхневої дії?**
- 141. Що використовують для виготовлення стійких мазей, що можуть зберігатися тривалий час?**
- 142. Що використовують як основу при виготовленні мазей**
- 143. Що означає рецептурне скорочення aq.?**
- 144. Що означає рецептурне скорочення but.?**
- 145. Що означає рецептурне скорочення D.?**
- 146. Що означає рецептурне скорочення dil.?**
- 147. Що означає рецептурне скорочення Inf.?**
- 148. Що означає рецептурне скорочення N.?**
- 149. Що означає рецептурне скорочення P. aeq.?**
- 150. Що означає рецептурне скорочення pil.?**
- 151. Що означає рецептурне скорочення pulv.?**
- 152. Що означає рецептурне скорочення rhiz.?**
- 153. Що означає рецептурне скорочення S.?**
- 154. Ректальні супозиторії, якщо в рецепті не вказана маса , виготовляють масою:**

155. Фармацевт приготував 150,0 емульсії. Вкажіть яку кількість олії він взяв ,якщо лікар не зазначив в рецепті
156. Вагінальні супозиторії якщо в рецепті не вказана маса, виготовляють масою:
157. Для поліпшення смаку, запаху мікстури додають інші речовини коригуючої дії. Здебільшого це сиропи. Який відсоток від загального об'єму мікстури може становити сироп?
158. Кількість індиферентного порошку, який треба взяти при виготовленні пасти, не повинна бути меншою ніж:
159. Якщо до складу мікстури входять настій , вивар, емульсія в рецепті їх пишуть:
160. Якщо немає інших вказівок розчинником при виготовленні мікстур беруть:
161. Як основу при виготовленні лініментів використовують
162. Як можна називати лікарський засіб після відповідної технологічної обробки у відповідності з правилами фармації
163. Як називається лікарський засіб після відповідної технологічної обробки у відповідності з правилами фармації?
164. Як називається форма випуску лікарських засобів, яка найкращим чином відповідає меті застосування і найбільш вигідна для використання з лікувальною і профілактичною метою?
165. Як називається частина рецепта, що йде після позначення “Rp”.?
166. Як називаються лікарські форми, які готуються в аптеці за рецептом лікаря

- 167. Як правильно позначити у рецепті, що пацієнту на 1 прийом потрібно двадцять міліграм порошку?**
- 168. Як правильно позначити у рецепті, що пацієнту потрібно сто грам присипки?**
- 169. Як правильно позначити у рецепті, що пацієнту на 1 прийом потрібно сто міліграм порошку?**
- 170. Як у рецепті зазначити, що необхідно додати у мікстуру 20 крапель настоянки?**
- 171. Яка кількість крапель міститься в одному мілілітрі олійного розчину ?**
- 172. Яка маса очної мазі:**
- 173. Який відсоток від загального об'єму мікстури може становити сироп?**
- 174. Який відсоток преднізолонової мазі, в 100 грамах якої міститься 0,5 грама преднізолону?**
- 175. Який емульгатор застосовують при виготовленні масляних емульсій:**
- 176. Який з перерахованих препаратів є новогаленовим**
- 177. Який з перерахованих препаратів належить до наркотичних лікарських засобів, які виписуються на рецептурних бланках форми №3**
- 178. Який нормативно-технологічний документ встановлює вимоги до лікарського засобу, його упаковки, умов і терміну зберігання та методів контролю його якості?**

179. Який правовий акт містить загальні вимоги до лікарських засобів, фармакопейні статті, а також методики контролю (фізико-хімічні, хімічні, біологічні) якості лікарських засобів?
180. Яким терміном позначається необхідність негайного відпуску хворому ліків
181. Які мазі бувають за місцем виготовлення?
182. Які мови використовують при виписуванні рецептів?
183. Які препарати виготовляють як стійкі витяжки з рослинної сировини максимально очищені від баластних речовин
184. Які препарати отримують шляхом простої витяжки з рослинної сировини за допомогою води, спирту або ефіру? Вони містять діючі баластні речовини.
185. Які речовини використовують в якості формоутворюючої речовини для виготовлення супозиторіїв?
186. Які розчинники використовуються в розчинах для ін.'єкцій?
187. Якою мовою пишуть сігнатуру?
188. Якою цифрою зазначено *Invocatio*?
189. Яку кількість індиферентного порошку треба взяти при виготовленні пасти (не повинна бути більшою ніж):
190. Яку назву отримав лікарський засіб, що відновлює порушену функцію?
191. Яку речовину використовують для виготовлення стійких мазей, що можуть зберігатися тривалий час?
192. Яку форму мають ректальні свічки?

- 193. Лікар виписав песарії і не вказав їх масу. Якої маси песарії необхідно приготувати в аптеці?**
- 194. Лікар виписав сірчану мазь від корости . Зазначте основи , які необхідно використати для приготування її в аптеці?**
- 195. При якій патології віддають перевагу аерозолям?**
- 196. У якій лікарській формі виписують лікарські речовини, які мають неприємний смак, запах, шкідливо впливають на зуби або мають подразнюючу дію?**
- 197. Що таке лікарський збір?**
- 198. Що таке лікарські збори?**
- 199. Як основу при виготовленні лініментів використовують**
- 200. Як основу при виготовленні мазей використовують**
- 201. Як називається лікарський засіб після відповідної технологічної обробки у відповідності з правилами фармації?**
- 202. Як називається частина рецепта, що йде після позначення “Rp”.?**
- 203. Як називаються лікарські форми, які готуються в аптеці за рецептом лікаря**
- 204. Яка маса очної мазі:**
- 205. Яку назву отримав лікарський засіб, що відновлює порушену функцію?**
- 206. Вказати показання до застосування розчину аміаку**
- 207. Вказати, 0,5 % розчин якого препарату використовують для промивання шлунка при отруєннях солями важких металів і алкалоїдами.**

- 208. При якому гострому отруєнні танін є засобом вибору для промивання шлунка?**
- 209. Який препарат належить до групи речовин подразнюючої дії?**
- 210. Вказати засіб для анестезії ротоглотки**
- 211. Указати препарат, який використовується при отруєннях і метеоризмі.**
- 212. Чому при наявності алергічної реакції на новокаїн не можна використовувати всі лікарські препарати, які є похідними параамінобензойної кислоти?**
- 213. Чому розчин таніну є засобом вибору для промивання шлунка при отруєнні солями важких металів?**
- 214. Яке показання до застосування лідокаїну?**
- 215. Атропіну сульфат абсолютно протипоказаний при:**
- 216. В результаті впливу на які елементи слизових оболонок та пошкоджених ділянок шкіри розвивається термінальна анестезія при застосуванні місцевих анестетиків?**
- 217. В якості антагоністів міорелаксантів антидеполяризуючої дії (тубокурарину хлориду) використовують:**
- 218. В'яжучий засіб рослинного походження**
- 219. Вибрати препарат для лікування хворого на глаукому:**
- 220. Відмітьте показання до застосування М - холіноміметиків**
- 221. Вкажіть групу засобів, які безпосередньо збуджують М- холінорецептори**

- 222. Вкажіть М,Н - холіноміметик прямої дії**
- 223. Вказати в'яжучий засіб рослинного походження**
- 224. Вказати адсорбуючий засіб при харчовому отруєнні**
- 225. Вказати анестетик для поверхневої анестезії у порошках і таблетках**
- 226. Вказати в'яжучий засіб в мазі**
- 227. Вказати в'яжучий засіб неорганічного походження (сіль важкого металу)**
- 228. Вказати в'яжучий засіб, який використовують при виразках і тріщинах шкіри**
- 229. Вказати засіб для анестезії рогівки**
- 230. Вказати засіб для анестезії ротоглотки**
- 231. Вказати засіб для інфільтраційної анестезії**
- 232. Вказати засіб для поверхневої (термінальної) анестезії у розчині**
- 233. Вказати засіб, що «екранує» слизову оболонку і перешкоджає всмоктуванню отрути при гострому отруєнні**
- 234. Вказати засіб, що використовується для всіх видів анестезії.**
- 235. Вказати засіб, що обволікає поверхню слизової оболонки шлунково-кишкового тракту**
- 236. Вказати засіб, що поглинає гази і токсини в просвіті травного тракту**
- 237. Вказати засіб, що подразнює рецептори слизової оболонки носа**

238. Вказати місцевий анестетик у мазі
239. Вказати місцевий анестетик у ректальних супозиторіях
240. Вказати обволікаючий засіб для застосування всередину при колітах
241. Вказати подразнювальний засіб при непритомності
242. Вказати показання до застосування анестезину
243. Вказати показання до застосування дикаїну
244. До складу препарату “Аерон” входять:
245. Загальними показами для застосування М-холіноміметиків і антихолінестеразних засобів можуть бути
246. Засіб з групи антихолінестеразних, що проникає через ГЕБ
247. Засіб з групи М - холіноблокаторів, що не проникає через ГЕБ
248. Лікар призначив пацієнту мазь “Ефкамон”, яка за механізмом дії належить до подразливих речовин. При яких станах ця мазь є протипоказаною?
249. М-холіноміметіки використовуються при:
250. На третій день після резекції шлунка виникла атонія кишечника. Який із препаратів необхідно застосувати?
251. Назвати показання до застосування атропіну.
252. Назвіть подразнювальну речовину, яка є діючою частиною препарату валідолу, при місцевому застосуванні звужує судини слизових оболонок, а рефлекторно розширює коронарні судини?

253. Препарати групи симпатолітиків застосовують для лікування

254. При видаленні зуба для знеболювання використовують розчин новокаїну. З якою метою його вводять не у ясна біля зуба, а у ділянку проходження чутливого нерва?

255. При закапуванні в око дія атропіну сульфату продовжується

256. При застосуванні антихолінестеразних засобів виникають наступні ефекти

257. При отруєнні грибами-мухоморами за антидот використовують атропін. Який із перелічених механізмів властивий атропіну, що призводить до знешкодження грибної отрути - мускарину?

258. При отруєнні ФОС (фосфорорганічними сполуками) специфічним антагоністом є:

259. При нападі ниркової коліки який препарат з вказаних необхідно призначити?

260. Розчин новокаїну якої концентрації необхідно вводити при проведенні інфільтраційної анестезії?

261. Який засіб належить до М-холіноміметиків?

262. Який засіб, що спричиняє міоз, збереже свою дію у тварини з денервованими гладенькими м'язами райдужки?

263. Який препарат в'язучої дії є засобом вибору для промивання шлунка при отруєнні солями важких металів?

264. Який препарат можна використати для провідникової анестезії при екстракції зуба?

- 265. Атропіну сульфат абсолютно протипоказаний при:**
- 266. Визначте препарат: міорелаксант короткої дії, введення антихолінестеразних препаратів пролонгує його дію**
- 267. Виразкова хвороба, гіпертонічний криз, облітеруючий ендартеріт є показами до застосування такого препарату, як:**
- 268. Відмітьте показання до застосування М - холіноміметиків**
- 269. Вкажіть групу засобів, які безпосередньо збуджують М- холінорецептори**
- 270. Вкажіть групу засобів, які опосередковано збуджують М- і Н- холінорецептори**
- 271. Вкажіть М,Н - холіноміметик прямої дії**
- 272. Вкажіть препарат (курареподібний засіб), антагоністом якого є прозерин**
- 273. Вказати в'яжучий засіб рослинного походження**
- 274. Вказати адсорбуючий засіб при харчовому отруєнні**
- 275. Вказати анестетик для поверхневої анестезії у порошках і таблетках**
- 276. Вказати в'яжучий засіб в мазі**
- 277. Вказати в'яжучий засіб неорганічного походження (сіль важкого металу)**
- 278. Вказати в'яжучий засіб, який використовують при виразках і тріщинах шкіри**
- 279. Вказати засіб для анестезії рогівки**
- 280. Вказати засіб для анестезії ротоглотки**

- 281. Вказати засіб для інфільтраційної анестезії**
- 282. Вказати засіб для поверхневої (термінальної) анестезії у розчині**
- 283. Вказати засіб, що «екранує» слизову оболонку і перешкоджає всмоктуванню отрути при гострому отруєнні**
- 284. Вказати засіб, що використовується для всіх видів анестезії.**
- 285. Вказати засіб, що обволікає поверхню слизової оболонки шлунково-кишкового тракту**
- 286. Вказати засіб, що поглинає гази і токсини в просвіті травного тракту**
- 287. Вказати засіб, що подразнює рецептори слизової оболонки носа**
- 288. Вказати м-холіноблокатор - четвертинний амоній**
- 289. Вказати м-холіноблокатор рослинного походження, який поступається за активністю атропіну**
- 290. Вказати м-холіноблокатор синтетичного походження**
- 291. Вказати м-холіноблокатор, який погано проникає через гематоенцефалічний бар'єр і діє периферично**
- 292. Вказати місцевий анестетик у мазі**
- 293. Вказати місцевий анестетик у ректальних супозиторіях**
- 294. Вказати обволікаючий засіб для застосування всередину при колітах**
- 295. Вказати подразнювальний засіб при неприємності**
- 296. Вказати показання до застосування анестезину**

297. Вказати показання до застосування вісмуту нітрату основного у вигляді мазі.
298. Вказати показання до застосування дикаїну
299. Вказати показання до застосування розчину аміаку
300. Вказати, 0,5 % розчин якого препарату використовують для промивання шлунка при отруєннях солями важких металів і алкалоїдами.
301. Для зниження артеріального тиску можна використати:
302. Для керованої гіпотонії використовують
303. До якої групи засобів належить атропіну сульфат ?
304. З якою метою використовують скополаміну гідробромід ?
305. Засіб з групи антихолінестеразних, що проникає через ГЕБ
306. Засіб з групи М - холіноблокаторів, що не проникає через ГЕБ
307. Механізм дії дитиліну
308. Місцевоанестезуючий засіб лідокаїн проявляє також таку дію
309. Назвати показання до застосування атропіну.
310. Назвіть подразнювальну речовину, яка є діючою частиною препарату валідолу, при місцевому застосуванні звужує судини слизових оболонок, а рефлекторно розширює коронарні судини?
311. Порекомендуйте місцевий анестетик для проведення інфільтраційної анестезії пацієнту з алергічною реакцією на новокаїн в анамнезі.

- 312. Препарати якої групи здатні викликати спазм акомодациї ?**
- 313. При закапуванні в око дія атропіну сульфату продовжується**
- 314. При застосуванні антихолінестеразних засобів виникають наступні ефекти**
- 315. При застосуванні якої групи засобів виникає параліч акомодациї?**
- 316. При отруєнні ФОС (фосфорорганічними сполуками) специфічним антагоністом є:**
- 317. При якому гострому отруєнні танін є засобом вибору для промивання шлунка?**
- 318. Розчин новокаїну якої концентрації необхідно вводити при проведенні інфільтраційної анестезії?**
- 319. Що доцільно ввести до складу комплексної терапії при гострому отруєнні фосфорорганічними сполуками?**
- 320. Як можна попередити гостре отруєння місцевоанестезуючим засобом (внаслідок швидкого всмоктування з місця ін'єкції) при його використанні для інфільтраційної анестезії?**
- 321. Яке показання до застосування лідокаїну?**
- 322. Який засіб належить до М-холіноблокаторів ?**
- 323. Який засіб належить до М-холіноміметиків ?**
- 324. Який препарат в'язучої дії є засобом вибору для промивання шлунка при отруєнні солями важких металів?**

- 325. Який препарат використовують для розширення зіниці з метою дослідження очного дна ?**
- 326. Який препарат можна використати для провідникової анестезії при екстракції зуба?**
- 327. Який препарат належить до групи речовин подразнюючої дії?**
- 328. Які показання до застосування гірчичників?**
- 329. Яку з перерахованих груп речовин використовують при виразковій хворобі шлунка і 12-палої кишки ?**
- 330. В чому полягає механізм дії М-холіноміметиків?**
- 331. Чому розчин таніну є засобом вибору для промивання шлунка при отруєнні солями важких металів?**
- 332. В якості антагоністів міорелаксантів антидеполяризуючої дії (тубокурарину хлориду) використовують:**
- 333. Вкажіть групу засобів, які безпосередньо збуджують М- холінорецептори**
- 334. Вкажіть препарат, що одночасно володіє альфа- і бета- адреноблокуючою активністю:**
- 335. Гіпотензивна дія клофеліну пов'язана з :**
- 336. Гіпотензивний ефект бета-адреноблокаторів включає всі компоненти, окрім:**
- 337. Для зменшення втрати крові при проведенні операції на печінці необхідно викликати штучну гіпотонію. Вибрати препарат:**

338. Для корекції артеріального тиску при колаптоїдному стані хворому було введено мезатон. Який механізм дії даного

339. З якою метою застосовують головним чином гангліоблокатори?

340. На третій день після резекції шлунка виникла атонія кишечника. Який із препаратів необхідно застосувати?

341. Який з гіпотензивних препаратів може бути рекомендований хворим з феохромоцитомою для нормалізації АТ?

342. Який з препаратів бета-адреноблокаторів не може бути застосований для лікування ішемічної хвороби серця у пацієнта, що одночасно страждає на бронхіальну астму?

343. Який з препаратів бета-адреноблокаторів не може бути застосований для лікування ішемічної хвороби серця у пацієнта, що одночасно страждає на бронхіальну астму?

344. Які ефекти пов'язані із збудженням бета₁ - адренорецепторів?

345. В пацієнта гостра судинна недостатність у результаті передозування резерпіну. Яким із засобів можна її усунути?

346. Для полегшення вправлення вивиху в плечовому суглобі з ціллю розслаблення м'язів хворому був введений міорелаксант дитилін. При цьому напустило "апноє". Що необхідно ввести

347. Для вправлення вивиху в плечовому суглобі для розслаблення м'язів хворому був введений міорелаксант дитилін. При цьому настало "апноє". Що необхідно ввести ?

348. Для дослідження очного дна необхідно розширити зіницю. Вкажіть речовину, яка викликає такий ефект:

349. Для зменшення втрати крові при проведенні операції на печінці необхідно викликати штучну гіпотонію. Вибрати препарат;

350. Для зменшення втрати крові при проведенні операції на печінці необхідно здійснити керовану гіпотонію. Виберіть необхідний препарат:

351. Для корекції артеріального тиску при колаптоїдному стані хворому було введено мезатон. Який механізм дії даного

352. Для купірування гіпертонічного кризу лікар призначив клофелін. До якої групи за механізмом дії відноситься зазначений лікарський засіб?

353. Для лікування хвороби Паркінсона лікар призначив циклодол. Який механізм дії препарату?

354. До курареподібних речовин належить

355. До лікарні швидкої допомоги доставили чоловіка з явищами колапсу. Для боротьби з гіпотензією лікар вибрав норадреналін. Який механізм дії цього препарату?

356. До лікаря звернувся пацієнт з проханням замінити відсутній на даний момент в аптеці бронхолітик ізадрин на найбільш близький за дією препарат. Який з наведених нижче засобів можна рекомендувати хворому?

357. До лікаря звернувся пацієнт з проханням замінити відсутній на даний момент в аптеці бронхолітик ізадрин на найбільш близький за дією препарат. Який з наведених нижче засобів можна рекомендувати хворому?

358. Жінці 36 років, що страждає на ішемічну хворобу серця, лікар спочатку призначив анаприлін. Яке з'ясувавши наявність супутнього захворювання він вирішив замінити цей засіб атенололом. Яке захворювання призвело до відмови від анаприліну?

359. Жінці, яка страждає на ішемічну хворобу серця, лікар спочатку призначив анаприлін. Але, з'ясувавши наявність супутнього захворювання, він змінив його атенололом. Яке захворювання є протипоказанням для призначення анаприліну?

360. Назвати показання до застосування нафтизину

361. Офтальмолог з діагностичною метою (розширення зіниць для огляду очного дна) використав 1 % розчин мезатону. Мідріаз, викликаний препаратом, обумовлений:

362. Пацієнту для зняття гіпертонічної кризи ввели розчин пентаміну. Який механізм дії препарату?

363. Пацієнту з гіпертонічним кризом гіпертонічним кризом був введений гангліоблокатор бензогексоній. Яких явищ слід остерігатися після введення препарату?

364. Який нейролептик застосовують для лікування виразкової хвороби?

365. Під час оперативного втручання після введення гігронію різко знизився артеріальний тиск. Засоби яких груп лікарських препаратів можуть нормалізувати артеріальний тиск?

366. Під час прийому у стоматолога в пацієнта виникла різка гіпотензія. Який із препаратів, що стимулює адренергічну іннервацію, Ви запропонуєте використати для нормалізації артеріального тиску?

367. Після введення анальгіну у хворого почалася гостра алергічна реакція, задуха, біль за грудиною. Пульс зник, припинилися серцеві скорочення. Які засоби фармакологічної допомоги слід застосувати в першу чергу?

- 368. Після введення лікарського засобу у хворого почалися гостра алергічна реакція, задуха, болі за грудниною. Пульс зник, серцеві скорочення припинилися. Які засоби фармакологічної допомоги слід застосувати в першу чергу?**
- 369. Після декількох днів застосування препарату для профілактики нападів бронхіальної астми у пацієнта порушився сон. Який з препаратів є вірогідною причиною цього ускладнення?**
- 370. По завершенню операції з приводу репозиції перелому стегна з використанням тубокурарину самотійне дихання не відновилося. Що треба ввести хворому для зняття міорелаксації?**
- 371. Порекомендуйте хворому, який судинозвужувальний препарат можна застосувати для лікування нежиті?**
- 372. Препарат “Аерон” проявляє активність при морській та повітряній хворобі за рахунок наявності у його складі:**
- 373. Препарати з групи α -адреноблокаторів застосовують для лікування:**
- 374. При відсутності в аптеці фенотеролу (беротек) в інгаляціях яким препаратом із групи бронхоселективних бета-2-адреноміметиків можна його замінити?**
- 375. При відсутності в аптеці фенотеролу (беротеку) яким препаратом з групи бронхоселективних бета-2-адреноміметиків можна його замінити?**
- 376. При комбінованому наркозі у хворого як міорелаксant застосовано тубокурарину хлорид. Який засіб - антагоніст міорелаксантів антидеполяризуючого типу дії - слід ввести хворому для відновлення самотійного дихання після закінчення оперативного втручання?**
- 377. При отруєнні фосфорорганічними сполуками використовують:**

378. При проведенні анестезії лікар передозував тубокурарину хлорид. Хворому призначили прозерин. Який механізм дії цього препарату?

379. При проведенні операції лікар-анестезіолог передозував дозу тубокурарину хлориду. Хворому призначили прозерин. На чому заснована дія цього препарату?

380. Стимуляція бета-адренорецепторів приводить до:

381. У пацієнта виник колаптоїдний стан через зниження тону периферичних судин. Який препарат найефективніший в цій ситуації?

382. У пацієнта виник колаптоїдний стан. Який лікарський засіб показаний для усунення цього стану?

383. У пацієнта напади бронхіальної астми виникають переважно вночі, супроводжуються брадикардією, спастичними болями у кишечнику, поносом. Препарати якої групи можуть усунути ці симптоми?

384. У пацієнта під час відвідування стоматолога виникла різка гіпотензія. Який із препаратів, що стимулює адренергічну іннервацію, ви запропонуєте використати для нормалізації артеріального тиску?

385. У пацієнта під час відвідування стоматолога виникла різка гіпотензія. Який із препаратів, що стимулює адренергічні синапси, ви запропонуєте використати для нормалізації артеріального тиску?

386. У пацієнта, якому під час оперативного втручання застосували міорелаксant - дитилін, розслаблення скелетних м'язів і пригнічення дихання продовжувалось більше 2 годин. Відсутність якого ферменту в сироватці крові зумовлює це?

- 387. У пацієнтки, яка перенесла операцію на нирці, після наркозу з`явилися явища рекурарезації і зупинилось дихання. Як міорелаксанти під час операції був використаний дитилін. Який засіб найбільш доцільно використати для відновлення дихання?**
- 388. У приймальне відділення лікарні доставлено хворого з тяжким отруєнням невідомою речовиною в стані гострої судинної недостатності. Який із зазначених препаратів необхідно використовувати для невідкладної допомоги?**
- 389. У хворого анафілактичний шок. Від якого з перелічених адреноміметиків можна чекати найбільшого терапевтичного ефекту?**
- 390. У хворого під час оперативного втручання з`явилися симптоми передозування дитиліну. Що необхідно зробити для усунення явищ інтоксикації?**
- 391. У хворого під час фторотанового наркозу різко знизився артеріальний тиск. Який препарат слід застосувати для відновлення рівня артеріального тиску?**
- 392. У хворого після оперативного втручання, проведеного із застосуванням дитиліну, більше 30 хвилин не відновлювалось дихання та попередній тонус м'язів. Яку допомогу необхідно надати пацієнтові?**
- 393. У хворого після операції резекції шлунка на 2-й день не відновились перистальтика кишечника. Що потрібно призначити в даній ситуації?**
- 394. У хворого розвинулась гостра судинна недостатність, викликана передозуванням гангліоблокатора. Який із запропонованих препаратів необхідно застосувати для корекції артеріального тиску?**
- 395. У хворого, що проходить у стаціонарі курс лікування з приводу бронхіальної астми, супутнім захворюванням є глаукома. Препарати якої групи в зв'язку з цим не рекомендується включати до схеми терапії бронхіальної астми?**

- 396. У хворої на бронхіальну астму після прийому одного з бронхолітичних засобів розвинувся гіпертензивний криз. Який засіб було використано?**
- 397. Який з нижчеперерахованих бронхолітичних засобів може спровокувати гіпертензивний криз?**
- 398. Який адреноміметичний препарат, що не належить до катехоламінів, треба використати, якщо під час фторотанового наркозу різко знизився артеріальний тиск?**
- 399. Який з перерахованих препаратів можна застосувати при гіпертонічному кризі**
- 400. Який з перерахованих препаратів належить до гангліоблокаторів?**
- 401. Який препарат з групи міорелаксантів не застосовують при генетичному дефіциті бутирилхолінестерази?**
- 402. Який препарат з міорелаксуючими властивостями не застосовують при генетичному дефіциті псевдохолінестерази?**
- 403. Який шлях введення норадреналіну?**
- 404. До лікарні швидкої допомоги доставили чоловіка 63 років з явищами колапсу. Для боротьби з гіпотензією лікар вибрав норадреналін. Який механізм дії цього препарату?**
- 405. Виберіть препарат, який можна використати для місцевого лікування тромбофлебітів:**
- 406. Вкажіть бензодіазепіновий снотворний засіб, при тривалому застосуванні якого синдром відміни проявляється важче, ніж при призначенні інших бензодіазепінів**

407. Вкажіть найменш токсичний інгаляційний наркозний засіб:
408. Вкажіть покази до використання спирту етилового:
409. Вкажіть покази до використання спирту камфорного:
410. Вкажіть протиепілептичний засіб вибору при парціальних судомах
411. Вкажіть протиепілептичний засіб для лікування атонічних судом
412. Вкажіть протипаркінсонічний засіб з протівірусною активністю
413. Вкажіть снодійний засіб — похідний бензодіазепіну тривалої дії
414. До лікарні звернулася хвора із скаргами на безсоння. Лікар призначив препарат із групи похідних бензодіазепіну. Назвіть цей препарат.
415. Ефір можна використовувати для наркозу пацієнту, що страждає:
416. Особливість дії натрію оксибутирату:
417. Особливості фармакодинаміки фторотану:
418. Побічні ефекти, що характерні при використанні ефіру для наркозу:
419. Позначте антиглутаматергічний протипаркінсонічний засіб
420. Помітьте снодійний засіб, який мало впливає на структуру сну
421. При інфаркті міокарду була проведена нейролептанальгезія. Який препарат з групи наркотичних анальгетиків найчастіше застосовується спільно з дроперидолом?
422. Яке явище виникає при комбінованій дії ліків і лежить в основі нейролептанальгезії?

- 423. Який з препаратів хворому на паркінсонізм необхідно призначити?**
- 424. Який засіб володіє протиепілептичними, снодійними, центральними міорелаксуючими і анксіолітичними властивостями. Стимулює ГАМК-ергічні процеси в мозку, використовується для зняття епілептичного статусу?**
- 425. Який препарат із перерахованих снодійних засобів не порушує структури сну і, як правило, не має постгіпнотичного ефекту?**
- 426. Який проти епілептичний засіб блокує кальцієві канали нейронів?**
- 427. Який протиепілептичний засіб збільшує синтез ГАМК у структурах мозку внаслідок активації ферменту глутаматдекарбоксилази**
- 428. Який снодійний засіб використовують при порушенні процесу засинання, короткочасної дії?**
- 429. Який снотворний засіб використовують як засіб резерву для лікування епілепсії?**
- 430. Який снотворний засіб індукує оксидазні ферменти печінки?**
- 431. Які побічні ефекти можливі при використанні наркозних засобів - похідних барбітурової кислоти?**
- 432. Вкажіть снотворний засіб у клізмі, який протипоказаний для прийняття всередину при виразковій хворобі шлунка і дванадцятипалої кишки**
- 433. . Хворий страждає на посттравматичну епілепсію, яка проявляється великими нападами. Який препарат слід призначити хворому для їх профілактики ?**
- 434. В поєднанні з якими препаратами посилюється токсична дія наркотичних анальгетиків на дихальний центр?**

435. Вкажіть снотворний засіб наркотичного типу дії, з малою терапевтичною широтою
436. Для більш швидкого введення в наркоз хворому застосовано таку комбінацію: ефір для наркозу + азоту закис + фторотан. Який це тип взаємодії лікарських засобів?
437. Для лікування хвороби Паркінсона лікар призначив циклодол. Який механізм протипаркінсонічної дії препарату?
438. До стоматолога звернувся пацієнт з артритом щелепно-лицьового суглоба. Лікар стоматолог призначив бутадіонову мазь. Який механізм дії цього лікарського засобу?
439. До травмпункту доставлений хворий з приводу свіжого, неускладненого вивиху плечового суглоба. Виберіть засіб швидкої, але короткочасної дії для амбулаторного вправлення вивиху.
440. З метою аналгезії можуть бути використані речовини, які імітують ефекти морфіну, але виробляються в ЦНС. Назвіть цю речовину.
441. Машиною “швидкої допомоги” доставлено до приймального відділення лікарні людину з гострим отруєнням морфіном. Який із антагоністів необхідно застосувати в цьому випадку?
442. Порадьте лікарю, які снодійні препарати можна призначити хворому з вираженими змінами в аналізі крові?
443. При інфаркті міокарда була проведена нейролептаналгезія. Який препарат з групи наркотичних анальгетиків найчастіше застосовується спільно з дроперидолом?

- 444. У наркологічному відділенні психоневрологічної лікарні хворому призначено тетурам. Яке з перелічених захворювань може бути показанням до його застосування.?**
- 445. У породіллі 35 років виражений больовий синдром, пов'язаний із затримкою першого періоду пологів. Який препарат краще всього застосувати для зменшення болю?**
- 446. У хворого зменшуються прояви паркінсонізму, якщо він у зв'язку з супутніми захворюваннями одержував:**
- 447. У хворого після автомобільної катастрофи гіпоксичний набряк мозку. Який із перелічених препаратів доцільно призначити?**
- 448. У хворого травматичний набряк мозку, гіпоксичні судоми. Який засіб раціонально використати для купірування судом?**
- 449. У чоловіка з медикаментозним отруєнням відсутня свідомість, спостерігаються міоз і посилення спинальних моносинаптичних рефлексів. Який засіб міг стати причиною отруєння?**
- 450. В поєднанні з якими препаратами посилюється токсична дія наркотичних анальгетиків на дихальний центр?**
- 451. В реанімаційне відділення доставлений хворий з судомами, які є наслідком гострого отруєння кокаїном. Вибрати фармакологічний засіб, який має протисудомний ефект:**
- 452. Виберіть препарат, який можна використати для місцевого лікування тромбофлебітів:**
- 453. Вкажіть бензодіазепіновий снотворний засіб, при тривалому застосуванні якого синдром відміни проявляється важче, ніж при призначенні інших бензодіазепінів**

- 454. Вкажіть засіб для діагностики опіоїдної наркоманії**
- 455. Вкажіть засіб, що посилює активність неопіоїдних (серотонінергічних та адренергічних) знеболювальних систем головного мозку:**
- 456. Вкажіть найменш токсичний інгаляційний наркозний засіб:**
- 457. Вкажіть наркотичний анальгетик з найменшим наркогенним потенціалом — з найменшою здатністю викликати наркотичну залежність**
- 458. Вкажіть наркотичний анальгетик із спазмолітичною та утеротонізуючою активністю**
- 459. Вкажіть покази до використання спирту етилового:**
- 460. Вкажіть покази до використання спирту камфорного:**
- 461. Вкажіть протиепілептичний засіб вибору при парціальних судомах**
- 462. Вкажіть протиепілептичний засіб для лікування атонічних судом**
- 463. Вкажіть протипаркінсонічний засіб з протівірусною активністю**
- 464. Вкажіть снодійний засіб — похідний бензодіазепіну тривалої дії**
- 465. Вкажіть снотворний засіб — похідний бензодіазепіну короткочасної дії**
- 466. Вкажіть снотворний засіб наркотичного типу дії, з малою терапевтичною широтою**
- 467. Вкажіть снотворний засіб у клізмі, який протипоказаний для прийняття всередину при виразковій хворобі шлунка і дванадцятипалої кишки**
- 468. Вказати засіб для неінгаляційного наркозу**

- 469. Вплив нестероїдних протизапальних засобів на матку характеризується**
- 470. Для знеболення пологів лікар призначив анагезивний засіб. Який з анальгетиків найбільш доцільно використати у даній ситуації?**
- 471. Для знеболювання пологів хворій був призначений синтетичний болезаспокійливий препарат, який підвищує скоротливу активність міометрія і розслаблює шийку матки. Назвіть препарат.**
- 472. До лікарні звернулася хвора із скаргами на безсоння. Лікар призначив препарат із групи похідних бензодіазепіну. Назвіть цей препарат.**
- 473. До приймального відділення лікарні доставлено людину з гострим отруєнням морфіном. Який специфічний антагоніст наркотичних анальгетиків необхідно застосувати в цьому випадку?**
- 474. Допоможіть лікарю швидкої допомоги зробити раціональний вибір анальгетичних препаратів, що є в аптечці, для хворого з важкою травмою на фоні прийому етилового алкоголю?**
- 475. Ефір можна використовувати для наркозу пацієнту, що страждає:**
- 476. З якою метою застосовують карбоген при отруєнні наркотичними анальгетиками?**
- 477. З якою групою препаратів комбінують наркотичні анальгетики для нейролептоаналгезії?**
- 478. Нестероїдні протизапальні препарати є ефективними при лікуванні ревматизму завдяки своїй здатності пригнічувати:**
- 479. Особливість дії натрію оксибутирату:**
- 480. Особливості фармакодинаміки фторотану:**

- 481. Побічні ефекти, що характерні при використанні ефіру для наркозу:**
- 482. Позначте антиглутаматергічний протипаркінсонічний засіб**
- 483. Позначте препарат вибору при міоклонус-епілепсії**
- 484. Помітьте снодійний засіб, який мало впливає на структуру сну**
- 485. Порадьте лікарю, які снодійні препарати можна призначити хворому з вираженими змінами в аналізі крові?**
- 486. Породіллі з патологією вагітності необхідне медикаментозне знеболювання пологів. Який препарат можна призначити?**
- 487. При інфаркті міокарду була проведена нейролептанальгезія. Який препарат з групи наркотичних анальгетиків найчастіше застосовується спільно з дроперидолом?**
- 488. Прозерин при системному введенні щурові підвищує тонус скелетних м'язів. Фторотан спричиняє релаксацію скелетних м'язів і зменшує ефекти прозерину. Визначте характер взаємодії прозерину і фторотану.**
- 489. Разом із головним лікарем виберіть наркотичні анальгетики, які можна використати в післяопераційному періоді дитині 10-ти років.**
- 490. Яку речовину треба вибрати для покращення пам'яті після тривалої напруженої роботи?**
- 491. У роділлі 35 років виявляється больовий синдром, пов'язаний з затримкою першого періоду родів. Який препарат краще за все слід застосувати для зменшення болі?**

492. У хворого, що лікується з приводу ревматоїдного поліартриту, в анамнезі є виразкова хвороба шлунка. Який із зазначених препаратів найбільш небажано застосовувати?
493. Яке явище виникає при комбінованій дії ліків і лежить в основі нейролептанальгезії?
494. Який з препаратів хворому на паркінсонізм необхідно призначити?
495. Який засіб використовують для промивання шлунка при отруєнні морфіном?
496. Який засіб володіє протиепілептичними, снодійними, центральними міорелаксуючими і анксіолітичними властивостями. Стимулює ГАМК-ергічні процеси в мозку, використовується для зняття епілептичного статусу?
497. Який із вказаних препаратів належить до снодійних
498. Який із наркотичних анальгетиків можна використати для зняття болі в гострій фазі інфаркту міокарда у хворого, що страждає спастичним колітом?
499. Який наркотичний анальгетик слід застосувати у комплексній терапії при ішемічній кардіалгії, враховуючи і короткочасність болю?
500. Який ненаркотичний анальгетик за анальгетичною активністю наближається до морфіну?
501. Який препарат використовується для нейролептоанальгезії?
502. Який препарат із перерахованих снодійних засобів не порушує структури сну і, як правило, не має постгіпнотичного ефекту?
503. Який проти епілептичний засіб блокує кальцієві канали нейронів?

- 504. Який протиепілептичний засіб збільшує синтез ГАМК у структурах мозку внаслідок активації ферменту глутаматдекарбоксилази**
- 505. Який снодійний засіб використовують при порушенні процесу засинання, короткочасної дії?**
- 506. Який снотворний засіб використовують як засіб резерву для лікування епілепсії?**
- 507. Який снотворний засіб індукує оксидазні ферменти печінки?**
- 508. Які побічні ефекти можливі при використанні наркозних засобів - похідних барбітурової кислоти?**
- 509. Для знеболювання маніпуляції, пов'язаної із обробкою опеченої поверхні, ввели внутрішньовенно препарат для короткочасного наркозу. Наркоз настав через хвилину, під час нього спостерігалися підвищення АТ, тахікардія, підвищення тонуусу скелетних м'язів; рефлексі збережені. Після виходу із наркозу у хворого відзначалися дезорієнтація, зорові галюцинації. Який препарат ввели хворому?**
- 510. До приймального відділення доставлено хворого у непритомному стані. Шкіра холодна, зіниці звужені, дихання з утрудненням, відзначається періодичність за типом Чейна-Стокса, артеріальний тиск знижений, сечовий міхур переповнений. Яким препаратом викликане отруєння?**
- 511. У дитини 7 років виник озноб, підвищилась температура до 39,0 С. Частота дихання дорівнювала 45 за хвилину, пульс -105 ударів за хвилину. Лікар діагностував гостру респіраторну вірусну інфекцію і призначив дитині ацетилсаліцилову кислоту. Реалізацію якого механізму дії цього препарату запропонував лікар?**

512. Для знеболювання маніпуляції, пов'язаної із обробкою опеченої поверхні, ввели внутрішньовенно препарат для короткочасного наркозу. Наркоз настав через 1 хвилину, під час нього спостерігалися підвищення АТ, тахікардія, підвищення тонуусу скелетних м'язів; рефлексів збережені. Після виходу із наркозу у хворого відзначалися дезорієнтація, зорові галюцинації. Який препарат ввели хворому?

513. Хворий на епілепсію протягом тривалого часу одержує фенобарбітал в добовій дозі 0,4 г. Останнім часом у нього стали частішими напади, спостерігається пригнічений настрій. Чим викликане погіршення стану хворого?

514. В аптеку прийшов хворий із порушеною ходою, невиразним маскоподібним обличчям, тремором рук. Хворий довготривало лікувався циклодолом. Якими препаратами можна посилити ефективність даної терапії?

515. Жінка після перенесеного нервового потрясіння погано спить. Якому з перелічених снодійних засобів слід надати перевагу при лікуванні безсоння?

516. Дитині 3-х років призначили операцію з приводу вродженої вади серця. Який із перелічених препаратів з наркотичною та антигіпоксичною дією необхідно застосувати для введного наркозу, враховуючи, що у дитини у зв'язку з набряком важко зробити внутрішньовенну ін'єкцію?

517. До приймального відділення доставлений хворий зі скаргами на різко виражений біль у попереку справа. З анамнезу з'ясовано, що хворий страждає на сечокам'яну хворобу. Який з анальгетиків доцільно застосувати для пригнічення больового синдрому викликаного спазмом гладенької мускулатури?

518. До прийомного відділення доставлений хворий 25 років у непритомному стані: дихання періодичне, серцевий ритм сповільнений, рефлексів, крім колінного, пригнічені, зіниці вузькі. Поряд з хворим знайдено 15 ампул з-під розчину морфіну. Які маніпуляції слід застосувати в першу чергу?

519. Жінка 28 років звернулася до стоматолога з приводу протезування зубів. Оскільки в неї алергія до місцевих анестетиків, обробку зубів необхідно було провести під загальною анестезією.

520. Жінка 45 років звернулася до лікаря зі скаргами на підвищену збудливість, роздратованість, безсоння. Який із запропонованих препаратів необхідно призначити хворій?

521. У автобусі жінці 20-30 років стало погано, вона втратила свідомість, з'явилися судоми, які не припинялись. Швидка допомога констатувала епілептичний стан. Який препарат треба ввести хворій з метою купування епілептичного стану?

522. Хвора 50 років страждає на безсоння. Протягом 3 місяців вона приймала різні снодійні засоби: етамінал натрію, фенобарбітал, барбаміл. Після відміни препаратів хвора стала дратівливою, відновилось безсоння, з'явилися агресивність, втрата апетиту, тремор кінцівок. Як називають ускладнення, що виникли у пацієнта?

523. Хворий страждає на посттравматичну епілепсію, яка проявляється великими нападами. Який препарат слід призначити хворому для їх профілактики ?

524. Хворий, який тривалий час приймав резерпін для лікування гіпертонічної хвороби, став відзначати у себе м'язову слабкість, обмеженість рухів, дрібний тремор рук. Поставлений діагноз лікарського паркінсонізму. Який препарат слід призначити хворому для зниження цього побічного ефекту?

525. Хворій 50 років з явищами неврозу, яка скаржиться на постійне почуття страху та тривоги, було призначено препарат з анксиолітичною дією. Який це препарат?

526. Хворому з порушенням засинання через постійні болі в ділянці шлунка було призначено снодійне, під впливом якого він засинав через 60 хв., спав на протязі 8 годин і після пробудження відчував важкість в голові, розбитість, сонливість. Який препарат був призначений хворому?

527. Хворому з явищами тривоги, страху, невпевненості, психічної напруги, лікар призначив сибазон. Який можливий механізм його транквілізуючої дії?

528. Чоловіку 70 років, що страждає хворобою Паркінсона, був призначений препарат леводопа. Через тиждень стан хворого значно покращився. Який механізм дії лікарського засобу?

529. Всі нестероїдні протизапальні засоби можуть пошкоджувати слизову шлунка. Для підбору засобів, що не викликають цього ускладнення, необхідно знати його природу. Вплив на який молекулярний субстрат слід зменшити, щоб ослабити вираженість цього ускладнення?

530. Дитина 5 років після невдалого падіння з дивану скаржиться на різкий біль у шиї, що виникає при найменших порухах. Огляд виявив припухлість, порушення цілості в ділянці правої ключиці, крепітацію. Що слід ввести в перш чергу для швидкого усунення болі і заспокоєння дитини?

531. Для знеболювання біопсії хворому внутрішньовенно ввели препарат, який через хвилину викликав наркоз тривалістю близько 5 хвилин. Під час наркозу відзначалися спонтанні рухи, незначне зниження АТ, короткочасне припинення дихання, яке швидко відновилося. Який препарат використали?

532. Для проведення оперативного втручання з приводу гострого флегмонозного апендициту лікар ввів хворому препарат з групи загальних анестетиків, якому властива тривала стадія збудження. Який препарат був введений пацієнту?

533. Який нейролептик застосовують при неефективності інших антипсихотичних засобів?

534. До нейрохірургічного відділення доставлений хворий із травмою черепа. Прогресивне наростання неврологічної симптоматики дозволяє поставити діагноз забою мозку, що є причиною набряку, здавлювання мозку і гіпоксії його структур. Призначте хворому лікувальний наркоз, який можна використати і як засіб боротьби з гіпоксією.

535. До нейрохірургічного відділення доставлено хворого із травмою черепа. Прогресуюче наростання неврологічної симптоматики дозволяє встановити діагноз струсу мозку. Це є причиною наростаючого набряку мозку, що призводить до здавлювання та гіпоксії мозкової тканини. Призначте хворому лікувальний наркоз, який можна використати і як засіб боротьби з гіпоксією.

536. До приймального відділення був доставлений хворий у непритомному стані з різким пригніченням дихання та серцевої діяльності, зниженням сухожильних рефлексів. За словами його дружини він останнім часом страждав на безсоння та приймав на ніч снодійні засоби. Який лікарський препарат необхідно ввести хворому для невідкладної допомоги?

537. До приймального відділення доставлений хворий 25 років у непритомному стані: дихання періодичне, серцевий ритм сповільнений, рефлекси, крім колінного, пригнічені, зіниці звужені. Поряд з хворим знайдено 15 ампул з-під розчину морфіну. Які маніпуляції слід застосувати в першу чергу?

538. До приймального відділення доставлено хворого у непритомному стані. Шкіра холодна, зіниці звужені, дихання з утрудненням, відзначається періодичність за типом Чейна-Стокса, артеріальний тиск знижений, сечовий міхур переповнений. Отруєння якою речовиною найбільш вірогідне?

539. До приймального відділення доставлено хворий у непритомному стані з різким пригніченням дихання та серцевої діяльності, зниженням сухожильних рефлексів. З анамнезу відомо, що він страждав на безсоння та приймав на ніч снодійні засоби. Який лікарський препарат необхідно ввести хворому для стимуляції дихання та серцебиття?

540. До стоматолога звернувся хворий із скаргою на зубний біль. Під час попередньої розмови лікар дізнався, що хворий страждає на паркінсонізм і тому приймає М-холінолітик циклодол. Яку побічну дію циклодолу у хворого можна очікувати?

541. Жінка 28 років звернулася до стоматолога з приводу протезування зубів. Оскільки у неї алергія до місцевих анестетиків, обробку зубів необхідно було провести під загальною анестезією. Який препарат доцільно використати для цього, зважаючи на короткочасність маніпуляції?

542. Жінка 28 років звернулася у поліклініку із скаргами на головний біль. Лікар запропонував їй парацетамол, взявши до уваги наявність соматичного захворювання. Яка супутня хвороба визначила призначення саме парацетамолу?

543. Після перенесеного нервового потрясіння хвора на протязі декількох днів погано спить. В зв'язку з цією скаргою лікар вирішив призначити їй снодійне. Якій групі снодійних засобів слід віддати перевагу для лікування безсоння, що виникло в зв'язку з емоційним збудженням хворої?

544. Після повторного оперативного втручання з використанням того ж самого загального анестетика у хворого виникло гостре ураження печінки (гепатит). Який загальний анестетик найбільш вірогідно може викликати дану патологію?

545. При огляді хворого відмічено різке звуження зіниць ока, сонливість, уповільнене дихання за типом Чейна- Стокса, затримка сечі, уповільнення серцевого ритму, підвищення спинномозкових рефлексів. Яка речовина викликала отруєння?

546. При оперативному втручанні для загальної анестезії використано комбінацію інгаляційного анестетика і похідного барбітурової кислоти. Яку з перелічених комбінацій препаратів слід призначити?

547. У поліклініку за допомогою звернувся хворий 60 років зі скаргами на інтенсивні, періодичні головні болі. При огляді хворого порушень апарата кровообігу не виявлено, на комп'ютерній томографії органічних змін ЦНС не знайдено. Однак гастроентеролог виявив виразковий дефект у цибуліни 12-палої кишки. Який препарат слід призначити хворому для купірування головного болю?

548. Який нейролептик слід використати для нейролептаналгезії?

549. Який побічний ефект не характерний для аміназину?

550. У хворого гострий інфаркт міокарда супроводжується стійкими болями за грудиною. Неефективність попередньовведених препаратів дала основу лікарю провести нейролептанальгезію. Який нейролептик використовують для цього виду знеболення ?

551. У хворого після довготривалого застосування призначеного з приводу гострого респіраторного захворювання препарату виникли такі симптоми: головний біль, запаморочення, шум у вухах, нудота, біль в епігастральній ділянці. Який препарат міг викликати подібну клінічну картину?

552. Хворий 18-ти років звернувся до лікаря зі скаргами на безсоння, що проявляється у поганому засинанні. В результаті цього він не висипається і на наступний день почуває втому, важко засвоює навчальний матеріал. Лікар встановив, що безсоння пов'язане з неврозоподібним станом. Зробіть раціональний вибір снодійного засобу.

553. Хворий з подагричним артритом приймає бутадіон. Після чергового аналізу крові лікар відмінив цей препарат. Яке ускладнення крові викликав бутадіон?

554. Хворому для короткочасного хірургічного втручання зробили нейролептаналгезію шляхом введення фентанілу і дроперидолу. Що з перелічених явищ обґрунтовує досягнення знеболювання, достатнього для проведення операції?

555. Хворому на хронічний алкоголізм лікар призначив тетурам. Який з наведених механізмів є основою позитивного ефекту при алкоголізмі?

556. Хворому через безсоння був призначений фенобарбітал по 1 таблетці перед сном. На 10-й день хворий знову звернувся до лікаря зі скаргами на безсоння. Зазначте, як називається зменшення ефекту фармакологічного засобу після повторних його введень.

557. Чоловіку 40 років під час операції на органах черевної порожнини проводили інгаляційний наркоз за допомогою леткої рідини. Наркоз настав через 5 хвилин від початку інгаляції, без стадії збудження. Під час наркозу відзначалися зниження АТ, брадикардія . Пробудження після наркозу відбулося швидко, без післяопераційної депресії. Який засіб для наркозу був використаний?

558. Чоловіку 56 років, що страждає на безсоння, був призначений фенобарбітал. Ритм сну нормалізувався. Але поступово протягом двох місяців дія препарату почала знижуватись і безсоння відновилось. Яке явище призвело до зменшення ефективності снодійного засобу?

559. Чоловіку 70 років, який страждає на хронічний бронхіт, призначили протикашльовий препарат кодеїн. Який механізм забезпечує протикашльовий ефект препарату?

560. В аптеку прийшов хворий із порушеною ходою, невиразним маскоподібним обличчям, тремором рук. Хворий довготривало лікувався циклодолом. Якими препаратами можна посилити ефективність даної терапії?

561. В кардіологічне відділення доставлений хворий з діагнозом гострий інфаркт міокарда. Для купірування больового синдрому в складі нейролептаналгезії пацієнту необхідно ввести таку комбінацію лікарських препаратів:

562. В кардіологічне відділення поступила хвора з гострою серцевою декомпенсацією, що супроводжувалась задишкою. Який препарат із групи наркотичних анальгетиків необхідно використовувати для полегшення стану хворої і нормалізації дихання?

563. В наркологічному відділенні психоневрологічної лікарні хворому призначено тетурам. Яке з перерахованих захворювань може бути показанням до його застосування?

564. В результаті падіння у дитини 5 років виник перелом в нижній третині плечової кістки справа. Який препарат найбільш доцільно використовувати для проведення обезболення в даному випадку?

565. В терапевтичне відділення з приводу ревмокардиту поступила хвора, у якої в анамнезі в минулому була виявлена виразкова хвороба шлунку. Який препарат треба призначити хворій із групи ненаркотичних анальгетиків з протизапальною дією, щоб не спровокувати виразковий процес в шлунку?

566. Дитина 4 років госпіталізована в ортопедичне відділення з переломом гомілки з зміщенням. Перед репозицією відламків необхідна аналгезія. Який препарат слід вибрати?

567. Дитина 4-х років госпіталізована в ортопедичне відділення з переломом гомілки з зміщенням. Перед репозицією відламків необхідна аналгезія. Який препарат слід вибрати?

568. Дитині 3-х років призначили операцію з приводу вродженої вади серця. Який із перелічених препаратів з наркотичною та антигіпоксичною дією необхідно застосувати для введеного наркозу, враховуючи, що у дитини у зв'язку з набряком важко зробити внутрішньовенну ін'єкцію?

569. Дівчина 25 років доставлена до токсикологічного відділення з явищами гострого отруєння морфіном. Який антидот слід ввести хворій?

570. Дівчина 25 років поступила в токсикологічне відділення з явищами отруєння морфіном. Який антидот потрібно ввести хворій?

571. Для проведення термінового оперативного втручання хворому в хірургічне відділення викликали анестезіолога, який вирішив провести нейролептаналгезію. Яка з перелічених комбінацій препаратів використовується для цього?

572. Для проведення термінового оперативного втручання хворому в хірургічне відділення викликали анестезіолога, який вирішив провести нейролептаналгезію. Яка з перелічених комбінацій препаратів використовується для цього?

573. Для проведення термінового оперативного втручання хворому в хірургічне відділення викликали анестезіолога, який вирішив провести нейролептаналгезію. Яка з перелічених комбінацій препаратів використовується для цього?

574. До лікарні доставили хворого з отруєнням морфіном. Відомо, що при гострому отруєнні морфіном використовується специфічний антагоніст налоксон. Який фактор є основним у розвитку антагоністичної дії?

575. До приймального відділення був доставлений хворий 30 років після автомобільної аварії з переломом кістки стегна. У хворого різко знижений АТ 70/40, слабкий пульс, посилена больова реакція на найменший дотик у ділянці пошкодження. Що необхідно ввести хворому для профілактики травматичного шоку?

576. До приймального відділення доставлений хворий зі скаргами на різко виражений біль у попереку справа. З анамнезу з'ясовано, що хворий страждає на сечокам'яну хворобу. Який з анальгетиків доцільно застосувати для пригнічення больового синдрому викликаного спазмом гладенької мускулатури?

577. До приймального відділення доставлений чоловік у непритомному стані. Об'єктивно: на зовнішні подразники хворий не реагує, дихання періодичне за типом Чейна- Стокса, зіниці звужені, зіничний рефлекс відсутній. Було встановлено, що дані симптоми обумовлені використанням морфіну. Який препарат необхідно призначити хворому?

578. До приймального відділення доставлено хворого у непритомному стані. Шкіра холодна, зіниці звужені, дихання з утрудненням, відзначається періодичність за типом Чейна- Стокса, артеріальний тиск знижений, сечовий міхур переповнений. Поставлений діагноз отруєння морфіном. Який препарат необхідно застосувати як антагоніст?

579. До приймального відділення надійшов хворий у непритомному стані. Шкіра холодна, зіниці звужені, дихання з утрудненням, відзначається періодичність по типу Чейн-Стокса, артеріальний тиск знижений, сечовий міхур переповнений. Поставлений діагноз: отруєння морфіном. Який препарат необхідно застосувати в якості антагоністу?

580. До приймального відділення доставлено хворий у непритомному стані з різким пригніченням дихання та серцевої діяльності, зниженням сухожильних рефлексів. З анамнезу відомо, що він страждав на безсоння та приймав на ніч снодійні засоби. Який лікарський препарат необхідно ввести хворому для стимуляції дихання та серцебиття?

581. До прийомного відділення доставлений хворий 25 років у непритомному стані: дихання періодичне, серцевий ритм сповільнений, рефлекси, крім колінного, пригнічені, зіниці вузькі. Поряд з хворим знайдено 15 ампул з-під розчину морфіну. Які маніпуляції слід застосувати в першу чергу?

582. Жінка 28 років звернулася до стоматолога з приводу протезування зубів. Оскільки в неї алергія до місцевих анестетиків, обробку зубів необхідно було провести під загальною анестезією.

583. Жінка 45 років звернулася до лікаря зі скаргами на підвищену збудливість, роздратованість, безсоння. Який із запропонованих препаратів необхідно призначити хворій?

584. Який препарат використовують для лікування депресій резистентних до дії амітриптиліну?

585. Жінці 25 років з явищами гострої інтоксикації був введений налоксон, що викликав швидке поліпшення її стану. Який переважаючий механізм дії цього препарату?

586. Лікар обговорював з колегами застосування нового проти епілептичного засобу – натрію вальпроату. Який можливий механізм дії препарату?

587. Лікар обговорював з колегами застосування нового протиепілептичного засобу – натрію вальпроату. Який можливий механізм дії препарату?

588. Лікар обговорював з колегами застосування нового протиепілептичного засобу — натрію вальпроату. Який можливий механізм дії препарату?

589. Після перенесеного нервового потрясіння хвора на протязі декількох днів погано спить. В зв'язку з цією скаргою лікар вирішив призначити їй снодійне. Якій групі снодійних засобів слід віддати перевагу для лікування безсоння, що виникло в зв'язку з емоційним збудженням хворої?

590. Після тривалого застосування бутадіону у пацієнта з'явилися болі у шлунку, нудота, диспепсичні явища. Хворий звернувся з проханням порекомендувати йому препарат заміни. Який з наведених засобів проявляє мінімальний вплив на слизову оболонку травного каналу

591. У автобусі жінці 20-30 років стало погано, вона втратила свідомість, з'явилися судоми, які не припинялись. Швидка допомога констатувала епілептичний стан. Який препарат треба ввести хворій з метою купування епілептичного стану?

592. У дитини 1,5 років прорізання зубів супроводжується болісним набряком ясен та гарячкою, у зв'язку з чим йому тривало дають панадол. В черговому аналізі крові знайдений метгемоглобін. Для якої лікарської речовини, яка є діючою у панадолі, характерна ця побічна дія?

593. У дитини 5 років періодично з'являються судомні напади з втратою свідомості. Лікар діагностував епілепсію (великі судомні напади). Який препарат доцільно призначити?

594. У клініку доставили пацієнта з ознаками гострого алкогольного отруєння. Які зміни вуглеводного обміну характерні для цього стану?

595. У наркоманів після закінчення дії наркотику виникають тяжкі психічні, неврологічні і соматичні порушення. Як називається цей симптомокомплекс?

596. У породілі 35 років виразимий больовий синдром, пов'язаний з патологією 1-го періоду пологів. Який засіб найбільш доцільно застосувати для обезболення в даному випадку?

597. У реанімаційне відділення доставлено хворого з ознаками гострого отруєння морфіном. Який засіб необхідно використати у даному випадку для промивання шлунка?

598. У реанімаційне відділення доставлено хворого із симптомами гострого отруєння морфіном - втрата свідомості, гіпотермія, дихання за типом Чейна-Стокса, гіпотензія, брадикардія, різкий міоз. Який з перелічених препаратів буде найефективнішим у даній ситуації?

599. У студента в період екзаменаційної сесії різко порушився сон, особливо засинання. Довготривале недосипання знизило працездатність і успішність. Допоможіть йому вибрати снодійний препарат?

- 600. У студента в період екзаменаційної сесії різко порушився сон, особливо засинання. Довготривале недосипання знизило працездатність і успішність. Допоможіть йому вибрати снодійний препарат?**
- 601. У хворого 55 років на 4-й день лікування індометацином виникла шлункова кровотеча в результаті виразки слизової оболонки шлунка, з чим пов'язана ульцерогенна дія препарату?**
- 602. У хворого був діагностований іноперабельний бронхогенний рак легенів з метастазами в хребет. Для полегшення стану хворого необхідно ввести знеболювальний засіб. Який знеболювальний засіб необхідно ввести хворому?**
- 603. У хворого гострий інфаркт міокарда супроводжується стійкими болями за грудиною. Неефективність попередньовведених препаратів дала основу лікарю провести нейролептанальгезію. Який нейролептик використовують для цього виду знеболення ?**
- 604. У хворого зменшались прояви паркінсонізму, якщо він у зв'язку з супутніми захворюваннями одержував:**
- 605. Після перенесеної черепно-мозкової травми у хворого виникли розлади уваги, пам'яті, мови. Який лікарський засіб бажано призначити у даному випадку?**
- 606. У хворого із сечокам'яною хворобою виникли нестерпні спастичні болі. Для попередження больового шоку йому ввели разом з атропіном наркотичний анагетик, що не має спазмогенного ефекту. Який це був препарат?**
- 607. У хворого із сечокам'яною хворобою виникли нестерпні спастичні болі. Для попередження больового шоку йому ввели разом з атропіном наркотичний анальгетик, що не має спазмогенного ефекту. Який це був препарат?**
- 608. У хворого на крупозну пневмонію збільшилась температура до 39 ° С.**

609. У чоловіка 68 років з тремтінням рук, порушенням координації рухів діагностована хвороба Паркінсона. Який засіб доцільно призначити хворому?

610. Хвора 63 років з артритом на тлі лікування ацетилсаліциловою кислотою (аспірін) поскаржилась на нудоту, тяжкість в епігастрії. Лікар відмінив аспірін і призначив протизапальний засіб із групи селективних інгібіторів ЦОГ2. Назвіть потрібний для хворої препарат.

611. Хворий з ревматоїдним поліартритом довготривалий час отримувач для лікування препарат, що випускається в капсулах по 25 мг. Хворобливість суглобів зменшилась, але з'явилися болі в підшлунковій ділянці, нудота, блювання з домішками крові. Який препарат був назначений для лікування хворому?

612. Хворий звернувся до лікаря зі скаргами на ригідність м'язів, скутість рухів, постійний тремор рук. За результатами обстеження лікар поставив діагноз - хвороба Паркінсона. Зробіть раціональний вибір препарату.

613. Хворий на епілепсію протягом довгого часу одержує фенобарбітал в добовій дозі 0,4. В останній час у нього стали частішими напади, спостерігається пригнічений настрій. Чим викликано погіршення стану хворого?

614. Хворий страждає на посттравматичну епілепсію, яка проявляється великими нападами. Який препарат слід призначити хворому для їх профілактики?

615. Хворий страждає на посттравматичну епілепсію, яка проявляється великими нападами. Який препарат слід призначити хворому для їх профілактики ?

616. Хворий що страждає на нирково-кам'яну хворобу поступив в лікарню у зв'язку з нападом ниркової коліки. Вибрати засіб швидкої допомоги в цьому випадку.

617. Хворий, що страждає на сечокам'яну хворобу, доставлений у лікарню через напад ниркової коліки. Вибрати засіб швидкої допомоги в цьому випадку.

618. Хворий, який тривалий час приймав резерпін для лікування гіпертонічної хвороби, став відзначати у себе м'язову слабкість, обмеженість рухів, дрібний тремор рук. Поставлений діагноз лікарського паркінсонізму. Який препарат слід призначити хворому для зниження цього побічного ефекту?

619. Хворий, який тривалий час приймав резерпін для лікування гіпертонічної хвороби, став відзначати у себе м'язову слабкість, обмеженість рухів, дрібний тремор рук. Поставлений діагноз лікарського паркінсонізму. Який препарат слід призначити хворому для зниження цього побічного ефекту?

620. Хворий 50 років з явищами неврозу, яка скаржиться на постійне почуття страху та тривоги, було призначено препарат з анксиолітичною дією. Який це препарат?

621. Хворий з явищами гострої інтоксикації морфіном був введений налоксон, який швидко покращив її стан. Який переважний механізм дії цього препарату?

622. Хворому при безсонні, викликаному емоційними розладами, лікар призначив засіб, що викликає сон за рахунок транквілізуючої дії. Який снодійний препарат був призначений?

623. Хворому в післяопераційному періоді тривалий час вводили промедрол. Внаслідок відміни препарату у пацієнта виникли тяжкі психічні та соматичні порушення. Як називається це ускладнення?

624. Хворому з болями у попереку поставлений діагноз ниркова коліка. Який засіб застосувати для її купірування?

625. Хворому з метою знеболювання при травматичному шоку ввели під шкіру розчин морфіну гідрохлориду. Який механізм анальгезивної дії цього препарату?

626. Хворому з неоперабельним раком легені значним больовим синдромом лікар призначив болезаспокійливий засіб. У хворого при цьому виникли явища непрохідності кишечника. Який із препаратів міг стати причиною цього?

627. Хворому з неоперабельним раком легень призначили морфін в ін'єкціях. На цьому фоні виникли явища гострої непрохідності кишечника, затримка сечопуску. Яким препаратом необхідно замінити морфін?

628. Хворому з неоперабельним раком легень призначили морфін в ін'єкціях. На цьому фоні виникли явища гострої непрохідності кишечника, затримка сечопуску. Яким препаратом необхідно замінити морфін?

629. Хворому з неоперабельним раком шлунка призначили промедол для зняття вираженого больового синдрому. З часом хворий відмітив зменшення знеболювального ефекту та тривалості дії препарату, різке посилення болю у всьому тілі. Лікар пояснив це тим, що:

630. Хворому з неоперабельним раком шлунка призначили промедол для зняття вираженого больового синдрому. З часом хворий відмітив зменшення знеболюючого ефекту та тривалості дії препарату, різке посилення болей у всьому тілі. Лікар пояснив це тим, що:

631. Хворому з порушенням засинання через постійні болі в ділянці шлунка було призначено снодійне, під впливом якого він засинав через 60 хв., спав на протязі 8 годин і після пробудження відчував важкість в голові, розбитість, сонливість. Який препарат був призначений хворому?

632. Хворому з явищами тривоги, страху, невпевненості, психічної напруги, лікар призначив сибазон. Який можливий механізм його транквілізуючої дії?

633. Хворому на бурсит з виразкою шлунка в анамнезі лікар запропонував целекоксиб — не стероїдний протизапальний засіб з групи оксикамів з маловиразним побічним ефектом. Вкажіть основний механізм його протизапальної й анальгезуючої дії.

634. Хворому на ревматизм лікар призначив диклофенак-натрію. Приймаючи препарат, хворий почав скаржитися на болі в епігастрії, відрижку, нудоту, на головний біль. Яким механізмом обумовлені ці побічні явища препарату?
635. Хворому під час проведення оперативного втручання як наркозний засіб анестезіолог використав азоту закис, який має виражені ліпофільні властивості. Який механізм проникнення цього препарату через біологічні мембрани?
636. Хлопець 15 років з ознаками гострого отруєння наркотичними анальгетиками потребує призначення специфічного антагоніста морфіноподібних засобів. Назвіть його.
637. Хлопець 18 років поступив в реанімаційне відділення в несвідомому стані. При огляді: зіниці різко звужені, ціаноз шкірних покривів, в ліктьовому згині є свіжий слід від ін'єкцій, АТ 80/60 мм.рт.ст. Рс 60 уд/хв. Який з лікарських засобів є найвірогіднішою причиною отруєння?
638. Через 2-3 години після парентерального введення препарату у пацієнта розвинувся коматозний стан, спостерігається дихання за типом Чейна- Стокса, зіниці різко звужені, колінний рефлекс збережений. Який препарат міг спричинити отруєння?
639. Чоловік 30 років був знайдений в коматозному стані. При огляді АТ 80/60 мм рт.ст., пульс 60 уд/хв., рефлекси, окрім сухожильних, пригнічені. Зіниці звужені, При катетеризації виявлено велике скупчення сечі в сечовому міхурі. Який лікарський препарат викликає подібну клінічну картину при передозуванні?
640. Чоловік 40 років доставлений в лікарню з нападом печінкової кольки. Який засіб найбільш доцільно використовувати для ліквідації больового синдрому?
641. Чоловік 58 років звернувся до лікаря з приводу хвороби Паркінсона. Хворий страждає також на глаукому. Що треба йому призначити?

642. Чоловік 58 років звернувся до лікаря з приводу хвороби Паркінсона. Хворий страждає також на глаукому. Що треба йому призначити?

643. Чоловіку 56 років, який страждає безсонням, призначили фенобарбітал. Ритм сну нормалізувався, але поступово протягом двох місяців дія препарату почала зменшуватися і безсоння відновилося. Яке явище призвело до зниження ефективності снодійного засобу?

644. Чоловіку 70 років, що страждає на хворобу Паркінсона, був призначений препарат леводопа. Через тиждень стан хворого значно покращився. Який механізм дії лікарського засобу?

645. Після тривалого застосування аміназину в зв'язку з розвитком побічних ефектів лікар призначив пацієнту інший препарат з групи нейролептиків. Який з перерахованих препаратів належить до групи нейролептиків?

646. Швидка допомога доставила в приймальне відділення хворого, в якого спостерігаються сонливість, ціаноз, рідке переривчасте дихання, різке звуження зіниць. Колінні рефлекси збережені. На руках виявлені сліди ін'єкцій. Про отруєння якими препаратами свідчать наведені симптоми?

647. Юнак 15 років звернувся до невропатолога з приводу болів, пов'язаних з невритом. Він попросив дати знеболювальний засіб трамал. Однак лікар відмовився призначити трамал, мотивуючи це можливістю ускладнення. Які недоліки цього препарату перешкоджають його призначенню при невриті?

648. Юнак 17 років звернувся до травматолога з скаргами на біль та припухлість колінного суглоба, які з'явилися після травми. Детальне обстеження дозволило підтвердити діагноз - травматичний артрит. Для терапії даного стану лікар призначив препарат з групи ненаркотичних анальгетиків. Вкажіть засіб, який поряд з вираженими протизапальними властивостями володіє мінімальними побічними властивостями?

649. "Денні анксиолітики" - це:

- 650. Більш виражений седативний ефект серед нейролептиків характерний для:**
- 651. В психіатричну клініку доставлений хворий у стані різкого збудження, агресії, з мареннями. Який препарат слід призначити?**
- 652. В чому небезпека тривалого застосування анксиолітиків (транквілізаторів)?**
- 653. Вкажіть анксиолітики, агоністи бензодіазепінових рецепторів:**
- 654. Вкажіть анксиолітики, агоністи серотонінових рецепторів:**
- 655. Вкажіть механізм дії буспірону:**
- 656. Вкажіть механізм дії флумазенілу - специфічного антагоніста бензодіазепінів?**
- 657. Вкажіть основні показання до призначення антипсихотичних лікарських засобів:**
- 658. Вкажіть характерні для пірацетаму ефекти:**
- 659. Всі твердження щодо побічних ефектів, які характерні для транквілізаторів бензодіазепінового ряду, вірні, за винятком:**
- 660. Для аміналону характерно усе вказане, окрім:**
- 661. Для анксиолітика, похідного бензодіазепіну, характерно все нижческазане, крім:**
- 662. Для буспірону характерно все, крім:**
- 663. Для зменшення болю та зняття запалення при стоматологічних втручаннях застосовують:**

- 664. Для зняття марення і галюцинацій при шизофренії призначають галоперидол. Який механізм антипсихотичної дії препарату?**
- 665. Для зняття марення і галюцинацій у хворої на шизофренію лікар використав аміназин. Який механізм антипсихотичної дії препарату?**
- 666. Для зняття страху, напруження та хвилювання у поліклінічних умовах застосовують все, крім:**
- 667. Для кофеїну характерні наступні фармакодинамічні ефекти:**
- 668. Для проведення оперативного втручання необхідно використати метод загального охолодження. При застосуванні якого препарату у комбінації з фізичним охолодженням спостерігається виразна гіпотермія?**
- 669. Для типових нейролептиків характерні наступні фармакодинамічні ефекти:**
- 670. Для флумазенілу, специфічного антагоніста бензодіазепінів, характерно все, крім:**
- 671. З чим пов'язаний психотропний ефект ноотропів?**
- 672. Імізін протипоказаний у всіх вказаних ситуаціях, крім:**
- 673. Каретою “швидкої допомоги” в лікарню доставили хворого, який в стані тяжкої депресії намагався покінчити життя самогубством. Діагноз - депресивний психоз. Які фармакологічні засоби необхідно призначити хворому?**
- 674. Лікування бромізму - хронічного отруєння препаратами броду полягає у призначенні:**
- 675. Ноотропні засоби призначають у всіх нижческазаних випадках, крім:**
- 676. Один з найбільш ефективних анксиолітиків це:**

677. Основні показання до застосування кофеїну наступні:

678. Після введення жабі стрихніну вона на мінімальне подразнення відповідає генералізованими судомами. Блокада якої структури ЦНС є причиною цього?

679. Після перенесеної черепно-мозкової травми у хворого виникли розлади уваги, пам'яті, мови. Який лікарський засіб бажано призначити у даному випадку?

680. Після тривалого застосування аміназину в зв'язку з розвитком побічних ефектів лікар призначив пацієнту інший препарат з групи нейролептиків. Який з перелічених препаратів належить до групи нейролептиків?

681. При органічних ушкодженнях головного мозку пам'ять може покращити:

682. При тривалому застосуванні антипсихотичних засобів розвиваються наступні побічні ефекти, крім:

683. Призначте найбільш адекватний засіб для систематичного лікування хворого з інтенсивно вираженими продуктивними симптомами (марення і галюцинації).

684. Причиною міорелаксації при застосуванні бензодіазепінів є:

685. Причиною розвитку бромізму є:

686. Психостимулятор кофеїн протипоказаний у наступних випадках, крім

687. Хворий похилого віку скаржиться на головний біль, запаморочення, швидку втомлюваність, погіршення пам'яті. В анамнезі черепно-мозкова травма. Препарат якої групи необхідно призначити хворому?

688. Який харчовий продукт слід виключити з раціону хворого, що лікується антидепресантами із групи інгібіторів MAO?

689. В курсовому лікуванні депресії необхідно перейти від застосування імізину на ніаламід. Який принцип антидепресантної терапії дозволить уникнути ускладнень цієї терапії?

690. Виберіть антипсихотичний засіб, похідний фенотіазіну

691. Виберіть засіб, який сильніший за транквілізуючою і снодійною дією, ніж діазепам

692. Виберіть засіб, який слабкіший за транквілізуючою і снодійною дією, ніж діазепам

693. Виберіть найбільш адекватний засіб для систематичного лікування хворого з інтенсивно вираженими продуктивними синдромами психозу?

694. Виберіть транквілізатор із психостимулюючими властивостями

695. Вкажіть “атиповий” нейролептик

696. Вкажіть антипсихотичний засіб, що володіє антипсихотичною, психоседативною, а також антидепресивною дією і викликає екстрапірамідні порушення

697. Вкажіть нейрометаболічний стимулятор, який покращує реологічні властивості крові, попереджає утворення тромбів

698. Вкажіть препарат, що здійснює антиманіакальну дію без вираженого психоседативного ефекту, має довготривалий латентний період (2-3 тижні) і малу терапевтичну широту. Використовується для попередження і лікування маніакальних станів.

699. Вкажіть седативний засіб з помірним спазмолітичним ефектом

700. Вкажіть стимулятор дихання рефлекторної дії:

701. Вкажіть, який з перерахованих препаратів належить до групи аналепників змішаної дії:

702. Дію яких препаратів потенціюють нейролептики:

703. Для проведення оперативного втручання необхідно використати метод загального охолодження. При застосуванні якого препарату у комбінації з фізичним охолодженням спостерігається виразна гіпотермія?

704. Доберіть адекватний засіб для систематичного лікування хворого з інтенсивно вираженою продуктивною симптоматикою (маренням і галюцинаціями).

705. Допоможіть лікарю вибрати препарат для виведення хворого із колапсу.

706. Допоможіть лікарю вибрати препарат для виведення хворого із стану отруєння алкоголем

707. Допоможіть лікарю вибрати препарат для виведення хворого із стану підвищеної сонливості

708. Колаптоїдний стан, спричинений передозуванням аміназину, не купірується введенням мезатону. Які причини цього

709. Лікар швидкої допомоги, викликаний до хворого 60 років, встановив, що у хворого гіпертонічний криз (АТ 200/120 мм. рт. ст.), хворий попередньо вводив папаверин, але тиск суттєво не змінився. Який засіб з групи нейротропних препаратів може бути ефективним?

710. Машиною швидкої допомоги в психіатричну лікарню був доставлений хворий, який в стані важкої депресії намагався покінчити з собою. Поставлений діагноз: депресивний психоз. Який фармакологічний засіб можна призначити даному хворому?

711. Який нейролептик використовують для лікування мігрені?

712. Молода дівчина 18 років з метою суїциду прийняла велику дозу фенобарбіталу. Після прибуття на місце події лікар швидкої допомоги швидко промив шлунок, ввів бемеGRID і розчин натрію гідрокарбонату внутрішньовенно. З якою метою лікар ввів натрію гідрокарбонат?

713. На фоні прийому алкоголю у хворого, який отримує аміназин для лікування маніакально-депресивного психозу, з'явилися явища різкого пригнічення центральної нервової системи. З чим це може бути пов'язане?

714. Пацієнт 68 років звернувся у поліклініку із скаргами на розлади психіки, котрі він пов'язує із тривалим вживанням фенобарбіталу. Який препарат слід йому призначити в якості заміни?

715. Першочергова мета невідкладної допомоги при колапсі — підвищити АТ. Який із перелічених препаратів треба використати для цього ефекту?

716. Під час ввідного наркозу тіопенталом у хворого впав артеріальний тиск і пригнітилося дихання. Від якого засобу невідкладної допомоги потрібно чекати найбільшого ефекту в цьому випадку?

717. Під час вечірнього обходу лікар почув від хворої скарги зі сторони серця і прийняв рішення призначити їй аналептик, що володіє прямою дією на серце. Який препарат із групи аналептиків з прямою дією на серце раціонально призначити цій хворій?

718. Під час наркозу у стадії хірургічного сну у хворого з'явились ознаки пригнічення дихання. Який із вказаних препаратів вибере лікар для підтримки дихання у хворого, якщо врахувати, що операція ще не завершилась?

719. Під час операції у пацієнта, що знаходиться в глибокому наркозі, виникла небезпека зупинки дихання. Вкажіть, який стимулятор дихання потрібно застосувати в даній ситуації.

- 720. Після тривалого застосування аміназину в зв'язку з розвитком побічних ефектів лікар призначив пацієнту інший препарат з групи похідних бутерофенону. Який з перерахованих препаратів належить до цієї групи засобів?**
- 721. Після тривалого застосування аміназину в зв'язку з розвитком побічних ефектів лікар призначив пацієнту інший препарат з групи нейролептиків. Який з перерахованих препаратів належить до групи нейролептиків?**
- 722. Побічними ефектами, спільними для більшості фенотіазинів, є**
- 723. Позначте антипсихотичний засіб, похідний тіоксантену**
- 724. Позначте загальнотонізуючий засіб тваринного походження**
- 725. Позначте седативний засіб, який не викликає кумуляції**
- 726. При інфаркті міокарду була проведена нейролептанальгезія. Який препарат з групи нейролептиків найчастіше застосовується спільно з фентанілом?**
- 727. При оперативному втручанні для загальної анестезії використано комбінацію інгаляційного анестетика і похідного барбітурової кислоти. Яку з перелічених комбінацій препаратів**
- 728. Протиблювотний ефект антипсихотичних засобів пов'язаний з блокадою дофамінових рецепторів**
- 729. Систематичне введення хворому з пост грипозною астеною сиднокарбу викликало покращення сприймання, уваги, мислення і підвищило розумову працездатність. Який молекулярний субстрат цієї дії?**
- 730. Який ефект кофеїну, обумовлений збудженням центрів довгастого мозку**

731. Який аналептик активує гіпофізарно-наднирникову систему організму та збільшує у крові рівень глюкокортикоїдів?

732. Який антипсихотичний засіб має психоседативний ефект менше, ніж у аміназину і в меншій мірі понижує артеріальний тиск, але часто викликає екстрапірамідні розлади?

733. Який засіб викликає антидепресивний і седативний ефекти, невибірково пригнічує нейрональне захоплення моноамінів (норадреналіну і серотоніну)?

734. Який засіб використовують для лікування депресії при супутніх серцево-судинних захворюваннях?

735. Який засіб володіє антидепресивними і психостимулюючими властивостями, вибірково пригнічує нейрональне захоплення серотоніну, але не проявляє атропіноподібної дії?

736. Який засіб ліквідує продуктивну симптоматику психозів і не викликає екстра пірамідних порушень?

737. Який механізм дії трициклічних антидепресантів?

738. Який препарат з групи аналептиків слід призначити при гострому отруєнні морфіном:

739. В поліклініку звернувся хворий 35 років зі скаргами на тривалу застуду. Скарги: апатія, нежить, кашель, слезотеча. Температура нормальна. На шкірі вугруватий висип. Із анамнезу з'ясовано, супутнє захворювання - невроз, який тривалий час лікується різноманітними прописаними мікстурами. Який препарат став причиною ускладнення?

740. В поліклініку звернулася жінка із скаргами на поганий настрій, безсоння, болі в серці. Який засіб для лікування неврозу слід призначити хворій?

- 741. В психіатричній клініці при тривалому лікуванні у хворого з'явилися симптоми паркінсонізму. Який препарат отримувач пацієнт?**
- 742. В психіатричну клініку доставлений хворий 40 років у стані збудження, агресії, марення. Який препарат слід призначати?**
- 743. Дитина народилася в стані асфіксії. Який препарат необхідно ввести новонародженому для стимуляції дихання?**
- 744. Дитина народилася в стані асфіксії. Який препарат необхідно ввести новонародженому для стимуляції дихання?**
- 745. Дитині, що народилася в стані асфіксії, лікар ввів у пупочну вену препарат для стимуляції дихання. Який препарат міг ввести лікар?**
- 746. Для лікування депресії психіатр призначив ніаламід. Про що необхідно попередити пацієнта у такому випадку?**
- 747. Для лікування депресій, які супроводжуються в'ялістю, загальмованістю, безініціативністю, зокрема при інволюційних і невротичних депресіях доцільно призначати такий антидепресант, як:**
- 748. Для покращення мнестичних процесів після перенесеного інсульту пацієнтові доцільно призначити:**
- 749. Для проведення оперативного втручання необхідно використати загальне охолодження. При застосуванні якого препарату у комбінації з фізичним охолодженням спостерігається виразна гіпотермія?**
- 750. До жінки, що намагалась покінчити з життям, був викликаний психіатр, який виявив стан ендогенної депресії. Який препарат найбільш доцільно призначити хворій для проведення курсу лікування?**

- 751. До жінки, яка намагалась покінчити з життям, був викликаний психіатр, який виявив стан ендогенної депресії. Який препарат найбільш доцільно призначити хворій для проведення курсу лікування?**
- 752. До жінки, яка намагалася покінчити життя самогубством, був викликаний психіатр, який виявив стан ендогенної депресії. Який препарат найбільш доцільно призначити хворій для проведення курсу лікування?**
- 753. До лікаря звернувся хворий зі скаргами на нежить, пригнічений настрій, появу вугрів на шкірі. При опиті з'ясовано, що хворий на протязі трьох тижнів приймав мікстуру, яку йому виписав невропатолог. З вживанням яких препаратів, якої групи пов'язані скарги пацієнта?**
- 754. До лікаря звернувся хворий зі скаргами на нежить, пригнічений настрій, появу "прищів" на шкірі. Під час опитування з'ясовано, що хворий протягом трьох тижнів приймав мікстуру, яку йому прописав невропатолог. З прийманням препаратів якої групи пов'язані скарги пацієнта?**
- 755. До лікаря звернувся хворий зі скаргами на нездужання, пригноблений настрій, появу "прищів" на шкірі. При опитуванні з'ясувалося, що хворий протягом останніх 3 тижнів приймав мікстуру, прописану невропатологом. З прийманням препаратів якої групи пов'язані скарги пацієнта?**
- 756. До лікаря звернулася жінка 48 років, що тривало та безконтрольно приймала натрію бромід, зі скаргами на загальмованість, порушення пам'яті, нежить, кашель. Яка причина цього?**
- 757. До лікаря звернулася жінка зі скаргами на слабкість, швидку стомлюваність, сонливість, головний біль. АТ 90/60 мм рт. ст. Поставлений діагноз гіпотонічна хвороба. Який препарат необхідно призначити хворій?**
- 758. У хворого на маніакально-депресивний психоз спостерігаються пригнічення психічної і рухової активності, тривожно-депресивний стан. Який препарат необхідно йому призначити для зняття патологічної депресії?**

759. До лікаря поліклініки звернувся юнак 19 років із скаргами на біль у ділянці серця. Виявилося, що він полюбляє каву і вживає до 8 склянок цього міцного напою в день. Чому кава, яка містить кофеїн, може погіршувати серцеву діяльність?

760. До неврологічного відділення доставлено хворого зі скаргами на зниження пам'яті і розумової працездатності, порушення сну, запаморочення. Перелічені симптоми хворий пов'язує із струсом мозку 2 роки назад у результаті автомобільної аварії. Призначте препарат, який покращує метаболізм головного мозку.

761. До нетрадиційних станів при яких призначають антидепресанти належить:

762. До приймального відділення був доставлений хворий у непритомному стані з передозуванням снодійними препаратами. Який лікарський засіб необхідно призначити пацієнтові для стимуляції дихального та судинно - рухового центрів?

763. До психіатричної лікарні доставлений хворий 40 років у стані збудження, агресії, марення. Який препарат слід призначити хворому?

764. До седативних засобів належать усі засоби, крім:

765. Жінка 35 років звернулася до лікаря зі скаргами на дратівливість, швидку втомлюваність, підвищену сенситивність, безсоння. Для усунення неврозу лікар призначив пацієнтці транквілізатор діазепам. Назвіть фармакодинамічний ефект діазепаму, що дав можливість застосувати його за цих обставин.

766. Жінка 63 років приймала пірацетам для відновлення функції ЦНС післяішемічного інсульту. Стан хворого значно покращився. Який механізм дії даного препарату?

767. Жінка після перенесеного потрясіння погано спить. Якому з перерахованих снодійних засобів слід віддати перевагу для лікування безсоння?

768. Молодій особі в стані важкого алкогольного сп'яніння лікар швидкої допомоги серед інших заходів провів внутрішньом'язеве введення розчину кофеїну. Поясніть на основі якого принципу дії дана маніпуляція є доцільною.

769. На прийомі у лікаря хворий скаржиться на швидку втому, слабкість, + сонливість. Об'єктивне обстеження показало: АТ 90/55 мм рт ст. Решта показників в межах норми. Що доцільно призначити в даному випадку?

770. Пацієнт 68 років звернувся у поліклініку із скаргами на розлади психіки, котрі він пов'язує із тривалим вживанням фенобарбіталу. Який препарат слід йому призначити в якості снодійного засобу?

771. Пацієнт 68 років звернувся у поліклініку із скаргами на розлади психіки, котрі він пов'язує із тривалим вживанням фенобарбіталу. Який препарат слід йому призначити?

772. Пацієнтові з нав'язливими станами призначили діазепам. З чим пов'язана анксиолітична дія бензодіазепінових похідних?

773. Під час барбітурового наркозу у хворого 65 років почалося пригнічення дихання. Анестезіолог зробив внутрішньовенну ін'єкцію 10 мл 0,5% розчину бемегриду. Стан хворого покращився, об'єм легеневої вентиляції збільшився. Яке явище покладено в основу взаємодії цих препаратів?

774. Під час видалення зуба у пацієнта виник колаптоїдний стан, хворий знепритомнів. Який препарат необхідно використати для швидкого виведення пацієнта з цього стану?

775. Під час операції у пацієнта в глибокому наркозі виникла загроза зупинки дихання. Назвіть, який стимулятор дихання слід застосувати в даній ситуації.

776. Під час щелепно-лицьової операції в стаціонарі лікар-стоматолог для премедикації, з метою зменшення почуття жаху та для потенціювання дії анестетиків, хворому призначив транквілізатор – похідне бензодіазепіну. Який з перелічених засобів призначив лікар?

777. Підберіть найбільш адекватне лікування для систематичного лікування хворого з вираженою продуктивною симптоматикою (марення, галюцинації)

778. При інфаркті міокарда була проведена нейролептаналгезія. Який препарат з групи нейролептиків найчастіше застосовується спільно з фентанілом?

779. При органічних пошкодженнях головного мозку пам'ять може покращити:

780. У хворого після тривалого курсу лікування шизофренії виникли явища паркінсонізму. Який з нижчеперелічених препаратів міг викликати дане ускладнення?

781. У хворого спостерігаються явища психозу у вигляді психомоторного збудження, слухових і зорових галюцинацій. Назвати препарат, показаний при описаному стані.

782. У хронічного алкоголіка розвинувся психоз. Які препарати доцільно при цьому використовувати?

783. Протягом двох тижнів хвора лікувалась вдома самостійно з приводу ГРВІ та шкірних висипань, однак покращення не було. Дільничний терапевт при зборі анамнезу з'ясувала, що перед цим пацієнтка протягом двох тижнів приймала призначену невропатологом мікстуру з приводу неврастенії та встановила діагноз “бромізм”. Що доцільно призначити у такому випадку?

784. Протягом двох тижнів хвора приймала мікстуру, призначену невропатологом з приводу неврастенії. Самопочуття хворої дещо покращилося, однак незабаром з`явилися скарги на нежить, кон`юнктивіт, шкірні висипи, млявість та послаблення пам`яті. Був встановлений діагноз бромізм. Що доцільно призначити для послаблення симптомів?

785. Студент звернувся до лікаря з проханням допомогти йому перебороти страх перед стоматологічними маніпуляціями. Який препарат порадив йому прийняти лікар?

786. Тривале призначення галоперидолу хворому шизофренією призвело до суттєвого послаблення галюцинаторного синдрому. З дією на який молекулярний субстрат пов`язаний ефект нейролептика в цьому випадку?

787. У хворого гострий інфаркт міокарда супроводжується стійкими болями за грудниною. Неефективність попередньо ведених препаратів дала підставу лікарю провести нейролептаналгезію. Який нейролептик використовують для цього виду знеболення?

788. У дитини 9 років виявлено порушення навчання, зниження інтелектуального розвитку. Призначення якої групи психотропних засобів є виправданим в даному випадку?

789. У другій половині вагітності жінка приймала транквілізатори групи бензодіазепінів. Пологи настали в строк, проходили нормально, але народилась дитина з численними аномаліями розвитку (заяча губа, полідактилія). Як називається описана дія?

790. У клініку “швидкої допомоги” доставлено хворого з легким отруєнням снодійними. Який препарат потрібно негайно ввести хворому?

791. У неврологічне відділення доставлено хворого зі скаргами на погіршення пам`яті та розумової працездатності після перенесеної травми голови. Запропонуйте лікарський засіб для покращання метаболізму головного мозку.

792. У неврологічне відділення поступив пацієнт зі скаргами на зниження пам'яті, розумової працездатності та головокружіння. Свій стан пов'язує з перенесеною автокатастрофою. Виберіть адекватне лікування

793. У пацієнта спостерігаються явища психозу з психомоторним збудження, зоровими та слуховими галюцинаціями. Вкажіть засіб показаний при описаному стані:

794. У поліклініку звернувся хворий 35 років зі скаргами на тривалу застуду. У хворого спостерігаються апатія, нежить, кашель, сльозотеча. Температура нормальна. На шкірі вугруватий висип. Із анамнезу з'ясовано, що хворий страждає неврозом, він тривалий час приймав препарати для лікування неврозу. Який препарат став причиною ускладнення?

795. У поліклініку звернулася за допомогою жінка із скаргами на поганий настрій, безсоння, болі в серці. Який засіб для лікування неврозу слід призначити хворій?

796. У приймальне відділення доставлено хворого з пригніченням дихання. Препарати якої фармакологічної групи стимулюють дихання при його пригніченні?

797. У психіатричній клініці при тривалому лікуванні у хворого з`явилися симптоми паркінсонізму. Який препарат вводили?

798. У психіатричну клініку доставлений хворий 40 років у стані збудження, агресії, марення. Який препарат слід ввести?

799. У реанімаційному відділенні перебуває хворий з отруєнням препаратом - похідним барбітурової кислоти. Введений антидот. У якого з антидотів у механізмі дії закладений принцип прямого антагонізму із снодійними в дії на дихальний центр?

800. У хворого діагностовано гострий інфаркт міокарда, який супроводжується стійкими болями за грудниною. Неефективність попередньо введених препаратів дала підставу лікарю провести нейролептаналгезію. Який нейролептик використовується для цього виду знеболення?

801. У хворого для усунення депресивного синдрому призначений інгібітор монооксигенази - іпразид. При обстеженні хворого з'ясувалось, що АТ у хворого підвищене - 180/90 мм рт. ст. Які харчові продукти слід виключити з раціону?

802. У чоловіка 36 років з черепно- мозковою травмою дихання слабке, пульс ниткоподібний, рефлексі відсутні. Який шлях введення пірацетаму найбільш доцільний у даному випадку?

803. Фармакологічні ефекти сибазону (діазепаму):

804. Характерні специфічні побічні ефекти нейролептиків - усі, крім:

805. Хвора протягом двох тижнів приймала призначену невропатологом мікстуру з приводу неврастенії. Самопочуття хворої дещо покращилось, однак незабаром з'явилися скарги на нежить, кон'юнктивіт, шкірні висипи, в'ялість та ослаблення пам'яті. Був встановлений діагноз бромізм. Що доцільно призначити для усунення симптомів?

806. Хвора 63 років з артритом на тлі лікування ацетилсаліциловою кислотою (аспірин) поскаржилась на нудоту, тяжкість в епігастрії. Лікар відмінив аспірин і призначив протизапальний засіб із групи селективних інгібіторів ЦОГ-2. Назвіть потрібний для хворої препарат.

807. Хвора протягом двох тижнів приймала призначену невропатологом мікстуру з приводу неврастенії. Самопочуття хворої декілька покращилось, однак незабаром з'явилися скарги на нежить, кон'юнктивіт, шкірні висипи, в'ялість та послаблення пам'яті. Препарат якої групи міг визвати подібну побічну дію?

808. Хворий 18-ти років звернувся до лікаря зі скаргами на безсоння, що проявляється у важкому засипанні. В результаті цього він не висипається і на наступного дня перевтомлений, важко засвоює новий матеріал. Лікар встановив, що безсоння пов'язане з невротоподібним станом. Зробіть раціональний вибір снодійного засобу:

809. Хворий 38 років, що страждає на шизофренію, тривалий час лікувався психотропними засобами. Він звернувся до лікаря із скаргами на порушення координації рухів, тремор у руках, сонливість. Яка група препаратів може викликати такий симптомокомплекс?

810. Хворий 50 років страждає шизофренією. Йому була зроблена внутрішньовенна ін'єкція аміназину для усунення марення, після чого хворий втратив свідомість. Яка причина цього ускладнення?

811. Хворий госпіталізований у коматозному стані з помірним пригніченням дихання і серцевої діяльності після приймання препаратів барбітурової кислоти. Призначити антидотну терапію.

812. Хворий звернувся до лікаря зі скаргами на безсоння, швидку стомлюваність. Як заспокійливий засіб йому призначили лікарський препарат. Невдовзі симптоми зникли, але хворий продовжував приймати препарат з профілактичною метою. Через деякий час у нього з'явилися нежить, кашель, кон'юнктивіт, дерматит, сонливість, погіршення пам'яті. Лікар поставив діагноз кумуляція даного лікарського препарату і призначив лікування хлоридом натрію і часте пиття. Який препарат приймав хворий?

813. Хворий звернувся до лікаря зі скаргами на страх, відчуття неспокою, внутрішнього напруження, що виникли після душевної травми. Який препарат слід йому призначити?

814. Хворий звернувся до невропатолога зі скаргами на дратівливість, безсоння та швидку втомлюваність. Після призначеного лікування симптоми зникли, однак пацієнт продовжував приймати приписаний лікарський засіб. Через деякий час з'явилися кашель, нежить, дерматит, кон'юнктивіт, погіршення пам'яті. Лікар поставив діагноз кумуляції даного препарату та призначив натрію хлорид. Що приймав пацієнт?

815. Хворий переніс інсульт. Який з перелічених препаратів слід внести до комплексної терапії з метою покращання кровообігу головного мозку?

816. Хворий похилого віку скаржиться на головний біль, запаморочення, швидку втому, погіршення пам'яті. В анамнезі черепно-мозкова травма. Яку групу препаратів необхідно призначити?

817. Хворий протягом двох тижнів отримувал лікарську терапію з приводу психозу. Стан хворого поліпшився, однак невдовзі з'явилися ригідність, тремор, гіпокінезія. Який з перелічених препаратів викликає названі ускладнення?

818. Хворий протягом двох тижнів отримувал медикаментозну терапію з приводу психозу. Стан хворого поліпшився, однак невдовзі з'явилися ригідність, тремор, гіпокінезія. Який з наведених препаратів викликає такі ускладнення?

819. Хворий, що лікувався з приводу неврозу сибазоном, відчув зубний біль. Лікар призначив йому знеболювальний засіб у дозі, меншій від середньої терапевтичної. Яке явище врахував лікар, зменшуючи дозу препарату?

820. Хворий, який страждає на шизофренію, тривалий час знаходився на лікуванні психотропними засобами. Він звернувся до лікаря із скаргами на порушення координації рухів, тремор у руках, сонливість. Яка група препаратів можуть викликати такий симптомокомплекс?

821. Хворому для лікування психотичного стану було призначено трифтазин. Який механізм його антипсихотичної дії?

822. Хворому в депресивному стані призначили ніаламід. Лікар застеріг хворого про необхідність виключити з харчування в період лікування сиру. Це пов'язано з ризиком розвитку:

823. Хворому в депресивному стані призначили ніаламід. Лікар застеріг хворого про необхідність виключити з харчування в період лікування:

824. Хворому в депресивному стані призначили препарат з групи інгібіторів MAO. Який харчовий продукт необхідно виключити з раціону в період лікування?

825. Хворому для лікування психозу було призначено трифтазин. Який механізм його антипсихотичної дії?

826. Хворому для усунення депресивного синдрому призначено інгібітор монооксигенази - іпразид. При обстеженні з'ясувалось, що АТ підвищений - 180/90 мм. рт. ст. Які харчові продукти слід виключити з раціону?

827. Хворому з депресивним синдромом лікар призначив препарат, наголосивши на необхідності виключити з раціону харчові продукти, що містять тирамін (сир, пиво, копченості тощо). Проте через деякий час хворий став порушувати дієту і в нього виникла гіпертензія. Який препарат було призначено хворому?

828. Хворому з маніакально- депресивним синдромом у стадії депресії, який скаржився на відчуття тривоги, страху, був призначений антидепресант із супутнім психоседативним ефектом. Який це був препарат?

829. Хворому з маніакально- депресивним синдромом у стадії депресії з відчуттям тривоги, страху був призначений антидепресант із супутнім психоседативним ефектом. Який це препарат?

830. Хворому з маніакально-депресивним синдромом в стадії депресії, який скаржився на відчуття тривоги, страху, був у стані ажитації та збудження необхідно призначити антидепресант із супутнім психоседативним ефектом. Який це препарат?

831. Хворому з порушеннями психоемоційної сфери та розладом сну був призначений діазепам. Що лежить в основі загальної дії діазепаму?

832. Хворому з порушеннями психоемоційної сфери та розладом сну був призначений діазепам. Що покладено в основу загальної дії діазепаму?

833. Хворому на шизофренію було призначено аміназин. Який з перерахованих фармакодинамічних ефектів є підставою для його призначення даному хворому?

834. Хворому на шизофренію було призначено аміназин. Який з перелічених фармакодинамічних ефектів є підставою для його призначення даному хворому?

835. Чим відрізняються "денні анксиолітики" від інших транквілізаторів?

836. В лікарню із іншого лікувального закладу переведений хворий з діагнозом астено-депресивний синдром. На протязі останнього часу він отримував препарат, після прийому якого симптоми астенії зникли, але з'явилась тахікардія, болі в ділянці серця, підвищення АТ. Допоможіть лікарю-невропатологу розібратися в ситуації, яким препаратом проводилось лікування?

837. В поліклініку звернувся чоловік 34 років зі скаргами на тривалий нежить, кашель, сльозотечу, апатію. Температура тіла нормальна. На шкірі тулуба є висипання. При опитуванні з'ясовано, що хворий постійно лікується у невропатолога з приводу неврозу. Взаємодія якого із застосованих хворим препаратів є найвірогіднішою причиною виниклого ускладнення?

838. В пологову залу був викликаний реаніматор в зв'язку з народженням дитини в стані асфіксії. Який із аналептиків повинен вибрати лікар для збудження дихання?
839. В психіатричній клініці при тривалому лікуванні у хворого появилися симптоми паркінсонізму. Який препарат вводили
840. В психіатричну клініку доставлений хворий 40 років у стані збудження, агресії, марення. Який препарат слід ввести хворому?
841. Виберіть алкалоїд барвінку для покращення мозкового кровообігу та посилення нейрометаболічних процесів
842. Внутрішньовенне введення 2,5 % розчину аміназину хворому з явищами гострого психозу викликає антипсихотичний ефект, емоційну індиферентність і навіть депресію. З блокадою яких дофамінових рецепторів головного мозку пов'язані ці ефекти?
843. Для знеболення, при вскритті абсцесу лікар використав нейролептаналгезію (фентаніл з дроперідолом). На якій загальнофармакологічній закономірності базується застосування комбінації цих препаратів?
844. Для зняття марення і галюцинацій у хворої на шизофренію лікар використав аміназин. Який механізм антипсихотичної дії препарату?
845. Для проведення оперативного втручання необхідно використати метод загального охолодження. При застосуванні якого препарату у комбінації з фізичним охолодженням спостерігається виразна гіпотермія?
846. До жінки, що намагалась покінчити з життям, був викликаний психіатр, який виявив стан ендогенної депресії. Який препарат найбільш доцільно призначити хворій для проведення курсу лікування?

847. До лікаря звернувся хворий зі скаргами на нежить, пригнічений настрій, появу "прищів" на шкірі. При опиті з'ясовано, що хворий на протязі трьох тижнів приймав мікстуру, яку йому виписав невропатолог. З вживанням яких препаратів, якої групи пов'язані скарги пацієнта?

848. До приймального відділення був доставлений хворий у непритомному стані з різким пригніченням дихання та серцевої діяльності, зниженням сухожильних рефлексів. За словами супроводжуючої його дружини він в останній час страждав на безсоння та приймав на ніч снодійні засоби. Який лікарський препарат необхідно ввести хворому для невідкладної допомоги?

849. Жінка після перенесеного нервового потрясіння погано спить. Якому з перерахованих снодійних засобів слід віддати перевагу для лікування безсоння?

850. Жінка, 35 років, звернулася до лікаря зі скаргами на дратівливість, швидку втомлюваність, підвищену чутливість, безсоння. Для усунення неврозу лікар призначив пацієнтці транквілізатор діазепам. Вкажіть фармакодинамічний ефект діазепаму, що дав можливість застосувати його за даних обставин?

851. Студент звернувся до лікаря з проханням допомогти йому перебороти страх перед стоматологічними маніпуляціями. Лікар порадив йому прийняти препарат;

852. У жінки 56 років, котра тривало приймає аміназин, виник лептичний синдром і значно виражений тремор рук. Який з наведених механізмів реалізований при виникненні цього стану?

853. У жінки захворювання серця ускладнилось дихальною недостатністю. Який препарат із групи аналептиків, що має властивості камфори і добре розчинюється у воді, можна ввести внутрішньовенно для надання їй швидкої допомоги?

- 854. У медичної сестри після дворічної роботи в психіатричному відділенні на руках розвинувся нейродерматит. Який препарат викликає цю побічну дію у медичного персонала?**
- 855. У пацієнта діагностовано гострий інфаркт міокарда, який супроводжується стійкими болями за грудниною. Неефективність раніше введених препаратів дала привід лікарю провести нейролептаналгезію. Який нейролептик слід використати?**
- 856. У хворих, що тривалий час приймають нейролептики, частим ускладненням є паркінсонізм. При появі перших ознак цього захворювання препарат відмінюють. Який препарат із групи нейролептиків тривалий час не викликає явищ паркінсонізму і його можна використати для заміни лікарського засобу, що викликав паркінсонізм?**
- 857. У хворого 37 років, що страждає шизофренією, на тлі лікування психотропними засобами з'явилося порушення координації рухів, тремтіння рук, сонливість. Які лікарські засоби найбільш ймовірно могли викликати цей стан?**
- 858. Хворій 39 років для зняття гіпертонічного кризу ввели розчин пентаміну. Який механізм дії препарату?**
- 859. У хворого для усунення депресивного синдрому призначений інгібітор монооксигенази - ніаламід. Які харчові продукти слід виключити з раціону?**
- 860. У хворого на маніакально-депресивний психоз спостерігаються пригнічення психічної і рухової активності, тривожно-депресивний стан. Який препарат необхідно йому призначити для зняття патологічної депресії?**
- 861. У хворого після тривалого курсу лікування в'ялопротікаючої шизофренії виникли явища паркінсонізму. Який з нижчеперерахованих препаратів міг викликати дане**

862. У хворого спостерігаються прояви психозу у вигляді психомоторного збудження, слухових і зорових галюцинацій. Вказати препарат, показаний при даному стані:

863. У хворі М. 60 років з нейроциркуляторною (первинною) артеріальною гіпотензією купіровали гіпотонічний криз підшкірним введенням 1 мл 20 % розчину кофеїну бензоату натрію. Який механізм дії цього препарату?

864. У хронічного алкоголіка розвинувся психоз. Які препарати доцільно при цьому використовувати?

865. Указати стимулятор дихання при отруєнні барбітуратами легкого ступеня

866. Хвора протягом двох тижнів приймала призначену невропатологом мікстуру з приводу неврастенії. Самопочуття хворої декілька покращилось, однак незабаром з'явилися скарги на нежить, кон'юктивіт, шкірні висипи, в'ялість та послаблення пам'яті. Був встановлений діагноз "бромізм". Що доцільно призначити для послаблення симптомів?

867. Хвора протягом двох тижнів приймала призначену невропатологом мікстуру з приводу неврастенії. Самопочуття хворої декілька покращилось, однак незабаром з'явилися скарги на нежить, кон'юктивіт, шкірні висипи, в'ялість та послаблення пам'яті. Препарат якої групи міг визвати подібну побічну дію?

868. Хворий 37 років, що страждає на облітеруючий ендартеріїт судин нижніх кінцівок, одержує фенілін в добовій дозі 60 мг/кг. В зв'язку з проявами судомного синдрому (в анамнезі ЧМТ) призначений фенобарбітал, після відміни якого у хворого виникла носова кровотеча. Дане ускладнення пов'язане з:

869. Хворий переніс інсульт. Який із перелічених препаратів слід включити в комплексну терапію з метою покращення метаболізму головного мозку?

- 870. Хворий скаржиться на швидку втому, слабість, сонливість. Об'єктивне обстеження показало: АТ 90/55 мм рт ст. Інші показники в межах норми. Що доцільно призначити?**
- 871. Хворій 40 років з явищами неврозу, яка скаржиться на постійне почуття тривоги, було призначено препарат з антиксіолітичною дією. Який це препарат?**
- 872. Хворого із слабо вираженими проявами синдрому Паркінсона очікує тривале застосування нейролептика, більшість з яких викликає і посилює названу патологію. Який нейролептик найменш небезпечний в такому випадку?**
- 873. Хворому 36 років на гострий психоз з явищами марення та галюцинацій було призначено лікарський засіб з антипсихотичною дією. Який це препарат?**
- 874. Хворому 40 років необхідно призначити препарат для лікування ускладнення терапії бромідами, які викликали сонливість, апатію, катаральний стан слизових оболонок верхніх дихальних шляхів, дерматит. Який препарат слід призначити в першу чергу?**
- 875. Хворому для лікування психотичного стану було призначено трифтазин. Який механізм його антипсихотичної дії?**
- 876. Хворому з алкогольним психозом був призначений нейролептик — похідне бутирофенону. Який з препаратів відноситься до цієї групи?**
- 877. Хворому з депресивним синдромом лікар призначив препарат, наголосивши на необхідності виключити з раціону харчові продукти, що містять тирамін (сир, пиво, копченості тощо). Проте через деякий час хворий став порушувати дієту і в нього виникла гіпертензія. Який препарат було призначено хворому?**
- 878. Хворому з порушенням психоемоційної сфери та розладом сну був призначений діазепам. Що лежить в основі психозаспокійливої дії діазепаму?**

879. Хворому з психомоторним збудженням введено внутрішньом'язево 2 мл 2,5% розчину аміназину, що супроводжувалося різким зниженням артеріального тиску. Що потрібно ввести хворому для нормалізації артеріального тиску?

880. Хворому на шизофренію було призначено аміназин. Який з перерахованих фармакодинамічних ефектів є підставою для його призначення даному хворому?

881. Хворому при безсонні, викликаному емоційними розладами, лікар призначив засіб, що викликає сон за рахунок транквілізуючої дії. Який снодійний препарат був призначений

882. Чоловіка 42 років протягом місяця непокоять нежить, кашель, слезотеча. Температура тіла нормальна. Апатичний. При огляді на шкірі тулуба є вугрева висипка. З'ясовано, що протягом 3 місяців хворої приймає броміди. Який лікарський препарат найбільш доцільно призначити хворому?

883. Чоловікові 49 років, що страждає хронічним алкоголізмом, для ліквідації агресії і марення була зроблена внутрішньовенна ін'єкція аміназину, що викликало у хворого втрату свідомості. Яка найвірогідніша причина виниклого ускладнення?

884. В результаті необережного поводження з фосфорорганічним інсектицидом у робітника виник бронхоспазм. Який з пропонованих бронхолітиків показаний в цій ситуації?

885. В умовах запалення знижується сила місцевоанестезуючої дії лідокаїну. В умовах якого стану у вогнищі запалення виникає порушення гідролізу солі новокаїну і вивільнення активного анестетика-основи?

886. Визначте групу препаратів місцевої дії, які при нанесенні на слизові оболонки викликають денатурацію (осадження) білків і ущільнення поверхневого шару слизової оболонки, виявляючи протизапальну дію.

887. Порекомендуйте місцевий анестетик для проведення інфільтраційної анестезії пацієнту з алергічною реакцією на новокаїн в анамнезі.

888. Потерпілий обробляв рослини інсектицидами без індивідуальних засобів захисту. Через деякий час з'явилися симптоми отруєння. Речовина, що викликала отруєння, належить до групи:

889. Препарати з цієї групи лікарі - стоматологи використовують при операціях для зниження секреції слинних залоз, для запобігання ларингоспазму, нудоті, брадикардії. Назвіть групу препаратів.

890. При проведенні анестезії лікар-анестезіолог передозував дозу тубокурарину хлориду. Хворому призначили прозерин. На чому базується дія цього препарату?

891. У очне відділення лікарні поступив пацієнт з різким болем в оці внаслідок попадання стороннього тіла, яке він в домашніх умовах не зміг видалити. Який вид місцевої анестезії показаний для видалення стороннього тіла з ока?

892. Хворому для знеболення рани призначили місцевоанестезуючий засіб у вигляді мазі, який нерозчинний у воді і застосовується тільки у вигляді мазей, паст, присипок. Назвіть цей препарат.

893. В дитини спостерігаються залишкові явища перенесеного поліомієліту. Який лікарський засіб можна призначити?

894. В лікарню доставлено хворого, який втратив свідомість. Щоб привести його до тями, лікар дав йому понюхати розчин аміаку. Який вид дії лежить в основі даного фармакологічного ефекту препарату?

895. В лікарню поступив хворий з приводу травми ока в результаті попадання металевої стружки. Виберіть препарат для місцевої термінальної анестезії при проведенні болючих маніпуляцій на оці.

896. В лікарню потрапила дитина 6 років з різко вираженими симптомами рухового і мовного збудження, сухістю в роті, утрудненим ковтанням, хриплим голосом. Шкіра суха, гаряча. Зіниці різко розширені, фотофобія, тахікардія. З анамнезу встановлено, що дитина з'їла якісь ягоди темно-фіолетового кольору. Вплив якої з токсичних речовин є причиною отруєння?
897. В лікарню потрапила дитина з отруєнням ягодами красавки. Вплив якої з токсичних речовин є причиною отруєння?
898. В приймальне відділення лікарні було доставлено чоловіка 25 років з ознаками отруєння дихлофосом. Вкажіть лікарський засіб, який застосовується при отруєнні фосфорорганічними сполуками:
899. В урологічне відділення доставлений чоловік з симптомами ниркової кольки. Який з нижеперерахованих лікарських засобів найбільш доцільно використовувати для ліквідації цього стану?
900. В хірургічне відділення поступив хворий із гнійним запаленням м'яких тканин пальця. Який вид місцевого знеболення показаний в даному випадку для проведення вскриття панарицію?
901. Внаслідок Чорнобильської аварії відбулось забруднення навколишнього середовища радіонуклідами, що спричиняє їх поступлення в організм людей з харчовими продуктами. Виберіть препарати, які можуть зв'язати радіонукліди у просвіті травного каналу.
902. Дитина 2 років випила очні краплі з домашньої аптечки. Стан важкий, значне пото- і слиновиділення, астматичне дихання, кашель, зіниці різко звужені, тони серця глухі, брадикардія. Перистальтика кишечника посилена, пронос, артеріальний тиск знижений. Яким препаратом викликане отруєння?
903. Дитина випадково випила із флакона розчин, який її бабуся використовувала для лікування глаукоми. Виявилось, що це був пілокарпін гідрохлорид. Який лікарський засіб можна застосувати в якості антидоту?

904. Для дослідження очного дна необхідно розширити зіницю. Назвіть речовину, яка для цього використовується в клініці.

905. Для премедикації анестезіолог ввів хворому препарат із групи М-холіноблокаторів, який погано проникає через гематоенцефалічний бар'єр. Який із зазначених препаратів використав лікар?

906. Для проведення маніпуляції екстракції зуба хворому була проведена провідникова місцева анестезія новокаїном. Через 5-7 хвилин появились ознаки зниження АТ. Який препарат необхідно негайно ввести для нормалізації тиску?

907. До лікарні госпіталізований хворий з приводу травми ока у результаті попадання металевої стружки. У хворого набряк ока, різка гіперемія, слезотеча, біль при миганні. Видалення стороннього тіла можливе тільки під місцевою анестезією. Виберіть препарат для цього.

908. До лікарні прийнята дитина 6 років з різко вираженими симптомами рухового і мовного збудження, сухістю в роті, утрудненим ковтанням, хриплим голосом. Шкіра суха, гаряча. Зіниці різко розширені, фотофобія, тахікардія. З анамнезу встановлено, що дитина з'їла якісь ягоди темно-фіолетового кольору. Вплив якої з токсичних речовин є причиною цього?

909. До лікаря звернувся пацієнт зі скаргами на запаморочення, відчуття спраги, утруднення ковтання, погане бачення близьких предметів. Об'єктивно у нього часте дихання, розширені зіниці, загальне збудження, говірливість, однак мова малозрозуміла. АТ 110/70 мм рт. ст., пульс 110 за 1 хв. Про передозування якого препарату можуть свідчити наведені симптоми?

910. До невропатолога звернувся чоловік 25 років із скаргами на слабкість у ногах та порушення ходи. Лікар діагностував міастенію і призначив хворому ін'єкції прозерину. Який механізм дії цього засобу?

911. До офтальмолога звернулися чоловік з скаргами на болі в правому оці, погіршення зору. Дослідження показало, що внутрішньоочний тиск в цьому оку значно підвищений. Який препарат потрібно призначити хворому?

912. До приймального відділення був доставлений хворий зі скаргами на запаморочення, зниження гостроти зору, нудоту, слинотечу та спастичні болі в животі. Був встановлений діагноз – отруєння фосфорорганічними сполуками. Що доцільно ввести до складу комплексної терапії?

913. До приймального відділення доставили хворого зі скаргами на сухість у роті, світлобоязнь і порушення зору. Шкіра гіперемійована, суха, зіниці розширені, тахікардія. При подальшому обстеженні був поставлений діагноз отруєння алкалоїдами беладони. Який із лікарських засобів доцільно призначити?

914. До приймального відділення доставлений хворий з діагнозом: отруєння алкалоїдами красавки. Який з лікарських засобів доцільно включити в склад комплексної терапії?

915. До приймального відділення доставлений хворий зі скаргами на сухість в роті, світлобоязнь та порушення зору. Шкіра гіперемійована, суха, зіниці розширені, тахікардія. При подальшому обстеженні був встановлений діагноз отруєння алкалоїдами беладони. Який з лікарських засобів доцільно призначити?

916. Прозерин при систематичному введенні щуру підвищує тонус скелетних м'язів. Фторотан викликає релаксацію скелетних м'язів і послабляє ефекти прозерину. Визначте характер взаємодії прозерину і фторотану.

- 917. До приймального відділення лікарні доставлено дитину 5 років, у якої лікарем встановлені такі симптоми: сильне рухове збудження, марення, хриплий голос, розширені зіниці, які не реагують на світло, суху, гарячу, гіперміювану шкіру, тахікардію, тахіпное. Перелічені симптоми виникли після вживання дитиною ягід беладони. Препарат якої фармакологічної групи потрібно призначити для лікування цього отруєння?**
- 918. До приймального відділення лікарні надійшла дитина з отруєнням ягодами красавки. Препарат якої фармакологічної групи потрібно призначити для лікування?**
- 919. До токсикологічного відділення доставлена дитина - хлопчик 4 років, що отруївся ягодами беладони, які містять М-холіноблокатор атропін. Який препарат слід призначити хворому в цьому стані?**
- 920. До токсикологічного відділення доставлена дитина - хлопчик 4 років, що отруївся ягодами беладони, які містять М-холіноблокатор атропін. Який препарат слід призначити хворому в цьому стані?**
- 921. До токсикологічного відділення доставлено чоловіка 40 років, який отруївся інсектицидом - хлорофосом. Який реактиватор холінестерази слід застосувати?**
- 922. До токсикологічного відділення доставлено чоловіка 40 років, який отруївся інсектицидом - хлорофосом. Який реактиватор холінестерази слід застосувати?**
- 923. До урологічного відділення доставлено чоловіка 48 років з симптомами ниркової коліки. Який препарат найбільш доцільно використати при цьому стані?**
- 924. До хірургічного відділення госпіталізований хворий з абсцесом плеча. При додатковому дослідженні виявлено шлуночкову екстрасистолію. Яке знеболення і яким препаратом найбільш доцільне в даному випадку?**

925. До хірургічного відділення доставлено хворого з гострим апендицитом. Йому було запропоновано провести апендектомію під місцевою анестезією. Однак із анамнезу з'ясувалося, що хворий часто страждає алергічними реакціями на ліки. Виберіть із зазначених препаратів найбільш доцільний для інфільтраційної анестезії в даному випадку.

926. Жінка після пересеного ішемічного інсульту мозку одержувала ін'єкції галантаміну. Стан хворої значно покращився. Який механізм дії цього засобу?

927. Пацієнт скаржиться на запаморочення, відчуття спраги, порушення ковтання, погане бачення близьких предметів. Об'єктивно: часте дихання, розширені зіниці, загальне збудження, говірливість, нерозбірлива мова. АТ - 110/70 мм рт. ст., пульс - 110 ударів за хвилину. Про передозування якого препарату можуть свідчити названі симптоми?

928. Перед проведенням інфільтраційної анестезії хворому проведено пробу на наявність сенсibiliзації (підвищеної чутливості) до новокаїну, яка виявилась позитивною. Який з перерахованих препаратів можна використати для проведення знечулення в даному випадку?

929. Під час оперативного втручання із застосуванням міорелаксантів виникли розлади дихання. Введення прозерину викликало покращання стану. Яким терміном визначається ця взаємодія ліків?

930. Після введення атропіну у хворого прискорився ритм серцевої діяльності, відмічаються сухість слизових оболонок, мідріаз. Що необхідно призначити хворому для нормалізації функцій організму?

931. Після введення лікарської речовини у піддослідної тварини зменшилося виділення слини, розширилися зіниці, а при подальшому введенні у вену ацитилхоліну частота скорочень серця істотно не змінилася. Назвіть цю речовину.

932. Потерпілий обробляв рослини розчином речовини з інсектицидною дією без індивідуальних засобів захисту. Через деякий час у нього почалося сильне виділення слюни, поту, слюзотеча, болі у животі, понос. При огляді виявлено міоз. Речовина, що викликала отруєння, належить до групи:

933. Препарат мало розчинний у воді, тому його застосовують для поверхневої анестезії у мазях, пастах, присипках, ректальних супозиторіях, а також призначають всередину у порошках при болях у шлунку, блюванні. Визначте препарат.

934. Прозерин при систематичному введенні щуру підвищує тонус скелетних м'язів. Фторотан викликає релаксацію скелетних м'язів і послабляє ефекти прозерину. Визначте характер взаємодії прозерину і фторотану.

935. Симптоми отруєння препаратами цієї групи такі: важкість повік, диплопія, порушення мови і ковтання. Розвивається розслаблення мускулатури кінцівок, в останню чергу виключаються діафрагма та міжреберні м'язи. Смерть настає від зупинки дихання. Це:

936. Системне введення речовини тварині спричинило мідріаз, зниження функції залоз зовнішньої секреції, тахікардію, розширення бронхів. Яка це речовина, якщо відомо, що вона не проникає через гематоенцефалічний бар'єр?

937. Студент 3-го курсу при проходженні медичної практики повинен був поставити гірчичники на спину хворому. Для цього він змочив гірчичники водою з температурою більше 600 С і поставив їх на спину хворому. Через півгодини студент виявив, що шкіра хворого на місці прикладення гірчичників не почервоніла. З чим пов'язана відсутність ефекту гірчичників? З інактивацією мірозину.

938. У хворого після оперативного втручання розвинувся парез кишечника. Який холінергічний засіб із групи антихолінестеразних слід йому призначити?

- 939. У дитини спостерігаються залишкові явища перенесеного поліомієліту. Який лікарський засіб йому можна призначити?**
- 940. У жінки 42 років, яка перенесла операцію на нирці, після наркозу з`явилися явища рекурарезації і зупинилось дихання. Як міорелаксант під час операції був використаний дитилін. Який засіб найбільш доцільно використати для відновлення дихання?**
- 941. У лікарню доставлено важкохворого, який по дорозі втратив свідомість. Щоб привести його до тями, лікар дав йому понюхати розчин аміаку. Який вид дії покладено в основу фармакологічного ефекту препарату?**
- 942. У приймальне відділення було доставлено хворого з такою симптоматикою: міоз, гіперсаливація, пітливість, спазм бронхів, блювання і діарея. Було встановлено діагноз отруєння фосфорорганічними сполуками. Які препарати доцільно ввести до комплексної терапії?**
- 943. У результаті впливу на які елементи шкіри та слизових оболонок розвивається термінальна анестезія?**
- 944. У стаціонар прийнятий хворий з отруєнням грибами, серед яких випадково був мухомор. Крім промивання шлунка, активованого вугілля і сольових проносних засобів всередину, а також інфузійної терапії, хворому призначили ін`єкції атропіну сульфату, в результаті имптомиотруєння значно зменшились. Назвіть тип взаємодії мускарину і атропіну.**
- 945. У токсикологічне відділення привезли дитину, яка отруїлася грибами, а саме мухоморами. Який препарат слід використати для надання невідкладної допомоги в першу чергу?**
- 946. У хворого з гострим інфарктом міокарда виникла шлуночкова аритмія. Серцевий ритм нормалізувався після введення протиаритмічного засобу з групи місцевих анестетиків. Який препарат введено?**

947. У хворого інколи виникають болі в серці, не пов'язані з фізичним навантаженням. Назвіть подразливу речовину, яка при місцевому застосуванні звужує судини слизових, а рефлекторно розширює коронарні судини?

948. У хворого міастенією після призначення прозерину з'явилися нудота, діарея, посмикування м'язів язика і скелетних м'язів. Чим можна купірувати інтоксикацію?

949. У хворого на міастенію після призначення прозерину з'явилися нудота, діарея, посмикування м'язів язика і скелетних м'язів. Чим можна купірувати інтоксикацію?

950. У хворого напади бронхіальної астми виникають переважно вночі, супроводжуються брадикардією, спастичними болями у кишечнику, поносом. Препарати якої групи можуть усунути ці симптоми?

951. У хворого після оперативного втручання розвинувся парез кишечника. Який холінергічний засіб із групи антихолінестеразних слід йому призначити?

952. У хворого після операції резекції шлунка на 2-3-й день не відновились перистальтика кишечника. Що потрібно призначити хворому для стимуляції функції шлунково-кишкового тракту?

953. У хворого, що проходить у стаціонарі курс лікування з приводу бронхіальної астми, супутнім захворюванням є глаукома. Препарати якої групи в зв'язку з цим не рекомендується використовувати в терапії бронхіальної астми?

954. Хвора на глаукому звернулася до аптеки з проханням видати їй очні краплі з атропіном сульфату, але провізор пояснила, що цей препарат їй протипоказаний. Чому атропін не призначають при глаукомі?

955. Хворий госпіталізований зі скаргами на неприємні відчуття в ділянці серця, напади гострої слабості, затьмарення свідомості, явища брадиаритмії.

Обстеження хворого кардіологами виявили наявність атріовентрикулярної блокади II ступеня з нападами Моргана-Адамса-Стокса. Який препарат слід призначити в даній ситуації?

956. Хворий 40 років був доставлений у лікарню у стані гострого нападу печінкової коліки зі скаргами на нестерпні болі у правому боці. Він перебував у вимушеному положенні. Який препарат треба ввести в першу чергу для усунення больового синдрому?

957. Хворий скаржиться на головокружіння, відчуття спраги, затруднене ковтання, погане бачення близьких предметів. Об'єктивно: часте дихання, розширені зіниці, загальне збудження, говірливість, але мова малозрозуміла. АТ - 110/70 мм рт ст. , пульс - 110/хв. Про передозування якого препарату можуть свідчити дані симптоми?

958. Хворому виразковою хворобою шлунку на фоні підвищеної кислотності шлункового соку [в анамнезі якого є глаукома] необхідно призначити М-холіноблокуючий засіб. Який засіб показаний, враховуючи супутні захворювання?

959. Хворому для ввідного наркозу внутрішньовенно ввели тіопентал натрію, після чого настав ларингоспазм, підсилилась салівація. Введення якого препарату можливо було б запобігти небажані ефекти?

960. Хворому для вступного наркозу внутрішньовенно ввели тіопентал натрію, після чого настав ларингоспазм, підсилилась салівація. Введенням якого препарату можливо було б запобігти небажаним ефектам?

961. Хворому для купірування кишкової коліки призначили атропіну сульфат. Яке із названих захворювань може бути протипоказанням у даному випадку?

962. Хворому для ліквідації кишкової кольки призначений атропіну сульфат. Яке з названих захворювань може служити протипоказанням в цьому випадку?
963. Хворому з глаукомою для зниження внутрішньоочного тиску лікар призначив прозерин у вигляді очних крапель. Який механізм дії даного препарату?
964. Хворому з метою відновлення дихання при отруєнні чадним газом був введений аналептичний засіб рефлекторного типу дії з групи н-холіномієтичних засобів. Який засіб було призначено?
965. Хворому з отруєнням недоброякісною їжею у комплексній терапії було призначено вугілля активоване. Який механізм дії даної речовини?
966. Хворому на виразкову хворобу шлунка на фоні підвищеної кислотності шлункового соку в стадії загострення (в анамнезі якого є глаукома) необхідно призначити М- холіно-блокувальний засіб. Якому з наведених засобів надати перевагу, враховуючи супутні захворювання?
967. Хворому на міастенію було призначено препарат, що викликав покращання м'язової діяльності. Але поступово виявився ряд недоліків: підвищене виділення слини, поту, діарея, нудота. Який засіб було вжито для лікування?
968. Хворому перед екстракцією зуба була проведена провідникова анестезія лідокаїном, після введення якого з'явилися набряк і гіперемія навколо місця ін'єкції, сверблячка шкіри. Визначте, як називається ускладнення?
969. Чоловік 65 років прийнятий до неврологічного відділення з діагнозом постінсультний синдром. Який препарат найбільш доцільно призначити хворому для прискорення одужання?
970. Чоловік надійшов до неврологічного відділення з діагнозом постінсультний синдром. Який препарат найбільш доцільно призначити хворому для прискорення одужання?

971. Чоловік переніс правосторонній ішемічний інсульт. Який препарат найбільш доцільно застосувати для відновлення функції холінергічних систем мозку?

972. В лікарню доставлено хворого, який втратив свідомість. Щоб привести його до тями, лікар дав йому понюхати розчин аміку. Який вид дії лежить в основі даного фармакологічного ефекту препарату?

973. В лікарню поступив хворий з приводу травми ока в результаті попадання металевої стружки. Виберіть препарат для місцевої термінальної анестезії при проведенні болючих маніпуляцій на оці.

974. В лікарню потрапила дитина 6 років з різко вираженими симптомами рухового і мовного збудження, сухістю в роті, утрудненим ковтанням, хриплим голосом. Шкіра суха, гаряча. Зіниці різко розширені, фотофобія, тахікардія. З анамнезу встановлено, що дитина з'їла якісь ягоди темно-фіолетового кольору. Вплив якої з токсичних речовин є причиною отруєння?

975. В результаті впливу на які елементи слизових оболонок та пошкоджених ділянок шкіри розвивається термінальна анестезія при застосуванні місцевих анестетиків?

976. В хірургічне відділення поступив хворий із гнійним запаленням м'яких тканин пальця. Який вид місцевого знеболення показаний в даному випадку для проведення вскриття панарицію?

977. Внаслідок Чорнобильської аварії відбулось забруднення навколишнього середовища радіонуклідами, що спричиняє їх поступлення в організм людей з харчовими продуктами. Виберіть препарати, які можуть зв'язати радіонукліди у просвіті травного каналу.

978. Дитина випадково випила із флакона розчин, який її бабуся використовувала для лікування глаукоми. Виявилось, що це був пілокарпіну гідрохлорид. Лікар призначив дитині атропіну сульфат. Який механізм лежить в основі антидотної дії атропіну

979. Для проведення маніпуляції екстракції зуба хворому була проведена провідникова місцева анестезія новокаїном. Через 5-7 хвилин появились ознаки зниження АТ. Який препарат необхідно негайно ввести для нормалізації тиску?

980. До неврологічного відділення поступив чоловік 65 років з діагнозом постінсультний синдром. Який препарат найбільш доцільно призначити хворому для прискорення одужання?

981. До приймального відділення доставлений хворий зі скаргами на сухість в роті, світлобоязнь та порушення зору. Шкіра гіпіремійована, суха, зіниці розширені, тахікардія. При подальшому обстеженні був встановлений діагноз: отруєння алкалоїдами красавки. Який з лікарських засобів доцільно застосувати?

982. До якої групи препаратів належить де-нол?

983. Пацієнт звернувся до лікаря зі скаргами на часті напади задухи, які пов'язані з підвищенням тонуусу n. vagus. Призначення якої групи препаратів буде найбільш обґрунтованим?

984. Перед проведенням інфільтраційної анестезії хворому проведено пробу на наявність сенсibiliзації (підвищеної чутливості) до новокаїну, яка виявилась позитивною. Який з перерахованих препаратів можна використати для проведення знечулення в даному випадку?

985. Після споживання страви з грибів мухомора у дорослої людини через 15-20 хв. почалось збудження, різко посилилось потовиділення, виникли явища гострого гастроентериту, зіниці різко звузились. Згодом виникли судоми, брадикардія, значна загальна слабкість, сонливість, розвинувся колапс.

Викликаний лікар негайно ввів хворому антидот з групи:

986. Симптоми отруєння препаратами цієї групи такі: важкість повік, диплопія, порушення мови і ковтання. Розвивається розслаблення мускулатури кінцівок, в останню чергу виключаються діафрагма та міжреберні м'язи. Смерть настає від зупинки дихання. Це:

987. У хворого після оперативного втручання розвинувся парез кишечника. Який холінергічний засіб із групи антихолінергічних речовин слід йому призначити?

988. У дитини 5 років лікарем встановлено такі симптоми: сильне рухове збудження, марення, хриплий голос, розширені зіниці, які не реагують на світло, суху, гарячу, гіперемовану шкіру, тахікардію, тахіпное. Вказані симптоми виникли після споживання дитиною ягід красавки. Препарат якої з представлених фармакологічних груп ліків потрібно призначити?

989. При тривалому використанні хворим на бронхіальну астму фенотеролу як бронхорозширювального засобу його терапевтична активність поступово зменшилась. Яка ймовірна причина розвитку звикання?

990. У очне відділення лікарні поступив пацієнт з різким болем в оці внаслідок попадання стороннього тіла, яке він в домашніх умовах не зміг видалити. Який вид місцевої анестезії показаний для видалення стороннього тіла з ока?

991. У результаті необережного поводження з фосфорорганічним інсектицидом у робітника розвинувся бронхоспазм. Який із бронхолітиків показаний у даній ситуації?

992. У хворого з гострим інфарктом міокарда виникла шлуночкова аритмія. Серцевий ритм нормалізувався після введення протиаритмічного засобу з групи місцевих анестетиків. Який препарат введено?
993. Указати препарат, який використовується при отруєннях і метеоризмі.
994. Характерна побічна дія гангліоблокаторів
995. Хворому виразковою хворобою шлунку на фоні підвищеної кислотності шлункового соку в стадії загострення [в анамнезі якого є глаукома] необхідно призначити М-холіноблокуючий засіб. Якому з наведених засобів надати перевагу, враховуючи супутні захворювання?
996. Хворому для вправлення вивиху плеча було введено міорелаксant. Розвинулась тривала зупинка дихання, яку вдалось ліквідувати переливанням свіжої цитратної крові. Який препарат викликав ускладнення?
997. Хворому для знеболення рани призначили місцевоанестезуючий засіб у вигляді мазі, який нерозчинний у воді і застосовується тільки у вигляді мазей, паст, присипок. Назвіть цей препарат.
998. Хворому з отруєнням недоброякісною їжею у комплексній терапії було призначено вугілля активоване. Який механізм дії даної речовини?
999. Хворому на глаукому для зниження внутрішньоочного тиску лікар призначив фізостигмін у вигляді очних крапель. Який механізм дії даного препарату?
1000. Хворому на глаукому лікар призначив пілокарпіну гідрохлорид для зниження внутрішньоочного тиску. До якої фармакологічної групи належить цей препарат?

1001. Хворому на міастенію було призначено препарат, що викликав покращення м'язевої діяльності. Але поступово виявився ряд побічних ефектів: підвищене виділення слини, поту, діарея, нудота. Який засіб приймав хворий?

1002. Хворому перед екстракцією зуба була проведена провідникова анестезія лідокаїном, після введення якого з'явилися набряк і гіперемія навколо місця ін'єкції, сверблячка шкіри. Визначте, як називається ускладнення?

1003. Чому атропін та інші препарати з групи М-холіноблокаторів абсолютно протипоказані при глаукомі?

1004. Чому при наявності алергічної реакції на новокаїн не можна використовувати всі лікарські препарати, які є похідними параамінобензойної кислоти?

1005. Чому при проведенні інфільтраційної анестезії до розчину місцевого анестетика додають адреналіну гідрохлорид?

1006. Під час оперативного втручання після введення гігронію різко знизився артеріальний тиск. Засоби яких груп лікарських препаратів можуть нормалізувати артеріальний тиск?

1007. Підготуйте аптечку протиотрут для приймального відділення лікарні, куди включіть засіб для підвищення артеріального тиску.

1008. При проведенні анестезії лікар-анестезіолог передозував дозу тубокурарину хлориду. Хворому призначили прозерин. На чому базується дія цього препарату?

1009. Хвора К., 45 років, діагноз: Миготлива аритмія. Гіпертонічна хвороба II ст. Препарат вибору для припинення приступу?

1010. Для проведення інтубації трахеї перед оперативним втручанням хворому був введений міорелаксант дитилін. Після закінчення операції спонтанне дихання не відновилось. Діагностовано генетичну патологію - недостатність бутирилхолінестерази. Що необхідно ввести пацієнтові?

1011. Для підвищення артеріального тиску хворому був призначений внутрішньовенно судиннозвужуючий препарат. Помилкове введення цього засобу в м'язи призвело до некрозу прилеглих тканин. Який це препарат?

1012. У хворої на ішемічну хворобу серця і бронхіальну астму після зняття приступу бронхоспазму інгаляціями ізадрину з'явився біль у ділянці серця. Чим обумовлене це ускладнення?

1013. У пацієнта під час операції з приводу резекції кишечника розвинулась серцева слабкість. АТ знизився до 60/30 мм рт. ст., пульс ниткоподібний. Однак анестезіолог не ввів адреналін. Який загальний анестетик, на фоні якого не можна вводити адреналін, був використаний?

1014. У чоловіка, якому під час оперативного втручання застосували міорелаксант - дитилін, розслаблення скелетних м'язів і пригнічення дихання продовжувалось більше 2 годин. Відсутність якого ферменту в сироватці крові зумовлює цей

1015. У чоловіка, якому під час оперативного втручання застосували міорелаксант дитилін, розслаблення скелетних м'язів і пригнічення дихання продовжувалось більше 2 годин. Генетична недостатність якого ферменту в сироватці крові зумовила такий стан?

1016. Хворий страждає на бронхіальну астму, супровідне захворювання - серцева тахіаритмія. Вкажіть, який препарат, який не погіршить порушення серцевого ритму, можна застосувати для зняття бронхоспазму в даній ситуації.

1017. Хворий з гострим ринітом придбав у аптеці нафтизин у вигляді крапель для носа. Проінформуйте пацієнта про можливі побічні ефекти препарату.

1018. Хворий з гострим ринітом часто застосовував інтраназально 5% розчин ефедрину гідрохлориду . Ефективність препарату різко зменшилась, на 3-й день зникла повністю. Чим зумовлене швидке зниження ефективності (тахіфілаксія)?

1019. Хворий з діагнозом феохромоцитома страждає від артеріальної гіпертензії, яка часто ускладнюється гіпертензивними кризами. Яка група препаратів показана в даній ситуації'?

1020. Хворий знаходиться на стаціонарному лікуванні з приводу бронхіальної астми. Як супутнє захворювання діагностовано гіпертонічну хворобу. Який з наведених препаратів протипоказаний у даному випадку?

1021. Хворий знаходиться на стаціонарному лікуванні з приводу гіпертонічної хвороби. Як супутнє захворювання діагностовано бронхіальну астму. Який з наведених препаратів протипоказаний у даному випадку?

1022. Хворий із хронічним бронхітом з астматичним компонентом тривалий час застосовує ізадрин для інгаляцій. З чим пов'язаний механізм лікувальної дії цього препарату?

1023. Хворий на бронхіальну астму не повідомив лікаря, що у нього ішемічна хвороба серця. Лікар призначив препарат, після прийому якого напади бронхіальної астми стали рідшими, однак почастишали напади стенокардії. Вкажіть, який це препарат.

1024. Хворий прийшов на прийом до лікаря з метою обстеження свого здоров'я. У черзі під час чекання у нього виник приступ бронхіальної астми. Препарати якої групи доцільно застосувати для надання йому першої допомоги?

1025. Хворий для зняття гіпертензивної кризи ввели внутрішньовенно краплинно розчин гігронію. Який механізм дії цього препарату?

1026. Хворому 40 років, при гіпертонічному кризі призначили клофелін. Який механізм гіпотензивної дії цього препарату?.

1027. Хворому для ввідного наркозу внутрішньовенно ввели тіопентал натрію, після чого настав ларингоспазм, підсилилась салівація. Введенням якого препарату можна було попередити небажані ефекти?

1028. Хворому для лікування ішемічної хвороби серця призначений анаприлін. Яке з наявних супутніх захворювань може бути протипоказанням ?

1029. Хворому з бронхіальною астмою призначили інгаляції ізадрину. Бронхоспазм був усунутий, але пацієнт почав скаржитись на біль у серці та серцебиття. З чим це пов'язано?

1030. 40-річний хворий страждає на бронхіальну астму протягом тривалого часу, а також тахікардію. Назвіть найефективніший в даній ситуації препарат для усунення бронхоспазму.

1031. В процесі лікування миготливої аритмії у хворого з'явився бронхообструктивний синдром - затруднення дихання, кашель. Який з протиаритмічних засобів здатний викликати таке ускладнення?

1032. В терапевтичне відділення поступив хворий з підвищеним артеріальним тиском, який викликаний спазмом периферичних судин. Який гіпотензивний препарат з групи альфа-адреноблокаторів, найбільш доцільно призначити хворому

1033. Для ослаблення або припинення передачі збудження через синапс з нервового закінчення на м'язове волокно в клініці використовуються курареподібні речовини — міорелаксанти. Який механізм дії цієї групи лікарських засобів?

1034. Для полегшення вправління вивиху у плечовому суглобі з метою розслаблення скелетних м'язів хворому ввели міорелаксант. При цьому настало "апноє". Хворому ввели прозерин, однак дихання не відновилося. Що необхідно ввести хворому?

1035. До жінки 28 років була викликана швидка допомога у зв'язку з нападом бронхіальної астми. Після внутрішньом'язової ін'єкції розчину ефедрину її стан поліпшився. Однак через 49 хвилин напад повторився. Ефедрин подіяв слабше. Третя атака бронхоспазму, яка почалася через півгодини, ефедрином не знялася. Яке явище покладено в основу цього феномену?

1036. До жінки 52 років була викликана бригада "швидкої допомоги" у зв'язку з задихою, що розвинулась на фоні бронхоспазму. Після внутрішньом'язового введення ефедрину гідро хлориду спостерігалось тимчасове полегшення дихання. Повторне введення препарату через півгодини мало слабкий ефект, а наступне третє введення не дало результату. Яке явище є основою зниження бронхорозширювальної дії?

1037. До лікарні "швидкої допомоги" доставили чоловіка 63 років з явищами колапсу. Для боротьби з гіпотензією лікар вибрав норадреналін. Який механізм дії цього препарату?

1038. До лікарні доставлений пацієнт з вивихом у плечовому суглобі. З метою розслаблення скелетних м'язів йому ввели міорелаксант дитилін, який діє в нормі 5-7 хвилин. Однак у даного пацієнта він діяв до 8 годин. Яка ймовірна причина цього ускладнення?

1039. До лікаря звернувся хворий 60 років, який скаржиться на болі в нижніх кінцівках вночі. Хворий багато і довго палить. Після обстеження поставлений діагноз облітеруючий ендоеартеріт. Який препарат найбільш доцільно призначити для лікування цього пацієнта?

1040. До приймального відділення лікарні доставлено дитину 5 років, у якої лікарем встановлені такі симптоми: сильне рухове збудження, марення, хриплий голос, розширені зіниці, які не реагують на світло, суху, гарячу, гіперміювану шкіру, тахікардію, тахіпное. Перелічені симптоми виникли після вживання дитиною ягід беладони. Препарат якої фармакологічної групи потрібно призначити для лікування цього отруєння?

1041. До приймальної палати лікарні доставлено хворого з тяжким отруєнням невідомою речовиною в стані гострої судинної недостатності. Який із зазначених препаратів необхідно використати для термінової допомоги?

1042. До травматологічного пункту каретою “швидкої допомоги” доставлено потерпілого від ДТП чоловіка з діагнозом закритий перелом середньої третини стегна зі зміщенням. З метою репозиції кісткових уламків хворому введено 10 мл 2% розчину дитиліну в/в, внаслідок чого розвинулись тривале апное та міорелаксація. Дефіцитом якого ферменту зумовлена зазначена фармакогенетична ферментопатія?

1043. До щелепно-лицьового відділення доставили хворого з переломом нижньої щелепи. Було вирішено з'єднання кісток провести хірургічним методом під наркозом. Після внутрішньовенного введення міорелаксанту спостерігались короточасні фібрилярні скорочення м'язів обличчя хворого. Який міорелаксант було застосовано?

1044. Жінка 50 років звернулась до поліклініки із скаргами на головний біль, нудоту. Обстеження виявило початкову стадію гіпертонічної хвороби. Інтерн намагався виписати їй резерпін, але лікар-консультант заперечив це, вказавши на наявність супутнього захворювання. Який патологічний процес є протипоказанням до призначення резерпіну?

1045. Жінка 60 років, яка страждає на токсичний зоб скаржиться на збільшення частоти серцевих скорочень. Який з зазначених препаратів слід призначити для нормалізації серцевого ритму?

- 1046. Жінка 60 років, яка страждає на токсичний зоб, скаржиться на збільшення частоти серцевих скорочень. Який з зазначених препаратів слід призначити для нормалізації серцевого ритму?**
- 1047. У хворої, страждаючої гіпертонічною хворобою, розвинувся приступ бронхіальної астми. Призначити засіб для зняття приступу:**
- 1048. Жінці 36 років, що страждає на ішемічну хворобу серця, лікар спочатку призначив анаприлін. Але з'ясувавши наявність супутнього захворювання він вирішив замінити цей засіб атенололом. Яке захворювання призвело до відмови від анаприліну?**
- 1049. З метою розслаблення скелетних м'язів і репозиції уламків при переломі стегнової кістки хворому був введений міорелаксant. При цьому дихання припинилося. Після введення свіжої цитратної крові дихання відновилося. Який міорелаксant вводили хворому?**
- 1050. Закапування в ніс при риніті лікарського препарату з групи непрямих адреноміметиків протягом декількох днів призвело до поступового зниження судинозвужувального ефекту. Як називається це явище?**
- 1051. Лікар швидкої допомоги був викликаний до жінки 40 років з приводу нападу бронхіальної астми з явищами стенокардії, лікар ввів хворій належний препарат. Який із препаратів найбільш ефективний для невідкладної допомоги?**
- 1052. На прийомі у стоматолога у пацієнта почався напад бронхіальної астми. Лікар – стоматолог надав допомогу і напад закінчився. Пацієнту дихати стало легше, але з'явилися тахікардія, головний біль, пітливість. Який препарат використав лікар?**
- 1053. Офтальмолог з діагностичною метою (розширення зіниць для огляду очного дна) використав 1% розчин мезатону. Мідріаз, викликаний препаратом, обумовлений:**

1054. Пацієнт з гіпертонічною хворобою тривалий час лікувалася гіпотензивними засобами. В останній час стан хворого погіршився. З'явилися нудота, набряк вік та губ, уртикарні висипи на шкірі, блювання, брадикардія, понос. Який препарат

1055. Пацієнт скаржиться на запаморочення, відчуття спраги, порушення ковтання, погане бачення близьких предметів. Об'єктивно: часте дихання, розширені зіниці, загальне збудження, говірливість, нерозбірлива мова. АТ - 110/70 мм рт. ст., пульс - 110 ударів за хвилину. Про передозування якого препарату можуть свідчити названі симптоми?

1056. Пацієнт тривалий час страждає на бронхіальну астму. В останній час у нього з'явилися приступи стенокардії. Який з перерахованих препаратів призначати йому протипоказано?

1057. Під час оперативного втручання із застосуванням міорелаксантів виникли розлади дихання. Введення прозерину викликало покращання стану. Яким терміном визначається ця взаємодія ліків?

1058. Під час оперативного втручання на фоні використання гігронію різко знизився артеріальний тиск. Представники яких груп лікарських препаратів можуть нормалізувати артеріальний тиск?

1059. Під час прийому у стоматолога у хворої розвинувся приступ бронхоспазму, який був знятий введенням 5% розчину ефедрину гідрохлориду. Через 20 хв приступ повторився. Повторне введення ефедрину не мало ефекту у зв'язку з розвитком тахіфілаксії. Який механізм лежить в основі розвитку цього явища?

1060. Після короткочасного оперативного втручання проведеного з застосування дитиліну понад 40 хвилин відмічалось пригнічення дихання, не відновився попередній тонус м'язів. Яку допомогу необхідно надати хворому?

1061. Після проведеної внутрішньо шкірної проби на чутливість до пеніциліну у хворого через кілька хвилин розвинулась реакція гіперчутливості, яку лікар визначив як анафілактичний шок: хворий втратив свідомість, розвинулися задуха і брадикардія. Лікар призначив засіб для усунення цих симптомів. Який препарат призначив лікар?

1062. Потерпілий обробляв рослини розчином речовини з інсектицидною дією без індивідуальних засобів захисту. Через деякий час у нього почалося сильне виділення слини, поту, слюзотеча, болі у животі, понос. При огляді виявлено міоз. Речовина, що викликала отруєння, належить до групи:

1063. При комбінованому наркозі у хворого, якому проведено резекцію шлунку, як міорелаксанти застосовано тубокурарину хлорид. Який засіб-антагоніст слід ввести хворому для відновлення самостійного дихання?

1064. При проведенні оперативного втручання в якості міорелаксанти був застосован тубокурарину хлорид. Який засіб-антагоніст слід ввести хворому для відновлення у нього самостійного дихання?

1065. При черговому нападі бронхіальної астми хворий за допомогою інгалятора вдихнув препарат, який у вигляді інгаляцій використовується як бронхолітик, а в ін'єкціях - в акушерській практиці для попередження викиднів. Який препарат був використаний хворим?

1066. Симптоми отруєння препаратами цієї групи такі: важкість повік, диплопія, порушення мови і ковтання. Розвивається розслаблення мускулатури кінцівок, в останню чергу виключаються діафрагма та міжреберні м'язи. Смерть настає від зупинки дихання. Це:

1067. Терапія анаприліном позитивно вплинула на динаміку хвороби у жінки 44 років, яка страждає стенокардією. Який головний механізм дії цього препарату?

1068. У приймальне відділення лікарні доставлено хворого з ознаками отруєння фосфорорганічними інсектицидами. Який препарат потрібно застосувати як засіб першої допомоги?

1069. У хворого після оперативного втручання розвинувся парез кишечника. Який холінергічний засіб із групи антихолінестеразних слід йому призначити?

1070. У хворої, що страждає на гіпертонічну хворобу, розвинувся напад бронхіальної астми. Призначити засіб для зняття нападу.

1071. У жінки 42 років, яка перенесла операцію на нирці, після наркозу розвинулись явища рекурарезації і припинилося дихання. Як міорелаксant під час операції був використаний дитилін. Який засіб найбільш доцільно використати для відновлення тону м'язів?

1072. У пацієнтки з постійною гіпоглікемією аналіз крові після введення адреналіну суттєво не змінився. Лікар діагностував порушення у печінці. Про зміну якої функції печінки може йти мова?

1073. У процесі лікування миготливої аритмії у хворого з'явився бронхообструктивний синдром (утруднення дихання, кашель). Який з протиаритмічних засобів здатний викликати таке ускладнення?

1074. У хворого анафілактичний шок. Від якого із названих адреноміметиків можна очікувати найбільшого терапевтичного ефекту в даному випадку?

1075. У хворого гостра судинна недостатність спричинена передозуванням резерпіну. Який із запропонованих засобів здатний її купірувати?

1076. У хворого з гіпертонічною хворобою після приймання гіпотензивного засобу та при вертикальному положенні розвинулося запаморочення. Який з препаратів міг визвати подібний ефект?

1077. У хворого з гіпертонічною хворобою після прийому гіпотензивного засоба та прийняття вертикального положення розвинувся паморочний стан. Який з препаратів міг визвати подібний ефект?

1078. У хворого з нападом бронхіальної астми супровідним захворюванням є стенокардія. Який бронхолітичний засіб потрібно призначати у такому випадку?

1079. У хворого з переломом стегнової кістки для послаблення напруження поперечносмугастих м'язів при репозиції уламків кістки треба призначити курареподібний засіб короткочасної дії. Який препарат доцільно призначити хворому?

1080. У хворого з приступом бронхіальної астми супровідним захворюванням є стенокардія. Який бронхолітичний засіб потрібно призначати у такому випадку?

1081. У хворого колаптоїдний стан зумовлений зниженням тону судин. Який лікарський засіб показаний для усунення цього стану?

1082. У хворого на міастенію після призначення прозерину з'явилися нудота, діарея, посмикування м'язів язика і скелетних м'язів. Чим можна купірувати інтоксикацію?

1083. У хворого під час оперативного втручання з'явилися симптоми передозування дитиліну. Що зменшить явища передозування?

1084. У хворого стенокардією після прийому антиангінального препарату виник бронхоспазм. Який препарат міг його спровокувати?

1085. У хворої з артеріальною гіпертензією розвинувся напад бронхіальної астми. Який з нижчеперелічених бронхолітичних засобів може спровокувати гіпертензивний криз?

1086. У хворої з артеріальною гіпертензією розвинувся приступ бронхіальної астми. Який з нижчеперерахованих бронхолітичних засібів може спровокувати гіпертензивну кризу?

1087. У хворої на бронхіальну астму підвищений артеріальний тиск. Який гіпотензивний препарат може спровокувати напад бронхіальної астми?

1088. У чоловіка 60 років під час операції з приводу резекції шлунка розвинулась серцева слабкість. АТ знизився до 70/50 мм рт. ст., пульс ниткоподібний. Однак анестезіолог не ввів адреналін. Який загальний анестетик, на фоні якого не можна вводити адреналін, був використаний?

1089. Хвора 50 років страждає гіпертонічною хворобою II стадії і виразковою хворобою шлунка з гіперацидним синдромом. Який із названих препаратів не рекомендується приймати хворій для лікування гіпертонічної хвороби?

1090. Хвора на бронхіальну астму для лікування захворювання щодня 3 рази на день приймала таблетки під язик. Через деякий час вона стала скаржитися на тахікардію, болі в ділянці серця, запаморочення, зниження АТ, швидку стомлюваність. Який препарат приймала хвора?

1091. Хвора на гіпертонічну хворобу тривалий час лікувалася гіпотензивними засобами. Останнім часом стан хворої погіршився: з`явилися нудота, набряки повік і губ, понос, ртикарні висипи на шкірі, блювання, брадикардія, явища паркінсонізму. Який гіпотензивний препарат є причиною их побічних ефектів?

1092. Хворий А., відчувши передвісники нападу бронхіальної астми, прийняв без контролю лікаря кілька таблеток всередину через короткі проміжки часу. Проте нетривале покращання стану відмітив тільки після вживання перших двох таблеток. Подальше приймання препарату не покращило його стану. Яким явищем обумовлене зниження ефекту препарату?

1093. Хворий з діагнозом феохромоцитома страждає від підвищеного артеріального тиску, який переростає в гіпертонічні кризи. Яка група препаратів допоможе хворому в даній ситуації?

1094. Хворий з діагнозом цукровий діабет вранці натщесерце отримав призначену дозу інсуліну пролонгованої дії. Пропустив чергове приймання їжі і відчув слабкість, головний біль, запаморочення, пітливість, тремтіння тіла, судоми, відчуття голоду. Застосування глюкози стану не поліпшило. Який препарат необхідно ввести для купірування гіпоглікемії?

1095. Хворий знаходиться на стаціонарному лікуванні з приводу бронхіальної астми. Як супутнє захворювання діагностовано гіпертонічну хворобу. Який з наведених препаратів протипоказаний у даному випадку?

1096. Хворий ішемічною хворобою серця не повідомив лікаря, що в нього бувають напади бронхоспазмів. Лікар призначив препарат, після приймання якого напади стенокардії стали рідші, але напади бронхоспазмів стали частіші. Який препарат був призначений?

1097. Хворий ішемічною хворобою серця не повідомив лікаря, що в нього бувають напади бронхоспазмів. Лікар призначив препарат, після приймання якого напади стенокардії стали рідші, але напади бронхоспазмів стали частіші. Який препарат був призначений?

1098. Хворий на бронхіальну астму не повідомив лікаря, що у нього бувають напади стенокардії. Лікар призначив препарат, після прийому якого напади бронхіальної астми стали рідшими, однак почастишали напади стенокардії. Вкажіть, який препарат був призначений.

1099. Хворий на гіпотонію, відчувши погіршення загального стану: головокружіння, слабкість, шаткість при ході прийняв без контролю лікаря кілька таблеток ефедрину через короткі проміжки часу. Проте деяке покращання спостерігав тільки після використання першої таблетки. Яким явищем обумовлена така дія?

1100. Хворий на ішемічну хворобу серця не повідомив лікаря, що у нього бувають напади бронхоспазму. Лікар призначив препарат, після приймання якого напади стенокардії стали рідшими, але почастишали напади бронхоспазму. Назвіть препарат, котрий був призначений?

1101. Хворий на ішемічну хворобу серця не повідомив лікаря, що у нього бувають напади бронхоспазму. Лікар призначив препарат, після прийому якого напади стенокардії стали рідшими, але почастишали напади бронхоспазму. Укажіть, котрий препарат був

1102. Хворий на феохромоцитому страждає від підвищеного артеріального тиску, який переростає в гіпертонічні кризи. Яка група препаратів допоможе хворому в даній ситуації?

1103. Хворий перебуває на стаціонарному лікуванні з приводу бронхіальної астми. Як супутнє захворювання діагностовано гіпертонічну хворобу. Який з наведених препаратів протипоказаний у даному випадку?

1104. Хворий, який страждає на гіпертонічну хворобу I стадії, приймав препарат у таблетках всередину. Через кілька тижнів він став відмічати болі у шлунку, нудоту, апатію, сонливість, зниження інтересу до життя. Який препарат міг викликати такі ефекти?

1105. Хворому 50 років, діагноз: ІХС, кардіосклероз, миготлива аритмія. Назвіть, який з препаратів необхідно призначити хворому?

1106. Хворому 68 років для екстракції зуба була проведена провідникова місцева анестезія новокаїном. Через 5-7 хвилин з'явилися ознаки зниження АТ. Що потрібно негайно ввести для нормалізації тиску?

1107. Хворому бронхіальною астмою призначили інгаляції 0,5% розчину ізадрина. Бронхоспазм був усунутий, але пацієнт почав скаржитись на болі в серці та серцебиття. З чим це

1108. Хворому була проведена операція з приводу поранення в живіт із застосуванням тубокурарину. В кінці операції, коли дихання відновилось, хворому ввели гентаміцин. Несподівано зупинилося дихання і відмічено довгочасне розслаблення скелетних м'язів. Який ефект покладено в основу цього явища?

1109. Хворому гіпертонічним кризом був введений гангліоблокатор бензогексоній. Яких явищ слід остерігатися після введення препарату?

1110. Хворому для купірування кишкової коліки призначили атропіну сульфат. Яке із названих захворювань може бути протипоказанням у даному випадку?

1111. Хворому з гіпертензивною кризою ввели внутрішньовенно клофелін. Який механізм лежить в основі антигіпертензивної дії клофеліну?

1112. Хворому з кардіогенним шоком, гіпотензією, задихою і набряками ввели неглікозидний кардіотонік. Зазначте, який саме препарат був введений хворому.

1113. Хворому з метою відновлення дихання при отруєнні чадним газом було введено аналептичний засіб рефлекторного типу дії з групи Н-холіноміметиків. Який засіб було призначено хворому?

1114. Хворому з метою відновлення дихання при отруєнні чадним газом був введений аналептичний засіб рефлекторного типу дії з групи н-холіноміметичних засобів. Який засіб було призначено?

1115. Хворому з ринітом закапали в ніс ефедрину гідрохлорид. Закладеність носа зникла. При частому повторному введенні ступінь цієї реакції зменшився аж до повного зникнення. Чим це обумовлено?

1116. Хворому на гіпертонічну хворобу був призначений препарат для зниження артеріального тиску з групи адренотропних засобів. Через деякий час у хворого тиск нормалізувався, але розвинулася брадикардія до 50 ударів на хвилину та атріо-вентрикулярна блокада 11 ступеню. Який препарат було

1117. Хворому на гіпертонічну хворобу з супутнім обструктивним бронхітом у складі комплексної терапії призначили анаприлін. Через деякий час у хворого розпочали з'являтися напади ядухи. З чим пов'язане виникнення даного побічного ефекту?

1118. Хворому на гіпертонічну хворобу з супутнім обструктивним бронхітом призначили гіпотензивний засіб. Через деякий час у пацієнта почали з'являтися напади ядухи, розвинулась виражена брадикардія. На ЕКГ відмічались ознаки порушення атріовентрикулярного проведення. При призначенні якого препарату найбільше імовірна поява подібних ефектів?

1119. Хворому на миготливу аритмію, в анамнезі якого - бронхіальна астма, треба призначити проти аритмічний засіб. Який препарат з цієї групи протипоказаний хворому?

1120. Хворому на міастенію було призначено препарат, що викликав покращення м'язової діяльності. Але поступово виявився ряд побічних ефектів: підвищене виділення слини, поту, діарея, нудота. Який засіб приймав хворий?

1121. Хворому необхідно провести часткову гепатектомію, яка призводить до сильної кровотечі. Хірург призначив внутрішньовенно крапельно засіб для зниження артеріального тиску. Який засіб призначив лікар?

1122. Хворому перед операцією був введений дитилін (лістенон) і проведена інтубація. Після закінчення операції і припинення наркозу самостійне дихання не відновилось. Недолік якого ферменту в організмі хворого продовжує дію м'язового релаксantu?

1123. Хворому у зв'язку зі значним підвищенням АТ була зроблена під шкіру ін'єкція гіпотензивного препарату. Через деякий час при спробі встати з ліжка хворий відчув запаморочення, потемніння в очах і втратив свідомість. Який із названих гіпотензивних препаратів міг стати причиною ортостатичного колапсу?

1124. Хворому, який страждає гіпертонічною хворобою (АТ -200/110 мм рт. ст.), серед комплексної терапії лікар призначив анаприлін (пропранолол). Через 2 тижні від початку приймання препарату хворий почав скаржитися на відчуття задухи, утруднення дихання. Поясніть можливу причину ускладнень і вашу тактику в даній ситуації.

1125. Хворому, що перебуває у ліжку з гіпертонічним кризом, внутрішньовенно ввели препарат, після чого він відчув полегшення і встав з ліжка. Відбулося виражене різке зниження АТ із втратою свідомості. Який препарат міг викликати такі ускладнення?

1126. Через декілька днів після постійного застосування препарату для профілактики нападів бронхіальної астми у пацієнта порушився сон. Який з препаратів є вірогідною причиною цього?

1127. Чоловік 45 років хворіє на бронхіальну астму. Йому було прописано препарат у таблетках, що сприяв поліпшенню стану хворого. Однак через деякий час у нього погіршився сон, підвищився АТ. Який засіб було призначено пацієнту?

1128. Чоловік 50 років був прооперований з приводу раку шлунка. В комплексній анестезіологічній допомозі був застосований дитилін. Після закінчення операції дія дитиліну продовжувалась. Чому прозерин протипоказаний при передозуванні дитиліну?

1129. Чоловік надійшов до неврологічного відділення з діагнозом постінсультний синдром. Який препарат найбільш доцільно призначити хворому для прискорення одужання?

1130. Чоловік переніс правосторонній ішемічний інсульт. Який препарат найбільш доцільно застосувати для відновлення функції холінергічних систем мозку?

1131. Хворому на гіпертонічну хворобу з супутнім астматичним бронхітом призначили гіпотензивний засіб. Через деякий час у пацієнта знизився артеріальний тиск, але з'явилися напади ядухи та брадикардія. Який препарат викликав ці побічні ефекти?

1132. На прийомі у стоматолога у пацієнта почався приступ бронхіальної астми. Лікар - стоматолог надав допомогу і приступ закінчився. Пацієнту дихати стало легше, але з'явилися тахікардія, головний біль, пітливість. Який препарат може викликати ці явища?

1133. Під час оперативного втручання на фоні використання гігронію різко знизився артеріальний тиск. Представники яких груп лікарських препаратів можуть нормалізувати артеріальний тиск?

1134. У хворої з артеріальною гіпертензією розвинувся приступ бронхіальної астми. Який з нижчеперерахованих бронхолітичних засібів може спровокувати гіпертензивну кризу?

1135. У прийомне відділення лікарні доставлений хворий з важким отруєнням невідомою речовиною в стані гострої судинної недостатності. Який із зазначених препаратів необхідно використовувати для невідкладної допомоги?

1136. Хвора гіпертонічною хворобою тривалий час лікувалася гіпотензивними засобами. В останній час стан хворої погіршився. З'явилися нудота, набряк вік та губ, уртикарні висипи на шкірі, блювання, брадикардія, понос. Який препарат приймала хвора?

1137. Хворий з діагнозом феохромоцитома страждає від підвищено_го артеріального тиску, який переростає в гіпертонічні кризи. Яка група препаратів допоможе хворому в даній ситуації'?

1138. Хворий із хронічним бронхітом тривалий час застосовує ефедрин. З чим пов'язаний механізм дії цього препарату?

1139. Хворому на гіпертонічну хворобу був призначений препарат для зниження артеріального тиску з групи адренотропних засобів. Через деякий час у хворого тиск нормалізувався, але розвинулася брадикардія до 50 ударів на хвилину та атріо-вентрикулярна блокада 11 ступеню. Який препарат було

1140. Хворому на гіпертонічну хворобу був призначений препарат для зниження артеріального тиску з групи адренергічних засобів. Через деякий час тиск нормалізувався, але розвинулася брадикардія та атріо-вентрикулярна блокада. Який препарат було призначено?

1141. Хворому на гіпертонічну хворобу з супутнім астматичним бронхітом призначили гіпотензивний засіб. Через деякий час у пацієнта знизився артеріальний тиск, але з'явилися напади ядухи та брадикардія. Який препарат викликав ці побічні ефекти?

1142. Хворому на гіпертонічну хворобу з супутнім обструктивним бронхітом призначили гіпотензивний засіб. Через деякий час у пацієнта почали з'являтися напади ядухи, розвинулась виражена брадикардія. На ЕКГ відмічались ознаки порушення атріовентрикулярного проведення. При призначенні якого препарату найбільше імовірно з'явлення подібних ефектів?

1143. Для проведення загальної анестезії лікар-анестезіолог призначив хворому засіб для наркозу пропанідид. Яка тривалість дії цього препарату?

1144. З метою зігрівання після переохолодження хворий використав розчин етилового спирту всередину. Як впливає спирт етиловий на терморегуляцію?

1145. В реанімаційне відділення доставлений хворий з судомами, які є наслідком гострого отруєння кокаїном. Вибрати фармакологічний засіб, який має протисудомний ефект:

1146. Після вживання ацетилсаліцилової кислоти у пацієнта з`явився біль у ділянці шлунка як наслідок загострення виразкової хвороби. Що покладено в основу ульцерогенності зазначеного препарату?