

ЗАВАНТАЖЕНО З САЙТУ ТЕСТУВАННЯ.УКР

Фармакологія засобів, що впливають на функцію органів і систем. Гормональні, вітамінні, протизапальні, протиалергічні, імуноотропні та ферментні лікарські засоби

Категорія: **Фармакологія**

Кількість запитань: **1420**

1. До якої групи належить предуктал (триметазидин)?
2. Попередником окиду азоту є:
3. Вкажіть інтерфероногени з імуностимулюючою дією
4. При лікуванні серцевими глікозидами діуретичний ефект пов'язаний з:
5. Максимальною матеріальною кумуляцією володіє:
6. Зазначити механізм дії амлодипіну
7. Вказати механізм фармакологічної дії клофеліну
8. Кардіотонічний засіб, який стимулює бета1 - адренорецептори
9. Кумуляція серцевих глікозидів залежить від
10. Кумуляція якого лікарського засобу виражена найбільше?
11. Як впливають серцеві глікозиди на провідну систему серця?
12. Вкажіть засіб, який гальмує скоротливу діяльність вагітної матки
13. Яке явище розвивається при повторному застосуванні серцевих глікозидів?
14. Який діуретик краще приймати при набряку легень
15. Екстракардіальні ефекти при передозуванні серцевих глікозидів проявляються:
16. Механізм бронхолітичної дії бета-2-адреноміметиків
17. Механізм бронхолітичної дії еуфіліну

18. Механізм бронхолітичної дії сальбутамолу
19. Механізм дії кромолін-натрію
20. Механізм стимулюючого впливу кордіаміну на дихання
21. Особливо тривалий ефект спостерігається при застосуванні:
22. Механізм стимулюючого впливу цититону на дихання
23. Лізиноприл —
24. Вкажіть засіб, який має жовчогінні властивості
25. Назвати серцевий глікозид швидкої дії при гострій серцевій недостатності.
26. Назвіть препарат, поновлюючий активність K^+ , Na^+ -АТФ-ази:
27. При введенні серцевих глікозидів в міокарді виявляється не більш:
28. Назвіть препарат, що використовують для лікування гострої серцевої недостатності:
29. Назвіть препарати, що зв'язують іони Ca^{2+} :
30. При введенні строфантину з шлунково-кишкового тракту всмоктується:
31. Лікування серцевими глікозидами приводить до наступних змін в системі кровообігу:
32. Збільшення сили серцевих скорочень під впливом серцевих глікозидів обумовлений:
33. Вкажіть діуретичний засіб, який може викликати гіпрекаліємію

34. При інтоксикації серцевими глікозидами спостерігаються наступні порушення з боку серця:
35. Ацетилцистеїн застосовується для лікування
36. БемеGRID відноситься до групи
37. Бромгексин відноситься до групи
38. Виберіть сечогінний препарат, котрий доцільно призначити при хронічній серцевій недостатності з метою попередження розвитку гіпокаліємії
39. Відсоток всмоктування дигітоксину (біодоступність) з шлунково-кишкового тракту складає:
40. Вплив на скоротливі білки міокарду серцеві глікозиди роблять, змінюючи вміст іонів:
41. Всі препарати серцевих глікозидів можуть бути призначені перорально, окрім:
42. Глюкокортикоїди, які використовують для лікування бронхіальної астми інгаляційно
43. Для зменшення набряків при лікуванні серцевими глікозидами серцевої недостатності призначаються препарати з групи:
44. Для зменшення токсичності глікозиди призначають разом з:
45. Для лікування хронічної серцевої недостатності застосовуються препарати:
46. Для попередження нападу бронхіальної астми лікар призначив хворому кромолін натрію. Який з наведених механізмів характерний для його засобу?

47. До бета2-адреноміметиків відноситься:

48. До приймального відділення лікарні доставлено хворого з вираженими явищами гострої серцевої недостатності. Яким із зазначених препаратів можна йому допомогти?

49. До чоловіка 56 років була викликана швидка допомога в зв'язку з гострим нападом серцевої недостатності. Коли фельдшер приготував шприц з 1 мл 0,025% розчину строфантину, лікар попросив його почекати і довідався у рідних, які ліки приймав хворий протягом останніх тижнів. Почувши про один препарат, він вирішив знизити дозу строфантину. Який препарат примусив лікаря зменшити дозу серцевого глікозиду?

50. Екстракардіальні зміни при передозуванні серцевих глікозидів виявляються:

51. Ефект систоли серцевих глікозидів обумовлений:

52. За швидкістю розвитку кардіотропної дії серцеві глікозиди можна представити таким чином:

53. Зміни в серцево-судинній системі під впливом серцевих глікозидів пов'язані з:

54. Зняття нападів бронхіальної астми здійснюється

55. Кардіостимулюючою дією володіють наступні групи речовин:

56. Кардіотонічна дія серцевих глікозидів забезпечується їх впливом, що інгібує:

57. Кардіотонічний ефект серцевих глікозидів забезпечується:

58. Кардіотонічні ефекти найбільш характерні для :

59. Кетотифен (задитен) застосовується для

60. Комбіноване застосування бета2-агоністів (фенотерол) та холінолітиків (іпратропій бромід) у хворих на бронхіальну астму доцільно:

61. Кордіамін застосовується при

62. Лібексин відноситься до групи

63. Настій з трави якої рослини входить до складу мікстури Бехтерева?

64. Негативна хронотропна дія на ЕКГ виявляється:

65. Обмежують застосування кардіотонічних засобів "неглікозидної" структури наступні ефекти:

66. При лікуванні серцевими глікозидами спостерігаються наступні зміни в діяльності серця:

67. При серцевій недостатності, непіддатливій терапії серцевими глікозидами, застосовують:

68. Причина смерті при інтоксикації серцевими глікозидами:

69. Протиаритмічна дія серцевих глікозидів обумовлена:

70. Протипоказанням до застосування серцевих глікозидів служить наявність у хворого:

71. Прояви кардіотонічної дії серцевих глікозидів на ЕКГ полягають у наступному:

72. Рефлекторна брадикардія при лікуванні серцевими глікозидами є наслідком:

- 73. Серцеві глікозиди депонуються переважно в :**
- 74. Серцеві глікозиди зменшують активність калій-натрієвої АТФази. Як при цьому змінюється збудливість серцевого м'яза?**
- 75. Серцеві глікозиди отримують з трави:**
- 76. У незміненому вигляді з організму виділяються препарати:**
- 77. У пацієнта в стоматологічному кабінеті розвинувся напад бронхіальної астми, який вдалося усунути сальбутамолом. До якої групи лікувальних засобів належить цей препарат?**
- 78. У пацієнта в стоматологічному кабінеті розвинувся напад бронхіальної астми. До якої групи лікувальних засобів належить препарат вибору?**
- 79. У пацієнтки 46 років на фоні миготливої аритмії почався набряк легень. Який січогінний препарат необхідно ввести в першу чергу для виведення хворої з важкого стану?**
- 80. У хворого виник гостий приступ стенокардії. Який препарат треба використати для увірвання приступу?**
- 81. У хворого виник спазм гладенької мускулатури бронхів. Використання яких активаторів для зняття нападу буде фізіологічно обґрунтованим?**
- 82. У хворого гостра серцево-легенева недостатність, що супроводжується набряком легень. Який препарат з групи діуретиків необхідно призначити?**
- 83. У хворого діагностували хронічну серцеву недостатність I класу, що супроводжується вегетативним неврозом. Який препарат доцільно призначити цьому хворому?**

84. У хворого діагностували хронічну серцеву недостатність I класу, що супроводжується вегетативним неврозом. Який препарат доцільно призначити цьому хворому?
85. У хворого з пневмонією відмічається надмірний кашель, що спричинює різкі болі у грудній порожнині. Що необхідно внести у комплексну терапію пневмонії для заспокоєння кашлю?
86. У хворого на бронхіальну астму з'явилися роздратованість, безсоння, тахікардія. Який з препаратів, що приймає хворий, міг спричинити цей ефект?
87. У хворого на фоні гіпертонічної хвороби розвинулась гостра серцева недостатність. Який із поданих засобів найбільш доцільно призначити в даному випадку?
88. У хворого на фоні прийому препарату серцевих глікозидів з'явилися бігеменія, різка м'язова слабкість, діарея, блювання, порушення зору. Який засіб можна застосувати для зменшення симптомів інтоксикації?
89. У хворого на фоні прийому дігітоксину з'явилась бігемінія, різка м'язова слабкість, діарея, блювання, порушення зору. Які препарати можуть ослабити явища отруєння?
90. У хворого напад бронхоспазму. Який міотропний засіб резорбтивної дії можна використати для його купірування?
91. У хворого після застосування препарату призначеного з приводу гострого бронхіту виник бронхоспазм. Який препарат міг викликати подібну клінічну картину?
92. У хворої виник напад бронхіальної астми. Який препарат слід застосувати?

93. У хворої з артеріальною гіпертензією розвинувся приступ бронхіальної астми. Який з нижчеперерахованих бронхолітичних засібів може спровокувати гіпертензивну кризу?
94. Ускладнення, що виникають при вживанні кодеїну як протикашльового засобу
95. Ускладнення, що виникають при тривалому використанні настою трави термопсису
96. Хворому з мерехтливою аритмією призначили дигітоксин. З якою дією засобу пов'язана його протиаритмічна активність?
97. Хворому з набряком легень на фоні гострої серцевої недостатності ввели інгаляційно 30% спирт етиловий. З якою метою це зробили?
98. Хворому з серцевою недостатністю та набряками призначили дигітоксин. З чим пов'язаний кардіотонічний ефект серцевих глікозидів?
99. Хворому з серцевою недостатністю та набряками призначили дигітоксин. З чим пов'язаний кардіотонічний ефект серцевих глікозидів?
100. Хворому з хронічним бронхітом призначено лібексин. Який механізм протикашльової дії препарату?
101. Хворому із гострою пневмонією було призначено препарат з протикашльовою дією, яка пов'язана із виразним пригніченням кашльового центру. Який препарат призначив лікар?
102. Хворому на бронхіальну астму призначено кетотифен. Який механізм антиалергічної дії цього препарату?
103. Хворому на гостру серцеву недостатність з рефрактерністю до серцевих глікозидів було введено добутамін. Який механізм дії цього препарату?

- 104. Хворому на гостру серцеву недостатність було введено серцевий глікозид швидкої дії. Який з перелічених засобів було**
- 105. Хворому, що страждає на хронічну серцеву недостатність, лікар порекомендував провести профілактичний курс лікування кардіотонічним препаратом з групи серцевих глікозидів який приймають внутрішньо. Який з препаратів було рекомендовано хворому?**
- 106. Які препарати підсилюють токсичність серцевих глікозидів?**
- 107. «Кардіотонічна» (сistolічна, позитивна ізотропна) дія серцевих глікозидів обумовлена**
- 108. Аглікони у серцевих глікозидах визначає 1. механізм дії, 2. головні фармакодинамічні властивості, 3. фармакокінетику препаратів**
- 109. Адреноміметик для купірування нападу бронхіальної астми**
- 110. Аналептики стимулюють**
- 111. Бета - адреноблокатори застосовують при всіх перелічених станах, крім:**
- 112. Бронхолітик , який викликає тахіфілаксію**
- 113. Визначте препарат, який у вигляді інгаляцій використовується як бронхолітик, а в ін'єкціях - в акушерській практиці для попередження викиднів.**
- 114. Відхаркувальний засіб рефлекторної дії, який при передозуванні може викликати блювання**
- 115. Відхаркувальні засоби рефлекторної дії**
- 116. Вкажіть аналептик, який рефлекторно відновлює дихання**

- 117. Вкажіть ефект, який спостерігається при застосуванні серцевих глікозидів?**
- 118. Вкажіть кардіотонічний засіб, інгібітор фосфодіестерази**
- 119. Вкажіть лікарські рослини, які не містять серцеві глікозиди**
- 120. Вкажіть препарат з групи серцевих глікозидів з найбільшою тривалістю дії.**
- 121. Вкажіть препарат серцевих глікозидів з найбільшим латентним періодом.**
- 122. Вкажіть препарат, який застосовують при хронічній серцевій недостатності:**
- 123. Вкажіть шляхи введення строфантину**
- 124. Вкажіть, який із видів дії серцевих глікозидів є основним?**
- 125. Вказати екстракардіальну дію, яка характерна для серцевих глікозидів.**
- 126. Вказати препарат із групи серцевих глікозидів з найкоротшим латентним періодом.**
- 127. Вказати який з препаратів серцевих глікозидів має седативну дію?**
- 128. Для добутаміну характерно**
- 129. Для кодеїну характерно**
- 130. Для попередження та лікування больового шоку при набряці легень використовують нейролептанальгезію – комбінацію**
- 131. Для швидкого зниження артеріального тиску та тиску у малому колі кровообігу можна використати**

- 132. До терапевтичного відділення поступив хворий з хронічною серцевою недостатністю. Який лікарський засіб необхідно призначити хворому?**
- 133. До хворого А. була викликана бригада швидкої допомоги з приводу нападу бронхіальної астми. Який шлях введення сальбутамолу найбільш доцільний у даному випадку?**
- 134. Добутамін проявляє свою кардіотонічну дію за рахунок**
- 135. Ефедрину гідрохлорид здатний викликати**
- 136. Кардіотоксична дія серцевих глікозидів збільшується при введенні**
- 137. Кардіотонічна дія амринону пов'язана з**
- 138. Кардіотонічний засіб з глікозидною структурою**
- 139. Лікар призначив унітіол в комплексній терапії глікозидної інтоксикації. Який механізм дії унітіолу при інтоксикації серцевими глікозидами?**
- 140. Механізм дії сальбутамолу**
- 141. Механізм кардіотонічної дії добутаміну:**
- 142. Назвати препарат калію, який застосовується при інтоксикації серцевими глікозидами**
- 143. Негативна хронотропна дія серцевих глікозидів проявляється**
- 144. Негативний дромотропний ефект — проявляє себе таким чином**
- 145. Неглікозидний кардіотонік -**
- 146. Норадреналін знімає бронхоспазм**

147. Пацієнтові не знімається напад бронхоспазму бета - адреноміметиками, що необхідно ввести для попередження астматичного статусу

148. Побічна дія характерна для серцевих глікозидів

149. Позитивна інотропна дія серцевих глікозидів характеризується

150. Позитивний батмотропний ефект серцевих глікозидів проявляється

151. Покази до застосування калію хлориду

152. препарат необхідно використати уданому випадку?

153. При гострій серцевій недостатності для швидкого отримання ефекту застосовують внутрішньовенну ін'єкцію такого засобу

154. При гострій серцевій недостатності показані такі препарати 1.Корглікон. 2. Адонізид. 3. Настойка конвалії. 4.Строфантин-К.

155. При загостренні хронічного бронхіту жінці призначили відхаркувальну мікстуру. Через деякий час вона звернулась до дерматолога зі скаргами на шкірні висипання, свербіж, кон'юнктивіт. Крім того були сонливість, втомлюваність. Що могло послужити причиною такого стану?

156. при сухому кашлі, а також у випадках, коли кашель супроводжується виділенням мокротиння, але має стійкий, виснажувальний характер доцільно призначати

157. Припинення піноутворення і відновлення прохідності дихальних шляхів здійснюється за допомогою таких піногасників 1. спирту етилового 2. антифомсилану 3. кодеїну 4. лібексину

158. Протикашльовий засіб з центральним механізмом дії, який пригнічує центр дихання тому протипоказаний дітям та людям старечого, похилого віку

- 159. Протикашльовий засіб периферичної дії. Механізм дії цього препарату - місцевоанестезуючий вплив на слизову оболонку дихальних шляхів, деяка бронхолітична активність. За протикашльовою ефективністю близький до кодеїну.**
- 160. Протикашльові засоби показані при**
- 161. Стимулятор дихання центральної дії, використовують при передозуванні наркозних засобів, легких отруєннях іншими речовинами пригнічувального впливу, при ателектазі легень, при асфіксії новонароджених. іноді його застосовують як протизапальний та протиалергічний засіб при артритах, поліартритах, бронхіальній астмі, астматичному бронхіті. Вкажіть засіб**
- 162. Тривале застосування кодеїну як протикашльового засобу обмежене таким фактором**
- 163. У випадках пригнічення дихання, коли збережена рефлекторна збудливість дихального центру, ви можете використати аналептики рефлекторної дії**
- 164. У серцевих глікозидів вузька широта терапевтичної дії. Що це означає?**
- 165. У хворого гостра серцева недостатність з нечутливістю міокарду до серцевих глікозидів. Який препарат необхідно призначити для лікування гострої серцевої недостатності?**
- 166. У хворого з серцевою недостатністю після лікування дигітоксеном виникли порушення серцевого ритму, порушення сну, порушення зору. Що потрібно призначити для відновлення активності Na^+ - K^+ -АТФ-ази?**
- 167. У хворого ознаки гострої інтоксикації серцевими глікозидами. Вказати, який з перерахованих препаратів є антидотом.**
- 168. Укажіть фактори, які сприяють кумуляції дигітоксину:**

169. Ускладнення при застосуванні серцевих глікозидів:

170. Характерна побічна дія кодеїну

171. Хворому з ознаками інтоксикації серцевими глікозидами призначено унітіол. Який механізм лікувальної дії препарату в цій ситуації?

172. Чим пояснюється негативна хронотропна дія серцевих глікозидів?

173. Який з препаратів серцевих глікозидів показаний лише при хронічній серцевій недостатності?

174. Який коефіцієнт елімінації дигітоксину?

175. Який коефіцієнт елімінації строфантину?

176. Який основний механізм виведення рідини з організму та зменшення набряків під впливом серцевих глікозидів при серцевій недостатності

177. Який препарат слід призначати хворому при передозуванні серцевих глікозидів?

178. 40-річний хворий страждає на бронхіальну астму протягом тривалого часу, а також тахікардією. Вкажіть найдоцільніший в даній ситуації препарат для усунення бронхоспазму:

179. До кардіологічного відділення доставлено хворого зі скаргами на частий пульс, задишку, синюшність слизових оболонок. При огляді: набряки на нижніх кінцівках, асцит. Який з перелічених препаратів необхідно призначити хворому внутрішньовенно для покращання самопочуття?

180. До лікаря звернувся пацієнт з проханням замінити відсутній на даний момент в аптеці бронхолітик ізадрин на найбільш близький за дією препарат. Який з наведених нижче засобів можна рекомендувати хворому?

181. До лікаря поліклініки звернувся юнак 19 років із скаргами на біль в області серця. Виявилося, що він полюбляє каву і вживає до 8 склянок цього міцного напою. Чому кава, яка містить кофеїн, може погіршувати серцеву діяльність?

182. До приймального відділення лікарні доставлено хворого з вираженими явищами гострої серцевої недостатності. Яким із зазначених препаратів можна йому терміново допомогти?

183. До приймального відділення був доставлений хворий у непритомному стані з ризьким пригніченням дихання та серцевої діяльності, зниженням сухожильних рефлексів. За словами супроводжуючої його дружини він в останній час страждав на безсоння та приймав на ніч снодійні засоби. Який лікарський препарат необхідно ввести хворому для невідкладної допомоги?

184. До чоловіка 22 років була викликана бригада “швидкої допомоги” з приводу нападу бронхіальної астми. Який шлях введення сальбутамолу найбільш доцільний у даному випадку?

185. До чоловіка 56 років була викликана швидка допомога в зв'язку з гострим приступом серцевої недостатності. Коли фельдшер приготував шприц з 1 мл 0.025% розчину строфантину, лікар попросив його почекати і довідався у рідних які ліки приймав хворий на протязі останніх тижнів. Почувши про один препарат, він вирішив знизити дозу строфантину. Який препарат примусив лікаря зменшити дозу серцевого глікозиду?

186. Жінка 42 років надійшла до кардіологічного відділення з діагнозом стенокардія, ішемічна хвороба серця. Приступи виникають 1-2рази на день. Який препарат найбільш доцільно призначити хворій для лікування?

187. При інфаркті міокарду була проведена нейролептанальгезія. Який препарат з групи наркотичних анальгетиків найчастіше застосовується спільно з дроперидолом?

- 188. Жінка 45 років страждає сезонним алергічним ринітом, зумовленим цвітінням амброзії. Який лікарський засіб з групи стабілізаторів тучних клітин можна застосувати для профілактики цього захворювання?**
- 189. Жінка 56 років звернулася до лікаря з приводу болів у серці, задишки, тахікардії, пастозності ступнів. Курс лікування атенололом покращив стан хворої. Який механізм дії цього препарату?**
- 190. Пацієнт тривалий час страждає на бронхіальну астму. Останнім часом у нього з'явилися напади стенокардії. Який з перелічених препаратів призначати йому протипоказано?**
- 191. Перед прийомом у стоматолога у пацієнта 65 років раптово виникла гостра серцева недостатність. Який з перелічених засобів буде найефективнішим у даному випадку?**
- 192. Під час збирання анамнезу у хворого бронхіальною астмою лікар з'ясував, що напади задухи виникають вночі, їм передують помірно виражена брадикардія. Яка група препаратів найбільш показана у даній ситуації?**
- 193. Під час оперативного втручання з використанням засобу для наркозу у хворого виник спазм гладенької мускулатури бронхів. Активатори якого типу рецепторів слід використати для зняття нападу бронхоспазму?**
- 194. До речовин, котрі пригнічують тонус вазомоторного центру, відносяться всі препарати, окрім:**
- 195. Після приймання препарату у хворого з серцевою недостатністю зменшилася частота скорочень серця, пульс став кращого наповнення, зменшилися набряки, збільшився діурез. Який препарат приймав хворий?**
- 196. Після прийому препарату у хворого з серцевою недостатністю зменшилася частота скорочень серця, пульс став кращого наповнення, зменшилися набряки, збільшився діурез. Вкажіть, який препарат приймав хворий:**

- 197. При обстеженні хворого з явищами гіпертензії з'ясувалось, що йому найбільш доцільно застосувати препарат, діючий на артеріальний тиск через систему ренін-ангіотензину. Який це препарат**
- 198. При черговому нападі бронхіальної астми хворий за допомогою інгалятора вдихнув препарат, який у вигляді інгаляцій використовується як бронхолітик, а у ін`єкціях - в акушерській практиці для попередження викиднів. Який препарат був використаний хворим?**
- 199. У дитини 6 років діагностовано гострий бронхіт. Напади сухого кашлю викликали безсоння, втрату апетиту. В легенях відмічаються сухі хрипи, температура знижена - 36,10С, пульс 87 за 1 хв, ЧД - 36 за 1 хв. Який лікарський засіб слід призначити?**
- 200. У жінки 53 років трапився інфаркт задньої стінки лівого шлуночка серця. Хвору бентежать сильні болі за грудиною, аритмія, задишка. Який препарат найбільш доцільно ввести у данному випадку для надання першо допомоги?**
- 201. У жінки 53 років трапився інфаркт задньої стінки лівого шлуночка серця. Хвору бентежать сильні болі за грудиною, аритмія, задишка. Який препарат найбільш доцільно ввести у данному випадку для надання першої (швидкої) допомоги?**
- 202. У приймальне відділення поступив хворих зі скаргами на набряки, частий пульс, задишку, синюшність слизових оболонок. Поставлений діагноз: хронічна серцева недостатність. Що необхідно призначити хворому для покращення самопочуття?**
- 203. У хворого з'явилися явища інтоксикації серцевими глікозидами, які швидко нівелювалися застосуванням донатором сульфгідрильних груп унітіолу. Який механізм терапевтичної дії цього засобу?**

204. У хворого 68 років, який страждає серцевою недостатністю та на протязі тривалого часу приймав препарати наперстянки, з'явилися явища інтоксикації, які швидко нівелювалися застосуванням донатором сульфгідрильних груп унітіолу. Який механізм терапевтичної дії цього засобу?

205. У хворого на хронічну серцеву недостатність в процесі лікування препаратами наперстянки виникли симптоми, що свідчать про початок токсичної дії серцевих глікозидів. Який препарат необхідно призначити для зменшення негативної дії

206. У хворого на хронічну серцеву недостатність в процесі лікування препаратами наперстянки виникли симптоми, що свідчать про початок токсичної дії серцевих глікозидів. Який препарат необхідно призначити для зменшення негативної дії глікозидів?

207. При лікуванні гіпертонічного кризу може використовуватися діуретик:

208. Який діуретик краще застосовувати при набряку легень?

209. У хворого на хронічну серцеву недостатність у процесі лікування препаратами наперстянки виникли симптоми, що свідчать про початок токсичної дії серцевих глікозидів. Який препарат необхідно призначити для зменшення негативної дії серцевих глікозидів?

210. У хворого при комбінованій терапії хронічної серцевої недостатності дігітоксеном та фуросемідом розвинулась різка м'язова слабкість. Які електролітні порушення можна виявити в крові?

211. У хворого при комбінованій терапії хронічної серцевої недостатності дігітоксеном та фуросемідом розвинулась різка м'язова слабкість. Які електролітні порушення можна виявити в крові?

212. У хворого, що страждає на хронічну серцево-судинну недостатність, в процесі дигіталізації виникли такі симптоми: головний біль, втома, нудота, порушення кольорового зору (навколишні предмети сприймаються в зеленому кольорі). На ЕКГ з'явилась синусова брадикардія та ознаки порушення атріовентрикулярного проведення. Який засіб можна застосувати для зменшення симптомів інтоксикації?

213. Хворому з серцевою недостатністю та набряками призначили дигітоксин. З чим пов'язаний кардіотонічний ефект серцевих глікозидів?

214. У хворого, що страждає на хронічну серцево-судинну недостатність в процесі дигіталізації з'явилися слідуючи симптоми: головний біль, втома, нудота, порушення кольорового зору (навколишні предмети сприймаються в зеленому кольорі). На ЕКГ з'явилась синусова брадикардія та ознаки порушення атріовентрикулярного проведення. Який засіб можна застосувати для зменшення симптомів інтоксикації?

215. У чоловіка 48 років виник приступ стенокардії. Лікар призначив йому таблетку нітрогліцерину, вказавши на необхідність покласти її під язик. Чому лікар вибрав сублінгвальний метод введення препарату?

216. У чоловіка 48 років розвилася гостра серцева недостатність. Інтерн запропонував вести хворому строфантин, але лікар швидкої допомоги, дізнавшись, що хворий тривалий час приймав дигітоксин відхилив цю пропозицію. Яке явище мало виникнути при введенні строфантину?

217. У чоловіка 48 років розвинулася гостра серцева недостатність. Інтерн запропонував ввести хворому корглікон, але лікар "швидкої допомоги", дізнавшись, що хворий тривалий час приймав дигітоксин, відхилив цю пропозицію. Яке явище мало виникнути при введенні строфантину?

218. Хворий 34 років отримує еуфілін внутрішньовенно у зв'язку з нападом бронхіальної астми. На тлі нападу розвинулась гостра серцева недостатність. Який з нижченазваних препаратів потенційно небезпечний для застосування:

219. Хворий 35 років з явищами бронхіту звернувся до провізора з проханням порекомендувати йому відхаркувальний засіб рослинного походження. Який з препаратів можна запропонувати пацієнтові?

220. Хворий 40 років, що страждає на бронхіальну астму, проходив курс лікування еуфіліном, що покращив стан його здоров'я. Який біохімічний механізм дії цього засобу?

221. Хворий 40 років, що страждає на бронхіальну астму, приймав курс лікування еуфіліном, що покращив стан його здоров'я. Який біохімічний механізм дії цього засобу?

222. Хворий 60 років доставлений зі скаргами на задишку, слабкість, серцебиття, набряки. Під час лікування стан хворого покращився, але потім знову погіршився – з'явилися задишка, екстрасистолія, нудота, порушення сприйняття кольорів. Який лікарський засіб приймав хворий?

223. Хворий 60 років доставлений зі скаргами на задишку, слабкість, серцебиття, набряки. Під час лікування стан хворого покращився, але потім знову погіршився – з'явилися задишка, екстрасистолія, нудота, порушення сприйняття кольорів. Який лікарський засіб одержував хворий?

224. Хворий 60 років поступив зі скаргами на задишку, слабкість, серцебиття, набряки. Під час лікування стан хворого покращився, але потім знову погіршився – з'явилася задишка, екстрасистолія, нудота, порушення сприйняття кольорів. Який лікарський засіб одержував хворий?

225. Хворий безконтрольно приймав дигоксин, що стало причиною порушення діяльності серця: зменшилася скоротлива здатність, розвинулися брадикардія і шлуночкові екстрасистолія. Який із перелічених засобів є препаратом вибору для купірування цих порушень?

226. При лікуванні серцевими глікозидами діуретичний ефект пов'язаний з:

227. Хворий безконтрольно приймав дигоксин, що стало причиною порушення діяльності серця: знизилась скоротлива здатність, з`явилися брадикардія, шлуночкові екстрасистолія. Який із названих засобів є препаратом вибору для купірування цих порушень?

228. ? Хворий з приводу ревматизму знаходився на стаціонарному лікуванні. У схему лікування включені: дигітоксин, дихлотіазид, аміодарон і диклофенак На. Через 6 тижнів на тлі зменшення симптомів захворювання розвинулися задишка, набряки, нудота, блювота, брадикардія, шлуночкові екстрасистолі, АТ -140/90 мм рт. ст. Причина погіршення стану:

229. Хворий з простудним захворюванням страждає від нестерпного кашлю з погано відділюваним мокротинням. Який з перелічених препаратів може полегшити його стан?

230. Хворий з хронічною серцево- судинною недостатністю приймав дигітоксин. Після призначення додаткової терапії розвинулись явища інтоксикації серцевими глікозидами. Які препарати мали можливість викликати підсилення дії інтоксикації серцевих глікозидів?

231. Альфа адреноблокатори застосовують для

232. Хворий з хронічною серцево-судинною недостатністю приймав дігітоксин. Після призначення додаткової терапії розвинулись явища інтоксикації серцевими глікозидами. Які препарати мали можливість викликати підсилення дії інтоксикації серцевих глікозидів?

233. Хворий знаходиться на стаціонарному лікуванні з приводу бронхіальної астми. Як супутнє захворювання діагностовано гіпертонічну хворобу. Який з наведених препаратів протипоказаний у даному випадку?

- 234. Хворий на серцеву недостатність II стадії з великими набряками, тахікардією, розладом травлення та сну потребує лікарську терапію. Яке із приведених серцевих глікозидів короткої дії стане найбільш ефективним у цьому випадку?**
- 235. Хворий на хронічну серцеву недостатність протягом декількох місяців приймав в амбулаторних умовах дигоксин. На певному етапі лікування у нього виникли симптоми передозування препарату. Яке явище покладено в основу розвитку цього ускладнення?**
- 236. Хворий на хронічну серцеву недостатність протягом декількох місяців приймав в амбулаторних умовах дигітоксин. На певному етапі лікування у нього виникли симптоми передозування препарату. Яке явище лежить в основі розвитку цього ускладнення?**
- 237. Хворий перебував на лікуванні в кардіологічному відділенні з приводу декомпенсованої хронічної серцевої недостатності. Йому був призначений дигітоксин в дозі 0,0001 г з першого дня перебування в стаціонарі, але покращення він відмітив тільки через тиждень. Повільне настання ефекту препарату лікар пояснив:**
- 238. Хворий поступив до стаціонару з гострою серцево-судинною недостатністю. Який препарат необхідно використати в даному випадку?**
- 239. Хворий прийнятий до стаціонару з гострою серцево-судинною недостатністю. Який препарат необхідно використати в даному випадку?**
- 240. Хворий скаржиться на слабкість, задишку, набряки нижніх кінцівок. Діагноз - хронічна серцева недостатність. Який засіб необхідно призначити хворому в першу чергу?**
- 241. Хворий страждає на слабкість, задишку, набряки нижніх кінцівок. Діагноз - хронічна серцева недостатність. Який засіб необхідно призначити хворому в першу чергу?**

242. Хворий страждає на слабкість, задишку, набряки нижніх кінцівок. Діагноз – хронічна серцева недостатність. Який засіб необхідно призначити хворому в першу чергу?

243. Хворий хронічним бронхітом тривалий час приймав відхаркувальну мікстуру, яка покращила відділення мокротиння. З часом у нього з`явилися нежить, слюзотеча, свербіння і висипання на шкірі. Який із компонентів мікстури міг стати причиною цього?

244. Хворому на гостру серцеву недостатність було введено серцевий глікозид швидкої дії. Який з перелічених засобів було введено?

245. Хворому 50 років з хронічною серцевою недостатністю і тахіаритмією призначили кардіотонічний препарат. Назвіть, який з препаратів призначили хворому?

246. Хворому 50 років з хронічною серцевою недостатністю і тахіаритмією призначили кардіотонічний препарат. Вкажіть, який з препаратів призначили хворому?

247. Препарати інсуліну тривалої дії (ультраленте) діють протягом

248. Хворому бронхіальною астмою призначили інгаляції 0,5% розчину ізадрину. Бронхоспазм був усунутий, але пацієнт почав скаржитись на болі в серці та серцебиття. З чим це пов'язано

249. Хворому для лікування ІХС був призначений бета-адреноблокатор, через деякий час у нього з`явилися кашель, бронхоспазм. У якого з перелічених засобів є така побічна дія?

250. Хворому для лікування ішемічної хвороби серця призначений анаприлін. Яке із супутніх захворювань може бути протипоказанням у даному випадку?

251. Хворому для попередження нападу бронхіальної астми лікар призначив кромолін натрію. Який із зазначених механізмів може бути найбільш характерним для препарату?
252. Хворому з застійною серцевою недостатністю призначили серцевий глікозид, який характеризується високою біодоступністю, міцним зв'язком з білками плазми, біотрансформацією в печінці, виражено кумуляцією. Визначте
253. До антигіпертензивних засобів міотропної дії належить
254. До групи антагоністів кальцію належать
255. Хворому з застійною серцевою недостатністю призначили серцевий глікозид, який характеризується високою біодоступністю, міцним зв'язком з білками плазми, біотрансформацією в печінці, вираженою кумуляцією. Визначте препарат.
256. Хворому з набряками серцевого походження призначили наперстянку в порошку. Через деякий час з'явилися ознаки дигіталісної інтоксикації: екстрасистолія, диспепсія. Чим ліквідувати ускладнення?
257. Хворому з набряками серцевого походження призначили наперстянку в порошку. Через деякий час з'явилися ознаки дигіталісної інтоксикації: екстрасистолія, диспепсія. Чим ліквідувати ускладнення?
258. Хворому на бронхіальну астму із супутньою стенокардією напруження був призначений препарат у інгаляціях. Під час чергової інгаляції хворий відчув себе погано: виникло серцебиття, а потім стискаючі болі у ділянці серця з іррадіацією в ліву лопатку і плече. Який із названих препаратів міг стати причиною цих побічних ефектів?
259. Хворому на гостру серцеву недостатність з рефрактерністю до серцевих глікозидів було введено добутамін. Який механізм дії у цього препарату?

260. Хворому на серцеву недостатність був призначений дигітоксин. Спочатку його стан покращився, але з часом прояви серцевої недостатності знову росли, і навіть з'явилися ознаки глікозидної інтоксикації. Чим це можна пояснити?

261. Хворому на серцеву недостатність був призначений дигоксин. Спочатку його стан покращився, але з часом прояви серцевої недостатності знову росли, і навіть з'явилися ознаки глікозидної інтоксикації. Чим це можна пояснити?

262. Хворому призначено препарат дигітоксин. Через декілька днів у хворого виявлено ознаки передозування цим препаратом, його вміст у крові значно перевищував верхню межу терапевтичної концентрації. Як називається такий варіант дії лікарських речовин?

263. Хворому призначено препарат дигоксин. Через декілька днів у хворого виявлено ознаки передозування цим препаратом, його вміст у крові значно перевищував верхню межу терапевтичної концентрації. Як називається такий варіант дії лікарських речовин?

264. Хворому, що страждає на хронічну серцеву недостатність, лікар порекомендував провести профілактичний курс лікування кардіотонічним препаратом з групи серцевих глікозидів, що приймають внутрішньо. Який з препаратів було рекомендовано хворому?

265. Хворому, який скаржиться на хронічну серцеву недостатність, призначили дигітоксин. Однак, через тиждень після початку приймання препарату у хворого з'явилися признаки інтоксикації препаратом (брадикардія, нудота, екстрасистолія), хоч одноразова доза його не перевищувала терапевтичної і тривалість курсу лікування не закінчилась. Як називається явище, що спостерігається у хворого?

266. Хворому, який скаржиться на хронічну серцеву недостатність, призначили дигоксин. Однак, через тиждень після початку прийому препарату у хворого з'явилися признаки інтоксикації препаратом (брадикардія, нудота, екстрасистолія), хоч одноразова доза його не привищувала терапевтичної і строк курсу лікування не вийшов. Як називається явище, що

267. При лікуванні серцевими глікозидами спостерігаються наступні зміни в діяльності серця:

268. Чоловік 60 років систематично приймав дигітоксин. Його стан спочатку покращився, а потім став погіршуватись, розвилася брадикардія, аритмія. Яке явище полягає в основі цього

269. Чоловік 60 років систематично приймав дигоксин. Його стан спочатку покращився, а потім став погіршуватись, розвинулися брадикардія, аритмія. Яке явище спричинило цей стан?

270. ? Чоловіку 70 років, який страждає хронічним бронхітом, призначили протикашльовий препарат кодеїн. Який механізм дії забезпечує протикашльовий ефект?

271. Чоловіку 70 років, який страждає на хронічний бронхіт, призначений протикашльовий препарат глауцин. Який механізм забезпечує гальмування кашльового центру?

272. В кардіологічному відділенні у хворого виникла гостра серцева недостатність. Хворому внутрушньовенно крапельно ввели добутамін. Який механізм дії ізотропної добутаміну?

273. Екстракардіальні ефекти серцевих глікозидів 1. сечогінний, 2. седативний 3.антиаритмічний, 4. протиішемічний

274. Засіб має здатність попереджувати напади бронхіальної астми та інших бронхоспастичних станів. В основі такої дії лежить здатність гальмувати дегрануляцію тучних клітин слизової оболонки дихальних шляхів, затримувати вихід з них медіаторних речовин, які сприяють появі бронхоспазму, алергії і запалення

275. Засіб належить до ненаркотичних протикашльових препаратів. Вибірково пригнічує центральні ланки кашльового рефлексу. Не пригнічує дихальний центр, не викликає наркотичної залежності, не впливає на функцію шлунково-кишкового тракту. Вкажіть назву

276. Засоби, які використовують для лікування набряку легень (усі, крім)

277. Пацієнт для зняття бронхоспазму почав приймати нові ліки, але з часом почались порушення сну, підвищення артеріального тиску, з'явилися закрепи. Який препарат міг викликати подібні ускладнення?

278. Пацієнтові з нападами бронхоспазму та супутнім захворюванням серця доцільно призначити для зняття бронхоспазму

279. Пацієнтові з нападами бронхоспазму та супутньою брадикардією доцільно призначити

280. Під час операції на серці виникла гостра серцева недостатність. Який із лікарських засобів доцільно застосувати внутрішньовенно краплинно?

281. Під час проведення дигіталізації хворого з'явилися симптоми інтоксикації. Лікар призначив унітіол. Який механізм дії унітіолу при інтоксикації серцевими глікозидами?

282. Похідне цистеїну. Під його впливом відбувається розщеплення дисульфідних зв'язків глікопротеїнів бронхіального слизу, харкотиння та гною, в результаті чого знижується їх в'язкість, підвищується ефективність мукоциліарного кліренсу бронхів. Використовується при гострому та хронічному бронхіті, пневмонії, бронхоектатичній хворобі, муковісцидозі

283. Препарат, який містить суміш полісахаридів з трави алтеї лікарської. Призначають як відхаркувальний засіб по 1-2 таблетки перед їдою при гострих і хронічних захворюваннях дихальних шляхів (бронхіті, пневмонії та ін.).

284. Протеолітичний фермент, який розщеплює пептидні зв'язки в молекулі білків, поліпептиди та деякі низькомолекулярні пептиди. Застосовують препарат для полегшення відходження в'язких секретів і ексудатів при трахеїтах, бронхітах, бронхоектатичній хворобі, пневмонії, післяопераційному ателектазі легень

285. синтетичний муколітичний препарат. Під його впливом збільшуються синтез та секреція сурфактанту, активізується система альвеолярних макрофагів. Він має муколітичні та секретолітичні властивості, активізує роботу мукоциліарного апарату, що супроводжується покращанням виділення харкотиння.

286. Сімейний лікар призначив хворому для лікування хронічної серцевої недостатності дигоксин. Через 1 місяць виявив симптоми глікозидної інтоксикації. Який препарат необхідно призначити внутрішньовенно для зняття інтоксикації?

287. Теофілінвмісний препарат міотропної дії, розслаблює м'язи бронхів, розширює вінцеві судини, знижує кров'яний тиск у легеневій артерії, збільшує нирковий кровотік, проявляє діуретичну дію, гальмує агрегацію тромбоцитів.

288. У хворого, що страждає на хронічну серцево-судинну недостатність в процесі дигіталізації з'явилися такі симптоми: головний біль, втома, нудота, порушення кольорового зору (навколишні предмети сприймаються в зеленому кольорі). На ЕКГ з'явилась синусова брадикардія та ознаки порушення атріовентрикулярного проведення. Який засіб можна застосувати для зменшення симптомів інтоксикації?

289. Хворий потрапив в кардіологічне відділення з явищами гострої серцевої недостатності. Який з перерахованих засобів можна застосувати в цьому випадку?

290. Хворий скаржиться на слабкість, задишку, набряки нижніх кінцівок. Діагноз — хронічна серцева недостатність. Який засіб необхідно призначити хворому?

291. Хворому було призначено препарат із групи водорозчинних серцеві глікозиди. Яка супутня патологія може сприяти кумуляції серцевих глікозидів?

292. Хворому з гострою серцевою недостатністю призначено строфантин. Вкажіть шлях введення препарату.

293. Вказати який препарат належить до групи бета-адреноблокаторів

294. Хворому, який скаржиться на хронічну серцеву недостатність, призначили дигітоксин. Однак, через тиждень після початку прийому препарату у хворого з'явилися признаки інтоксикації препаратом (брадикардія, нудота, екстрасистолія), хоча одноразова доза його не перевищувала терапевтичної і строк курсу лікування не вийшов. Як називається явище, що спостерігається.

295. Вплив на скоротливі білки міокарду серцеві глікозиди роблять, змінюючи вміст іонів:

296. Всі препарати серцевих глікозидів можуть бути призначені перорально, окрім:

- 297. Для лікування хронічної серцевої недостатності застосовуються препарати:**
- 298. Для магнію сульфату характерні всі ефекти, окрім:**
- 299. Кардіоселективні бета-адреноблокатори:**
- 300. Кардіостимулюючою дією володіють наступні групи речовин:**
- 301. Кардіотонічна дія серцевих глікозидів забезпечується їх впливом, що інгібує:**
- 302. Кардіотонічний ефект серцевих глікозидів забезпечується:**
- 303. Кардіотонічні ефекти найбільш характерні для :**
- 304. Конкурентним антагоністом ангіотензинових рецепторів типу A1 є:**
- 305. Терапія препаратами серцевих глікозидів приводить до наступних змін в системі кровообігу:**
- 306. Максимальною матеріальною кумуляцією володіє:**
- 307. Механізм гіпотензивної дії салуретиків:**
- 308. На прийомі у лікаря хворий скаржиться на швидку втому, слабкість, + сонливість. Об'єктивне обстеження показало: АТ 90/55 мм рт ст. Решта показників в межах норми. Що доцільно призначити?**
- 309. На тлі гіпертонічного кризу (АТ -220/140 мм.рт.ст.) який препарат показаний?**
- 310. Назвіть препарат, що використовують для лікування гострої серцевої недостатності:**
- 311. Який кардіотонічний засіб входить до складу мікстури Бехтерева?**

312. Обмежують застосування кардіотонічних засобів "неглікозидної" структури наступні ефекти:

313. Пацієнт тривалий час страждає на бронхіальну астму. В останній час у нього з'явилися приступи стенокардії. Який з перерахованих препаратів призначати йому протипоказано?

314. Під час оперативного втручання після введення гігронію різко знизився артеріальний тиск. Засоби яких груп лікарських препаратів можуть нормалізувати артеріальний тиск?

315. Празозин блокує:

316. Кількість серцевих глікозидів при їх введенні, що виявляється в міокарді:

317. При введенні строфантину з шлунково-кишкового тракту всмоктується:

318. При інтоксикації серцевими глікозидами спостерігаються наступні порушення з боку серця:

319. При інфаркті міокарду була проведена нейрорептанальгезія. Який препарат з групи нейрорептиків найчастіше застосовується спільно з фентанілом?

320. При призначенні якого препарату з групи гіпотензивних засобів може бути ускладнення - гірсутизм?

321. При серцевій недостатності, невіддатливій терапії серцевими глікозидами, застосовують:

322. Причина смерті при інтоксикації серцевими глікозидами:

323. Протипоказанням до застосування серцевих глікозидів служить наявність у хворого:

- 324. Прояви кардіотонічної дії серцевих глікозидів на ЕКГ полягають у наступному:**
- 325. Рефлекторна брадикардія, що виникає при лікуванні серцевими глікозидами є наслідком:**
- 326. Серцеві глікозиди депонуються переважно в :**
- 327. Серцеві глікозиди отримують з трави:**
- 328. Терапія анаприліном позитивно вплинула на динаміку хвороби у жінки 44 років, яка страждає стенокардією. Який головний механізм дії цього препарату?**
- 329. Тривалість дії якого з гіпотензивних засобів рівна 1-2 хв.?**
- 330. У морської свинки створено експериментальна модель порушення ритму серця .Для демонстрації протиаритмічної властивості використано верапаміл.З чим пов'язана буде**
- 331. У незміненому вигляді з організму виділяються препарати:**
- 332. Зазначити препарат, що належить до групи бета бета-адреноблокаторів**
- 333. У пацієнтки 46 років на фоні миготливої аритмії почався набряк легень. Який сечогінний препарат необхідно ввести в першу чергу для виведення хворої з важкого стану?**
- 334. У поліклініку звернувся хворий зі скаргами на болі за грудиною, задишку, серцебиття. Після обстеження лікар діагностував у хворого ІХС і призначив верапаміл. Який механізм дії даного препарату?**
- 335. У приймальне відділення лікарні поступив хворий зі скаргами на набряки, підвищення артеріального тиску. Що необхідно призначити хворому для зменшення набряків?**

- 336. У приймальне відділення поступив хворий з гіпертонічним кризом. Що необхідно ввести хворому для нормалізації артеріального тиску?**
- 337. У хворого гіпертонічною хворобою при систематичному лікуванні гіпотензивним препаратом з'явився кашель. Який із нищезазначених засобів може бути причиною побічної дії ?**
- 338. У хворого 55 років виявлено гіпертонічну хворобу з підвищеним рівнем реніну в крові. Якому гіпотензивному препарату слід надати перевагу при лікуванні хворого?**
- 339. У хворого 68 років, який страждає серцевою недостатністю та на протязі тривалого часу приймав препарати наперстянки, з'явилися явища інтоксикації, які швидко нівелювалися застосуванням донатором сульфгідрильних групп унітіолу. Який механізм терапевтичної дії цього засобу?**
- 340. У хворого відмічене різке підвищення артеріального тиску. З метою невідкладної допомоги хворому внутрішньовенно ввели препарат, що викликав короткочасне підвищення тиску, який потім знизився. Визначте препарат.**
- 341. У хворого гостра серцево-легенева недостатність, що супроводжується набряком легенів. Який препарат з групи діуретиків необхідно призначити?**
- 342. У хворого гострий інфаркт міокарда супроводжується стійкими болями за грудиною. Неефективність попередньовведених препаратів дала основу лікарю провести нейролептанальгезію. Який нейролептик використовують для цього виду знеболення ?**
- 343. У хворого діагностували хронічну серцеву недостатність I класу, що супроводжується вегетативним неврозом. Який препарат доцільно призначити цьому хворому?**
- 344. У хворого з інфарктом міокарду та явищами серцевої недостатності виникла шлуночкова аритмія. Який препарат є засобом вибору в цьому разі?**

345. У хворого з гіпертонічною хворобою після прийому гіпотензивного засоба та прийняття вертикального положення розвинувся паморочний стан. Який з препаратів міг визвати подібний ефект?
346. У хворого з приступом бронхіальної астми супровідним захворюванням є стенокардія. Який бронхолітичний засіб потрібно призначати у такому випадку?
347. У хворого з хронічною серцево-судинною недостатністю з'явилися ознаки набряку легень. Що треба призначити хворому із сечогінних засобів для швидкого ліквідування цього
348. У хворого колаптоїдний стан через зниження тонуусу перифіричних судин. Який препарат найефективніший в цій
349. Яке ускладнення у новонародженого виникає при введенні породіллі перед пологами магнію сульфату?
350. У хворого на бронхіальну астму виник гіпертонічний криз. Який антигіпертензивний препарат раціонально застосувати в комплексній терапії цього патологічного стану?
351. У хворого на гіпертонічну хворобу виявлено високий рівень реніну в крові. Якому з гіпотензивних засобів слід віддати перевагу в цьому випадку?
352. У хворого на гіпертонічну хворобу після стоматологічних маніпуляцій розвинувся гіпертонічний криз. Які з нищеперерахованих препаратів треба призначити хворому ?
353. У хворого на фоні прийому дігітоксину з'явилась бігемінія, різка м'язова слабкість, діарея, блювання, порушення зору. Які препарати можуть ослабити явища отруєння?

- 354. У хворого на хронічну серцеву недостатність в процесі лікування препаратами наперстянки виникли симптоми, що свідчать про початок токсичної дії серцевих глікозидів. Який препарат необхідно призначити для зменшення негативної дії**
- 355. У хворого напади бронхіальної астми виникають звичайно вночі, супроводжуються брадикардією, спастичними болями в кишечнику, поносом. Препарати якої групи можуть усунути ці симптоми?**
- 356. У хворого після видалення зуба з'явився стійкий біль за грудиною. Після вживання під язык антиангінального засобу, біль за грудиною зник, але хворий поскаржився на головний біль і головокружіння. Який препарат використав хворий?**
- 357. У хворого при комбінованій терапії хронічної серцевої недостатності дігітоксіном та фуросемідом розвинулась різка м'язова слабкість. Які електролітні порушення можна виявити в крові?**
- 358. У хворого стенокардією після прийому антиангінального препарату виник бронхоспазм. Який препарат міг його спровокувати?**
- 359. У хворого, що страждає на хронічну серцево-судинну недостатність в процесі дигіталізації з'явилися слідуючи симптоми: головний біль, втома, нудота, порушення кольорового зору (навколишні предмети сприймаються в зеленому кольорі). На ЕКГ з'явилась синусова брадикардія та ознаки порушення атріовентрикулярного проведення. Який засіб можна застосувати для зменшення симптомів інтоксикації?**
- 360. У хворої з артеріальною гіпертензією розвинувся приступ бронхіальної астми. Який з нижчеперерахованих бронхолітичних засібів може спровокувати гіпертензивну кризу?**

361. У хворої на хронічну серцеву недостатність з набряковим синдромом у крові виявлено підвищення вмісту альдостерону. Який діуретичний засіб найдоцільніше призначити?

362. У хворої Ю. 59 років з нейроциркуляторною (первинною) артеріальною гіпотензією купіровано гіпотонічний криз зашкірним введенням 1 мл 20% розчину кофеїну бензоату натрію. Механізм дії цього препарату?

363. У хворої, страждаючої гіпертонічною хворобою, розвинувся приступ бронхіальної астми. Призначити засіб для зняття приступу:

364. Хвора К., 45 років, діагноз: Миготлива аритмія. Гіпертонічна хвороба II ст. Препарат вибору для припинення приступу?

365. Хворий на гіпертонічну хворобу II стадії з лікувальною метою приймав один з гіпотензивних препаратів. Через деякий час АТ знизився, але хворий став скаржитися на в`ялість, сонливість, байдужість. Пізніше з`явився біль у шлунку, була діагностовано виразкова хвороба. Який гіпотензивний препарат приймав

366. Хворий страждає брадиаритмією на фоні гіпертонічної хвороби. Який з лікарських засобів йому доцільно призначити?

367. Хворому 40 років, при гіпертонічному кризі призначили клофелін. Який механізм гіпотензивної дії цього препарату?

368. Хворому 50 років з хронічною серцевою недостатністю і тахіаритмією призначили кардіотонічний препарат. Вкажіть, який з препаратів призначили хворому?

369. Хворому з набряком легень на фоні гострої серцевої недостатності ввели інгаляційно 30% спирт етиловий. З якою метою це зробили?

370. Хворому, що знаходиться у ліжку з гіпертонічним кризом, внутрішньовенно ввели препарат, після чого він відчув полегшення і встав з ліжка. Відбулося виражене різке зниження АТ із втратою свідомості. Який препарат міг викликати такі

371. Антигіпертензивна дія бета-адреноблокаторів включає всі компоненти, окрім:

372. Який з гіпотензивних препаратів може бути рекомендований хворим з феохромоцитомою для нормалізації АТ?

373. Який з несприятливих ефектів діазоксиду перешкоджає його систематичному прийому?

374. Який з перерахованих інгібіторів АПФ володіє найбільшою тривалістю дії?

375. Який з перерахованих лікарських препаратів необхідно призначити як гіпотензивну терапію хворому з первинним гіперальдостеронізмом?

376. Який з перерахованих препаратів інгібує ренін?

377. Який з препаратів (група: блокатори кальцієвих каналів) володіє найбільшою тривалістю дії?

378. Який з препаратів бета-адреноблокаторів не може бути застосований для лікування ішемічної хвороби серця у пацієнта, що одночасно страждає на бронхіальну астму?

379. Який препарат не можна призначати хворому з гіпертонічною хворобою, у якого є бронхіальна астма?

380. Які гіпотензивні препарати діють на ренін-ангіотензин-альдостеронову систему регуляції АТ?

- 381. Які ефекти пов'язані із збудженням бета₁ - адренорецепторів?**
- 382. Які препарати підсилюють токсичність серцевих глікозидів?**
- 383. Анаприлін протипоказаний для зниження артеріального тиску, якщо у хворого супутнє захворювання - бронхіальна астма, оскільки він:**
- 384. Що є антагоністом іонів магнію :**
- 385. Антигіпертензивний ефект метопрололу обумовлений**
- 386. Антигіпертензивний ефект препарату клофелін пов'язаний з :**
- 387. Антигіпертензивні засоби - це**
- 388. В приймальне відділення поступив хворий з гіпертонічним кризом. Який із наведених антигіпертензивних препаратів доцільно призначити**
- 389. В терапевтичне відділення поступив хворий з гіпертонічним кризом. Який із наведених антигіпертензивних препаратів доцільно призначити внутрішньом'язево?**
- 390. Вазоділятаторними властивостями наділені всі перераховані сполуки, окрім:**
- 391. Вазоконстрікторами є всі перераховані речовини, окрім:**
- 392. Вкажіть сечогінний препарат, який доцільно призначити при хронічній серцевій недостатності з метою попередження розвитку гіпокаліємії**
- 393. Вказати антигіпертензивний препарат, який з обережністю призначають з препаратами, пригнічуючими центральну нервову систему**
- 394. Відмітьте фармакодинамічний ефект верапамілу**

395. Зазначити відсоток всмоктування дигітоксину (біодоступність) з шлунково-кишкового тракту складає:

396. Вкажіть блокатор агрегації тромбоцитів, який пригнічує зворотне захоплення аденозину та зменшує його ферментативне руйнування

397. Вкажіть відмінність Сустан-форте від нітрогліцерину?

398. Вкажіть засіб, який може застосовуватися при ішемічній хворобі серця, гіпертонічній хворобі та серцевих аритміях?

399. Вкажіть засіб. Який застосовують сублінгвально для зняття приступу стенокардії

400. Вкажіть кардіоселективний бета - адреноблокатор

401. Вкажіть особливості дії хінідину сульфату на серце

402. Зазначте засіб, що одночасно володіє альфа- і бета- адреноблокуючою активністю:

403. Вкажіть протиаритмічний засіб із групи блокаторів натрієвих каналів

404. Вкажіть протиаритмічний засіб з групи адреноблокаторів

405. Вкажіть протиаритмічний засіб з мембраностабілізуючою дією

406. Вкажіть типовий ефект клофеліну

407. Зазначте тривалість гіпотензивної дії клофеліну при пероальному застосуванні:

408. Вказати ускладнення при застосуванні фуросеміду

409. Вказати, що характерно для петлевих діуретиків

- 410. Вказані ефекти клофеліну сприяють зниженню артеріального тиску , окрім:**
- 411. Гіпотензивний ефект клофеліну пов'язаний з :**
- 412. Гіпотензивна дія клофеліну пов'язана з**
- 413. Гіпотензивна дія магнію сульфату проявляється при**
- 414. Діуретик, в основі механізму дії якого лежить антагонізм стосовно гормону кори надниркових залоз**
- 415. Зазначити сечогінний засіб, який найчастіше використовується при набряку мозку**
- 416. Дія нітрогліцерину та інших органічних нітратів зумовлена**
- 417. Препарат дибазол проявляє такі ефекти:**
- 418. З метою зменшення крововтрати при проведенні операції на печінці необхідно викликати штучну гіпотонію. Вказати препарат, який можна використати з цією метою:**
- 419. З метою зменшення набряків при лікуванні серцевими глікозидами серцевої недостатності призначаються препарати з групи:**
- 420. З метою зниження токсичності глікозиди призначають разом з:**
- 421. Для зняття гіпертонічного кризу лікар призначив апресин. До якої групи за механізмом дії відноситься зазначений лікарський засіб?**
- 422. Для зняття тахікардії при гіпертиреозі доцільно використовувати**
- 423. З метою підвищення артеріального тиску при колаптоїдному стані хворому було введено мезатон. Який механізм дії даного препарату?**

424. Для зняття гіпертонічного кризу лікар призначив клофелін. До якої групи за механізмом дії відноситься зазначений лікарський засіб?

425. До бета - адреноблокаторів належать

426. До блокаторів кальцієвих каналів належить

427. Ефективність антагоністів іонів кальцію при артеріальній гіпертензії пов'язана з:

428. Ефективність ніфедіпіну (фенігідину) при артеріальній гіпертензії пов'язана з:

429. Пацієнтка , 48 років, поступила в кардіологічне відділення з діагнозом ішемічна хвороба серця. Приступи стенокардії виникають 1-2 рази на день. Який препарат доцільно призначити хворій ?

430. Що зумовлює виникнення бронхоспазму при тривалому лікуванні інгібіторами АПФ?

431. З якою метою застосовують гангліоблокатори?

432. За швидкістю розвитку кардіального ефекту серцеві глікозиди можна поставити в ряд таким чином:

433. Зазначити при яких аритміях найбільш ефективний ксикаїн?

434. Зазначити показання до застосування сустаку

435. Зазначити як впливає препарат із групи інгібіторів АПФ на показники іонного балансу

436. Засіб знижує потребу серця у кисні та збільшує доставку кисню за рахунок блокади симпатичної інервації

437. Засіб належить до класу інгібіторів ГМГ-КоА редуктази, що знижують біосинтез холестерину. Використовують при гіперліпідемії, захворюваннях серцево-судинної системи
438. Засоби, які застосовуються для лікування ішемічної хвороби серця
439. Кардіальні ефекти під впливом серцевих глікозидів пов'язані з:
440. Інгібітори АПФ - це
441. Калійзберігаючий діуретик
442. Каптоприл - це
443. Еналаприл протипоказаний хворим:
444. Клофелін —
445. Лікар діагностував у хворого шлуночкову аритмію. Який препарат можна призначити?
446. Лікар загальної практики діагностував у хворого шлуночкову аритмію. Який препарат необхідно призначити?
447. Мета комбінування тріамтерену з дихлотіазидом
448. Механізм антигіпертензивної дії симпатолітика резерпіну пов'язаний із
449. На прийомі у сімейного лікаря хворому поставлений діагноз хронічна коронарна недостатність (стенокардія). Який препарат необхідно призначити для попередження нападу стенокардії?
450. Який із перерахованих препаратів доцільно застосувати при гіпертонічному кризі

451. Зазначте препарат, який відновлює активність K^+ , Na^+ -АТФ-ази при передозуванні серцевих глікозидів:
452. Вказати препарати, що зв'язують іони кальцію:
453. Вказати препарати, що зв'язують іони кальцію:
454. На ЕКГ негативна хронотропна дія виявляється:
455. Ортостатичний колапс при застосуванні гангліоблокаторів є наслідком
456. Основний ефект нітрогліцерину
457. Зазначити основний механізм дії препаратів групи похідних дигідроперідину:
458. Найбільша тривалість дії спостерігається при застосуванні:
459. Вказати петльовий діуретик, який проявляє виражену гіпотензивну дію
460. Побічний ефект клофеліну, який розвивається у разі раптового припинення прийому препарату після його тривалого застосування
461. Побічні ефекти характерні для анаприліну
462. Побічні ефекти характерні для інгібіторів АПФ
463. Показання для застосування препарату із групи інгібіторів АПФ
464. Показання до застосування фуросеміду
465. Еналаприл протипоказаний хворим:
466. Препарат з групи нітратів, який має пролонговану дію при ІХС

467. Препарат, що збуджує центральні альфа 2-адренорецептори, знижує артеріальний тиск, викликає брадикардію, сухість в роті
468. Препарат, який знижує артеріальний тиск шляхом блокади кальцієвих каналів периферичних судин
469. Препарати якої групи (їх міжнародні назви) закінчуються на - іпін
470. Препарати якої групи переважно закінчуються на -прил
471. При пероральному застосуванні магнію сульфату спостерігається ефект:
472. При гострому отруєнні морфіном виникла необхідність у проведенні форсованого діурезу. Який з препаратів необхідно застосувати?
473. При застосуванні фуросеміду у великих дозах можливий розвиток
474. Пацієнту з інфарктом міокарда була проведена нейролептанальгезія. Зазначити лікарський засіб з групи нейролептиків застосовується спільно з фентанілом?
475. Чим обумовлена антиаритмічна дія серцевих глікозидів :
476. Протипокази до застосування бета - адреноблокаторів
477. Серцеві глікозиди в якості протиаритмічних засобів недоцільно призначати
478. Симпатолітик, який застосовується в комбінованих препаратах для лікування гіпертонічної хвороби
479. Сімейний лікар діагностував у хворого артеріальну гіпертензію II-ої стадії. Який препарат необхідно призначити, що відноситься до інгібіторів ангіотензинперетворюючого ферменту?

- 480. Сімейний лікар діагностував у хворого гіперліпідемію з атеросклерозом судин. Який із препаратів доцільно призначити для тривалого лікування?**
- 481. Терапія анаприліном позитивно вплинула на динаміку хвороби у жінки, яка страждає стенокардією. Який головний механізм дії цього препарату?**
- 482. У хворого стійка артеріальна гіпертензія. Який препарат необхідно призначити, що відноситься до інгібіторів ангіотензинперетворюючого ферменту?**
- 483. Який препарат треба використати для зняття приступу стенокардії?**
- 484. У хворого гіперліпідемію з атеросклерозом судин. Який із препаратів доцільно призначити для тривалого лікування?**
- 485. У хворого при комбінованій терапії хронічної серцевої недостатності дігітоксіном та фуросемідом розвинулась різка м'язова слабкість. Які електролітні порушення можна виявити в крові?**
- 486. Фентоламін застосовують**
- 487. Хворий з ІХС скажить на гострий біль за грудиною, що виникає при фізичному навантаженні. Який препарат є засобом вибору при приступі стенокардії?**
- 488. При гіпоглікемії ви можете використати**
- 489. Хворий знаходиться на диспансерному обліку з приводу гіпертонічної хвороби. Має супутні захворювання: миготлива аритмія, стенокардія, хронічний бронхіт. Хворому необхідно призначити препарат з групи В-адреноблокаторів. Який препарат буде показаний хворому з урахуванням супутніх захворювань?**

490. Хворий поступив в кардіологічне відділення з нападом стенокардії, де йому було призначено лікування. Після прийому ліків хворий відмітив сильний головний біль і нудоту. Для якої групи антиангінальних засобів характерний такий побічний ефект?
491. Хворий страждає на аритмію та серцеву недостатність. При якому виді аритмії протипоказані серцеві глікозиди ?
492. Хворому з ІХС призначено препарат з групи нітратів. Вказати характерну побічну дію
493. Хворому із миготливою аритмією призначено новокаїнамід Чому препарат не можна вводити швидко внутрішньовенно?
494. Хворому на аритмію лікар призначив кордарон, Який основний механізм протиаритмічної дії препарату?
495. Хворому на стенокардію лікар призначив прийом таблеток нітрогліцерину для зняття болю за грудиною. Чому таблетки нітрогліцерину призначаються тільки сублінгвально?
496. Хворому призначено препарат із неселективних бета-адреноблокаторів. Вказати можливу побічну дію
497. Який антиангінальний препарат провокує бронхоспазм?
498. Який з перерахованих препаратів, що використовується для лікування гіпертонічної хвороби, викликає лікарський паркінсонізм і депресію?
499. Який із нижче вказаних антиаритмічних препаратів має місцевоанестезуючі властивості ?
500. Який із перерахованих препаратів доцільно застосувати при гіпертонічному кризі

- 501. Який протиаритмічний препарат є похідним параамінобензойної кислоти?**
- 502. Вагітній А. за показаннями необхідно переривання вагітності. Який з перелічених препаратів може визвати скорочення матки на будь-якому терміні вагітності?**
- 503. Виберіть сечогінний препарат, котрий доцільно призначити при хронічній серцевій недостатності з метою попередження розвитку гіпокаліємії.**
- 504. Вказати групу препаратів, що стимулюють моторику кишечника**
- 505. Вказати групу препаратів,що пригнічують моторику кишечника**
- 506. Для лікування виразкової хвороби шлунку використовують препарати з групи інгібіторів протонної помпи. Який з перерахованих препаратів належить до цієї групи?**
- 507. Для припинення атонічної маткової кровотечі використовують алкалоїди маткових ріжків. Що забезпечує їх гемостатичну дію в даному випадку?**
- 508. До антацидів відносять**
- 509. До офтальмологічного відділення прийнятий хворий з гострим нападом глаукоми. Яким діуретичним засобом можна посилити дію пілокарпіну?**
- 510. До пологового будинку доставлена вагітна жінка із загрозою передчасних пологів. Який препарат необхідно призначити у даній ситуації?**
- 511. До послаблюючих засобів відносять**
- 512. До приймального відділення обласної лікарні доставлена жінка 40 років з діагнозом гострий панкреатит. Що треба в першу чергу ввести хворій?**

- 513. До реанімації лікарні потрапив хворий з тяжким отруєнням невідомою речовиною. Який із перелічених препаратів необхідно використати для проведення форсованого діурезу?**
- 514. Засіб, що володіє антиферментною активністю і використовуване в комплексній терапії гострого панкреатиту**
- 515. Зменшують секрецію слинних залоз**
- 516. Лікарський засіб, який використовують при атонії кишечника**
- 517. Ліквідатора Чорнобильської аварії, який отримав опромінення, стала турбувати блювота, яка виникає несподівано. Який препарат слід призначити хворому?**
- 518. Механізм спазмолітичної дії атропіну**
- 519. Механізм спазмолітичної дії платифіліну**
- 520. Основний побічний ефект анорексигенних препаратів фепранону і дезопимону**
- 521. Підвищують секрецію слинних залоз**
- 522. Механізм дії інтерфероногенів (продигіозан, полудан) полягає у:**
- 523. Після тривалої терапії препаратом з кори крушини його проносний ефект зменшився. Яке явища обумовило цей процес?**
- 524. Побічні ефекти атропіну при вживанні у випадку виразкової хвороби шлунку**
- 525. Позначте засіб ефективний при морській і повітряній хворобі**

526. Покази до призначення засобів, що знижують секрецію залоз шлунку
527. Покази до призначення засобів, що підвищують секрецію залоз шлунку
528. Поясніть молодому лікареві, який препарат з групи гепатопротекторів найдоцільніше застосовувати при лікуванні хворих інфарктом міокарду.
529. Препарат, що знижує секрецію залоз шлунку
530. Препарат, що стимулює секрецію залоз шлунку
531. При інформуванні лікарів про наявність в аптеці жовчогінних засобів, відмітьте, якому з препаратів властива холекінетична дія?
532. При інформуванні хворого про наявність в аптеці жовчогінних засобів, відмітьте, якому з препаратів властива холеретична дія?
533. Протиблювотні засоби, використовувані в стоматологічній практиці при знятті зліпків
534. Протиблювотну дію надає
535. Ранітидин блокує
536. У зв'язку з порушенням скоротливості міометрія у післяпологовому періоді у породіллі виникла маткова кровотеча. Який препарат слід призначити в даній ситуації?
537. У комплексному лікуванні набряку легень необхідно підібрати сечогінний засіб, що не впливає на кислотно-лужний стан і виділення іонів калію.
538. У приймальне відділення лікарні доставлений хворий зі скаргами на набряки, підвищення артеріального тиску. Що необхідно призначити хворому для зменшення набряків?

- 539. У результаті черепно-мозкової травми у потерпілого розвинувся набряк мозку. Який лікарський засіб з дегідратаційною дією слід ввести до комплексної терапії?**
- 540. У тварини - експериментальний гіпертензивний синдром, спричинений систематичним введенням дезоксикортикостерону. Який із названих гіпотензивних засобів може специфічно протидіяти його розвитку?**
- 541. У терапевтичне відділення лікарні поступив хворий на виразкову хворобу шлунка. Яку групу лікарських засобів необхідно використати у комплексній терапії пацієнта?**
- 542. Вкажіть засіб замісної терапії при хронічному панкреатиті**
- 543. У терапевтичне відділення лікарні поступив хворий з гепатитом Яку групу лікарських засобів необхідно використати у комплексній терапії пацієнта?**
- 544. У хворого встановлено діагноз - виразкова хвороба шлунка. Препарат з якої групи лікарських засобів необхідно використати в комплексній терапії пацієнта ?**
- 545. У хворого гіпертонічною хворобою артеріальний тиск 170/100 мм рт.ст., набряки на ногах, добовий діурез понижений. Який препарат доцільніше ввести до складу комплексної терапії?**
- 546. У хворого гостра серцево-легенева недостатність, що супроводжується набряком легенів. Який препарат з групи діуретиків необхідно призначити?**
- 547. У хворого гострий набряк легенів, зумовлений лівошлуночковою серцевою недостатністю. Який осмотичний діуретик слід вибрати для його купірування?**
- 548. У хворого з хронічною серцево-судинною недостатністю з'явилися ознаки набряку легень. Що треба призначити хворому із сечогінних засобів для швидкого ліквідування цього стану?**

549. У хворого з явищами загальних набряків, ацидозу, гіперкаліємії необхідно призначення сечогінного засобу. Який препарат рекомендувати хворому?

550. У хворого з явищами поносу з`явилися спастичні болі в ділянці тонкого кишечника. Який препарат треба застосувати для терапевтичної допомоги?

551. У хворого на виразкову хворобу шлунка з гіперацидним синдромом відзначається схильність до запорів. Який антацидний препарат раціонально йому призначити?

552. У хворого на гіпертонію виражений терапевтичний ефект дав спіронолактон. Його терапевтична активність зумовлена зменшенням дії:

553. У хворого на рак шлунку після променевої терапії виникла нудота, слабкість. Який протиблювотний засіб треба призначити хворому?

554. Механізм дії лоратидину

555. У хворого на рак шлунку після променевої терапії виникла нудота, слабкість. Який протиблювотний засіб треба призначити хворому?

556. У хірургічне відділення лікарні доставлена хвора з явищами гострого панкреатиту: блюванням, проносом, сильним оперізувальним болем у животі, слабкістю, гіпотензією, збезводненням організму. Який препарат з антиферментною активністю призначити?

557. Хворому з явищами загальних набряків, ацидозу і гіперкаліємії необхідно призначити сечогінний засіб. Який із названих засобів рекомендувати?

558. Хворому із черепно-мозковою травмою з метою попередження набряку мозку лікар призначив сечогінний засіб. Який з перелічених засобів є препаратом вибору у даній ситуації?

559. Який діуретик потрібно призначити хворому, який лікується серцевими глікозидами, щоб зберегти в організмі калій?
560. Який з нижченаведених сечогінних засобів слід призначити хворому з первинним гіперальдостеронізмом?
561. Який з перелічених сечогінних засобів не буде проявляти діуретичного ефекту у пацієнта з хворобою Адісона?
562. Який засіб ефективний при морській і повітряній хворобі
563. Який із засобів, що викликають підвищення моторики кишечника, діє в основному на товсту кишку, може акумулювати і подразнювати нирки, забарвлює сечу у червоний колір?
564. Який препарат доцільно призначати для збільшення слиновиділення при ксеростомії
565. Який препарат доцільно призначати для зменшення слиновиділення
566. Який препарат доцільно призначити хворому на хронічний гастрит з підвищеною секреторною функцією?
567. Виберіть засіб для зниження шлункової секреції при виразковій хворобі
568. Виберіть препарат, який знижує секрецію залоз шлунка
569. Виберіть сечогінний засіб, який доцільно призначити при хронічній серцевій недостатності з метою попередження розвитку гіпокаліємії.
570. Відносно лоперамиду все правильно, крім
571. Вкажіть аналог фесталу

572. Вкажіть аналог фосфалюгеля

573. Вкажіть групу препаратів для стимуляції моторики кишечника у післяопераційному періоді

574. Вкажіть групу препаратів, які пригнічують моторику кишечника

575. Вкажіть М - холіноблокатор, який використовують для лікування виразкової хвороби шлунка

576. Вкажіть механізм дії апоморфіну гідрохлориду

577. Вкажіть покази до застосування лазіксу (усі відповіді вірні, крім однієї)

578. Вкажіть препарат вісмуту

579. Вкажіть препарат для штучного аборт у будь - який термін вагітності

580. Вкажіть препарат, який використовують при атонії сечового міхура. Побічна дія - викликає гіперсекрецію залоз шлунка. При передозуванні - спастичні болі в черевній порожнині, бронхоспазм

581. Вкажіть рвотний засіб центральної дії

582. Вкажіть сечогінний засіб, який обмежує виведення іонів кальцію з організму

583. Властивості лазіксу (усі відповіді правильні, крім однієї)

584. Гастропротектори - це 1. мізопростол, 2. алюмінію гідроксид, 3.вікалін , 4. де-нол. Правильні відповіді

585. Головний ефект фепранону

586. Дія якого проносного засобу проявляється на протязі усього кишечника?

587. Для зниження тонуусу шийки матки призначають
588. Для зупинки післяпологової маткової кровотечі необхідно призначити
589. При загрози переривання вагітності жінці ввели сальбутамол. Який механізм токолітичної дії препарату?
590. Для підсилення пологової діяльності в якості допоміжного засобу можна використати
591. Для проведення вимірювання базальної секреції залоз шлунка доцільно призначати
592. Для проведення форсованого діурезу доцільно призначити усе, крім
593. Для профілактики утворення каменів у нирках при лікуванні подагри необхідно
594. Для фуросеміду характерні наступні ускладнення, крім:
595. До антацидних засобів належить 1.Алюмінію гідроксид 2. Ранітидин 3. Атропін 4. Альмагель А
596. До блокаторів H₂ - гістамінових рецепторів належать
597. До діуретиків екстреної дії належать (всі відповіді правильні, крім однієї)
598. До жовчогінних засобів належить
599. До калійзберігаючих діуретиків належать (усі відповіді неправильні, крім однієї)
600. До петльових діуретиків належать (усі відповіді неправильні, крім однієї)
601. До побічних ефектів H₂ - гістаміноблокаторів відносять наступні, крім

602. До послаблюючих засобів, які призначають при гострому закріпі належить
603. До послаблюючих засобів, які призначають при хронічному закріпі належить
604. До урикозуричних препаратів відносяться (усі відповіді правильні, крім однієї)
605. Ерготамін протипоказаний
606. Жінці, яка страждає звичними викиднями, у комплексну терапію необхідно включити
607. Засоби, що викликають ритмічні скорочення міометрію (усі відповіді правильні крім однієї)
608. Засоби, що викликають тонічні (спастичні, тетанічні) скорочення матки (усі відповіді правильні, крім однієї)
609. Зниження слуху як побічна дія можливе при застосуванні
610. Механізм дії динопросту
611. Механізм дії уродану
612. Однією з головних причин розвитку виразкової хвороби шлунка є
613. Основний побічний ефект анорексигенних засобів
614. Особливості застосування панкреатину 1. вживати перед їжею 2. вводити ректально 3. таблетку ретельно розжувати 4. запивати молоком
615. Партусистен показаний при (усі відповіді правильні, крім однієї)

- 616. Пацієнт, який отримав опромінення, став скаржитися на блювання, що виникає несподівано. Який препарат слід призначити хворому?**
- 617. Пацієнтові після перенесеного гепатиту А призначили жовчогінний засіб, який отримують з плодів шипшини**
- 618. Пацієнтці, яка страждає на закрепи протягом трьох років, доцільно призначити**
- 619. Побічна дія характерна для динопросту**
- 620. Показами до застосування діакарбу є всі, крім**
- 621. Вказати механізм антиагрегантної дії кислоти ацетилсаліцилової:**
- 622. Показання для ліквідації хелікобактерної інфекції (усі відповіді правильні, крім однієї)**
- 623. Показання до застосування засобів, що підвищують секрецію залоз шлунка**
- 624. Покази до застосування алопуринолу (всі відповіді правильні, крім однієї)**
- 625. Покази до застосування кислоти хенодезоксихолевої кислоти**
- 626. Покази до застосування кислоти урсодезоксихолевої кислоти**
- 627. Препарати ферментів протипоказані при 1. гострі панкреатити 2. хронічні панкреатити 3. порушення травлення**
- 628. При слабкості пологової діяльності, для прискорення інволюції матки трансбукально призначають**

629. При хронічному гепатиті хворому призначили гепатопротектор, що також стимулює імунітет. Назвіть препарат.
630. Провідний засіб, який пригнічує утворення сечової кислоти
631. Ранітидин блокує
632. Секрецію слинних залоз знижують
633. У схеми антигелікобактерної терапії виразкової хвороби можуть входити наступні препарати (усі відповіді правильні, крім однієї)
634. У чоловіка 42 років, який страждає на подагру, в крові підвищена концентрація сечової кислоти. Для зниження рівня сечової кислоти йому призначено алопуринол. Конкурентним інгібітором якого фермента є препарат?
635. Фармакологічна група ессенціале
636. Яка група засобів використовується для профілактики нудоти і блювання при морській і повітряній хворобі?
637. Який засіб використовується для профілактики нудоти і блювання при морській і повітряній хворобі?
638. Який проносний засіб впливає переважно на товстий кишечник
639. В комплексному лікуванні гіпертонічної хвороби хворому був призначений сечогінний препарат. Через кілька днів АТ знизився, але виникли ознаки гіпокаліємії. Вкажіть препарат, який міг викликати такі ускладнення?
640. Для попередження передчасних пологів вагітній жінці ввели розчин препарату, який ще відомий як протисудомний, гіпотензивний, жовчогінний та проносний засіб. Скорочення матки та болі припинились, виник заспокійливий ефект. Який із названих препаратів застосував лікар?

641. Для зменшення набряків на ногах хворому з хронічною серцево- судинною недостатністю лікар призначив діуретичний засіб. Через деякий час у хворого з`явилися ознаки гіпокаліємії. Який з препаратів міг цьому сприяти?

642. До гастроентерологічного відділення госпіталізовано чоловіка 25 років зі скаргами на голодні болі, відчуття тяжкості за грудниною, печію. Лікар призначив гастроцепін. Яка фармакодинамічна властивість гастроцепіну примусила лікаря зробити цей вибір?

643. До гастроентерологічного відділення госпіталізувати чоловіка 25 років зі скаргами на “голодні” болі, відчуття важкості за грудниною, снагу. Лікар призначив гастроцепін. На яку фармакологічну властивість гастроцепіну розраховував лікар?

644. До лікаря звернулася хвора на гіпертонічну хворобу, яка довгий час лікувалась гідрохлортіазидом, зі скаргою на появу набряку та болю в уражених суглобах. Що спричинило ці ускладнення?

645. До нейрохірургічного відділення лікарні доставлений хворий з черепно-мозковою травмою. Діагностовано набряк мозку. У комплексі заходів невідкладної терапії показана дегідратація. Який діуретичний засіб у даній ситуації повинен призначити лікар?

646. До стаціонару прийнятий хворий з діагнозом виразкова хвороба 12-палої кишки у фазі загострення, виразка цибулини 12-палої кишки. Аналіз шлункового соку показав підвищення секреторної і кислототвірної функції шлунка. Виберіть препарат, який знижує секреторну функцію залоз шлунка за рахунок блокування H₂-гістамінових рецепторів.

647. Жінка 40 років звернулася до лікаря з приводу кишкового порушення, що проявилось у частому стулі, буркотінні у черевній порожнині, метеоризмі. Бак-аналіз не виявив патогенної флори. Який лікарський засіб найбільш доцільно призначити в цьому випадку?

648. Ліквідатор Чорнобильської аварії, який отримав опромінення, став скаржитися на блювання, що виникає несподівано. Який препарат слід призначити хворому?

649. Для дипіридамолу не характерно наступне:

650. Лікування гельмінтозів полягає у застосуванні антигельмінтного препарату в комбінації з проносним засобом. Котрий з проносних засобів не можна застосовувати з екстрактом чоловічої папороті?

651. Пацієнт з виразковою хворобою шлунка приймав антацидний препарат альмагель. Для лікування гострого бронхіту йому призначили антибіотик метицилін. Проте протягом 5 днів температура не знизилась, кашель і характер харкотиння не змінилися. Лікар дійшов висновку про несумісність ліків при їх взаємодії. Про який саме вид несумісності ліків йде мова?

652. Пацієнтка 57 років, за спеціальністю бухгалтер, у зв'язку з хронічними запорами приймала за призначенням лікаря екстракт крушини сухий, який протягом 2 тижнів виявляв позитивну лікувальну дію, але далі його ефективність суттєво зменшилась. Визначте, яка реакція розвинулася у хворої у відповідь на повторне введення ліків?

653. Препарати з цієї групи лікарі-стоматологи використовують при операціях для зниження секреції слинних залоз, запобігання ларингоспазму, нудоти, брадикардії. Назвіть групу препаратів.

654. У відділення реанімації поступила 4-х річна дитина в коматозному стані. Відомо, що помилково, замість вітамінів, вона з'їла 6 таблеток снодійного засобу. Для швидкого виведення отрути з організму провели форсований діурез. Який з сечогінних засобів використали?

655. Хворому з дискінезією жовчовивідних шляхів та запорами лікар призначив жовчогінний засіб, який має ще значну проносну дію. Який засіб призначив лікар?

656. У жінки 65 років хронічна ниркова недостатність на фоні хронічного гломерулонефриту. Стан хворої погіршився: загальне нездужання, блювання, шкірний свербіж, біль у грудях, артеріальний тиск (АТ) 180/105 мм рт. ст. Звук тертя перикарда, двобічний набряк щиколоток. Концентрація креатиніну в сироватці крові 26 мг/л. Який діуретичний засіб слід призначити?

657. У лікарню привезли хворого з отруєнням. Необхідно терміново викликати блювання. Який з перелічених нижче засобів слід застосувати?

658. У пана М., 59 років, після нефрэктомії розвинувся парез кишечника. Який холінергічний засіб із групи антихолінергічних слід йому призначити?

659. У пацієнтки 46 років на фоні миготливої аритмії почався набряк легень. Який сечогінний препарат необхідно ввести в першу чергу для виведення хворої з тяжкого стану?

660. У практиці невідкладної допомоги і реанімації часто трапляються стани, які супроводжуються набряком клітин мозку. Для боротьби з цим явищем у організм хворих доцільно вводити речовини, які:

661. У приймальне відділення доставлений хворий з алкогольним отруєнням. Лікар призначив провести пацієнту форсований діурез. Який сечогінний засіб необхідно використовувати?

662. У процесі лікування хронічного набрякового синдрому фуросемідом у хворого виникло порушення катіонного складу плазми крові. Який засіб слід використати для його корекції?

663. У стаціонар доставлено хворого з діагнозом виразкова хвороба 12-палої кишки в фазі загострення. Аналіз шлункового соку показав підвищення секреторної і кислототвірної функції шлунка. Виберіть препарат, який знизить секреторну функцію залоз шлунка за рахунок блокади H₂-рецепторів.

664. У хворого 35 років, який зловживає алкоголем, на фоні лікування сечогінними засобами виникли виражені м'язова і серцева слабкості, блювання діарея, АТ 100/60 мм рт. ст., депресія. Причиною цього стану є посилене виведення із сечею:
665. У хворого 40 років - виразка шлунка у стадії загострення із значним підвищенням кислотності шлункового соку, больовим та диспепсичним синдромом. Виберіть відповідний засіб.
666. У хворого атонія жовчного міхура, ускладнена жовчнокам'яною хворобою. Який із запропонованих засобів слід використати для посилення евакуації жовчі у кишечник у цих умовах?
667. У хворого зі значними периферичними набряками почергове застосування дихлотіазиду, етакринової кислоти і фуросеміду не сприяло значному діуретичному ефекту. У крові - значне підвищення кількості альдостерону. Назвіть препарат вибору.
668. Для низькомолекулярних гепаринів не характерно наступне:
669. У хворого із значними периферійними набряками почергове використання дихлотіазиду, етакринової кислоти і фуросеміду не призвело до значного діуретичного ефекту. Аналіз крові показав значне підвищення кількості альдостерону. Назвіть препарат вибору.
670. У хворого на 2-3 день після операції вшивання виразки шлунку виявились ознаки атонії кишечника та затримка сечовиділення. Виберіть препарат для усунення цього ускладнення:
671. У хворого на хронічну серцеву недостатність, незважаючи на терапію кардіотонічними засобами й тіазидовим діуретиком, збільшуються набряки і навіть виникли ознаки асцити. Який препарат слід призначити для підсилення діуретичного ефекту застосованих ліків?

- 672. У хворого подагричний артрит. Який препарат необхідно призначити для пригнічення синтезу сечової кислоти в організмі?**
- 673. У хворого травма мозку. В післяопераційному періоді розвинулась загроза набряку мозку. Призначте препарат для усунення цього ускладнення.**
- 674. У хворого, який звернувся до лікаря, діагностували антацидний гастрит. Для покращання роботи шлунка хворому призначили таблетки ацедин-пепсину. Який вид лікування був призначений хворому?**
- 675. У хворої 65 років на фоні хронічної серцевої недостатності розвинувся вторинний гіперальдостеронізм. Який препарат для збільшення діурезу слід призначити?**
- 676. У хворої на хронічну серцеву недостатність з набряковим синдромом у крові виявлено підвищення вмісту альдостерону. Який діуретичний засіб найдоцільніше призначити?**
- 677. У чоловіка 42 років, який страждає на подагру, в крові підвищена концентрація сечової кислоти. Для зниження рівня сечової кислоти йому призначили алопуринол. Конкурентним інгібітором якого ферменту є алопуринол?**
- 678. Хвора у віці 69 років страждає хронічним запором, в основі якого покладено гіпотонію товстого кишечника. Який з перелічених препаратів доцільно призначити?**
- 679. Хворий доставлений до офтальмологічного відділення з діагнозом відкритокутова глаукома лівого ока. Після додаткового обстеження лікар призначив діакарб. Назвіть механізм зниження внутрішньоочного тиску під впливом діакарбу.**

- 680. Хворий доставлений у хірургічне відділення з діагнозом гострий панкреатит, розпочато консервативне лікування. Призначення якого препарату є патогенетично обґрунтованим?**
- 681. Хворий з діагнозом “гострий панкреатит” госпіталізований у стаціонар. Вибір якого препарату є патогенетично обґрунтованим ?**
- 682. Хворий з хронічним гіперацидним гастритом для усунення печії приймає антацидний засіб, після чого відмічає покращання, однак разом з тим виникає відчуття розпирання у шлунку. Який із названих препаратів приймав хворий?**
- 683. Хворий із хронічним запором приймав щодня одну таблетку бісакодилу. Через деякий час для отримання ефекту він змушений був приймати по 2 таблетки. Як називається такий тип зміни дії лікарських речовин?**
- 684. Хворий на гіпертонію, який лікувався гіпотіазидом, скаржиться на загальну слабкість, втрату апетиту, серцебиття. Спостерігаються гіпотонія м'язів, в'ялі паралічі, послаблення перистальтики кишечника. Що може бути причиною такого стану?**
- 685. Хворий надійшов у хірургічне відділення з діагнозом: гострий панкреатит, розпочато консервативне лікування. Призначення якого препарату є патогенетично обґрунтоване?.**
- 686. Хворий поступив у хірургічне відділення з діагнозом: гострий панкреатит, розпочато консервативне лікування. Призначення якого препарату є патогенетично обґрунтованим?**
- 687. Хворий поступив у хірургічне відділення з діагнозом: гострий панкреатит, розпочато консервативне лікування. Призначення якого препарату є патогенетичне обґрунтоване?**

688. Хворий похилого віку страждає хронічним запором, в основу якого покладено гіпотонію товстого кишечника. Який препарат слід призначити хворому?

689. Хворий скаржиться на болі у шлунку, печію. При обстеженні шлункового соку виявлено підвищення кислотності шлункового соку. Що необхідно призначити хворому для нейтралізації кислотності шлункового соку?

690. Хворий скаржиться на печію і біль у шлунку. При огляді виявлена підвищена кислотність шлункового соку. Що необхідно призначити хворому для нейтралізації кислоти шлункового соку?

691. Хворий тривалий час лікувався віх хронічного запору бісакодилом. Однак через декілька тижнів проносний ефект препарату знизився. З чим це може бути пов'язано?

692. Хворому поставлений діагноз: черепно-мозкова травма, набряк мозку. Який із сечогінних засобів слід призначити з метою дегідратації мозку?

693. Хворому в післяопераційному періоді для стимуляції перистальтики кишечника та тону сечового міхура було призначено препарат з групи антихолінестеразних засобів. Визначте його серед нижченаведених препаратів:

694. Хворому в післяопераційному періоді для стимуляції перистальтики кишечника та тону сечового міхура було призначено препарат з групи антихолінестеразних засобів. Визначте його серед нижченаведених препаратів: прозерін діхлотіазид

695. Хворому з виразковою хворобою призначено фамотидин. Кислотність шлункового соку значно знизилась. Який механізм покладено в основу дії даного препарату?

696. Який механізм лежить в основі дії фамотидину?

697. Хворому з високою кислотністю шлункового соку поставлений діагноз виразки шлунка. Який із нижчеперелічених засобів найбільш сильно пригнічує секрецію соляної кислоти?

698. Хворому з гіпертензивним кризом в комплексному лікуванні необхідно призначити сечогінний засіб. Порадьте лікареві-інтерну, який препарат необхідно ввести хворому?

699. Хворому з загостренням подагри призначено алопуринол, який знижує вміст уратів у крові. Який механізм цієї дії?

700. Хворому з набряком мозку був призначений препарат з групи петлевих діуретиків. Назвіть препарат.

701. Хворому з ознаками гострого медикаментозного отруєння слід провести форсований діурез. Який препарат можна застосувати?

702. Хворому з опіковим шоком введено сечогінний препарат, який збільшує осмотичний тиск як у просвіті судин, і діє протягом всього нефрона. Назвіть, який сечогінний засіб був введений хворому?

703. Хворому з підвищеним артеріальним тиском і явищами гіперпродукції альдостерону лікар призначив сечогінний засіб. Який препарат найкраще використати в даній ситуації?

704. Хворому з початковою стадією гіпертонічної хвороби призначили діуретик по 0,025 грамів 2 рази на день. Через 7-8 днів АТ дещо знизився, але пацієнт став відчувати болі в ділянці серця, м'язову слабкість, тремтіння у кінцівках. Аналіз крові показав зміни електролітного балансу в бік гіпокаліємії. Який із названих препаратів міг стати причиною цього?

705. Хворому на виразкову хворобу 12-палої кишки призначено препарат, який за механізмом дії блокує протонну помпу ($K^+ H^+$ АТФ-азу). Назвіть цей препарат.

706. Хворому на подагру лікар призначив алопуринол. Яка фармакологічна властивість препарату забезпечує терапевтичний ефект у даному випадку?

707. Хворому на сечокам'яну хворобу після обстеження призначили алопуринол - конкурентний інгібітор ксантиноксидази. Підставою для цього був хімічний аналіз ниркових каменів, які склалися переважно з:

708. Хворому на хронічний гепатит було призначено препарат, що стимулює жовчовиділення. Назвіть препарат.

709. Хворому, якій перебуває в гастроентерологічному відділенні, призначили гістамінову пробу. З якою метою хворому вводять гістамін?

710. Чоловік 37 років доставлений до хірургічного відділення з явищами гострого панкреатиту: блювання, пронос, брадикардія, гіпотензія, слабкість, явища зневоднення організму. Який препарат найбільш доцільно використати в першу чергу?

711. Чоловіку 42 років, що страждає на виразкову хворобу 12-палої кишки, призначені такі препарати: де-нол, амоксицилін, метронідазол. Терапія виявилась доцільною. Яка основна причина високої ефективності цього комплексу препаратів?

712. Чоловіку 42 років, який страждає виразковою хворобою 12-палої кишки, призначили такі препарати: де-нол, ампіцилін, метронідазол. Така комбінація виявилась доцільною. Яка причина високої ефективності цього комплексу?

713. Юнак 23 років з діагнозом виразкова хвороба шлунка доставлений до гастроентерологічного відділення через часті рецидиви і незадовільну дію попереднього лікування. Хворий одержував в'язучі, холіно-, гістаміно- та блокатори H⁺K⁺-АТФази. Яку групу препаратів найбільш доцільно призначити додатково?

714. До реанімації лікарні поступив пацієнт з тяжким отруєнням невідомою речовиною. Який із перелічених препаратів необхідно використати для проведення форсованого діурезу?

715. До так званих «малих» кровоспинних засобів, які використовуються у акушерсько - гінекологічній практиці належать (усі відповіді правильні, крім однієї)

716. До тіазидних діуретиків відносять (усі відповіді неправильні, крім однієї)

717. Жінці для збереження вагітності призначено токолітичний засіб, який ще володіє гіпотензивною, протисудомною, жовчогінною дією. Який засіб було призначено?

718. З метою розчинення жовчних каменів (тільки при наявності холестеринових (рентгенонегативних) каменів) розмірами не більш за 15 - 20 мм, при функціонуючому жовчному міхурі, та збереженій прохідності міхуревої і загальної жовчної протоки можна призначати

719. Загостренню подагри можуть сприяти наступні фактори (усі відповіді правильні крім однієї)

720. Засіб належить до калійзберігаючих діуретиків з помірним натрійуретичним ефектом. Діуретичний ефект пов'язаний з антагонізмом стосовно гормону кори надниркових залоз - альдостерону

721. Комбінований препарат тваринного походження, має властивості справжнього холеретика. Застосовують як жовчогінний препарат при захворюваннях печінки, холециститі, порушеннях травлення

722. Покази до застосування цього препарату - індукція пологів та їх стимуляція при слабкій пологовій діяльності, профілактика та лікування атонічних маткових кровотеч у ранній післяпологовий період, штучне викликання пологів при ускладненнях вагітності, для посилення лактації.

723. Породіллі із слабкістю пологової діяльності було призначено препарат пітуїтрин. Які гормони входять до складу цього препарату.

724. Препарат має специфічну здатність інгібувати фермент ксантиноксидазу, який бере участь у перетворенні гіпоксантину на ксантин і ксантину на сечову кислоту. Внаслідок цього знижується вміст уратів у сироватці крові та попереджується відкладення останніх у тканинах і нирках

725. Препарат пригнічує фермент H^+/K^+ -АТФазу, який відповідальний за секрецію соляної кислоти кислотними клітинами шлунка. Завдяки своєму механізму дії, зменшує не тільки базальну секрецію кислоти, але й ту секрецію, яка може бути стимульована, незалежно від виду стимулятора; він підвищує величину рН і зменшує секреторний об'єм. Вкажіть препарат

726. Препарат селективно блокує мускаринові рецептори, знижує продукцію шлункового соку та підвищує рН у шлунку. Використовується для лікування гастритів, виразкової хвороби шлунка тощо

727. Препарат стимулює секрецію молока, посилює вироблення пролактину - гормону передньої частки гіпофіза. Крім того, препарат активує виділення молока з молочної залози в зв'язку з впливом на її скоротливі елементи; має слабкий антидіуретичний ефект та істотно не впливає на рівень артеріального тиску. Є пептидним гормоном (октапептидом) задньої частки гіпофіза

728. Препарат являє собою комбінацію високоактивних ферментів рослинного і тваринного походження з протизапальною, протинабряковою, фібринонолітичною, фібринолітичною, імуномодулюючою і вторинною знеболюючою дією.

729. Препарат, який пригнічує центр голоду

730. Препарати, які використовують для лікування виразкової хвороби шлунка
1. фамотидин, 2. альмагель А, 3. де-нол, 4.термопсис

731. При виражених болях в епігастрії у зв'язку із загостренням виразкової хвороби ви можете рекомендувати:

732. При гострому приступі подагри можна призначати наступні препарати, крім

733. При проведенні хіміотерапії жінці з пухлиною яєчника для попередження виникнення блювання доцільно призначити

734. Для тромбоксану А2 характерні всі властивості, окрім одної:

735. У відділення реанімації поступила дитина в коматозному стані. Відомо, що помилково, вона з'їла таблетки снодійного засобу. Для швидкого виведення отрути з організму провели форсований діурез. Який з сечогінних засобів використали?

736. У пацієнта з вираженими периферичними набряками почергове застосування дихлотіазиду, етакринової кислоти і фуросеміду не сприяло значному діуретичному ефекту. У крові - значне підвищення кількості альдостерону. Назвіть препарат вибору.

737. У пацієнта після проведеної нефроктомії розвинувся парез кишечника. Який холінергічний засіб із групи антихолінестеразних слід йому призначити?

738. У пологовому відділенні знаходиться жінка, у якої за строком вагітності вже повинні наступити пологи. При обстеженні шийка матки розкрита, але скорочення матки відсутні. Призначте засіб гормональної природи для посилення пологової діяльності.

739. У приймальне відділення поступив хворий з алкогольним отруєнням. Лікар призначив провести пацієнту форсований діурез. Який сечогінний засіб необхідно застосувати?

740. Фармакологічні методи підвищення чутливості вагітної матки до окситоцину - це введення

741. Хворій на гіпертонічну хворобу у комплексній терапії призначено гідрохлортіазид. Який побічний ефект можна очікувати?

742. Хворому з хронічним холециститом призначено препарат - алкалоїд опію, який має міотропну спазмолітичну дію. Як називається цей препарат?

743. Головний недолік парацетамолу, як активного знеболюючого та жарознижуючого засобу, це -

744. Хворому на хронічний гепатит лікар призначив гепатопротектор, який містить есенціальні фосфоліпіди та сприяє репарації клітинних мембран. Вкажіть препарат

745. З якою метою хворому із стенокардією призначили ацетилсаліцилову кислоту?

746. Антиагрегантна дія простацикліну пов'язана з:

747. Антиагрегантний засіб тиклопідин (тиклід) має основну дію:

748. Відзначити можливі механізми гіпоглікемії, що викликається похідними сульфонілсечовини:

749. Відзначити антитиреоїдний засіб, що пригнічує синтез гормонів щитовидної залози:

750. Відзначити глюкокортикоїдний препарат з резорбтивною дією:

751. Відзначити гормон - похідне амінокислот:

752. Відзначити гормон задньої частки гіпофіза:

753. Відзначити механізм антифібринолітичної дії амінокапронової кислоти:

- 754. Відзначити механізм дії урокінази:**
- 755. Відзначити найбільш важливі показання до застосування кортикотропіну:**
- 756. Відзначити основний ефект вазопресину:**
- 757. Відзначити основні ефекти гонадотропіну хоріонічного**
- 758. Відзначити основні засоби, вживані при лікуванні гіпохромної анемії:**
- 759. Відзначити основні показання до застосування бромокриптину:**
- 760. Відзначити основну властивість гепарину:**
- 761. Відзначити основну властивість урокінази.**
- 762. Відзначити показання до застосування антифібринолітичних засобів:**
- 763. Відзначити препарат з переважною дією анаболізму?**
- 764. Відзначити препарат, вживаний для лікування гіперхромної анемії:**
- 765. Відзначити препарати гіпоталамічних гормонів:**
- 766. Відзначити препарати гормонів передньої частки гіпофіза:**
- 767. Відзначити протидіабетичний засіб, ефективний при прийомі всередину:**
- 768. Відзначити речовину, стимулюючу лейкопоез:**
- 769. Відзначити речовину, що зменшує агрегацію тромбоцитів:**
- 770. Вкажіть засіб, вживаний при лейкопенії і агранулоцитозі:**

- 771. Вкажіть препарат для прийому всередину при ЦД з пониженою інсуліноподібною функцією п/ш залози?**
- 772. Вказати антагоніст гепарину:**
- 773. Вказати антикоагулянт для перорального застосування:**
- 774. Вказати засіб для лікування гіпохромних анемій:**
- 775. Вказати засіб, вживаний для лікування анемії при вагітності:**
- 776. Вказати засіб, вживаний при поліцитемії (еритемі):**
- 777. До аптеки звернувся хворий з питанням на анемію Адісона-Бірмера, який препарат застосовують для лікування цього стану разом з фолієвою кислотою.**
- 778. Ефект феніліну підсилюється фенобарбіталом, і це пов'язано із:**
- 779. З якою метою препарати заліза в порошках для приймання всередину призначаються в капсулах?**
- 780. З якою метою хворому із стенокардією призначили ацетилсаліцилову кислоту ?**
- 781. Можливості застосування натрію гідроксиду:**
- 782. Молодий провізор при знайомстві з анотацією на гепарин звернувся з питанням про механізм дії цього препарату.**
- 783. Провізор-інтерн при знайомстві з анотацією на гепарин звернувся з питанням про механізм дії цього препарату.**
- 784. Назвіть колезі-провізорів препарат, що відноситься до групи низькомолекулярних гепаринів**

785. Основна дія простацикліну полягає в тому, що:

786. Перерахувати препарати нової групи антикоагулянтів-низькомолекулярних гепаринів:

787. Проконсультуйте лікаря-інтерна, чому одночасно з препаратами заліза не доцільно застосовувати антацидні засоби?

788. Групова належність димедролу

789. Розчин для інфузій: містить натрію хлорид, калію хлорид, натрію гідрокарбонат; коригує вміст води, електролітів і концентрацію іонів водню, які визначають кислотно-лужне середовище в організмі, покращує реологічні властивості крові, зменшує гіповолемію, поліпшує мікроциркуляцію, збільшує діурез.

790. Що не характерно для тканинного активатора плазміногену (алтеплази)

791. Що характерно для неодикумарину:

792. Який із перерахованих препаратів і недоцільно застосовувати для стимуляції лейкопоезу і фагоцитозу?

793. Який із перерахованих препаратів не викликає пригнічення кровотворення?

794. Який механізм протизгортальної дії гепарину?

795. Агрегацію тромбоцитів знижує

796. Антиагрегантна дія ацетилсаліцилової кислоти зумовлена

797. Антиагрегантна дія кислоти ацетилсаліцилової обумовлена

798. Антифібринолітичний засіб - це

- 799. Ацетилсаліцилова кислота знижує агрегацію тромбоцитів за рахунок**
- 800. Ацетилсаліцилову кислоту у добовій дозі 100 мг призначають для:**
- 801. Виберіть правильне твердження**
- 802. Визначте препарат: гальмує агрегацію тромбоцитів, перешкоджає утворенню тромбосану А2, використовують всередину для профілактики тромбозів, може викликати виразкування ШКТ**
- 803. Вітамінний препарат з коагулянтною активністю**
- 804. Вкажіть антикоагулянт з найкоротшим латентним періодом**
- 805. Вкажіть вітамінний засіб ефективний при анемії**
- 806. Вкажіть вітамінний засіб, який здатний підвищувати згортання крові**
- 807. Вкажіть засіб для стимуляції лейкопоезу**
- 808. Вкажіть механізм дії вікасолу?**
- 809. Вкажіть найефективніший засіб для лікування інфаркту міокарда в перші дві години**
- 810. Вкажіть низькомолекулярні гепарини 1.фраксипарин, 2. еноксапарин 3. гепарин 4. кальцитрин**
- 811. Вкажіть препарат - інгібітор фібринолізу**
- 812. Вкажіть препарат заліза, який стимулює еритропоез**
- 813. Вкажіть препарат, що підвищує згортання крові. 1.Фібриноген, 2. Гепарин, 3.Вікасол, 4. Неодикумарин**

814. Вкажіть препарат, що підвищує згортання крові. 1.Фібриноген, 2. Гепарин, 3.Фраксипарин, 4. Неодикумарин

815. Всі відповіді вірні, ОКРІМ:

816. Всі твердження про гепарин вірні, ОКРІМ:

817. Всі твердження стосовно антикоагулянтів вірні ОКРІМ

818. Для зупинки маткової кровотечі використовують

819. Для лікування мегалобластичної анемії доцільно призначити

820. Для попередження вільнорадикальних реакцій, які можуть ініціювати препарати двохвалентного заліза, до складу залізовмісних препаратів включають

821. Для профілактики та лікування лейкопенії у пацієнта після променевої терапії призначають

822. Для профілактики тромбозу застосовують 1. фібриноген, 2. тромбін, 3.стрептокіназу, 4.неодикумарин

823. Для реканалізації судин при тромбозі використовують:

824. Для стимуляції еритропоезу використовують 1. коамід, 2. ферковен, 3. заліза лактат 4.меркаптопурин

825. Для стимуляції лейкопоезу використовують 1. тамоксифен, 2. тардиферон, 3.пентоксил, 4. метилурацил

826. До антикоагулянтів непрямої дії належать 1. варфарин, 2. неодикумарин, 3.гепарин, 4. вікасол

827. До антикоагулянтів прямої дії належать 1. гепарин, 2. неодикумарин, 3. вікасол 4. тромбін
828. До гемостатиків належать 1. гепарин, 2. неодикумарин, 3. вікасол 4. тромбін
829. До засобів, які безпосередньо активують плазміноген належить
830. Дози варфарину підбирають індивідуально з урахуванням індивідуальної реакції кожного пацієнта на прийом на підставі
831. Зазначте вірне твердження
832. Згортання крові посилює
833. Кислоту ацетилсаліцилову застосовують у якості
834. Дегрануляція опасистих клітин призводить до
835. Діазолін на відміну від димедролу
836. Лікарю рентгенологу для корекції порушень стану системи крові внаслідок професійних шкідливостей доцільно призначити
837. Макроцитарну анемію здатні посилювати та провокувати такі препарати: 1. дифенін, 2. ізоніазид, 3. нон-овлон, 4. ціанокобаламін, що необхідно враховувати при лікуванні
838. Механізм дії гепарину полягає в тому, що він
839. Механізм дії дипіридамолу
840. Механізм дії тиклопідину
841. Місцево для зупинки кровотеч можна використати

842. На відміну від гепарину низькомолекулярні гепарини:
843. Назвіть антикоагулянт, який пригнічує згортання крові *in vivo* та *in vitro*
844. Після перенесеної резекції шлунка і дванадцятипалої кишки пацієнту для лікування гіпохромної анемії доцільно призначити
845. Препарат кобальту - це
846. Препарат, для зупинки кровотеч, котрий протипоказано вводити парентерально
847. Препарати заліза поділяють на 1.прості, легкоіонізуючі солі, 2. полінуклеарні гідроксильні сполуки, 3. алкалоїди, 4.вітамінні засоби
848. Препарати, які недоцільно застосовувати для стимуляції лейкопоезу і фагоцитозу? 1.Кальцитрин, 2. Метилурацил, 3.Пентоксил, 4.Натрію нуклеїнат, 5.Молграмостим
849. Препаратом вибору при передозуванні антикоагулянтів прямої дії є
850. Препаратом вибору при передозуванні непрямих антикоагулянтів є
851. При гіпохромній анемії призначають
852. При передозуванні гепарину використовують
853. Пригнічує згортання крові
854. Пригнічує утворення протромбіну у печінці
855. Призначте для лікування гострого тромбофлебіту препарат, який безпосередньо впливає на фактори згортання крові
856. Стрептокіназа стимулює перехід

857. У пацієнта з хворобою Крона для лікування залізодефіцитної анемії необхідно призначити

858. Фібринолітичний засіб - це

859. Яка властивість характерна для ціанокобаламіну?

860. Який препарат заліза не можна вводити парентерально?

861. Який з названих засобів сприяє відновленню прохідності судин на початкових етапах тромбоутворення?

862. Який засіб належить до рекомбінантних препаратів людських колонієстимулюючих факторів?

863. Який засіб слід призначити хворому з метою пригнічення фібринолізу та зупинки кровотечі, що виникла під час лікування виразкової хвороби шлунка?

864. Який механізм антагоністичної дії антикоагулянтів непрямої дії та вікасолу?

865. Який побічний ефект характерний для препаратів заліза, які застосовують всередину?

866. Яку властивість з нижчеперерахованих має тромбоксан А2?

867. Вагітній жінці з метою профілактики залізодефіцитної анемії призначали препарат заліза. Який механізм дії цього препарату?

868. Вкажіть ненаркотичний анальгетик, похідне саліцилової кислоти:

869. Дитина 8 років готувалася до тонзилектомії. Аналіз крові показав, що час згортання збільшено (до 7 хвилин). Який препарат за 5 днів до операції слід ввести до комплексу лікарських засобів підготовчого періоду в першу чергу?

870. Дитині що страждає на геморагічний діатез, був призначений гемостатик. Назвіть цей препарат?

871. Для лікування тромбозу лікар призначив хворому препарат з групи антикоагулянтів прямої дії. Назвіть цей препарат.

872. До провізора звернувся хворий з проханням відпустити засіб від головного болю, який одночасно має антиагрегантну дію. Назвіть цей препарат?

873. Жінка 48 років звернулася до стоматолога із скаргами на кровотечу з ясен, що спостерігається після ранкового туалету. Із анамнезу було з'ясовано, що вона страждає на стенокардію і приймає декілька лікарських препаратів. Який з них міг стати причиною кровотечі?

874. Жінці 50 років, яка хворіє тромбофлебіом, ввели гепарин, що спровокував кишкову кровотечу. Який препарат потрібно призначити?

875. Для анальгетика - антипіретика парацетамолу характерне все, крім:

876. Залізодефіцитна анемія досить поширена серед вагітних, ускладнює перебіг вагітності, пологів, несприятливо позначається на стані плода і новонародженого. Запропонуйте для лікування препарат

877. На тлі тривалого введення гепарину у хворого розвинулось шлункова кровотеча. Назвіть специфічний антидот гепарину, який треба негайно застосувати.

878. У результаті незначної травми руки у хворого на цироз печінки виникла кровотеча. Протромбіновий індекс в межах норми, у зв'язку з чим був поставлений діагноз фібринолітичної кровотечі. Який із гемостатиків необхідно призначити у даному випадку?

- 879. Пацієнту 50 років, який довгий час хворіє на стенокардію разом з коронаролітиками лікар призначив ацетилсаліцилову кислоту для зменшення агрегації тромбоцитів. Який механізм антиагрегантної дії ацетилсаліцилової кислоти?**
- 880. Пацієнту з тромбоемболією вен нижніх кінцівок призначено медикаментозне лікування. Через 2 доби на шкірі з'явилися геморагії. Який препарат із нижчезгаданих викликає подібне ускладнення?**
- 881. Під час гепаринотерапії виникла кровотеча. Який з вказаних лікарських засобів слід ввести для обмеження дії**
- 882. Під час довготривалого лікування хронічного захворювання препаратом бутадіон у хворого зменшилась кількість лейкоцитів. Який з перелічених засобів стимулює утворення лейкоцитів?**
- 883. Під час зимування у геологів були зафіксовані сильні головні болі, носові кровотечі, кровоточивість ясен, лущення шкіри. Призначення якого вітамінного препарату є доречним у даному випадку?**
- 884. При відпуску лікарських засобів в аптеці провізор звернув увагу хворого на недоцільність одночасного застосування ціанокобаламіну і тіаміну хлориду. Як називають такий тип взаємодії ліків?**
- 885. При гострому тромбозі показана антикоагулянтна терапія. Назвіть антикоагулянт прямої дії, який застосовують при загрозі тромбозу.**
- 886. При гострому тромбозі показана антикоагулянтна терапія. Відзначте антикоагулянт прямої дії, вживаний при загрозі тромбозу.**
- 887. При обстеженні працівників хімічної промисловості по переробці свинцю в пацієнта виявлено зменшення кількості лейкоцитів та гранулоцитів у крові. Назвіть засіб фармакологічної корекції порушень гемопоезу в даній ситуації.**

- 888. При обстеженні чоловіка 40 років було встановлено діагноз гіпохромна анемія. Який препарат треба призначити для лікування?**
- 889. При обстеженні чоловіка 40 років було встановлено діагноз: гіпохромна анемія. Який препарат треба призначити для лікування?**
- 890. При передопераційному обстеженні хворого виявлений дефіцит протромбіну в крові. Який засіб необхідно призначити для зменшення крововтрати при операції?**
- 891. При передопераційному обстеженні хворого виявлений дефіцит протромбіну в крові. Яку речовину необхідно призначити заздалегідь для зменшення крововтрати.**
- 892. Як впливає ергокальциферол на фосфорно -кальцієвий обмін?**
- 893. При проведенні щорічної диспансеризації у лікаря-рентгенолога відмічено лейкопенію. Який засіб необхідно призначити для корекції гемопоезу?**
- 894. Призначаючи лікування хворому з агранулоцитозом лікар звернувся в аптеку за консультацією щодо наявності препарату, який стимулює проліферацію та диференціацію гранулоцитів і моноцитів. Яким препаратом цікавився лікар?**
- 895. У 6-місячної дитини спостерігалися часті та інтенсивні підшкірні крововиливи. Призначення синтетичного аналога вітаміну К (вікасолу) дало позитивний ефект. В карбоксилюванні глутамінової кислоти якого білка зсідальної системи крові бере участь цей вітамін?**
- 896. У вагітної жінки при аналізі крові виявлено мегалобласти і високий кольоровий показник. Встановлено діагноз: мегалобластична анемія. Який засіб необхідно призначити хворій**
- 897. У вагітної жінки ШОЕ становить 40 мм/час. Причиною цього є збільшення:**

898. У жінки 43 років, яка перд тим була прооперована з приводу фіброміоми матки, почалася кровотеча. Лікар призначив внутрішньовенно 5% розчин амінокапронової кислоти (100 мл), що викликало гемостаз покращення стану хворої. Який механізм дії цього препарату?

899. У жінки 43 років, яка перд тим була прооперована з приводу фіброміоми матки, почалася кровотеча. Лікар призначив внутрішньовенно 5% розчин амінокапронової кислоти (100 мл), що викликало гемостаз покращення стану хворої. Який механізм дії цього препарату?

900. У жінки під час пологів, ускладнених передчасним відшаруванням плаценти, розпочалася масивна маткова фібринолітична кровотеча. Який препарат необхідно їй призначити для ігібування фібрінолізу?

901. У зв'язку з великою крововтратою у жінки після тиреоїдектомії виникла гіпохромна анемія. Який препарат слід призначити хворій?

902. У породіллі після відділення плаценти почалася масивна кровотеча. Який препарат необхідно ввести?

903. У результаті незначної травми руки у хворого із хронічною патологією печінки виникла кровотеча. Аналіз крові показав збільшення фібринолітичної активності. Назвіть, який препарат показаний у даній ситуації.

904. У хворого виявлено інфаркт міокарда з тромбозом коронарної артерії. Який з перерахованих препаратів можна використати для відновлення кровообігу?

905. У хворого після резекції шлунка розвинулась мегалобластична анемія. Який препарат необхідно призначити хворому?

906. У хворого тромбоз коронарних судин. Необхідне введення речовини, поновлюючої їх прохідність. Яка з пропонованих речовин володіє необхідними властивостями?

907. У хворої 56 років, яка протягом двох тижнів приймає неодикумарін з приводу тромбофлебіту при черговому обстеженні в крові виявлено зниження протромбіну, в сечі спостерігається мікрогематурія. Який лікарській засіб необхідно застосувати в якості антагоністу неодикумарину?

908. У хворої гінекологічного відділення виникли симптоми внутрішньої кровотечі. Який засіб слід призначити з метою пригнічення фібринолізу та припинення кровотечі?

909. У хворої, яка приймає неодикумарин у зв'язку із тромбофлебітом, виникла кровоточивість. Який препарат

910. У чоловіка 48 років діагностовано хронічний бронхіт. Який препарат бактеріального походження доцільно призначити даному пацієнтові з метою стимуляції імунітету та активації процесів регенерації?

911. Хвора скаржиться на біль у гомілці, яка підсилюється при ходьбі. Об'єктивно відмічається набряк та почервоніння по ходу вени, тому лікар призначив антикоагулянт прямої дії для місцевого приймання. Який препарат можна використати з цією метою?

912. Хворий 37 років, що страждає облітеруючим ендартеріїтом, отримує фенілін у добовій дозі 60 мг/кг. У зв'язку з проявами судомного синдрому призначили фенобарбітал, після відміни якого у хворого виникла носова кровотеча. Дане ускладнення пов'язане із:

913. Хворому на інфаркт міокарду, для розчинення внутрішньосудинних тромбів, призначили фібринолітичний засіб, який містить фермент стрептокіназу, виготовлений із гемолітичного стрептокока. Виберіть цей засіб.

914. Хворий 70 років протягом декількох років перебував на диспансерному обліку з приводу цирозу печінки. В результаті незначної травми руки виникла кровотеча. Аналіз крові показав збільшення фібринолітичної активності. Вкажіть, який препарат найбільш показаний в даній ситуації.

915. Хворий госпіталізований у травматологічне відділення з переломом гомілки, пошкодженням м'яких тканин і значною кровотечею. Об'єктивно: блідість шкірних покривів, виражена болючість при пальпації у ділянці травми, набряклість гомілки, кровоточивість по всій поверхні рани. Який препарат показаний для місцевого застосування в даному випадку?

916. Хворий гострим інфарктом міокарду у складі комплексної терапії отримувал препарат антикоагулянт. Через деякий час з'явилася гематурія. Для усунення цього ускладнення призначили протаміну сульфат. Який антикоагулянт отримувал хворий?

917. Хворий з тромбозом глибоких вен гомілки в комплексній терапії отримує фенілін. За яким показником слід контролювати дозу препарату?

918. Хворий на гострий інфаркт міокарда в складі комплексної терапії отримувал гепарин. Через деякий час з'явилася гематурія. Який засіб (антидот) можна використовувати?

919. Чоловіку 60 років, який довгий час хворіє на стенокардію, разом з коронаролітиками лікар призначив ацетилсаліцилову кислоту для зменшення агрегації тромбоцитів. Який механізм антиагрегантної дії ацетилсаліцилової кислоти?

920. Хворий поступив в травматологічне відділення з переломом гомілки, пошкодженнями м'яких тканин і рясною кровотечею. Об'єктивно: блідість шкірних покривів, виражена болючість при пальпації в області травми, набряклість гомілки, кровоточивість по всій раневій поверхні. Вкажіть препарат для місцевого застосування з метою зупинки кровотечі в рані.

921. Хворий тривалий час безконтрольно приймал левоміцетин. Після проведеного обстеження у нього виявлено лейкопенію. Який препарат призначити для корекції лейкопоезу?

922. Хворій з приводу мегалобластичної анемії, яка виникла після гастректомії, отримав тривалий курс лікування вітаміном B12. Препарат вводили внутрішньом'язово. В чому перевага парентерального шляху введення вітаміну B12?

923. Хворого з анемією лікують препаратами заліза. Чим потрібно посилити всмоктування препаратів заліза?

924. Хворому 60 років, який довгий час хворіє на стенокардію разом з коронаролітиками лікар призначив ацетилсаліцилову кислоту для зменшення агрегації тромбоцитів. Який механізм антиагрегантної дії ацетилсаліцилової кислоти?

925. Хворому з інфарктом міокарда ввели гепарин. З якою метою було призначено цей препарат?

926. Хворому з тромбоемболією вен нижніх кінцівок призначено медикаментозне лікування. Через 2 доби на шкірі з'явилися геморагії. Який препарат із нижченаведених викликає подібне ускладнення?

927. Хворому з тромбофлебітом призначена комплексна терапія, що впливає на різні етапи тромбоутворення. Який з названих засобів сприяє відновленню прохідності судини?

928. Хворому із діагнозом стенокардія, який отримує для лікування ізосорбідну мононітрат було додатково призначено лікарський засіб з дезагрегантним ефектом. Визначте препарат

929. Хворому із перенесеним гострим інфарктом міокарду лікар рекомендував протягом 3-4 місяців приймати ацетилсаліцилову кислоту по 0,25 г 1 раз в 2-3 дні. На яку дію аспіріну розраховував лікар?

930. Хворому із тромбозом коронарних судин необхідне введення речовини, яка відновлює їх прохідність. Який із запропонованих засобів має такі властивості?

931. Хворому на гіпертонічну хворобу лікар запропонував засіб, який припиняє тромбоутворення, вводиться парентерально і має низькомолекулярну масу. Виберіть цей засіб.

932. Хворому на гострий інфаркт міокарда у комплексній терапії було призначено гепарин. Через деякий час після введення даного препарату з'явилась гематурія. Який антагоніст гепарину необхідно ввести хворому для усунення даного ускладнення?

933. Хворому на тромбофлебіт призначено комплексну терапію, яка діє на різні етапи тромбоутворення. Який з перелічених засобів сприяє відновленню прохідності судини?

934. Хворому після гострого інфаркту міокарду лікар порекомендував протягом 3-4 місяців приймати ацетилсаліцилову кислоту. На яку дію ацетилсаліцилової кислоти розраховував лікар?

935. Хворому, що знаходиться на стаціонарному лікуванні з приводу ревматичного артрити призначений нестероїдний протизапальний препарат бутадіон. Через 2 тижні стан хворого покращав, зменшилася припухлість і хворобливість суглобів. Проте в аналізі крові - виражена лейкопенія. З вказаних препаратів виберіть найбільш переважний для боротьби з лейкопенією.

936. Хворому, який переніс інфаркт міокарда, призначена ацетилсаліцилова кислота по 75 мг щоденно. З якою метою призначено препарат?

937. Хворому, який страждає тромбоемболічною хворобою, призначили синтетичний антикоагулянт пелентан. Антагоністом якого вітаміну є цей препарат?

938. Чоловік, що страждає на хронічний бронхіт звернувся до лікаря, який довів, що у хворого вторинний імунodefіцит. Який препарат із метою стимуляції імунітету було призначено?

939. В пробірці міститься свіжозібрана кров. Яка з речовин не змінить швидкість згортання крові в таких умовах?

940. Визначте засіб. Використовується для розчинення свіжих тромбів. Може викликати кровотечі в зв'язку з системним фібринолізом, часто спричиняє алергічні реакції.

941. Для лікування тромбоемболії призначено гепарин. Вказати механізм протизгортальної дії антикоагулянтів прямої дії?

942. Для лікування хворого з агранулоцитозом лікар вирішив призначити препарат, який стимулює проліферацію та диференціацію гранулоцитів і моноцитів. Який це препарат?

943. Для профілактики тромбоемболії призначено неодикумарин. Вказати механізм протизгортальної дії антикоагулянтів непрямої дії?

944. Донору, який постійно здає кров, для профілактики залізодефіцитної анемії призначено заліза закисного сульфат. Який механізм дії препарату?

945. Пацієнтові після перенесеного інфаркту міокарда було призначено для тривалого лікування аспірин. На яку дію розраховує лікар?

946. Пацієнту з гострим тромбофлебітом глибоких вен правої ноги ввели 10000 ОД гепарину. Через який час потрібно вводити наступну дозу?

947. Після гастректомії з приводу раку у пацієнта розвинулась гіперхромна анемія. Цому було призначено лікування вітаміном В12 у вигляді внутрішньом'язових ін'єкцій. Чому у даному випадку застосування вітаміну всередину не призведе до стимуляції кровотворення?

948. Після двох тижнів прийому неодикумарину при черговому обстеженні в крові виявлено зниження протромбіну, в сечі спостерігається мікрогематурія. Призначте лікування

949. При гіперхромній (мегалобластичній) анемії хворому призначили вітамінний препарат, що нормалізує утворення еритроцитів (еритропоез). Вкажіть препарат.

950. У пацієнта гостра фаза інфаркту міокарду. Який препарат доцільно використати для відновлення кровообігу у перші години розвитку захворювання?

951. У пацієнта на тлі масивної глистяної інвазії розвинулась анемія. Який препарат доцільно призначити у такому випадку?

952. У пацієнта на тлі прийому бутадіону розвинулась гранулоцитопенія. Призначте лікування

953. У породіллі після відділення плаценти почалася масивна фібринолітична кровотеча. Який препарат необхідно ввести?

954. У хворого анемія. Який препарат необхідно призначити для підвищення рівня гемоглобіну?

955. У хворого виникли ознаки передозування прямих антикоагулянтів : підвищена кровоточивість, геморагії, петехії. Який препарат є антагоністом гепарину?

956. У хворого з хронічною гемороїдальною кровотечею виявлено зниження кольорового показника крові до 0,9, вміст гемоглобіну - 75 г/л. Виберіть препарат для нормалізації показників крові.

957. У хворого після лікування протипухлинними засобами різко знизилася кількість лейкоцитів у крові. Який препарат призначили хворому для стимуляції лейкопоезу?

958. У хворі післяопераційна кровотеча. Назвати препарат, який є інгібітором фібринолізу.

959. Вкажіть гормональний засіб, який підвищує рівень кальцію в крові

960. Хвора скаржиться на біль у гомілці, який підсилюється при ходьбі.

Об'єктивно - набряк та почервоніння по ходу вени, лікар призначив антикоагулянт у вигляді мазі. Який це препарат?

961. Хворий з гострим інфарктом міокарда в складі комбінованої терапії одержував препарат, що знижує згортання крові. Назвіть препарат.

962. Хворого з анемією лікують препаратами заліза. Який засіб доцільно призначити для підсилення всмоктування заліза?

963. Хворому з фібринолітичною кровотечею було введено внутрішньовенно струминно препарат. Як побічний ефект розвинулись артеріальна гіпотензія, брадикардія, екстрасистолія. Який лікарський засіб міг викликати вищезазначене?

964. Хворому з геморагічним синдромом на тлі вірусного гепатиту В в комплексну терапію доцільно включити

965. Хворому з інфарктом міокарда ввели гепарин. З якою метою було призначено цей препарат?

966. Хворому з тромбоемболією вен нижніх кінцівок призначено медикаментозне лікування. Через 2 доби на шкірі з'явились геморагії. Який препарат із нижчезгаданих викликає міг спричинити подібне ускладнення?

967. Хворому на хронічну пневмонію в складі комплексної терапії призначили препарат бактеріального походження, який стимулює імунітет та підсилює процеси регенерації. Визначте препарат.

968. Хворому перед операцією потрібно призначити препарат, що підвищує згортання крові. Який засіб призначено хворому?

969. Хворому, що страждає на тромбоемболічну хворобу, призначено синтетичний антикоагулянт пелентан. Антагоністом якого вітаміну є ця сполука?

970. Хворому, який страждає на анемію, призначили препарат в ампулах для введення в вену. До складу цього засобу входить залізо і кобальт. Визначте препарат

971. Чоловік тривало приймав неодикумарин після операції на серці. Для покращення сну лікар призначив снотворний засіб, без корекції дози антикоагулянта. Під час прийому препарату розвинувся тромбоз. Який засіб міг спричинити дане ускладнення?

972. Чоловікові з діагнозом мегалобластична анемії призначено ін'єкції вітаміну В12. Чому?

973. Як ускладнення тривалої терапії сульфаніламидами у хворого розвинулась лейкопенія? Призначте лікування

974. До ендокринолога звернулась хвора 45 років із скаргами на підвищення апетиту, сухість слизових оболонок ротової порожнини, зростання діурезу. При обстеженні вперше виявлено інсуліннезалежний діабет. Який з названих препаратів доцільно призначити хворій?

975. Коли міометрій найбільш чутливий до окситоцину?

976. Чому пацієнту, який тривалий час отримував преднізолон з приводу ревматоїдного поліартриту, необхідно сторонитися контакту з інфекційними хворими?

977. Як впливає кальцитонін на обмін кальцію?

978. Як впливає паратиреоїдин на обмін кальцію і фосфору?

979. Як впливають глюкокортикоїди на склад периферичної крові?

- 980. Який механізм впливу бромокриптину на дофамінергічні процеси в центральній нервовій системі?**
- 981. Який механізм гіпоглікемічної дії акарбози?**
- 982. Який механізм гіпоглікемічної дії інсуліну?**
- 983. Який препарат застосовують для лікування цукрового діабету?**
- 984. Які види дії глюкокортикоїдів знаходять застосування в медичній практиці?**
- 985. Які ефекти характерні для мінералокортикоїдів?**
- 986. Які зміни обміну викликає тироксин?**
- 987. Андрогени можуть сприяти розвитку**
- 988. Бігуаніди у хворих на цукровий діабет**
- 989. Види діабетичних ком 1. гіперглікемічна, 2. гіпоглікемічна, 3. гіперосмолярна, 4. тиреотоксична**
- 990. Вкажіть абсолютні протипокази до застосування глюкокортикостероїдів**
- 991. Вкажіть гормональний засіб, який знижує рівень кальцію в крові**
- 992. Вкажіть гормональний засіб, який знижує рівень фосфатів в крові, одночасно підвищуючи рівень кальцію**
- 993. Вкажіть гормональний засіб, який коригує водно-електролітний баланс організму**
- 994. Який вітамін зміцнює епідерміс?**

995. Вкажіть гормональний засіб, який сприяє укріпленню кісткової тканини, сприяючи затримці кальцію
996. Вкажіть гормональний препарат із протизапальною активністю
997. Вкажіть ефекти кортикостероїдів (усі відповіді правильні, крім однієї, вкажіть її)
998. Вкажіть препарат для прийому всередину особам з цукровим діабетом
999. Вкажіть простагландин для стимуляції пологової діяльності
1000. Всі твердження, що стосуються ефектів інсуліну, правильні, за винятком
1001. Глюкобай (акарбоза) сповільнює засвоєння вуглеводів і таким чином знижує засвоєння глюкози шляхом
1002. Гормональний засіб з андрогенними властивостями
1003. Гормональний засіб стероїдної структури з протишоковою дією
1004. Гормональний засіб, який пригнічує реакції відторгнення трансплантата, не впливаючи на вироблення антитіл, пригнічує фагоцитоз
1005. Препарати інсуліну короткої дії (прості інсуліни) діють протягом
1006. Гормональні засоби, які регулюють обмін кальцію і фосфатів в організмі, забезпечують сталий вміст кальцію в плазмі крові та інтерстиціальній рідині: 1. паратгормон, 2. кальцитонін, 3. холекальциферол, 4. альдостерон
1007. Гормони стероїдної будови: 1. дезоксикортикостерону ацетат, 2. прогестерон, 3. інсулін, 4. 1,25-діоксихолекальциферол
1008. Депо - проvera спричиняє

- 1009. Для преднізолону характерні всі побічні ефекти, окрім:**
- 1010. Для виведення пацієнта з гіпоглікемічної коми препаратом вибору є**
- 1011. Для виведення хворого з гіперглікемічної коми ви можете використати**
- 1012. Для зменшення всмоктування вуглеводів у кишечнику пацієнтові, хворому на цукровий діабет призначили**
- 1013. Для корекції мікседеми застосовують**
- 1014. Для корекції синдрому відміни, після різкого припинення лікування дексаметазоном необхідно призначати**
- 1015. Для лікування проявів клімактеричного синдрому доцільно призначати**
- 1016. Для лікування хвороби Адісона (бронзової хвороби) використовують**
- 1017. Для лікування цукрового діабету використовують**
- 1018. Для лікування цукрового діабету II типу (інсулінонезалежного) застосовують**
- 1019. Для покращення заживлення перелому стегнової кістки та стимуляції утворення кісткової мозолі 75-річному чоловікові можна призначити**
- 1020. Для прискорення видужання, нормалізації білкового обміну, набирання ваги після виснажливого інфекційного захворювання жінці призначили із гормональних засобів**
- 1021. До гормонів - похідних амінокислот - відносять: 1. адреналін, 2. трийодтиронін, 3. АКТГ, 4. тестостерон**

1022. До гормонів білкової структури належать: 1. кальцитонін, 2. естроген, 3. тироксин, 4. інсулін
1023. Жінці з цукровим діабетом для корекції гіперглікемії призначили бутамід, пояснивши, що засіб
1024. Жінці, в якої у анамнезі два самовільних викиднів під час вагітності треба призначити
1025. Зазначити механізм гіпоглікемічного ефекту акарбози
1026. Зазначити засіб, який використовують при слабкості пологової діяльності
1027. Зазначте гормональний засіб, який використовують при слабкості пологової діяльності
1028. Зазначте особливості дії бігуанідів у хворих на цукровий діабет
1029. Зазначте, які зміни обміну речовин викликає тироксин.
1030. Засіб, який необоротно руйнує тканини щитовидної залози
1031. Застосування дексаметазону (усі відповіді правильні, крім однієї, вкажіть її)
1032. Кальцитонін - це
1033. Механізм дії мерказолілу?
1034. Найчастіше розвиваються такі побічні ефекти від лікування глюкокортикоїдами (усі відповіді правильні, крім однієї, вкажіть її)

1035. Після проведення мастектомії жінці зі злоякісною пухлиною необхідно призначити засіб нестероїдної структури, який усуває стимулюючий вплив естрогенів на пухлинний ріст?
1036. Побічна дія не характерна для препаратів соматотропного гормону
1037. Побічні дії при застосуванні тестостерону 1. набряки, затримка рідини, 2. розвиток гіперплазії простати, 3. апное уві сні, 4. гіпотензія
1038. Побічні ефекти глюкокортикостероїдів з боку ендокринної системи (усі відповіді правильні окрім однієї, вкажіть її)
1039. Побічні ефекти характерні для мерказолілу 1.пригнічення кровотворення, 2.лімфаденопатія, 3. пригнічення розвитку плода, 4. гіпоглікемія
1040. Покази до застосування вазопресину 1. нецукровий діабет, 2. кровотеча з розширених вен стравоходу у хворих на цироз печінки, 3. гостра артеріальна гіпотензія, коли неефективний адреналін, 4. цукровий діабет
1041. Покази до застосування глюкокортикоїдів (усі відповіді правильні крім однієї)
1042. Покази до застосування глюкокортикоїдів 1. Гіпертонічна хвороба, 2. Алергічні захворювання, 3. Шок, 4. Зоб
1043. Покази до застосування кальцитоніну 1. остеопороз, 2. мікседема, 3. психози, 4. деформуюча остеодистрофія (хвороба Педжета)
1044. При контрацепції пероральними засобами можливі побічні дії 1. порушення місячних, 2. порушення функції печінки, 3. тромбоемболічні розлади, 4. гіпотонія, колапс
1045. При цукровому діабеті використовують(усі відповіді неправильні, крім однієї)

1046. Протипокази до застосування інсуліну тривалої дії (усі відповіді правильні крім однієї)

1047. Речовини, що можуть призвести до зміни рівня глюкози у крові: 1. кортикостероїди, 2. адреналін, 3. оральні контрацептиви, 4. інсулін

1048. Речовини, які отримують із залоз внутрішньої секреції, або їх синтетичні замінники, що специфічно впливають на обмін речовин і регулюють різноманітні функції організму - це

1049. Розвиток синдрому Іценко - Кушинга пов'язаний з прийомом наступних засобів (усі відповіді вірні, окрім однієї):

1050. Синтетичний глюкокортикоїд тривалої дії, який виявляє протизапальну, протиалергійну, протиексудативну і протисвербіжну дію

1051. Чому глюкокортикостероїди хворим на цукровий діабет призначають у виключних випадках?

1052. Чому не радять призначати пацієнтам, які приймають пероральні гіпоглікемічні засоби (бутамід) призначати однозначно нестероїдні протизапальні типу бутадіону?

1053. Як варто призначати глюкокортикоїди для максимального ефекту при хронічному застосуванні

1054. Як до підвищення, так і до зниження властивості інсуліну зменшувати рівень глюкози у крові можуть бути причетні 1. Бета-блокатори, 2. Солі літію, 3. Спирт етиловий, 4. Парацетамол

1055. Як необхідно вводити окситоцин для зупинки післяпологової атонічної маткової кровотечі?

1056. Як необхідно вводити окситоцин для стимуляції пологової діяльності при її слабкості?

1057. Який засіб може знижувати імунітет?

1058. 45-річний хворий скаржиться на постійну спрагу, виражену поліурією. Рівень глюкози в плазмі крові 5 ммоль/л, в сечі вона відсутня. Діагноз - нецукровий діабет. Що необхідно застосувати для його лікування?

1059. Багато видів патології (запалення, набряк легенів, шок різного походження) супроводжуються підвищенням проникності судин. Який із перелічених засобів можна використати для протидії цьому при будь-якому із названих видів патології?

1060. В акушерське відділення поступила вагітна жінка із загрозою переривання вагітності. Який гормональний препарат доцільно застосувати в цьому випадку?

1061. В аптеку надійшли препарати інсуліну. Який із перерахованих є засобом тривалої (20-30 год.) дії ?

1062. В пологове відділення поступила вагітна жінка зі слабкою пологовою діяльністю. Призначте засіб гормональної природи для посилення пологової діяльності?

1063. Глюкокортикоїдний препарат "Триамцінолон " володіє мінімальною мінералокортикоїдною активністю. Дана властивість робить його препаратом вибору:

1064. Дайте відповідь провізору-інтерну: який з препаратів відноситься до препаратів задньої долі гіпофізу ?

1065. Допоможіть лікарю вибрати препарат для замісної терапії після видалення щитовидної залози.

1066. Відмітьте покази до застосування ергокальциферолу

1067. Жінка 38 років звернулась до онкологічного центру в зв'язку із злоякісною пухлиною грудної залози. Після оперативного втручання їй провели хіміотерапевтичне лікування. Який із зазначених засобів є більш ефективним?

1068. Жінка 38 років звернулась до онкологічного центру в зв'язку із злоякісною пухлиною грудної залози. Після оперативного втручання їй провели хіміотерапевтичне лікування. Який із зазначених засобів є більш доцільним при такому виду

1069. Запалення, набряк легень, шок різного генезу супроводжуються підвищенням проникності судин. Яку речовину можна використовувати для протидії цьому при будь-якому із названих видів патології?

1070. Пацієнту, що хворіє на цукровий діабет та алергічний дерматит лікар призначив фторований гормональний препарат в мазі. На питання хворого, про переваги призначеного препарату над маззю гідрокортизону лікар пояснив, що:

1071. Під час експерименту тварині вводили речовину, що пригнічує транскрипцію генів. Специфічна дія якого гормону збережеться за цих умов?

1072. Після операції з приводу вузлового зобу у хворого наступного ранку почалися конвульсії які пов'язані з гіпокальціємією. Який з гормональних препаратів треба ввести хворому в першу

1073. Після прийому інсуліну подовженої дії у хворого виникла гіпоглікемічна кома. Введено препарат, що являє собою гормон п/ш залози і антагоністом інсуліну. Вкажіть цей препарат.

1074. Після тиреоїдектомії у хворого розвинувся судомний стан (тетанія). За допомогою якого препарату можна його усунути?

1075. Після тривалого приймання одного з лікарських препаратів у хворого розвинулась підвищена чутливість до простудних захворювань. Який із названих нижче лікарських засобів міг сприяти зниженню імунітету?

1076. Породіллі 32 років зі слабкістю пологової діяльності лікар призначив пітуїтрин. При наявності яких супутніх захворювань введення цього препарату буде протипоказано?

1077. Породіллі із слабкістю пологової діяльності було введено препарат пітуїтрин. Назвіть гормони, що входять до його складу.

1078. При гіперфункції щитовидної залози хворому призначили антитиреоїдний препарат, що порушує синтез тироксину і трийодтироніну безпосередньо в щитовидній залозі. Який препарат призначено?

1079. При обстеженні у хворої жінки виявлено підвищена активність тиреоїдних гормонів. Який з препаратів необхідно призначити ?

1080. При обстеженні у хворої жінки виявлено підвищену активність тиреоїдних гормонів. Який з препаратів необхідно призначити?

1081. При обстеженні хворого 70 років виявлено інсуліннезалежний цукровий діабет. Який препарат доцільно призначити хворому?

1082. При обстеженні хворого 70 років виявлено інсулінонезалежний цукровий діабет. Який препарат доцільно призначити хворому?

1083. При тривалому використанні препарату у хворого виникли остеопороз, ерозії слизової шлунка, гіпокаліємія, затримка натрію і води, зменшення вмісту кортикотропіну у крові. Який препарат було застосовано?

1084. Приймання оральних контрацептивів, які містять статеві гормони, пригнічує секрецію гормонів гіпофіза. Секреція якого з наведених гормонів пригнічується при прийманні оральних контрацептивів, які містять статеві гормони?

1085. Приймання оральних контрацептивів, які містять статеві гормони, пригнічує секрецію гормонів гіпофіза. Секреція якого з наведених гормонів пригнічується при прийманні оральних контрацептивів, які містять статеві гормони?

1086. Ранком хворий на ЦД отримав дозу інсуліну, пропустив прийом їжі і відчув слабкість, головний біль, головокружіння, пітливість, тремтіння тіла, судоми, відчуття голоду, явища гіпоглікемії. Прийом глюкози стану не облегчило. Що потрібно ввести хворому

1087. Ретаболіл та його аналоги збільшують масу скелетних м'язів, що дозволяє використовувати їх для лікування дистрофій. Взаємодією з яким клітинним субстратом зумовлена ця дія?

1088. Тварині в експерименті вводили речовину, яка пригнічує транскрипцію генів. Специфічна дія якого гормону найбільше збережеться в цих умовах?

1089. Відмітьте фармакологічні властивості кислоти аскорбінової

1090. Тестостерон і його аналоги збільшують масу скелетних м'язів, що дозволяє використовувати їх для лікування дистрофій. Взаємодія з яким клітинним субстратом обумовлює цю дію?

1091. У хворого діагностовано діабетичну кому. Концентрація цукру в крові становить 18,44 ммоль/л. Який з цукрознижувальних препаратів необхідно призначити хворому?

1092. У жінки 46 років діагностовано рак молочної залози. Який гормональний препарат слід призначити хворій?

1093. У жінки спостерігається звичний викидень. Який гормонопрепарат можна призначити для збереження вагітності?

1094. У пологове відділення доставлена вагітна жінка зі слабкою пологовою діяльністю. Призначте гормональний засіб для посилення пологової діяльності?

1095. У хворого в'ялість, апатія затруднене дихання. В анамнезі - цукровий діабет. Об'єктивно: свідомість спутана, шкіра і слизові бліді, сухі, запах ацетона з рота. Поставлено діагноз: гіперглікемічна кома. Який препарат необхідно ввести в данній ситуації?

1096. У хворого діагностовано діабетичну кому. Концентрація цукру в крові становить 18,44 ммоль/л. Який з цукрознижуючих препаратів необхідно призначити даному хворому?

1097. У хворого на ЦД після ін'єкції інсуліну виникло зниження артеріального тиску, холодний піт, втрата свідомості. Вказати препарат, показаний для усунення цього явища.

1098. У хворого на цукровий діабет після чергової ін'єкції інсуліну стан погіршився: з'явилися неспокій, холодний піт, тремор кінцівок, загальна слабкість, запаморочення. За допомогою якого препарату знімаються ці симптоми?

1099. У хворого непритомний стан, відчутний запах ацетону з рота. Діагноз: діабетична кома. Який засіб здатний зняти коматозний стан?

1100. У хворого після видалення щитовидної залози виникли напади судом. Який препарат треба призначити в даному випадку?

1101. У хворого після видалення щитовидної залози виникли напади судом. Препарат якого гормону треба призначити в даному випадку?

1102. У хворого після операції на щитовидній залозі почалися судоми тетанічного характеру. Який з перерахованих препаратів необхідно призначити папдєнту?

1103. У хворого скарги на в'ялість, апатію, утруднене дихання. Об'єктивно: свідомість спутана, шкіра і слизові бліді, сухі, риси обличчя загострені, очі запавші. АТ 100/60 мм рт. ст., пульс слабкий, частий запах ацетона з рота, явища гіперглікемічної коми. Що необхідно ввести для купування даного стану?

1104. У хворого цукровим діабетом після ін'єкції інсуліну знизився артеріальний тиск, виступив холодний піт, хворий втратив свідомість. Який препарат необхідно призначити для усунення цього явища?

1105. У хворого цукровим діабетом, ускладненим гіперглікемічною комою необхідно усунути кетоацидоз. Розчин якого препарату, що є внутрішньоклітинним буфером, слід застосувати?

1106. У хворого, що тривалий час приймав глюкокортикоїди, в результаті відміни препарату виникло загострення наявного захворювання, зниження артеріального тиску, слабкість. Чим можна пояснити ці явища?

1107. У хворого, який тривалий час приймав глюкокортикоїди, у результаті відміни препарату виникло загострення захворювання, знизився артеріальний тиск. Чим зумовлені ці явища?

1108. У хворої 52 років невдовзі після операції видалення щитовидної залози з'явилися оніміння кінцівок, парестезії, лабораторно діагностовано гіпокальціємію. Який гормональний препарат слід призначити?

1109. У хворої 52 років невдовзі після операції видалення щитовидної залози з'явилися оніміння кінцівок, парестезії, лабораторно діагностовано гіпокальціємію. Який препарат слід призначити?

1110. У хворої на 3-й день після тотальної тиреоїдектомії виникли судоми. Які лікарські засоби слід призначити?

1111. Хвора 60 років перенесла мастектомію. Після курсу променевої терапії лікар призначив синтетичний препарат нестероїдної структури, що усуває стимулювальний вплив естрогенів на пухлинний ріст. Який препарат був призначений?

1112. Вітамін із вираженими антиоксидантними властивостями ї

1113. Хвора Е., 63 роки., діагноз: інсуліннезалежний цукровий діабет. Ендокринолог почав лікування з призначення бутаміду. Укажіть механізм дії цього засобу.

1114. Хвора на бронхіальну астму приймала протягом 2 місяців преднізолон у таблетках. Внаслідок значного покращання стану раптово припинила його приймання. Розвиток якого ускладнення найбільш імовірний у цьому випадку?

1115. Хвора на бронхіальну астму приймала протягом 2-х місяців преднізолон у таблетках (по 1 табл. 3 рази на день). Внаслідок значного покращання стану раптово припинила його прийом. Розвиток якого ускладнення високо ймовірний у цьому

1116. ? Хвора на цукровий діабет ввела собі 30 ОД інсуліну, після чого у неї виникла слабкість. Хвора зайшла в аптеку і звернулась за допомогою. В аптеці втратила свідомість, виникли судоми. Яку медикаментозну допомогу слід надати хворій?

1117. Хворий цукровим діабетом ранком натщесерце отримав призначену дозу інсуліну пролонгованої дії. Пропустив чергове приймання їжі і невдовзі відчув ознаки гіпоглікемії. Застосування глюкози не покращило стан. Який препарат необхідно ввести для купірування даного стану?

1118. Хворий з діагнозом цукровий діабет скаржиться на в`ялість, апатію, утруднене дихання. Об`єктивно: свідомість сплутана, шкірні покриви і слизові оболонки бліді, сухі, риси обличчя загострені, очі запали. АТ 100/60 мм рт. ст., пульс слабкий і частий, запах ацетону з рота. Діагноз -гіперглікемічна кома. Який препарат необхідно ввести для купірування даного стану?

1119. Хворий поступив у клініку зі скаргами на в`ялість, апатію, утруднення дихання. У анамнезі у хворого цукровий діабет. Об`єктивно: свідомість сплутана, шкірні покриви і слизові оболонки бліді, сухі, запах ацетону з рота. Поставлений діагноз гіперглікемічна кома. Який препарат необхідно ввести у даній ситуації?

1120. Хворий 45 років скаржиться на постійну спрагу, виражену поліурію. Рівень глюкози в плазмі крові 5 ммоль/л, у сечі вона відсутня. Діагноз - нецукровий діабет. Який із названих засобів слід призначити для його лікування?

1121. Хворий 60 років протягом 9 років хворіє на цукровий діабет, отримує для корекції гіперглікемії інсулін - семіленте. 10 днів тому почав лікування гіпертонічної хвороби анаприліном. Через годину після прийому гіпотензивного препарату розвинулась гіпоглікемічна кома. Який механізм виникнення гіпоглікемії за умови призначення анаприліна?

1122. Хворий 60 років протягом 9 років хворіє на цукровий діабет, отримує для корекції гіперглікемії інсулін - семіленте. 10 днів тому почав лікування гіпертонічної хвороби. Через годину після прийому гіпотензивного препарату (бета-адреноблокатору), хворий відчув слабкість, запаморочення, знизився артеріальний тиск і через кілька хвилин хворий знепритомнів. Виберіть необхідний засіб терапії даного патологічного стану.

1123. Хворий був доставлений до лікарні в коматозному стані. В анамнезі цукровий діабет. При огляді: дихання Кусмауля, зниження АТ, у видихуваному повітрі запах ацетону. Який препарат потрібно ввести хворому?

1124. Хворий був доставлений до лікарні в коматозному стані. В анамнезі цукровий діабет. При огляді: дихання Кусмауля, зниження АТ, у видихуваному повітрі запах ацетону. Після проведеної невідкладної терапії стан покращився. Який препарат було введено хворому?

1125. Хворий з нейродермітом протягом тривалого часу використовував дексаметазон. При обстеженні в нього виявили підвищення рівня цукру в крові. Вплив глюкокортикостероїдів на яку ланку обміну вуглеводів призводить до виникнення гіперглікемії?

1126. Хворий з ревматоїдним артритом протягом декількох тижнів приймав препарати глюкокортикостероїдів, потім раптово припинив їх приймання. Яке ускладнення може виникнути в цьому випадку?

1127. Хворий колагенозом протягом тривалого часу приймав преднізолон у дозі 30 мг на добу. Останнім часом у нього з`явилися хворобливі спазми скелетних м`язів кінцівок. Що можна використати для їх послаблення?

1128. Хворий на інсулінозалежний цукровий діабет приймає інсулін тривалої дії (20-30 годин). Назвіть засіб, який має таку тривалу дію?

1129. Вітамінний засіб, який бере участь у кальцієво - фосфорному метаболізмі

1130. Хворий на цукровий діабет вчасно не отримав ін`єкцію інсуліну, що призвело до розвитку гіперглікемічної коми (вміст глюкози в крові - 50 ммоль/л). Який механізм є головним у розвитку цієї коми?

1131. Хворий самовільно припинив приймати глюкокортикоїди, що призвело до виникнення синдрому відміни. Це можна пояснити:

1132. Хворий тривалий час приймав глюкокортикоїди. Після різкої відміни препарату він почав скаржитися на міалгію, підвищену втомлюваність, емоційну нестабільність, головний біль, безсоння, втрату апетиту, нудоту. У хворого розвинувся синдром відміни глюкокортикоїдів. Які препарати необхідно призначити для корекції даного стану?

1133. Хворий тривало приймав глюкокортикоїди. Після різкої відміни препарату скаржиться на міалгію, підвищену стомлюваність, емоційну нестабільність, головний біль, безсоння, втрату апетиту, нудоту. Розвинувся синдром відміни глюкокортикоїдів. Призначення яких препаратів показане для корекції даного синдрому?

1134. Хворій 65-ти років, що страждає на інсуліннезалежний цукровий діабет призначили всередину манініл. Вкажіть механізм гіпоглікемічної дії цього препарату.

1135. Методи профілактики гастропатій спровокованих НПЗП: все, крім

1136. Хворому 56 років із скаргами на спрагу та часте сечовипускання було поставлено діагноз цукрового діабету та призначено бутамід. Який механізм дії цього препарату?

1137. Хворому 56 років із скаргами на спрагу, часте сечовиділення після обстеження у ендокринолога було встановлено діагноз цукровий діабет та призначено глібенкламід. Назвіть механізм дії цього препарату?

1138. Хворому 56 років із скаргами на спрагу, часте сечовиділення, після обстеження у ендокринолога було встановлено діагноз цукровий діабет та призначено бутамід. Вкажіть механізм дії цього препарату?

1139. Хворому А. з гострою недостатністю надниркових залоз був призначений лікарський препарат, після якого у хворого з'явилися скарги на біль в кістках (двічі були переломи), часті простудні хвороби, набряки, повільне загоювання ран. Який препарат міг спричинити такі явища?

- 1140. Хворому з діагнозом базедова хвороба лікар призначив препарат, механізм дії якого пов'язаний із пригніченням синтезу тиреоїдних гормонів у щитовидній залозі. Який із перелічених препаратів призначив лікар?**
- 1141. Вкажіть препарат, механізм дії якого пов'язан з пригніченням синтезу тиреоїдних гормонів в щитовидній залозі.**
- 1142. Хворому з діагнозом цукровий діабет II типу ендокринолог призначив глібенкламід. Назвіть основний механізм дії цього засобу.**
- 1143. Хворому з діагнозом цукровий діабет II типу ендокринолог призначив бутамід. Вкажіть основний механізм дії цього засобу.**
- 1144. Хворому на ревматоїдний артрит призначено преднізолон. Який механізм його протизапальної дії?**
- 1145. Хворому на тиреотоксикоз для його лікування був призначений мерказоліл. Що лежить в основі антитиреоїдної активності препарату?**
- 1146. Хворому на тиреотоксикоз для лікування був призначений мерказоліл. Що покладено в основу антитиреоїдної активності препарату?**
- 1147. Хворому на тиреотоксикоз, було призначено препарат, який пригнічує ферментні системи, що приймають участь в синтезі гормонів щитовидної залози. Вкажіть цей препарат.**
- 1148. Хворому на цукровий діабет медсестра помилково ввела майже подвійну дозу інсуліну, що призвело до гіпоглікемічної коми. Який лікарський засіб необхідно ввести хворому для її усунення?**
- 1149. Помилкове введення подвійної дози інсуліну призвело до гіпоглікемічної коми. Який лікарський засіб необхідно ввести хворому для її усунення?**

1150. Хворому показано приймання глюкокортикоїдів всередину. Як доцільно їх призначати з урахуванням фізіологічних коливань вмісту гормонів кори надниркових залоз у крові?

1151. Хворому цукровим діабетом у стані гіпоглікемічної коми в результаті передозування інсуліну тривалої дії був введений препарат, що є гормоном підшлункової залози і антагоністом інсуліну. Назвіть цей препарат.

1152. Вкажіть антигістамінний засіб - похідне фенотіазіну з альфа - адреноблокуючою активністю

1153. Чоловік 52 років, що страждає на екзему, звернувся до дерматолога за консультацією з приводу застосування нового гормонального засобу із групи глюкокортикоїдів. Лікар звернув увагу на наявність фтору в молекулі цього препарату і вказав хворому приблизну різницю між новим засобом і преднізолоном. Чим відрізняється новий препарат?

1154. Чоловік 52 років, який страждає екземою, звернувся до дерматолога за консультацією з приводу нового гормонального препарату із групи глюкокортикоїдів. Лікар звернув увагу на наявність фтору у молекулі цього препарату і назвав хворому різницю між новим препаратом і преднізолоном. У чому полягає різниця?

1155. Юнак 16 років, що страждає на цукровий діабет з 10 років, почув про можливість замінити ін'єкції інсуліну таблетками глібенкламід. Проте лікар, до якого він звернувся, категорично йому відмовив. Чому глібенкламід не можна призначити у даному випадку?

1156. Юнак 16 років, що страждає на цукровий діабет з 10 років, почув про можливість замінити ін'єкції інсуліну таблетками глібенкламід. Проте лікар, до якого він звернувся, категорично йому відмовив. Чому глібенкламід не можна призначити у

1157. Гіполіпідемічний та гіпохолестеринемічний засіб із антиферментною дією

1158. Механізм дії інталу

1159. Юнак 16 років, який хворіє цукровим діабетом з 10 років, почув про можливість замінити ін`акції інсуліну таблетками бутаміду. Однак лікар, до якого він звернувся, категорично йому відмовив. Чому глібенкламід не можна призначати у даному випадку?

1160. В ендокринологічне відділення поступив хлопець зі скаргами на адинамію, погане загальне самопочуття. Звертає увагу бронзове забарвлення шкіри (взимку), АТ -90/60 мм рт. ст. На УЗД встановлений дефект структури правого наднирника. Який препарат замісної терапії потрібно ввести передусім?

1161. В клініку поступила хвора з діабетичною комою. Першочергове завдання

1162. Гормон, який впливає на ріст та диференціювання тканин, стимулює серцеву діяльність, підвищує споживання кисню та стимулює вироблення тепла практично усіма органами і системами. При недостатності розвивається мікседема, набряки, закрепи, зниження температури тіла, слабкість, анемія, стомлюваність

1163. Гормон, який стимулює ріст скелета, ріст і диференціацію органів, збільшення маси тіла, анаболічні процеси, насамперед біосинтез білків, стимулює синтез факторів росту. Використовується для лікування гіпофізарного нанізму

1164. Гормональний засіб для інтраназального введення, застосовують для лікування нецукрового діабету. Вкажіть препарат

1165. Гормональний засіб, який стимулює ліпогенез, регулює вуглеводний обмін. Стимулює біосинтез нуклеотидів, застосовують для нормізації рівня цукру крові

1166. Для уникнення системних ефектів глюкокортикоїдів при шкірних захворюваннях ви можете призначити мазь, яка має переважно місцевий вплив і практично не всмоктується. Це -

1167. Для цієї групи засобів є характерними наступні побічні ефекти: акне, алопеція, гірсутизм, свербіж, висипання, кропив'янка; порушення гормонального фону; порушення роботи печінки, жовтяниця. Використовуються у акушерсько - гінекологічній практиці

1168. Доставили хворого в непритомному стані, з рота - запах ацетону. Діагноз: діабетична кома. Перша фармакодопомога:

1169. Жінка для лікування ревматоїдного артриту приймає преднізолон 20 мг/добу, їдучи в гості на кілька тижнів, вирішила зробити перерву у лікуванні. Ймовірні наслідки

1170. Жінка звернулась до гінеколога зі скаргами на порушення менструального циклу, після збирання анамнезу лікар пояснив хворій, що це пов'язано з прийомом одного з препаратів. Якого саме?

1171. Одночасне призначення глюкокортикоїдів та цих засобів різко підвищує ризик розвитку ульцерогенної дії. Про які засоби йдеться?

1172. Ожиріння тулуба при надлишку цих гормонів розвивається без значного збільшення маси тіла, що особливо помітно на фоні атрофії м'язів кінцівок. Виникають такі ознаки, як «горб буйвола» та «місяцеподібне обличчя». Це -

1173. Вкажіть блокатори гістамінових H1 -рецепторів

1174. Пацієнт протягом місяця приймав глюкокортикостероїди, потім раптово припинив їх прийом. Яке ускладнення може виникнути в цьому випадку?

1175. Пацієнт скаржиться лікарю, що на фоні прийому преднізолону у нього постійно загострення хронічного тонзиліту. В результаті чого така ситуація?

1176. Пацієнтові амбулаторно проводилася терапія дексаметазоном з приводу ревматичного артриту. Явища артриту майже зникли і хворий самостійно припинив прийом прерарату. Проте через день настав рецидив, причому хвороба протікала інтенсивніше, ніж спочатку. Вкажіть причину цього ускладнення

1177. Пацієнтові, який приймає бутамід по 1 табл. 3 рази на добу було призначено бутадіон, через що розвинулось гостре ускладнення. Яке саме?

1178. Після видалення щитовидної залози у пацієнта розвинулись напади судом, які успішно були зняті препаратами кальцію. З чим пов'язане дане ускладнення?

1179. Після видалення щитовидної залози у хворого 46 років розвинулись напади судом. Який препарат треба призначити в даному випадку?

1180. Породіллі зі слабкістю пологової діяльності лікар призначив пітуїтрин. При наявності яких супутніх захворювань введення цього препарату буде протипоказано?

1181. Глюкокортикоїди проявляють протизапальний ефект шляхом пригнічення такого ферменту

1182. При гіперфункції щитовидної залози призначили антитиреоїдний препарат, що порушує синтез тироксину і трийодтироніну безпосередньо в щитовидній залозі. Який препарат був призначений?

1183. При тривалому застосуванні цієї групи препаратів розвивається багато ускладнень, в тому числі - гіпертонія, цукровий діабет, "горб буйвола" тощо. Які це препарати? (усі відповіді вірні, окрім однієї)

1184. У молодій жінки на тлі повного здоров'я розвинувся гострий тромбоз судин. Який із вживаних препаратів міг спричинити дане ускладнення?

1185. У хворого 62 років цукровий діабет 2 типу, ожиріння, атеросклероз, ішемічна хвороба серця виявлена базальна гіперінсулінемія. Оберіть адекватне лікування, вибравши препарат:

1186. У хворого на цукровий діабет після чергової ін'єкції інсуліну стан погіршився: появився неспокій, холодний піт, тремор кінцівок, загальна слабкість, запаморочення. За допомогою якого препарату знімаються ці симптоми?

1187. У хворого цукровим діабетом після ін'єкції інсуліну виникло зниження артеріального тиску, холодний піт, втрата свідомості. Міри допомоги

1188. Хворий цукровий діабет після прийому інсуліну пропустив чергову їду і незабаром відчув явища гіпоглікемії. Застосування глюкози стан не полегшило. Чим можна допомогти?

1189. Хворому з гострою недостатністю надниркових залоз було призначено препарат для замісної терапії. Назвіть препарат.

1190. Хворому призначили лікарський засіб, при застосуванні якого виникли такі побічні ефекти: „стероїдний діабет”, набряки, остеопороз, артеріальна гіпертензія. Який це лікарський засіб?

1191. Хворому цукровим діабетом в стані гіпоглікемічної коми, викликаній передозуванням препарату інсуліну тривалої дії, був введений препарат, що є антагоністом інсуліну. Вкажіть цей препарат.

1192. Юнак, що хворіє на цукровий діабет з 10 років, хоче замінити ін'єкції інсуліну таблетками глібенкламиду. Проте лікар, до якого він звернувся, категорично йому відмовив. Чому глібенкламід не показаний у даному випадку?

1193. Виберіть засіб із вираженою протизапальною дією, ефективний при подагрі

- 1194. Вкажіть необхідні заходи допомоги при гострому отруєнні саліцилатами:**
- 1195. При яких станах можна застосовувати інгібітори ЦОГ2?**
- 1196. Антиагрегантна дія простацикліну пов'язана з:**
- 1197. Антигістамінний засіб III покоління, який не впливає на ЦНС**
- 1198. Антигістамінний засіб без вираженої седативної дії**
- 1199. Антигістамінні засоби (блокатори H1 - рецепторів) застосовують при усіх вказаних станах, крім:**
- 1200. В якості базисної терапії ревматоїдного артриту використовують**
- 1201. Виберіть засіб для зупинки кровотечі**
- 1202. Високоселективний інгібітор ЦОГ - 2, це**
- 1203. Вкажіть один з найбільш активних протизапальних засобів з низькою токсичністю та значною широтою терапевтичної дії:**
- 1204. Вкажіть один з найбільш токсичних препаратів з групи НПЗЗ, який викликає побічні ефекти у значної кількості (до 50 %) пацієнтів:**
- 1205. Вкажіть показання до застосування кислоти нікотинової**
- 1206. Вкажіть препарати тимусу, які мають імуностимулюючий ефект.**
- 1207. Вкажіть системи, які найбільш чутливі до дефіциту вітаміну B12.**
- 1208. Вкажіть характерні для саліцилатів побічні ефекти:**
- 1209. Вкажіть характерні побічні ефекти для саліцилатів**

1210. Для бутадіону характерно наступне: 1. протизапальний засіб, 2. знеболюючий, 3. жарознижуючий, 4. антигістамінний препарат, 5. імунодепресант

1211. Для закриття функціонуючої артеріальної боталлової протоки у недоношених дітей педіатри використовують

1212. Для зменшення інтоксикаційного синдрому, для корекції вуглеводного обміну використовують

1213. Для корекції порушень електролітного балансу із плазмозаміників застосовують

1214. Для левамізолу характерно наступне: 1. протиглисний, 2. седативний, 3. гіпотензивний, 4. імуностимулюючий, 5. психостимулюючий

1215. Для лікування алергічних реакцій використовують такі препарати, крім

1216. Для лікування алергічних реакцій негайного типу застосовують наступні групи засобів:

1217. Для лікування алергічних реакцій сповільненого типу використовують усе, крім:

1218. Для лікування ахілії з метою замісної терапії використовують

1219. Для лікування гіперхромної анемії застосовують

1220. Для лікування ксерофтальмії, кератомалачії застосовують

1221. Для лікування рахіту застосовують

1222. Для лікування рахіту призначають

- 1223. Для лікування цинги застосовують**
- 1224. Для лікування пелагри препаратом вибору є**
- 1225. Для парацетамолу характерне все, крім:**
- 1226. Для парентерального білкового харчування потрібні**
- 1227. Для поповнення ОЦК при крововтраті доцільно використовувати**
- 1228. Для стероїдних протизапальних засобів характерні наступні фармакологічні ефекти:**
- 1229. Для стимуляції процесів регенерації тканин доцільно призначати:**
- 1230. Для супрастіну характерно все, крім**
- 1231. Для фармакокінетики ацетилсаліцилової кислоти характерне все вказане, крім:**
- 1232. Для якого препарату з групи антигістамінних засобів не характерний снодійний ефект?**
- 1233. До блокаторів H1 - гістаміноблокаторів належать усі засоби, крім**
- 1234. До засобів, які пригнічують імуногенез належить:**
- 1235. До засобів, які пригнічують переважно циклооксигеназу 2, належить**
- 1236. До засобів, які пригнічують переважно ЦОГ-2 належать 1. німесулід, 2. диклофенак, 3. целекоксиб, 4. мелоксикам**
- 1237. До імуносупресивних засобів належать 1. циклофосфан, 2. левамізол, 3. преднізолон, 4. аспірин**

- 1238. До побічних засобів левамізолу відносяться:**
- 1239. До стероїдних протизапальних належать:**
- 1240. До ускладнень при терапії диклофенаком натрію належить все, крім**
- 1241. З чим пов'язана протиалергічна дія глюкокортикоїдів?**
- 1242. Засіб вибору для лікування макроцитарної анемії**
- 1243. Засіб вибору при анафілактичному шоці**
- 1244. Засіб для парентерального харчування**
- 1245. Засіб, що містить в собі іони калію і магнію, використовують для лікування та профілактики електролітних порушень при вживанні діуретиків**
- 1246. ? Засоби, які використовують при реакціях гіперчутливості негайного типу**
1. бета - адреноміметики, 2. глюкокортикоїди, 3. нейролептики, 4. антациди
- 1247. Імунодепресанти - антиметаболіти 1. меркаптопурин, 2. метотрексат, 3. левамизол, 4. циклофосфан**
- 1248. Імунодепресивна дія цитостатиків пов'язана з**
- 1249. Чим пояснюється зниження судинної проникності при дії препаратів, які містять кислоту аскорбінову та біофлавоноїди?**
- 1250. Інтерферони, які належать до цитокінів, мають наступні характерні властивості: 1.Противірусна дія, 2.Імуностимулююча дія, 3.Антипроліферативна дія, 4. Антиоксидантна дія, 5. Протизапальна дія**
- 1251. Іонний засіб для зупинки кровотеч**

1252. Комбінований вітамінний засіб, який зменшує проникність та ламкість капілярів, зміцнює судинну стінку, зменшує її набряклість і запалення, має антиоксидантні і радіопротекторні властивості, бере участь в окислювально-відновних процесах, обміні вуглеводів, утворенні стероїдних гормонів, сприяє підвищенню опірності організму до несприятливого впливу навколишнього середовища та інфекційних захворювань

1253. Лікарські засоби, що зменшують ушкодження тканин

1254. Нестероїдний протизапальний засіб, який внаслідок центральних механізмів дії, використовується лише як анальгетик - антипіретик

1255. Обмежене застосування целекоксибу пов'язане зі здатністю препарату

1256. Одна із основних ознак гострого передозування перфузійними розчинами

1257. Оптимальним жарознижуючим засобом для грудних дітей є

1258. Основний ефект Т-активіну пов'язаний з:

1259. Основні побічні ефекти характерні для нестероїдних протизапальних, похідних піразолону такі:

1260. Основні показання для застосування анальгіну наступні:

1261. Перфузійний розчин на основі гідроксиетилкрохмалю, використовують для профілактики та лікування гіповолемії та шоку у зв'язку з операціями, травмами, інфекційними захворюваннями і опіками; для гемодилуції

1262. Побічна дія антигістамінних препаратів I покоління

1263. Побічна дія димедролу (усі відповіді правильні, крім однієї, вкажіть її)

1264. Побічні ефекти НПЗП на слизову ШКТ пов'язані з

1265. Покази до застосування індометацину 1. склеродермія, 2. дерматоміозит, 3. хвороба Бехтерева, 4. біль при інфаркті міокарда

1266. Покази до застосування неогемодезу

1267. Покази до застосування НПЗП 1. невралгії, 2 артрити, 3. радикуліти 4. гіпертонія

1268. Поясніть механізм жарознижуючої дії НПЗЗ:

1269. Поясніть механізм протизапальної дії НПЗЗ:

1270. Поясніть механізм протизапальної дії стероїдних протизапальних засобів:

**1271. При алергічних реакціях сповільненого типу використовують:
1.антигістамінні засоби, 2. засоби, що зменшують пошкодження тканин, 3.
імунодепресанти, 4.кардіотоніки**

**1272. При алергіях негайного типу доцільно використовувати наступний
гормональний засіб**

1273. При вірусних інфекціях для покращення імунітету доцільно призначати:

1274. При гострому отруєнні саліцилатами спостерігається, наступне, крім:

**1275. При недостатності якого вітаміну спостерігається кровоточивість ясен,
розхитування і випадання зубів**

1276. При призначенні ізоніазиду необхідно профілактично призначати

1277. При яких станах застосовують ретинол?

**1278. Призначити знеболювальний препарат при міозиті для хворого з
виразковою хворобою шлунка і лейкопенією.**

1279. Протипокази до застосування неогемодезу усі перераховані, крім
1280. Реополіглюкін можна використовувати
1281. Саліцилізм - це
1282. Специфічна гіпосенсибілізація передбачає
1283. Так звана «голуба кров», штучний замінник гемоглобіну
1284. У комплексній терапії переміжної кульгавості для покращення кровотоку з успіхом використовують
1285. Ульцерогенна дія проявляється
1286. Характерний побічний ефект препаратів парацетамолу
1287. Характерні властивості НПЗЗ, усе, крім:
1288. Цитотоксична та імунодепресивна дія азатіоприну базується на
1. зменшенні синтезу антитіл, 2. збільшенні синтезу антитіл, 3. зменшенні проліферації Т-лімфоцитів, 4. зменшенні синтезу пуринів
1289. Чим викликаний ульцерогенний ефект нестероїдних протизапальних засобів?
1290. Чим кардинально відрізняються антигістамінні засоби різних поколінь
1291. Явища гіпервітамінозу можуть розвиватись при вживанні такого засобу
1292. Який вітамінний засіб зменшує проникність біологічних мембран
1293. Який з вітамінних препаратів більш доцільно призначити хворому 28 років з гемералопією (“куряча сліпота”)?

- 1294. Який препарат при тривалому застосуванні можуть викликати гіповітаміноз піридоксину?**
- 1295. Який препарат слід призначити хворому, у якого через висип алергічного походження з почервонінням, набряком, сильним зудом розвинулося безсоння?**
- 1296. Який препарат треба призначити хворому, у якого безсоння з'явилося внаслідок появи висипань алергічного характеру з почервонінням, набряком, сильним свербінням?**
- 1297. Який препарат, що розщеплює гіалуронову кислоту, можна застосовувати для лікування контрактур суглобів**
- 1298. Які вітаміни засоби застосовують при перніціозній анемії**
- 1299. Які ефекти пов'язані зі збудженням гістамінових H1 -рецепторів?**
- 1300. Які ефекти пов'язані зі збудженням гістамінових H2 -рецепторів?**
- 1301. Які засоби застосовують для неспецифічної гіпосенсибілізації?**
- 1302. Які побічні ефекти зі сторони системи крові характерні для нестероїдних протизапальних похідних піразолону:**
- 1303. Які препарати використовують для лікування алергічних реакцій (свербіж, шкірні висипання, кропивниця)?**
- 1304. Які препарати застосовують при анафілактичному шоці?**
- 1305. Які протигістамінні засоби мають виражений снодійний ефект?**
- 1306. Антигельмінтний препарат, який може використовуватись для стимуляції імунітету. При одночасному прийомі зі спиртними напоями спостерігаються дисульфірамоподібні симптоми.**

- 1307. Аспірин має протизапальну дію, оскільки пригнічує активність циклооксигенази. Рівень яких біологічно активних речовин буде при цьому знижуватися?**
- 1308. НПЗЗ пригнічують активність циклооксигенази. Рівень яких біологічно активних речовин буде при цьому знижуватися?**
- 1309. Більшість патологічних станів (запалення, набряк легень, шок різноманітного походження) супроводжуються підвищенням проникності судин. Який засіб можна використовувати для протидії цьому явищу у всіх випадках?**
- 1310. В клітинах сполучної тканини утворюються ферменти та інші активні речовини, які регулюють її щільність і проникність. Який ферментний препарат використовується з метою розрихлення і підвищення проникності сполучнотканинних утворень?**
- 1311. В процесі хіміотерапії злоякісної пухлини у хворого погіршилися показники імунних реакцій. Який з вказаних засобів слід призначити при такому стані?**
- 1312. Вітамін , який забезпечує нормальну діяльність органа зору, структурну цілісність тканин, підвищує стійкість організму до несприятливих факторів навколишнього середовища. Ранньою ознакою гіповітамінозу є погіршення присмеркового зору, апетиту, зниження маси тіла, ослаблення опірності організму до інфекцій і т.ін.**
- 1313. Вкажіть засіб, який зменшує системні прояви алергічних реакцій, знімає бронхоспазм, підвищує судинний тонус, стимулює серцеву діяльність, препарат вибору при анафілаксії**
- 1314. Вкажіть засіб, який має протиалергічний ефект, а також протизапальний, антитоксичний та протишоковий. Пригнічує кооперацію Т - лімфоцитів, гальмує антитілоутворення і утворення імунних комплексів**

1315. Внаслідок метаболізму арахідонової кислоти утворюються локальні, «клітинні гормони», які за будовою є циклічними жирними кислотами. Ці біологічно активні прозапальні сполуки називають

1316. Гіпервітаміноз цього вітаміну проявляється у дітей підвищенням температури, розвиваються блювання, пітливість, сонливість, петехії і висип на шкірі, олігурія. Можливий також розвиток гідроцефалії і випинання тім'ячка у немовлят. У дорослих відмічається головний біль, нудота, блювання, сонливість, дратівливість, порушення ходи. Який це вітамінний засіб?

1317. Дівчинка 10 років часто хворіє гострими респіраторними інфекціями, після яких спостерігаються численні крапкові крововиливи у місцях тертя одягом. Гіповітаміноз якого вітаміну має місце у дівчинки?

1318. Для лікування кропивниці з метою усунення висипань та свербіння шкіри хворому призначили димедрол. Який механізм забезпечує його ефективність у даному випадку?

1319. Для лікування системної склеродермії призначено імунодепресант, відомий ще як протималарійний засіб. Який препарат призначено хворому?

1320. Для попередження нападу бронхіальної астми лікар призначив хворому кромолін натрію. Який із наведених механізмів дії типовий для цього препарату?

1321. До комплексного лікування пародонтозу додали вітамінний засіб з вираженою судинорозширювальною дією. Визначте цей препарат.

1322. До лікаря звернувся хворий на анемію Адісона-Бірмера. Який препарат необхідно застосувати для лікування цього стану разом із фолієвою кислотою?

1323. До педіатра звернулася жінка з приводу поганого самопочуття дитини 8 місяців: пітливість, збільшений розмір тім'ячка, відставання в прорізуванні зубів (всього 2 зуби), неспокій. Який з препаратів треба призначити в першу чергу?

1324. До терапевтичного відділення прийнятий хворий з тривалою бронхопневмонією. Антибіотикотерапія не дала належного ефекту. Який препарат для підвищення імунного статусу слід додати до комплексної терапії цього хворого?

1325. Жінка 25 років з метою схуднення протягом 1,5 місяців перебувала на дієті, яка складалась з 2 чашок кави без цукру, 3 сухарів з білого хліба, 2 сосисок або 2 яєць на добу. Маса тіла знизилась на 5 кг, з'явилися сильні головні болі, постійні носові кровотечі, кровоточивість ясен, розхитування зубів, лущення шкіри і посилене випадання волосся. Призначення якого вітамінного препарату є ефективним у даному випадку?

1326. Жінка 35 років приймала ацетилсаліцилову кислоту, гальмуючи біль у зубі. Через деякий час вона звернула увагу на виникнення порушень травлення, почуття важкості у животі, печію. Чому препарат викликає ускладнення стану шлунка?

1327. Жінка 45 років страждає на сезонний алергічний риніт, пов'язаний з цвітінням амброзії. Який лікарський засіб з групи стабілізаторів тучних клітин можна застосувати для профілактики даного захворювання?

1328. Жінка 60 років, яка страждає артритом тазостегнового суглоба, тривалий час приймала бутадіон. Після аналізу гемограм лікар відмінив цей препарат. Яке найбільш ймовірне ускладнення спричинив бутадіон у жінки?

1329. Жінка, яка тривалий час лікується з приводу хронічного поліартриту, скаржиться на підвищення артеріального тиску, появу спраги, поліурії, порушення менструального циклу та підвищення маси тіла. В анамнезі -прийом преднізолону. З чим пов'язані описані скарги?

1330. Жінку 59 років непокоять болі в правому колінному суглобі. Об'єктивно: шкіра в ділянці коліна гіперемійована. Температура підвищена, тканини напружені, в ділянці колінного суглоба рентгенологічно виявлено ексудат. Який препарат найбільш ефективний для лікування цієї хворої?

1331. Жінку 59 років непокоять болі у правому колінному суглобі. Об'єктивно: шкіра в ділянці коліна гіперемійована. Температура підвищена, тканини напружені, в ділянці колінного суглоба рентгенологічно виявлений ексудат. Який препарат найбільш ефективний для лікування цієї хворої?

1332. Жінці із сезонним вазомоторним ринітом, яка працює диспетчером на залізній дорозі і перебуває на амбулаторному лікуванні, показано призначення антигістамінного засобу, який не пригнічує ЦНС. Назвіть цей препарат.

1333. З приводу алергічної реакції хворий приймав димедрол. На дні народження у товариша, нехтуючи порадою лікаря, прийняв звичну для себе дозу алкоголю. Замість очікуваного середнього ступеня сп'яніння розвинулася алкогольна кома. Назвіть характер описаної взаємодії лікарського препарату і алкоголю.

1334. Засіб усуває дисбаланс електролітів, дефіцит магнію і калію, знижує збудливість і провідність міокарда, виявляє помірний антиаритмічний ефект, поліпшує обмін речовин у міокарді та коронарний кровообіг, а також зменшує чутливість міокарда до серцевих глікозидів і прояви їх токсичності.

1335. У хворого деменція, діарея, дерматит. Діагностовано пелагру. Який вітамінний препарат Ви застосуєте для лікування?

1336. Кислота - антисептик. Має антимікробний, подразнювальний ефекти, виявляє кератолітичну дію. При місцевому застосуванні виявляє протимікробну, подразливу, відволікаючу і кератолітичну дію. Покази: інфекційні ураження шкіри, жирна себорея, свербіж шкіри, ороговіння шкіри, звичайні вугри

1337. Лікування дитини, хворої рахітом, за допомогою вітаміну Д3 не дало позитивного результату. Яка найбільш ймовірна причина цього?

1338. Ліпополісахаридний комплекс бактеріального походження (виділяють з культури *B. prodigiosum*). Підвищує резистентність організму до інфекцій, ефективність протимікробних засобів, зокрема антибіотиків, стимулює систему Т-лімфоцитів, фагоцитарну активність лейкоцитів, функцію кори надниркових залоз, регенеративні процеси (у вогнищі запалення).

1339. Нестероїдний протизапальний засіб, який використовується в клініці більше 100 років. Як протизапальний агент призначається у добовій дозі 3-4 г (до 6 г). Як антиагрегант 80-100 мг.

1340. Пацієнт, який після перенесеного інфаркту міокарда приймав антиагреганти, потрапив у лікарню з діагнозом «Кровоточива виразка шлунка». Який засіб міг спровокувати дане ускладнення?

1341. Пацієнтові з приводу суглобового болю призначили мелоксикам. Який механізм дії цього препарату?

1342. Під час зимування у геологів були зафіксовані сильні головні болі, носові кровотечі, кровоточивість ясен, лущення шкіри. Призначення якого вітамінного препарату є доречним у даному випадку?

1343. Під час лікування артриту індометацином у хворого розвинулись ускладнення з боку шлунково-кишкового тракту, ЦНС, та системи крові. Яким препаратом з цієї ж групи необхідно його замінити для зниження побічних ефектів?

1344. Після вживання ацетилсаліцилової кислоти у пацієнта з'явився біль в ділянці шлунка як наслідок загострення виразкової хвороби. Що лежить в основі ульцерогенності вказаного

1345. Після приймання НПЗЗ у пацієнта з'явився біль в ділянці шлунка як наслідок загострення виразкової хвороби. Що покладено в основу ульцерогенності названого препарату?

1346. Плазмозамінний розчин на основі декстрану, застосовують для комплексного лікування травматичного, операційного, токсичного і опікового шоку; для покращання артеріального і венозного кровообігу з метою профілактики і лікування тромбозів, тромбофлебітів; для додавання до перфузійної рідини в апаратах штучного кровообігу (АШК) при операціях на серці

1347. Плазмозамінник на основі полівінілпіролідону, застосовують для дезінтоксикації організму при токсичних формах захворювань ШКТ (дизентерія, диспепсія, сальмонельоз); інших інфекційних захворюваннях, що супроводжуються токсикозами; опіковій хворобі у фазі інтоксикації; гострій променевої хворобі; різних захворюваннях печінки (гепатитах, холециститах, печінковій комі).

1348. Препарат - мембраностабілізатор, використовують виключно для попередження нападів бронхіальної астми. Перешкоджає вивільненню гістаміну та інших біологічно активних речовин - медіаторів алергії - із тучних (опасистих) клітин

1349. Препарат тимуса великої рогатої худоби. За хімічною структурою належать до поліпептидів. Застосовують при імунодефіцитних станах (наприклад після променевої та хіміотерапії у онкологічних хворих, при хронічних гнійних та запальних процесах тощо).

1350. При алергічному дерматиті лікар призначив хворому у складі комплексної терапії H1-гістаміноблокатор. Визначте цей препарат.

1351. При артриті суглоба щелепи стоматолог призначив препарат, що належить як до групи ненаркотичних аналгетиків, так і до не стероїдних протизапальних засобів, переважно впливає на циклооксигеназу-2 і має помірний подразливий вплив на слизову оболонку травного каналу. Назвіть цей препарат.

1352. При загостренні ревматоїдного артрити хворому, в анамнезі якого супутній хронічний гастрит, призначено мелоксикам. Чим обумовлено зменшення побічної дії препарату на травний тракт?

1353. При загостренні ревматоїдного артрити хворому, в анамнезі якого супутній хронічний гастрит, призначено німесулід. Чим обумовлено зменшення побічної дії препарату на травний тракт?

1354. При лікуванні артрити індометацином у хворого розвинулися ускладнення з боку шлунково-кишкового тракту, ЦНС, крові. Яким препаратом із цієї ж групи необхідно замінити індометацин для зниження побічних ефектів?

1355. При обстеженні 3-річної дитини виявлені порушення об'єднання кінцівок, деформація хребта і грудної клітки, викривлення нижніх кінцівок. Який препарат є найбільш ефективним у даній ситуації?

1356. При огляді 3-річної дитини виявлено порушення об'єднання кісток, деформацію хребта і грудної клітки, викривлення нижніх кінцівок. Який препарат є найбільш ефективним у даній ситуації?

1357. При огляді дворічної дитини виявлено порушення з'єднання кісток, деформацію хребта і грудної клітки, викривлення нижніх кінцівок. Призначте лікування

1358. Противірусний засіб. Крім того, він сприятливо впливає на перебіг імунних процесів. У поєднанні з іншими лікарськими засобами його призначають при деяких інфекційних захворюваннях (наприклад, гепатит), а також пухлинах (особливо мієлома, лімфома із В-лімфоцитів). Можна призначати дітям будь-якого віку.

1359. Профілактика та лікування пелагри, спазми судин кінцівок та головного мозку, рани, що в'яло загоюються, виразки, неврити лицьового нерва, інфекційні захворювання, гастрити з пониженою кислотністю, коліти, захворювання печінки (гепатити). Це покази до застосування для такого засобу як

1360. Сорокалітня жінка звернулась до лікаря зі скаргою на болі в колінних суглобах. При огляді виявлено: припухлість, почервоніння, гіпертермію в ділянці цих суглобів. Лабораторне дослідження показало позитивні ревмопроби. Які препарати мають бути використані для лікування хворої?

1361. Спадкова нестача парієтальних клітин шлунка призвела до селективної мальабсорбції вітаміну. Який препарат вирішить цю проблему?

1362. У 4-місячної дитини яскраво виражені прояви рахіту. Розладів травлення немає. Дитина багато перебуває на сонці. Протягом 2 місяців отримує вітамін Д3, однак прояви рахіту не зменшуються. Порушенням синтезу якої речовини можна пояснити розвиток рахіту у дитини?

1363. У дівчинки, яка лікувалася антибіотиками з групи пеніцилінів з приводу гострого бронхіту, на 3 день розвинувся алергічний дерматоз. Який препарат хворій треба призначити?

1364. У клітинах сполучної тканини утворюються ферменти та інші активні речовини, які регулюють її щільність і проникність. Який ферментний препарат використовується з метою розрихлення і підвищення проникності сполучнотканинних утворень?

1365. У комплексну терапію ІХС включають токоферол. Який ефект препарату використовують у цьому випадку?

1366. У півторарічного хлопчика порушився нормальний розвиток скелета. Педіатр встановив діагноз “Вітамін D-залежний рахіт” і відповідно до цього призначив йому жиророзчинний вітамін D. Назвіть механізм проникнення цієї речовини через клітинні мембрани.

1367. У результаті помилкового приймання вітамінного препарату у дитини виникли анорексія, нудота, блювання, діарея, гіпертермія, з'явилися крововиливи на шкірі та слизових, а також проявлення менінгізму. Який препарат приймала дитина?

1368. У терапевтичне відділення госпіталізований хворий з тривалою бронхопневмонією. Антибіотико терапія не дала належного ефекту. Який препарат для підвищення імунного статусу слід додати до комплексної терапії хворого?

1369. У хворого 46 років з виразковою хворобою шлунка діагностовано ревматоїдний артрит. Який з протизапальних препаратів найбільш доцільний у цьому випадку?

1370. У хворого 55 років на 4-й день лікування диклофенак-натрієм виникла шлункова кровотеча в результаті виразки слизової оболонки шлунка. З чим пов'язана ульцерогенна дія препарату?

1371. У хворого 55 років на 4-й день лікування індометацином виникла шлункова кровотеча в результаті виразки слизової оболонки шлунка. З чим пов'язана ульцерогенна дія препарату?

1372. У хворого виявлено наявність гіповітамінозу з симптоматикою поліневриту. Який вітамінний препарат йому потрібно призначити?

1373. У хворого діагностовано мегалобластична анемія. Дефіцит якої речовини може призводити до розвитку цього захворювання?

1374. У хворого з ревматоїдним артритом, який лікувався диклофенак-натрієм, виникли ознаки гастропатії. З якою дією можна пов'язати виникнення цього ускладнення?

1375. У хворого кропивниця, яку лікували димедролом. З дією на який із названих елементів патогенезу алергії пов'язаний терапевтичний ефект димедролу?

1376. У хворого на ревматоїдний артрит, який лікувався індометацином, виникли ознаки гастропатії. З якою дією препарату можна пов'язати виникнення цього ускладнення?

1377. У хворого після довготривалого застосування призначеного з приводу ГРВІ препарату виникли головний біль, запаморочення, шум у вухах, нудота, біль в епігастральній області. Який препарат міг викликати подібну клінічну картину?

1378. У хворого після резекції шлунка розвинулась мегалобластична анемія. Який препарат необхідно призначити хворому?

1379. У хворого спостерігається комплекс симптомів: діарея, запалення відкритих ділянок шкіри і прогресуюча недоумкуватість. Лікар пояснив симптоматику відсутністю у їжі одного із вітамінів і призначив його препарат. Який препарат призначив лікар?

1380. У хворого спостерігається порушення зору - гемералопія ("куряча сліпота"). Який вітамінний препарат треба приймати хворому, щоб відновити зір?

1381. У хворого хронічним алкоголізмом відзначаються симптоми поліневриту і серцевої недостатності. Який вітамінний препарат слід призначити хворому?

1382. У хворого, який зазнав впливу іонізуючого опромінювання, в імунограмі відмічене різке зниження Т-ланки клітинного імунітету. Який препарат йому потрібно призначити з метою лікування цього стану?

1383. У чоловіка 39 років спостерігається підвищений ризик розвитку інфекційних процесів, гіперкератоз, порушення присмеркового зору. Який вітамінний препарат необхідно призначити?

1384. У чоловіка 39 спостерігаються хронічні інфекційні процеси, гіперкератоз, порушення сутінкового зору. Який вітамінний препарат необхідно призначити?

1385. Український засіб, проявляє анальгезуючу, жарознижувальну і протизапальну активність. Індукує синтез ендогенного інтерферону. Використовується всередину при больових синдромах при остеохондрозі, артритах, невралгіях, менінгоенцефаліті, при хронічному бронхіті, при вірусному гепатиті. Засіб малотоксичний, добре переноситься хворими.

1386. Усі нестероїдні протизапальні засоби мають ульцерогенну дію. Це ускладнення пов'язане з:

1387. Учасникові ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС лікар призначив комбінований вітамінний препарат "Тріовіт", який сприяє репарації ДНК і нормалізує загальний стан організму, має антиоксидантні властивості. Завдяки наявності якого вітамінного засобу "Триовіт" проявляє зазначений фармакологічний ефект?

1388. Хвора 63 років з артритом на тлі лікування ацетилсаліциловою кислотою (аспірин) поскаржилась на нудоту, тяжкість в епігастрії. Лікар відмінив аспірин і призначив протизапальний засіб із групи селективних інгібіторів циклооксигенази-2. Назвіть потрібний для хворої препарат.

1389. Хворий 40 років страждає хронічним кон'юнктивітом алергічного генезу. За професією водій. Який антигістамінний препарат необхідно призначити хворому з урахуванням специфіки його роботи?

1390. Хворий 60 років з діагнозом ревматоїдний поліартрит тривалий час застосовує не стероїдний протизапальний засіб індометацин. Який механізм дії цього препарату?

1391. Хворий госпіталізований до лікарні після бджолиних укусів з вираженим набряком Квінке. Який протигістамінний препарат, що не дає одночасно седативного ефекту, необхідно призначити хворому?

1392. Хворий з алергічним ринітом прийняв антигістамінний препарат у таблетках всередину. Через деякий час хворий відчув сухість у роті, загальмованість, у нього виник легкий сон. Який препарат прийняв хворий?

1393. Хворий з діагнозом вогнищевий туберкульоз верхньої долі правої легені в складі комбінованої терапії одержує ізоніазид. Через деякий час пацієнт почав пред'являти скарги на м'язову слабкість, зниження шкірної чутливості, порушення зору, координації рухів. Який вітамінний препарат доцільно використати для усунення даних явищ?

1394. Хворий з подагричним артритом, приймає бутадіон. Після чергового аналізу крові лікар відмінив цей препарат. Яке ускладнення з боку крові викликав бутадіон?

1395. Хворий з приводу мегалобластичної анемії, яка виникла після гастректомії, тривалий курс лікувався вітаміном В12. Препарат вводили внутрішньом'язово. У чому перевага парентерального шляху введення вітаміну В12 порівняно з ентеральним?

1396. Хворий звернувся до лікаря із скаргою на карієс. Який засіб вітамінної дії треба додати до комплексної терапії для зміцнення емалі зубів?

1397. Хворий звернувся до лікаря із скаргою на численний карієс. Який засіб вітамінної дії треба додати до комплексної терапії для укріплення емалі зубів?

1398. Хворий скаржиться на втрату апетиту, зниження ваги тіла, слабкість, біль у епігастральній ділянці. На основі клінічних даних і аналізу крові був поставлений діагноз хвороба Адісона-Бірмера (перніціозна анемія). Який препарат є основним для лікування даного захворювання?

1399. Хворій на ревматоїдний поліартрит призначили не стероїдний протизапальний засіб диклофенак- натрій. Через деякий час його застосування у хворої виникло загострення супутнього захворювання, що змусило відмінити препарат. Яке супутнє захворювання могло призвести до відміни препарату?

1400. Хворій, що перенесла мастектомію у зв'язку з раком молочної залози, був призначений курс променевої терапії. Який з перелічених вітамінних препаратів має виражену радіопротекторну дію, зумовлену антиоксидантною активністю?

1401. Хворій, що перенесла мастектомію у зв'язку з раком молочної залози, був призначений курс променевої терапії. Який з перелічених вітамінних препаратів має виражену радіопротекторну дію, зумовлену антиоксидантною активністю?

1402. Хворому 60 років лікар- ревматолог встановив діагноз: остеоартроз колінного суглоба. Препарати якої групи потрібно призначити для патогенетичного лікування?

1403. Хворому з артритом тазостегнового суглоба лікар призначив протизапальний препарат - селективний інгібітор ферменту циклооксигенази-2 . Що це за препарат?

1404. Хворому з ознаками атеросклерозу судин було призначено один з гіполіпідемічних засобів, який знижує синтез холестерину за рахунок блокування ферменту 3-гідрокси-3-метилглутарил-КоА редуктази. Вкажіть, який це засіб.

1405. Хворому з ревматоїдним артритом призначили препарат, що пригнічує імунітет. Назвіть цей засіб.

1406. Хворому з хронічним інфекційним захворюванням показано призначення препарату для активації імунних реакцій. Визначити препарат.

1407. Хворому на атеросклероз призначено ловастатин всередину по 0,04 г на ніч. Чим обумовлено призначення препарату 1 раз на добу перед сном?

1408. Хворому на ішемічну хворобу серця до комплексної терапії додано токоферол. На який ефект препарату розраховує лікар?

1409. Хворому на ревматизм призначили нестероїдний протизапальний засіб диклофенак натрію. Через загострення супутнього захворювання відмінили. Яке захворювання є протипоказанням до призначення диклофенак натрію?

1410. Хворому на ревматоїдний артрит призначено преднізолон. Який механізм його протизапальної дії?

1411. Хворому на цукровий діабет призначили курс ін'єкцій вітаміну B1 (тіаміну) для корекції метаболічного ацидозу. З яким біохімічним механізмом дії препарату пов'язана його позитивна дія у даному випадку?

1412. Хворому призначена променева терапія. Який вітамінний препарат з антиоксидантними властивостями треба додати, щоб підвищити стійкість судин у цьому випадку?

1413. Хворому, який перебуває на стаціонарному лікуванні з приводу ревматоїдного артриту, призначили не стероїдний протизапальний препарат бутадіон. Через 2 тижні стан хворого покращився, припухлість и хворобливість суглобів зменшилися. Однак в аналізі крові виражена лейкопенія. Який препарат призначити для її ліквідації?

1414. Хворому, який страждає на остеоартроз і виразкову хворобу шлунка, призначили протизапальний препарат з групи селективних інгібіторів цикло-оксигенази (ЦОГ- 2). Який препарат призначили хворому?

1415. Хворому, який страждає склеродермією, призначили імунодепресант, що належить до групи протималярійних засобів - похідних хіноліну. Після тривалого лікування у хворого знизилася вага, побіліло волосся, зменшилася гострота зору, з`явилося миготіння в очах. Окуліст терміново відмінив препарат. Визначте, яким препаратом лікували хворого.

1416. Цей вітамін запобігає ушкодженню клітинних і субклітинних мембран продуктами надлишкового вільнорадикального окислення. Знижує інтенсивність атерогенезу, процесу склерозування судинних стінок. Має кардіотонічну дію, покращує скорочувальну діяльність міокарда, знижує споживання кисню міокардом. Застосовують для профілактики негативних наслідків проживання в регіонах із несприятливою екологічною (у тому числі радіаційною) ситуацією

1417. Чоловік 62 років довгий час хворіє на коксит. Лікар призначив йому новий нестероїдний протизапальний засіб моваліс, що призвів до поліпшення стану хворого. У чому перевага цього препарату?

1418. Чоловік, що страждає на хронічний бронхіт, звернувся до лікаря, який довів, що у хворого вторинний імунодефіцит. Який препарат з метою стимуляції імунітету було призначено?

1419. Жінка 50 років страждає сезонним алергічним ринітом, пов'язаним з цвітінням амброзії. Який лікарський засіб з групи стабілізаторів тучних клітин можна застосувати для профілактики даного захворювання?

1420. У пацієнта з хронічним алкоголізмом відзначаються симптоми поліневриту і серцевої недостатності. Який вітамінний препарат слід призначити хворому?