

ЗАВАНТАЖЕНО З САЙТУ ТЕСТУВАННЯ.УКР

Клінічна фармакологія антибактеріальних, нестероїдних і стероїдних протизапальних засобів. Клінічна фармакологія засобів, що впливають на ЦНС та ШКТ

Категорія: **Фармакологія**

Кількість запитань: **476**

- 1. До макролідів відноситься:**
- 2. До азалідів відноситься:**
- 3. До тетрациклінів відноситься:**
- 4. До групи лінкозамідів відноситься:**
- 5. До групи аміноглікозидів відноситься:**
- 6. До групи тетрациклінів відноситься:**
- 7. До препаратів групи аміноглікозидів відноситься:**
- 8. До препаратів групи глікопептидів відноситься:**
- 9. До антибіотиків широкого спектру дії відноситься:**
- 10. Переважно на грампозитивні бактерії діє:**
- 11. Переважно на грамнегативні бактерії діє:**
- 12. Активний відносно синьогнійної палички:**
- 13. Синтез клітинної стінки бактерій порушує:**
- 14. Синтез білка на рибосомах порушує:**
- 15. Рифампіцин порушує:**
- 16. Поліміксин М порушує:**
- 17. Переважно бактерицидно діють:**
- 18. Переважно бактеріостатично діють:**

- 19. Бета-лактамі антибіотики діють бактерицидно тому, що порушують:**
- 20. Біосинтетичні пеніциліни діють бактерицидно тому, що порушують:**
- 21. Спрямованість противірусної дії мідантану і ремантадину:**
- 22. Чому не можна призначати НПЗЗ вагітним жінкам в останній триместр вагітності?**
- 23. Який із нижче перерахованих патологічних станів є показом для призначення НПЗЗ?**
- 24. У психіатричну клініку доставлений хворий 40 років у стані збудження, агресії, марення. Який препарат слід ввести хворому?**
- 25. Вказати механізм дії такого препарату, як: ацикловір:**
- 26. Вказати механізм дії метисазона:**
- 27. Хворому з порушеннями психоемоційної сфери та розладом сну був призначений діазепам. Що лежить в основі механізму дії діазепаму ?**
- 28. До кліндаміцину чутливі:**
- 29. До глікопептидів чутливі такі мікроорганізми:**
- 30. Біосинтетичні пеніциліни:**
- 31. У чоловіка 68 років з тремтінням рук, порушенням координації рухів діагностована хвороба Паркінсона. Який засіб доцільно призначити хворому?**
- 32. В поліклініку звернулася за допомогою жінка із скаргами на поганий настрій, безсоння, болі в серці. Який засіб для лікування неврозу слід призначити хворій?**

33. До напівсинтетичних пеніцилінів відноситься:

34. Хворому з маніакально-депресивним синдромом в стадії депресії, який скаржився на відчуття тривоги, страху, був призначений антидепресант із супутнім психоседативним ефектом. Який це був препарат?

35. У хворого Н., 40 років, виразка шлунку у стадії загострення із значним підвищенням кислотності шлункового соку, больовим та диспептичним синдромом. Виберіть відповідний засіб:

36. Побічна дія ністатину при вживанні ентерально виявляється:

37. У психіатричній клініці при тривалому лікуванні у хворого з'явилися симптоми паркінсонізму. Який препарат вводили хворому?

38. Карбапенеми діють бактерицидно тому, що порушують:

39. Цефалоспорины діють бактерицидно тому, що порушують:

40. Хворому в депресивному стані призначили ніаламід. Лікар застеріг хворого про необхідність виключити з харчування в період лікування:

41. При інфаркті міокарду була проведена нейролептанальгезія. Який препарат з групи нейролептиків найчастіше застосовується спільно з фентанілом?

42. Лікар обговорював з колегами застосування нового протиепілептичного засобу - натрію вальпроату. Який можливий механізм дії препарату?

43. Хвора протягом двох тижнів приймала призначену невропатологом мікстуру з приводу неврастенії. Самопочуття хворої декілька покращилось, однак незабаром з'явилися скарги на нежить, кон'юнктивіт, шкірні висипи, в'ялість та послаблення пам'яті. Препарат якої групи міг визвати подібну побічну дію?

44. Жінка після перенесеного нервового потрясіння погано спить. Якому з перерахованих снодійних засобів слід віддати перевагу для лікування безсоння?

45. Хвора протягом двох тижнів приймала призначену невропатологом мікстуру з приводу неврастенії. Самопочуття хворої декілька покращилось, однак незабаром з'явилися скарги на нежить, кон'юктивіт, шкірні висипи, в'ялість та послаблення пам'яті. Був встановлений діагноз "бромізм". Що доцільно призначити для послаблення симптомів?

46. Хворому з виразковою хворобою призначено фамотидин. Кислотність шлункового соку значно знизилась. Який механізм лежить в основі дії даного препарату?

47. Для зняття марення і галюцинацій у хворої на шизофренію лікар використав аміназин. Який механізм антипсихотичної дії препарату?

48. В наркологічному відділенні психоневрологічної лікарні хворому призначено тетурам. Яке з перерахованих захворювань може бути показанням до його застосування.?

49. Хворому при безсонні, викликаному емоційними розладами, лікар призначив засіб, що викликає сон за рахунок транквілізуючої дії. Який снодійний препарат був призначений

50. Після тривалого застосування аміназину в зв'язку з розвитком побічних ефектів лікар призначив пацієнту інший препарат з групи нейролептиків. Який з перерахованих препаратів належить до групи нейролептиків?

51. Яка спрямованість противірусного засобу гамаглобуліну:

52. Чоловік 58 років звернувся до лікаря з приводу хвороби Паркінсона. Хворий страждає також на глаукому. Що треба йому призначити?

53. До прийомного відділення обласної лікарні поступила жінка 40 років з діагнозом гострого панкреатиту. Що треба в першу чергу ввести хворій?
54. Чоловіку 70 років, що страждає на хворобу Паркінсона, був призначений препарат леводопа. Через тиждень стан хворого значно покращився. Який механізм дії лікарського засобу?
55. У дитини 5 років періодично з'являються судомні напади з втратою свідомості. Лікар діагностував епілепсію (великі судомні припадки). Який препарат доцільно призначити хворій дитині?
56. У хворого на маніакально-депресивний психоз спостерігаються пригнічення психічної і рухової активності, тривожно-депресивний стан. Який препарат необхідно йому призначити для зняття патологічної депресії?
57. У хронічного алкоголіка розвинувся психоз. Які препарати доцільно при цьому використовувати?
58. У дитини 9 років виявлено порушення навчання, зниження інтелектуального розвитку. Призначення якої групи психотропних засобів є виправданим в даному випадку?
59. Хворий похилого віку скаржиться на головний біль, запаморочення, швидку втому, погіршення пам'яті. В анамнезі черепно-мозкова травма. Яку групу препаратів необхідно використати?
60. Який препарат доцільно призначити хворому на хронічний гастрит з підвищеною секреторною функцією?
61. Хворому з дискінезією жовчовивідних шляхів та закрепами лікар призначив жовчогінний засіб, який має ще значну послаблюючу дію. Який засіб призначив лікар?

62. Після тривалої терапії препаратом з кори крушини, його проносний ефект зменшився. Яке явища обумовило цей процес?
63. Для лікування хронічного закрепу хворий тривало використовував сенадексин. Однак, через декілька тижнів, послаблюючий ефект препарату знизився. З чим це може бути пов'язано?
64. При органічних пошкодженнях головного мозку пам'ять може покращити:
65. Хворому на шизофренію було призначено аміназин. Який з перерахованих фармакодинамічних ефектів є підставою для його призначення даному хворому?
66. Хворому для лікування психотичного стану було призначено трифтазин. Який механізм його антипсихотичної дії?
67. Для лікування хвороби Паркінсона лікар призначив циклодол. Який механізм протипаркінсонічної дії препарату?
68. Хворий страждає на посттравматичну епілепсію, яка проявляється великими нападами. Який препарат слід призначити хворому для їх профілактики ?
69. Хворий звернувся до лікаря зі скаргами на страх, відчуття неспокою, внутрішньої напруги, що виникли після душевної травми. Який препарат слід йому призначити?
70. У хворого на виразкову хворобу шлунка з гіперацидним синдромом відзначається схильність до закрепів. Який антацидний препарат раціонально йому призначити?
71. Хворий похилого віку страждає хронічним закрепом, в основі якого лежить гіпотонія товстого кишечника. Який препарат слід призначити хворому?

72. Каретою швидкої допомоги в лікарню доставили хворого, який в стані важкої депресії намагався покінчити життя самогубством. Діагноз: депресивний психоз. Які фармакологічні засоби необхідно призначити хворому ?

73. У неврологічне відділення поступив хворий зі скаргами на погіршення пам'яті та розумової працездатності після перенесеної травми голови. Запропонуйте лікарський засіб для покращення метаболізму головного мозку.

74. Хвора у віці 69 років страждає хронічним закрепом, в основі якого лежить гіпотонія товстого кишечника. Який з перерахованих препаратів доцільно призначити?

75. Який з перерахованих препаратів відноситься до селективних інгібіторів ЦОГ-2?

76. Який з перерахованих препаратів відноситься до неселективних інгібіторів ЦОГ?

77. Які властивості мають нестероїдні протизапальні засоби?

78. Які категорії хворих відносяться до групи ризику виникнення гастропатій після застосування НПЗЗ?

79. Які з перерахованих нижче досліджень є критеріями оцінки ефективності та безпеки застосування НПЗЗ?

80. При наявності яких захворювань можливий розвиток гастропатій після застосування НПЗЗ?

81. Який із перерахованих нижче побічних ефектів властивий НПЗЗ?

82. До цефалоспоринів відноситься:

- 83. Який із перерахованих нижче препаратів можна застосовувати при хронічних запальних захворюваннях респіраторного тракту?**
- 84. Який із перерахованих НПЗЗ має найбільшу гепатотоксичність, особливо у людей з 14 років?**
- 85. З якими із нижче перерахованих препаратів не можна комбінувати НПЗЗ?**
- 86. З якою метою застосовують аспірин у хворих ІХС?**
- 87. Які заходи профілактики є доцільними для усунення розвитку гастропатій після перорального прийому НПЗЗ?**
- 88. Який із нижче перерахованих препаратів може викликати задуху, поліпоз слизової носа, риніт, кропив'янку?**
- 89. Який із нижче перерахованих препаратів може викликати гемораргічний синдром?**
- 90. Хворий 60 років з діагнозом ревматоїдний поліартрит тривалий час застосовує нестероїдний протизапальний засіб індометацин. Який механізм дії цього препарату?**
- 91. Хворому на ангіну, лікар призначив бісептол. В чому пріоритет бісептолу в порівнянні з іншими сульфаніламидами?**
- 92. У хворого, що лікується з приводу ревматоїдного поліартриту, в анамнезі є виразкова хвороба шлунку. Який із зазначених препаратів найбільш небажано застосовувати?**
- 93. Чоловік 62 років довгий час хворіє на коксит. Лікар призначив йому новий нестероїдний протизапальний засіб моваліс, що призвів до покращення стану хворого. В чому перевага цього засобу?**

94. Хворому із запаленням легень лікар призначив сульфаніламідний препарат. Який механізм дії сульфаніламідів передбачає лікар ?
95. У хворого з запаленням легенів непереносимість до антибіотиків. Який з комбінованих сульфаніламідних препаратів слід призначити хворому ?
96. У хворого з ревматоїдним артритом, який лікувався індометацином, виникли ознаки гастропатії. З якою дією можна пов'язати виникнення цього ускладнення?
97. Хворому, який страждає на остеоартроз і виразкову хворобу шлунка, призначили протизапальний препарат з групи селективних інгібіторів циклооксигенази (ЦОГ-2). Який препарат призначили хворому?
98. Хворому на ревматоїдний артрит призначено преднізолон. Який механізм його протизапальної дії?
99. Юнак захворів на гостру диспепсію. Є потреба застосувати сульфаніламідний препарат, що не всмоктується у кишечнику. Який саме?
100. Хворий з подагричним артритом, приймає бутадіон. Після чергового аналізу крові лікар відмінив цей препарат. Яке ускладнення з боку крові викликав бутадіон?
101. До стоматолога звернувся пацієнт з артритом щелепно-лицевого суглоба. Лікар стоматолог призначив диклак(диклофенак) гель . Який механізм дії цього лікарського засобу?
102. При артриті суглобу щелепи стоматолог призначив препарат, що належить як до групи ненаркотичних анальгетиків, так і до нестероїдних протизапальних засобів, переважно впливає на циклооксигеназу-2 і має помірний подразнюючий вплив на слизову оболонку травного каналу. Назвіть цей препарат.

- 103. Що доцільно призначити хворому на хронічний гастрит з підвищеною секреторною функцією?**
- 104. Хворому з дискінезією жовчовивідних шляхів та закрепами лікар призначив жовчогінний засіб, який має значну послаблюючу дію. Який засіб призначив лікар?**
- 105. Хворому на гострий туберкульоз легень призначили стрептоміцин. Який механізм дії цього препарату?**
- 106. Хворому 42 років для лікування бактеріальної пневмонії призначено ампіцилін. Вкажіть, який механізм бактерицидної дії препарату?**
- 107. У пацієнта після переохолодження у ділянці крил носа та верхньої губи з'явились герпетичні висипання. Для лікування була застосована мазь. Який противірусний засіб містить застосована мазь?**
- 108. У хворого гнійна рана. Застосували розчин, який проявив антисептичну дію та сприяв механічному очищенню рани. Який саме розчин був використаний?**
- 109. У хворого на туберкульоз, що знаходиться на лікуванні, погіршився слух. Який препарат викликав таке ускладнення?**
- 110. Після оперативного втручання хворому призначили напівсинтетичний антибіотик з групи пеніцилінів з переважною дією на стафілококи. Визначити препарат.**
- 111. Для лікування інфекцій кістково-рухового апарату застосовують ряд антибіотиків. Виберіть з названих нижче препарат, що має здатність накопичуватись у кістковій тканині.**
- 112. Хворому на сепсис призначте антимікробний препарат з групи фторхінолонів.**

- 113. У відділення очних хвороб надійшов хворий з герпетичним ураженням очей. Лікар призначив ідоксуридин в очних краплях. Який механізм дії цього препарату?**
- 114. Призначаючи антибіотики групи тетрацикліну перорально, хворого слід попередити про те, що не можна приймати препарат з молочними продуктами, тому, що вони:**
- 115. У пацієнта стоматолог діагностував герпетичний стоматит. Що слід призначити в даному випадку для лікування?**
- 116. Хворому із стрептококовою інфекцією ясен було призначено препарат, що містить у своїй структурі бета-лактамне кільце. Який препарат відноситься до цієї групи ?**
- 117. Дитині 13 років хворій на ангіну призначено комбінований сульфаніламідний препарат бактерицидного типу дії. Який препарат призначено?**
- 118. У інфікованого на СНІД виникла діарея бактеріального генезу. За результатами мікробіологічного дослідження йому був призначений ко-тримоксазол (бісептол, бактрим). Яким типом (характером) протимікробної дії володіє цей препарат?**
- 119. Хворий страждає ревмокардитом з частими загостреннями. Який антибіотик слід використовувати для профілактики загострень?**
- 120. Дитині 4 років треба призначити протимікробний засіб широкого спектру дії при кишковій інфекції. Який з наведених препаратів не призначається дітям у зв'язку із шкідливим впливом на розвиток кісткової тканини?**
- 121. Хворому 35 років для лікування хронічного бронхіту у фазі загострення лікар призначив бактрим. Який основний механізм дії препарату?**

122. Хворому проведено апендектомію. Для хіміопрофілактики анаеробних ускладнень в післяопераційний період першочергово доцільно призначити:
123. Хворому необхідно призначити антибіотик з групи пеніцилінів, стійкий до пеніцилінази. Який препарат з перелічених можна порекомендувати?
124. Допоможіть медичній сестрі визначити, який з названих протимікробних препаратів не належить до антибіотиків групи цефалоспоринів:
125. Хворому на ангіну, лікар призначив бісептол. В чому пріоритет бісептолу в порівнянні з іншими сульфаніламидами?
126. Механізм дії рифампіцину.
127. У хворого виявили туберкульоз легень. Який антибіотик слід йому призначити поряд з іншими протитуберкульозними препаратами?
128. Хворому, який лікувався тетрацикліном, лікар порадив не вживати молочних продуктів. Чому лікар дав таку рекомендацію?
129. Після 10-денного лікування препаратом із групи антибіотиків у пацієнта спостерігається явища дисбактеріозу: диспептичні явища, кандидомікоз; жовтяниця, фотосенсибілізація. Антибіотик якої групи приймав хворий?
130. Хворому з ревматоїдним артритом призначено препарат біцилін-5 1 раз в 4 тижні. Чим обумовлена тривалість дії
131. Хворий 37 років госпіталізований у венерологічне відділення з діагнозом сифіліс. Який із перелічених препаратів буде використовуватися для лікування хворого?
132. Для лікування хворого із запаленням легень призначено комбінований препарат з групи сульфаніламідів. Який препарат було призначено хворому?

133. У хворого на туберкульоз після тривалого лікування з'явилися шум та дзвін у вухах, зниження слуху, порушилась координація рухів, висипи на шкірі, набряк слизових оболонок. Після відміни препарату стан хворого значно покращився. Який препарат приймав хворий?

134. До інфекційного відділення надійшла дитина 9 років із скаргами на біль в животі, понос, анорексію. В випорожненнях знайдено еритроцити. Баканаліз показав наявність дизентерійної флори. Який препарат найкраще призначити хворому?

135. При тривалому безконтрольному вживанні препарату виникла глухота. Який з перелічених засобів має таку побічну дію?

136. У хворого із запаленням легень непериносимість до антибіотиків. Який з комбінованих сульфаніламідних препаратів слід призначити хворому ?

137. Містить триметроприм і сульфаметоксазол. Має високу протимікробну активність. Механізм дії зв'язаний з подвійним блокуючим ефектом препарату на метаболізм бактерій. Побічні ефекти: диспепсичні явища, алергічні реакції, пригнічення кровотворення. Що це за препарат?

138. При важкому перебігу гострих гнійно-запальних процесів щелепно-лицьовій області (періостит, остеомієліт, флегмона, абсцес і ін.) проводиться інтенсивна терапія з застосуванням всіх препаратів, окрім:

139. Відзначити амебоцидний препарат, ефективний при локалізації амеб у просвіті і стінці кишечника:

140. Визначити спектр дії ефективного хіміотерапевтичного засобу хінгаміну:

141. Визначити спектр дії ефективного хіміотерапевтичного засобу хінгаміну:

142. Який побічний ефект виникає при тривалому призначенні хінгаміну:

- 143. Визначити протималярійний механізм дії хлоридину:**
- 144. Що характерно для хініну:**
- 145. При стійкості збудника малярії до сульфаніламідів і сульфонів, який комбінований препарат застосовується:**
- 146. Визначити препарат, що має гамонтоцидну дію на статеві форми малярійного плазмодія:**
- 147. При малярії (малярійній комі), що швидко розвивається, препарати призначають:**
- 148. Вказати препарат, ефективний відносно еритроцитарних форм плазмодіїв (гематошизотропний засіб):**
- 149. Який препарат ефективний відносно параеритроцитарних форм плазмодіїв:**
- 150. Який препарат ефективний відносно прееритроцитарних форм плазмодіїв:**
- 151. Відзначити амебоцидний препарат, ефективний при будь-якій локалізації патологічного процесу:**
- 152. Відзначити тканинний амебоцид, ефективний при локалізації амев в печінці:**
- 153. Відзначити препарат, ефективний при токсоплазмозі:**
- 154. Відзначити засіб, широко вживаний при лікуванні вісцерального лейшманіозу:**
- 155. Відзначити засіб, вживаний при лікуванні трипаносомозу:**
- 156. Відзначити протигрибковий антибіотик:**

- 157. Відзначити препарат (похідне імідазолу), вживаний при системних глибоких мікозах:**
- 158. Який препарат застосовують при кандидомікозі, що викликається умовно патогенними грибами:**
- 159. Який препарат використовується місцево при дерматомікозах:**
- 160. Які збудники найбільш чутливі до ністатину:**
- 161. Які збудники чутливі до амфотерицину:**
- 162. Що характерно для амфотерицину В:**
- 163. Механізм дії амфотерицину В:**
- 164. Що характерно для ністатину:**
- 165. Що характерно для міконазолу:**
- 166. Що характерно для гризеофульвіну:**
- 167. Що характерно для флуконазолу:**
- 168. Амфотерицин В призначають:**
- 169. Якими шляхами можна вводити ністатин:**
- 170. Яка побічна дія характерна для амфотерицину В при внутрішньовенному введенні:**
- 171. Який з нижче перерахованих противірусних засобів є біологічною речовиною, що продукується клітинами макроорганізму:**
- 172. Відзначити противірусний засіб, похідний пептидів, інгібітор протеаз ВІЛ:**

- 173. Відзначити засіб, який використовується для профілактики грипу типу А:**
- 174. Відзначити противірусний засіб (аналог нуклеозидів), що володіє протигерпетичною активністю:**
- 175. Відзначити противірусний препарат (похідне фосфономурашиної кислоти), який використовується при цитомегаловірусній інфекції:**
- 176. Основні побічні ефекти зидовудину:**
- 177. Вказати основне застосування мідантану:**
- 178. Що характерно для арбідолу:**
- 179. Що характерно для оксаліну:**
- 180. Що характерно для рибавіріну:**
- 181. Якими властивостями окрім противірусної активності володіють інтерферони:**
- 182. Який з перерахованих препаратів діє на вірус імунодефіциту людини (ВІЛ):**
- 183. Вказати препарат вибору для профілактики натуральної віспи:**
- 184. Бета-лактамі антибіотики:**
- 185. До біосинтетичних пеніцилінів відноситься:**
- 186. Напівсинтетичні пеніциліни діють бактерицидно тому, що порушують:**
- 187. Монобактами діють бактерицидно тому, що порушують:**
- 188. Тетрациклін діє бактеріостатично тому, що порушує:**

189. Поліміксин Мдіє бактерицино тому, що порушує:
190. Ріфампіцин діє бактерицидно тому, що порушує:
191. Левоміцетин діє бактеріостатично тому, що порушує:
192. Глікопептиди діють бактерицидно тому, що порушують:
193. Макроліди діють бактеріостатично тому, що порушують:
194. До біосинтетичних пеніцилінів чутливі:
195. До оксациліну чутливі:
196. До ампіциліну чутливі:
197. Напівсинтетичні пеніциліни, що володіють найбільшою активністю відносно синьогнійної палички:
198. Цефалоспорином властиві такі ознаки:
199. Карбапенемам властиві такі ознаки:
200. Азтреонам має таку властивість:
201. До еритроміцину не чутливі:
202. До азитроміцину не чутливі:
203. До тетрацикліну не чутливі:
204. До левоміцетину чутливі:
205. До хлорамфеніколу чутливі:

206. До групи левоміцетину чутливі:
207. До аміноглікозидів не чутливі:
208. До стрептоміцину не чутливі:
209. До поліміксину М сульфату чутливі:
210. До поліміксину М сульфату чутливі такі мікроорганізми:
211. До кліндаміцину чутливі такі мікроорганізми:
212. До глікопептидів чутливі:
213. Для біосинтетичних пеніцилінів характерна така з наведених ознак:
214. Для біосинтетичних пеніцилінів вірним є наступне твердження:
215. Для бензилпеніциліну натрієвої солі характерна така ознака з наведених:
216. Для бензилпеніциліну натрієвої солі характерна така ознака з наведених:
217. На відміну від бензилпеніциліну натрієвої солі, біцилін-5:
218. Для оксациліну характерна така ознака з наведених:
219. Для ампіциліну характерна така ознака з наведених:
220. Для амоксициліну характерна така ознака з наведених:
221. Для карфециліну характерна така ознака з наведених:
222. При вживанні ентерально ефективні:
223. Напівсинтетичний пеніцилін, який не має вираженого широкого спектру дії:

224. У кислому середовищі шлунку стійкі:

225. Напівсинтетичний пеніцилін, який стійкий до бета-лактамаз грампозитивних бактерій:

226. Для цефаклору характерна така ознака:

227. Для цефалоспоринів характерна така ознака з наведених:

228. Для цефалоспоринів вірно:

229. Для цефотаксиму характерна така ознака з наведених:

230. Для цефепіму характерна така ознака з наведених:

231. Для іміпенему характерна така ознака:

232. Для меропенему характерна така ознака:

233. Для азтреонаму характерна така ознака з наведених:

234. Для еритроміцину вірно:

235. Азитроміцин в порівнянні з еритроміцином:

236. Для групи тетрациклінів вірно:

237. Для левоміцетину правильне наступне твердження:

238. Для стрептоміцину правильне наступне твердження:

239. Для поліміксину М вірно наступне твердження:

240. Для кліндаміцину вірно наступне твердження:

241. Для ванкоміцину правильне наступне твердження:

242. Діють, в основному, на грампозитивні бактерії; порушують синтез клітинної стінки; нестійкі до бета-лактамаз грампозитивних бактерій; руйнуються в кислому середовищі шлунку; призначають парентерально:

243. Діє, в основному, на грампозитивні бактерії; порушує синтез клітинної стінки; стійкий до бета-лактамаз грампозитивних бактерій; кислототривкий; призначають всередину і парентерально:

244. Володіє широким спектром дії; порушує синтез клітинної стінки; нестійкий до бета-лактамаз грампозитивних бактерій; кислототривкий; призначають всередину і парентерально:

245. По спектру дії близький до бензилпеніциліну натрієвої солі; порушує синтез білка на рибосомах; здатний накопичуватися у фагоцитах; призначають всередину:

246. Володіють широким спектром дії; володіють високою ефективністю відносно збудників чуми, туляремії, бруцельозу, холери, а також рикетсій, хламідій; порушують синтез білка на рибосомах:

247. Володіє широким спектром дії; володіє ефективністю відносно мікобактерій туберкульозу, синьогнійної палички; порушує синтез білка на рибосомах; володіє бактерицидною дією; погано всмоктується ШКТ; призначають парентерально:

248. Діє, в основному, на грамнегативні бактерії; володіє ефективністю відносно синьогнійної палички; порушує проникність мембрани цитоплазми; погано всмоктується ШКТ; призначають всередину і місцево:

249. Діє, в основному, на стрепто- і стафілококи, бактероїди; порушує синтез білка на рибосомах; володіє бактеріостатичною дією; побічний ефект - псевдомембранозний коліт; добре всмоктується ШКТ; призначають всередину:

250. Діє, в основному, на грампозитивні бактерії; стійкий до бета-лактамаз грампозитивних бактерій; порушує синтез клітинної стінки; погано всмоктується ШКТ; призначають внутрішньовенно:

251. Вибрати вірне показання до застосування бензилпеніциліну натрієвої солі:

252. Вибрати правильне показання до застосування бензилпеніциліну натрієвої солі:

253. Вибрати найбільш підходяще показання до застосування бензилпеніциліну натрієвої солі:

254. Вибрати найбільш точне показання до застосування бензилпеніциліну натрієвої солі:

255. Вибрати найточніше показання до застосування бензилпеніциліну натрієвої солі:

256. При інфекціях, викликаних синьогнійною паличкою застосовують:

257. При інфекціях, викликаних синьогнійною паличкою показаний:

258. Застосовують при інфекціях, викликаних синьогнійною паличкою:

259. Тетрациклін є препаратом вибору при:

260. Тетрациклін являється препаратом вибору при:

261. Тетрациклін застосовується при:

262. Як протитуберкульозний засіб застосовують:

263. Як протитуберкульозний препарат застосовують:

264. Аміноглікозиди застосовують при:

265. Аміноглікозиди використовують при:

266. Аміноглікозиди являються препаратами вибору при:

267. Показання до застосування поліміксину М:

268. Поліміксин М використовують при:

269. Побічні ефекти, пов'язані з хіміотерапевтичною дією антибіотиків:

270. Побічні ефекти антибіотиків, пов'язані з прямим токсичним впливом на органи і тканини:

271. Вибрати побічний ефект антибіотиків, пов'язані з прямим токсичним впливом на органи і тканини:

272. Побічні ефекти пеніцилінів:

273. Вибрати побічний ефект антибіотиків, пов'язані з прямим токсичним впливом на органи і тканини:

274. Побічні ефекти цефалоспоринів:

275. Побічні ефекти макролідів:

276. Побічні ефекти тетрацикліну:

277. Визначити побічний ефект тетрацикліну:

278. Вибрати побічний ефект тетрацикліну:

279. Побічні ефекти левоміцетину:

280. Побічні ефекти аміноглікозидів:

281. Побічні ефекти поліміксину М:

282. Побічні ефекти кліндаміцину:

283. Побічні ефекти ванкоміцину:

284. Ураження нирок можуть викликати:

285. Реакцію "загострення" викликають:

286. Реакцію "загострення" :

287. Реакція "загострення" більшою мірою характерна для:

288. Ототоксичною дією володіють:

289. Пригнічуючим впливом на кровотворення володіє:

290. Пригнічуючим впливом на нервово-м'язову передачу володіють:

291. Антибактеріальний ефект бактерицидних антибіотиків дії бактеріостатичних:

292. М'язорелаксуюча дія курареподібних речовин під впливом аміноглікозидів:

293. Ототоксична дія аміноглікозидів під впливом "" діуретиків (фуросемід, етакринова кислота):

294. Антимікробна дія аміноглікозидів під впливом бета-лактамних антибіотиків:

295. Вибрати невірне твердження:

296. Вибрати неправильне твердження:

297. Вибрати неправильне твердження:

298. Вибрати твердження, яке не відповідає істині:

299. Вибрати правильне твердження:

300. Вибрати невірне твердження:

301. Вибрати вірне твердження:

302. Вибрати істинне твердження:

303. Вибрати неправильне твердження:

304. Вибрати істинне твердження:

305. Вибрати вірне твердження:

306. Вибрати неправильне твердження:

307. Вибрати твердження, яке не відповідає істині:

308. Вибрати правильне твердження:

309. Вибрати вірне твердження:

310. Правильне твердження наступне:

311. Правильне твердження наступне:

312. Невірне твердження наступне:

313. Неправильне твердження наступне:

- 314. Які лікарські засоби з нижченаведених є найбільш ефективними для лікування виразкової хвороби дванадцятипалої кишки ?**
- 315. Як найбільш доцільно приймати антациди при виразковій хворобі шлунка та дванадцятипалої кишки ?**
- 316. При поєднанні виразкової хвороби із захворюваннями печінки протипоказане застосування:**
- 317. При наявності у хворого на виразкову хворобу помірної депресії на фоні рефлюксних явищ препаратом вибору може стати:**
- 318. До препаратів, які підсилюють механізми захисту слизової оболонки шлунка і 12-палої кишки, відносяться :**
- 319. Який з наведених препаратів не рекомендується призначати в комбінації з сукральфатом (вентером) ?**
- 320. Назвіть можливі побічні ефекти циметидину :**
- 321. Назвіть можливі побічні ефекти циметидину :**
- 322. До антацидів відносяться :**
- 323. До побічних дій альмагелю відносяться :**
- 324. Який з наведених препаратів використовується при виразковій хворобі як репарат ?**
- 325. Протипоказанням до призначення солкосерилу хворим на виразкову хворобу є:**
- 326. Гастроцепін при виразці дванадцятипалої кишки призначається :**

327. Який препарат з нижченаведених, що використовується для лікування загострення виразкової хвороби, має виражену цитопротективну дію ?
328. Яким хворим на виразкову хворобу є найбільш показаним еглоніл ?
329. До якої групи медикаментозних препаратів відноситься гастроцепін ?
330. Який з наведених препаратів відноситься до групи блокаторів дофамінових рецепторів ?
331. До препаратів, що знижують продукцію хлористоводневої кислоти, відносяться:
332. До істинних антацидів відноситься :
333. 333. Препаратом вибору для лікування хронічного антрального гастриту є:
334. Які з перерахованих нижче препаратів відносяться до системних антацидних засобів?
335. Який із перерахованих нижче засобів може викликати вторинну гіперсекрецію?
336. Який із перерахованих нижче антацидних засобів містить у своєму складі анестезин?
337. Якому із препаратів властива протизапальна і спазмолітична дія?
338. Який із перерахованих нижче засобів може викликати розвиток ниркової недостатності?
339. Який із перерахованих нижче засобів відноситься до селективних М-холіноблокаторів?

- 340. Скільки разів на добу призначається препарат гастроцепін?**
- 341. Який із перерахованих нижче засобів відноситься до H2-холіноблокаторів?**
- 342. Які покази до призначення препарату Гастроцепін?**
- 343. Які покази до призначення препаратів фармакотерапевтичної групи H2-гістаміноблокаторів?**
- 344. Які фармакологічні ефекти властиві H2-гістаміноблокаторам?**
- 345. З якими препаратами не можна одночасно призначати H2-гістаміноблокатори?**
- 346. Для яких препаратів із групи H2-гістаміноблокаторів не характерний синдром «рикошету»?**
- 347. Для яких препаратів із групи H2-гістаміноблокаторів характерний синдром «рикошету»?**
- 348. До якої групи належить препарат Рабепразол?**
- 349. При яких захворюваннях призначаються ЛЗ з групи інгібіторів протонної помпи?**
- 350. Яку фармакологічну дію мають препарати фармакотерапевтичної групи інгібіторів протонної помпи?**
- 351. В якому середовищі препарати групи інгібіторів протонної помпи проявляють свої фармакологічні властивості?**
- 352. З чим пов'язана бактеріостатична дія препаратів групи інгібіторів протонної помпи?**

- 353. Чому не бажано раптово відмінити препарати групи інгібіторів протонної помпи?**
- 354. До якої групи належить препарат Мізопростол?**
- 355. Покази до призначення препарату Мізопростол:**
- 356. До якої групи належить препарат Сукралфат?**
- 357. Якому із перерахованих нижче препаратів властива антихелікобактерна дія?**
- 358. Якому із перерахованих нижче препаратів не властива антихелікобактерна дія?**
- 359. Чому не бажано застосовувати антациди разом з препаратом Сукралфат?**
- 360. Які протипокази до призначення ЛЗ групи гастроцитопротекторів?**
- 361. Які побічні ефекти характерні для препарату Мізопростол?**
- 362. Які побічні ефекти характерні для препаратів групи H2-гістаміноблокаторів?**
- 363. Які побічні ефекти характерні для препаратів групи інгібіторів протонної помпи?**
- 364. До якої групи належить препарат Карбеноксолон?**
- 365. Які проти покази до призначення препарату Карбеноксолон?**
- 366. Для лікування пацієнта з пептичною виразкою шлунку показано приймання препарату з гастроцитопротекторною активністю. Виберіть цей препарат.**

367. Найефективнішим препаратом в профілактиці ерозивного гастродуоденіту, спровокованого НПЗЗ, є:

368. При тривалому прийманні антацидів, які містять алюміній, відмічається:

369. Хвора М. випадково випила розчин, який виявився лугом. Який із перерахованих засобів можна призначити хворій, оскільки промивання шлунку в даному випадку протипоказане?

370. Хворий В. 43 років поступив в приймальне відділення лікарні і був госпіталізований з діагнозом - пептична виразка шлунку, ускладнена кровотечею. Який із перерахованих засобів необхідно призначити хворому?

371. Хвора з хронічним гіперацидним гастритом приймала препарат для зменшення печії і больового синдрому. У зв'язку із забарвлення калу в чорний колір звернулася у відділення з метою з'ясування причини. Після огляду кровотеча була виключена. Який препарат міг викликати подібні зміни?

372. Хвора з метою ліквідації печії випила розчин натрію гідрокарбонату, проте через деякий час печія відновилася, з'явилося відчуття дискомфорту в епігастральній ділянці. З чим пов'язано виникнення даних ускладнень?

373. Хворий поступив у приймальне відділення з діагнозом: « Хронічний панкреатит». Який із ЛЗ доцільно призначити хворому в комбінованій терапії з метою пригнічення зовнішньої секреції підшлункової залози?

374. Хворий скаржиться на болі у шлунку, печію. При обстеженні виявлено підвищення кислотності шлункового соку. Що необхідно призначити хворому у цьому випадку?

375. У стаціонар поступив хворий з діагнозом “Виразкова хвороба 12-палої кишки в фазі загострення.” Лабораторні дослідження показали підвищення секреторної і кислотоутворюючої функції шлунку. Виберіть препарат, який знизить секреторну функцію залоз шлунку за рахунок блокади H₂-рецепторів.

376. У хворого 40 років, виразка шлунку у стадії загострення із значним підвищенням кислотності шлункового соку, больовим та диспептичним синдромом. Виберіть відповідний засіб:

377. Хворий скаржиться на болі у шлунку, печію. При обстеженні виявлено підвищення кислотності шлункового соку. Що необхідно призначити хворому у цьому випадку?

378. Хворий з хронічним гіперацидним гастритом для усунення печії приймає антацидний засіб, після прийому якого відмічає покращення, однак разом з тим виникає відчуття розпирання в шлунку. Який із перерахованих препаратів міг викликати вказаний побічний ефект.

379. Хворому з виразковою хворобою призначено фамотидин. Кислотність шлункового соку значно знизилась. Який механізм лежить в основі дії цього препарату?

380. Хворий з виразковою хворобою шлунку приймав антацидний препарат альмагель. Для лікування гострого бронхіту йому призначили антибіотик аугментин. Проте протягом 5 днів температура не знизилась, кашель і характер харкотиння не змінились. Лікар прийшов до висновку про несумісність ліків при їх взаємодії. Про який саме вид несумісності ліків йде мова?

381. Хворому виразковою хворобою шлунку на фоні підвищеної кислотності шлункового соку в стадії загострення [в анамнезі якого є глаукома] необхідно призначити М-холіноблокуючий засіб. Якому з наведених засобів надати перевагу, враховуючи супутнє захворювання?

382. У стаціонар поступив хворий з діагнозом “ГЕРХ у фазі загострення.” . Виберіть найоптимальніший препарат для лікування цього хворого.

383. Хворий Н., 40 років, страждає на пептичну виразку шлунка із значним підвищенням кислотності шлункового соку, больовим та диспептичним синдромом. Виберіть відповідний засіб:

384. Хворий скаржиться на болі у шлунку, печію. При обстеженні шлункового соку виявлено підвищення кислотності шлункового соку. Що необхідно призначити хворому для нейтралізації кислотності шлункового соку?

385. Чоловіку 42 років, що страждає на виразкову хворобу 12-палої кишки призначені такі препарати: амоксицилін, кларитромцилін, лансопразол. Терапія виявилась доцільною. Яка основна причина високої ефективності цього комплексу препаратів?

386. До гастроентерологічного відділення госпіталізовано чоловіка 25 років зі скаргами на голодні болі, відчуття важкості за грудиною, печію. Лікар призначив гастрोцепін. Яка фармакодинамічна властивість гастрोцепіну примусила лікаря зробити цей вибір?

387. У хворого на виразкову хворобу шлунка з гіперацидним синдромом відзначається схильність до закрепів. Який антацидний препарат раціонально йому призначити?

388. Хворий, 32 років, поступив на лікування з діагнозом виразкова хвороба 12-палої кишки. Лікар призначив у комплексній терапії омепразол. Яким лікарським засобом можна замінити цей препарат?

389. У хворого 28 років, на пептичну виразку шлунка виявлено, що його секреторна функція різко підвищена. Який з наведених препаратів бажано призначати у цьому випадку?

390. Хворому К, 54 років, який кілька років страждає хронічним гіперацидним гастритом, призначений альмагель. Які ускладнення фармакотерапії з боку органів травлення можуть виникнути перш за все?

391. Хворому з приводу захворювання на пептичну виразку 12-палої кишки призначено де-нол. Поясніть пацієнту, як правильно вживати препарат.

392. Пацієнт К. з пептичною виразкою 12-палої кишки звернувся до лікаря з питанням про найбільш оптимальний час приймання маалокса.

393. Хворому з виразковою хворобою шлунку, був призначений противиразковий препарат, який володіє здатністю одночасно понижувати секрецію соляної кислоти і пригнічувати мікроорганізм хелікобактер пілорі. Назвіть цей препарат.

394. Хворому на пептичну виразку шлунку призначено антацидний препарат фосфалюгель. Для лікування гострого слизово-гнійного бронхіту йому призначили антибіотик спіраміцин. Проте протягом 3 днів клінічний перебіг хвороби не змінився. Лікар прийшов до висновку про несумісність ліків. Про який саме вид несумісності ліків йде мова?

395. На фоні підвищеної кислотності хворому на пептичну виразку шлунка в стадії загострення (в анамнезі якого є глаукома) необхідно призначити М-холіноблокуючий засіб. Якому з наведених засобів надати перевагу, враховуючи супутні захворювання?

396. 28. Хворий 28-ти років звернувся до лікаря зі скаргами на безсоння, що проявляється у важкому засинанні і ранньому пробудженні. В результаті цього він не висипається і на наступний день почуває втому, важко засвоює навчальний матеріал. Лікар встановив, що безсоння пов'язане з неврозоподібним станом. Який із перерахованих засобів доцільно призначити хворому?:

397. У гастроентерологічне відділення поступив хворий з діагнозом “Пептична виразка 12-палої кишки в фазі загострення.” Аналіз шлункового соку показав підвищення секреторної і кислотоутворюючої функції шлунку. Виберіть препарат, який знизить секреторну функцію залоз шлунку.

398. Протягом двох тижнів хвора приймала призначену невропатологом мікстуру з приводу неврастенії. Самопочуття хворої декілька покращилось, однак незабаром з'явилися скарги на нежить, кон'юктивіт, шкірні висипи, в'ялість та послаблення пам'яті. Препарат якої групи міг визвати подібну побічну дію?

399. Хворий скаржиться на відчуття важкості та болі в епігастрії, печію. При обстеженні шлункового соку виявлено підвищення кислотності шлункового соку. Що необхідно призначити хворому для нейтралізації кислотності шлункового соку?

400. Чоловік 57 років поступив до хірургічного відділення з явищами гострого панкреатиту: болі у животі, блювота, пронос, гіпотензія, слабкість, явища зневоднювання організму. Який препарат найбільш доцільно використати в першу чергу?

401. Хворий 58 років, що страждає на шизофренію, тривалий час приймав психотропні засоби. Він звернувся до лікаря зі скаргами на порушення координації рухів, тремор у руках, сонливість. Яка група препаратів може викликати такі побічні ефекти?

402. Хворий 25 років звернувся до лікаря зі скаргами на застуду. У хворого спостерігається апатія, нежить, кашель, сльозотеча, на шкірі вугруватий висип, температура в нормі. Встановлено, що хворий страждає неврозом і тривалий час приймає препарати для його лікування. Який препарат став причиною подібних клінічних проявів?

403. Хвора 35 років звернулась до лікаря з скаргами на порушення сну, що проявлялося погіршенням засинання і пробудженнями серед ночі. Який снодійний засіб необхідно призначити у такому випадку?

404. До лікаря зі скаргами на болі в колінних суглобах звернувся пацієнт, 48 років. При огляді виявлено: припухлість, почервоніння в ділянці цих суглобів, болючість при пальпації.. Лабораторне дослідження показало позитивні ревмопроби. Які препарати мають бути використані для лікування хворої ?

405. Хворій на ревматоїдний поліартрит призначили нестероїдний протизапальний засіб диклофенак. Через деякий час його застосування у хворої виникло загострення супутнього захворювання, що сприяло відміні препарату. Яке супутнє захворювання могло призвести до відміні препарату?

406. Хвору 30 років турбують відчуття переповнення в епігастрії, раннього насичення після прийому їжі, вздуття у верхній частині живота; нудота, загальна слабкість. Об'єктивне та лабораторне обстеження відхилень від норми не виявило. ФЕГДС: слизова оболонка стравоходу, шлунку та дванадцятипалої кишки не змінена. При УЗД органів черевної порожнини відхилень від норми не виявлено. Який препарат доцільно призначити хворій?

407. Хвора С., 38 років, скаржиться на ниючий біль в правому підребер'ї, свербіж шкіри, підвищення температури ввечері, зноблення. При огляді: виснажена, шкіра жовтушна. Печінка на 3 см виступає з-під краю правої реберної дуги, ущільнена, болюча. Ан. крові: лейкоц. 11,8 гл, ШОЕ 27 мм/год. З якого препарату треба почати лікування?

408. Має широкий спектр протимікробної дії, найбільш чутливі до нього стафілококи та мікобактерії туберкульозу. Дія пов'язана з пригніченням синтезу РНК бактерій. Добре всмоктуються ШКТ. Має гепатотоксичну дію, викликає алергічні реакції, забарвлює сечу, харкотиння і слюзну рідину в червоний колір.

409. Лікар призначив хворому на ентероколіт одночасно вживати фторхінолон (ципрофлоксацин) та обволікаючий засіб (сметта). Завідувач відділення вважає призначення помилковим. До якого наслідку призводить поєднання цих препаратів?

410. Хворому з генералізованою формою сальмонельозу була призначена антибактеріальна терапія. Через деякий час при проведенні загального аналізу крові була виявлена ретикул- і гранулоцитопенія, відмічалось деяке зниження кількості еритроцитів. При призначенні якого антибіотика найбільш можлива подібна зміна картини крові?

411. Чоловік 56 років поступив у пульмонологічне відділення з діагнозом позашпитальна пневмонія. З анамнезу відомо, що у нього алергічна реакція на всі бета-лактамі антибіотики. Який з нижченаведених препаратів можна призначати цьому хворому?

412. Хворий, 19 років, скаржиться на сухий кашель, біль у м'язах, підвищення температури тіла до 39 0C. Протягом тижня спостерігались біль у горлі, субфебрилітет. Об'єктивно: жорстке дихання. У крові: л. - 7,0109 /л, лейкоцитарна формула в нормі. ШОЕ - 26 мм/год. Дані рентгенографії органів грудної клітки: посилення легеневого малюнка, вогнищеві тіні слабкої інтенсивності в нижніх відділах правої легені. Які препарати доцільно призначити?

413. Лікар-інтерн призначив хворому на ентероколіт одночасно вживати фторхінолон (ципрофлоксацин) та обволікальний засіб (сукралфат). Завідувач відділення вважає призначення помилковим. До якого наслідку призводить поєднання цих препаратів?

414. У психічному статусі хворого, 32 років, стійке патологічне зниження настрою. Контактний. Коротко, але по суті відповідає на запитання. Мовна продукція вкрай лаконічна, в уповільненому темпі. Висловлює ідеї самозвинувачення і самоприпинення. Препарати якої групи в першу чергу показані хворому?

415. Хворий з підвищеною кислотністю приймав антацидний препарат альмагель. Для лікування гострого бронхіту йому призначили антибіотик кларитроміцин. Проте протягом 5 днів температура не знизилась, кашель і характер харкотиння не змінились. Лікар прийшов до висновку про несумісність ліків при їх взаємодії. Про який саме вид несумісності ліків йде мова?

416. Хворому на хронічний панкреатит в стадії загострення (в анамнезі якого є глаукома) необхідно призначити М-холіноблокуючий засіб. Якому з наведених засобів надати перевагу, враховуючи супутні захворювання?

417. Хворий 18-ти років звернувся до лікаря зі скаргами на безсоння, що проявляється у важкому засипанні. В результаті цього він не висипається і на наступний день почуває втому, важко засвоює навчальний матеріал. Лікар встановив, що безсоння пов'язане з невротоподібним станом. Зробіть раціональний вибір снодійного засобу:

418. До стаціонару поступила хвора з діагнозом “Виразкова хвороба 12-палої кишки в фазі загострення.” Аналіз шлункового соку показав підвищення секреторної і кислотоутворюючої функції шлунка. Виберіть препарат, який знизить секреторну функцію залоз шлунка за рахунок блокади H₂-рецепторів.

419. Хворий на епілепсію протягом довгого часу одержує фенobarбітал в добовій дозі 0,2. За останній час у нього стали частішими напади, спостерігається пригнічений настрій. Чим викликане погіршення стану хворого?

420. Хвора протягом двох тижнів приймала призначену невропатологом мікстуру з приводу неврастенії. Самопочуття хворої через декілька днів покращилось, однак незабаром з'явилися скарги на нежить, кон'юнктивіт, шкірні висипи, в'ялість та послаблення пам'яті. Препарат якої групи міг визвати подібну побічну дію?

421. Хворий скаржиться на болі у шлунку, печію. При обстеженні пацієнта виявлено підвищення кислотності шлункового соку. Що необхідно призначити хворому для нейтралізації кислотності шлункового соку?

422. Чоловік 47 років поступив до хірургічного відділення з явищами гострого панкреатиту: блювота, пронос, брадикардія, гіпотензія, слабкість, явища зневоднювання організму. Який препарат найбільш доцільно використати в першу чергу?

423. Хворий 38 років, що страждає на шизофренію, тривалий час приймав психотропні засоби. Він звернувся до лікаря зі скаргами на порушення координації рухів, тремор у руках, сонливість. Яка група препаратів може викликати такий симптомокомплекс?

424. У поліклініку звернувся хворий 35 років зі скаргами на тривалу застуду. У хворого спостерігається апатія, нежить, кашель, слезотеча. Температура нормальна. На шкірі вугруватий висип. Із анамнезу з'ясовано, що хворий страждає неврозом, він тривалий час приймав препарати для лікування неврозу. Який препарат став причиною ускладнення?

425. Хворий протягом двох тижнів отримувал л фармакотерапію з приводу психозу. Стан хворого поліпшився, однак невдовзі з'явилась ригідність, тремор, гіпокінезія. Який з перелічених препаратів виклакає вказані ускладнення?

426. До лікаря звернувся хворий зі скаргами на нездужання, пригнічений настрій, появу “прищів” на шкірі. При опитуванні з'ясувалося, що хворий протягом останніх 3 тижнів приймав мікстуру, яку виписав невропатолог. З прийомом препаратів якої групи зв'язані скарги пацієнта?

427. Хвора 45 років звернулась до лікаря з скаргами на порушення сну, що проявлялося погіршенням засинання і пробудженнями серед ночі. Лікар призначив хворій снодійний засіб. Який вид фармакотерапії використав лікар?

428. Пацієнтка 57 років, за спеціальністю бухгалтер, у зв'язку з хронічними закрепамі приймала за призначенням лікаря екстракт крушини сухий, який протягом 2 тижнів виявляв позитивну лікувальну дію, але далі його ефективність суттєво зменшилась. Визначте, яка реакція розвинулася у хворої у відповідь на повторне введення ліку?

429. Хворому з депресивним синдромом лікар призначив препарат, наголосивши на необхідності виключити з раціону харчові продукти, що містять тирамін (сир, пиво, копченості тощо). Проте через деякий час хворий став порушувати дієту і в нього виникла гіпертензія. Який препарат було призначено хворому

430. Жінка звернулась до лікаря зі скаргою на болі у колінних суглобах, суглобах кистей. При огляді виявлено: припухлість, почервоніння, гіпертермію в ділянці цих суглобів. Лабораторне дослідження показало позитивні ревмопроби. Які препарати мають бути використані для лікування хворої ?

431. Хвора 63 років з артритом на тлі лікування ацетилсаліциловою кислотою (аспірин) поскаржилась на нудоту, тяжкість в епігастрії. Лікар відмінив аспірин і призначив протизапальний засіб із групи селективних інгібіторів ЦОГ-2. Назвіть потрібний для хворої препарат.

432. Хворій на ревматоїдний поліартрит призначили нестероїдний протизапальний засіб індометацин. Через деякий час після його застосування у хворої виникло загострення супутнього захворювання, що змусило відмінити препарат. Яке захворювання могло призвести до відміни препарату?

433. Госпіталізовано чоловіка 25 років зі скаргами на голодні болі, відчуття важкості за грудиною, печію. Лікар призначив гастроцепін. Яка фармакологічна дія препарату примусила лікаря зробити цей вибір??

434. Хворого турбують відчуття переповнення в епігастрії, раннього насичення після прийому їжі, вздуття у верхній частині живота; нудота, загальна слабкість, дратівливість. Об'єктивне та лабораторне обстеження відхилень від норми не виявило. Який препарат доцільно призначити хворому?

435. Хвора С., 35 років, скаржиться на ниючий біль у правому підребер'ї, свербіж шкіри, підвищення температури ввечері. При огляді: виснажена, шкіра жовтушна. Печінка на 3 см виступає з-під краю правої реберної дуги, ущільнена, болюча. Ан. крові: лейк. 10,8 гл, ШОЕ 25 мм/год. З якого препарату треба почати лікування?

436. .Відноситься до антибіотиків дія, яких пов'язана з пригніченням синтезу РНК бактерій. Добре всмоктується в ШКТ. Має гепатотоксичну дію, викликає алергічні реакції, забарвлює сечу, харкотиння і слизову рідину в червоний колір. Визначити препарат.

437. Для лікування хворого з сальмонельозом була призначена антибактеріальна терапія. Через деякий час при проведенні загального аналізу крові було виявлено ретикул- і гранулоцитопенію, відмічалось деяке зниження кількості еритроцитів. При застосуванні якого антибіотика можлива подібна зміна картини крові?

438. Чоловік 70 років поступив з діагнозом позалікарняна пневмонія, 3 категорія. З анамнезу відомо, що у нього алергічна реакція на всі бета-лактамі антибіотики. Який з нижченаведених препаратів можна призначати цьому хворому?

439. Хворий, 29 років, скаржиться на сухий кашель, підвищення температури тіла до 39 0С. Протягом тижня спостерігались біль у горлі, субфебрилітет. Об'єктивно: жорстке дихання. У крові: л. - 8,0109 /л, лейкоцитарна формула в нормі. ШОЕ - 28 мм/год. Дані рентгенографії органів грудної клітки: посилення легеневого малюнка, вогнищеві тіні слабкої інтенсивності в нижніх відділах правої легені. Які препарати доцільно призначити?

440. Хворий, 20 років, яка перебуває на лікуванні та обстеженні в гастроентерологічному відділенні, встановлено діагноз гепатиту. Яка група препаратів входить до базисної терапії хворої?

441. Хвору, 40 років, непокоїть біль у суглобах пальців рук, колінних і променево-зап'ястковому суглобах зранку, у спокої та при навантаженні, скутість до обіду, підвищення температури тіла. Нижче правого колінного суглоба визначається невеличкий еластичний вузлик. Аналіз крові: ер. - 2,91012/л, Нб - 97 г/л, л. - 9,9109/л. Сечова кислота - 0,38 ммоль/л, сіалові кислоти - 0,26 од., СРП - +++. На рентгенограмі кисті остеопороз. Який препарат є базисним для лікування?

442. У психічному статусі хворого, 32 років, стійке патологічне зниження настрою. Контактний. Коротко, але по суті відповідає на запитання. Мовна продукція вкрай лаконічна, в уповільненому темпі. Висловлює ідеї самозвинувачення і самоприпинення. Препарати якої групи в першу чергу показані хворому?

443. Хвора, 36 років, скаржиться на загальну слабкість, збудливість, тяжкість в правому підребер'ї, субфебрилітет. 4 роки тому перехворіла на вірусний гепатит. Зазначені скарги поступово наростали протягом останніх 3 міс. Об'єктивно: печінка виступає на 3 см з-під краю ребрової дуги. Лабораторно: загальний білірубін - 64,5 мкмоль/л, прямий - 22,7 мкмоль/л, (-глобуліни - 31 %, АсАт - 1,42 ммоль/год.л, АЛТ - 1,96 ммоль/год.л. Виявлено ознаки активної реплікації вірусу (HBeAg - позитивна реакція). Який з препаратів для етіотропного лікування найбільш ефективний?

444. У хворого дрібновузловий цироз печінки. Протягом останніх 2 міс. з'явилася задишка, набряки на нижніх кінцівках, асцит. Хворий приймав гепатопротектори і глюкокортикоїди. Яку комбінацію додати до лікування, що вже проводиться?

445. У стаціонар поступила хвора 32 років з вовчаковим кризом, високою клініко- лабораторною активністю, температурою тіла 39,5 0 С. Яке лікування даної хворої?

446. У чоловіка , 38 р., півроку тому під час лікування в клініці з приводу виразкової хвороби дванадцятипалої кишки було виявлено підвищення рівня холестерину до 8,0 ммоль/л. Після гіпохолестеринемічної дієти протягом 6 міс. і занять ранковою гімнастикою холестерин залишався в межах 7,4-7,8 ммоль/л. З анамнезу відомо, що батько хворого помер від ІХС у 45 років. Об’єктивно: зріст 175 см, маса тіла - 78 кг, пульс - 80 за 1 хв, АТ - 130/80 мм рт.ст. Змін з боку внутрішніх органів не виявлено. Яке медикаментозне лікування доцільно призначити пацієнту для первинної профілактики ІХС?

447. Хворому на інфільтративний туберкульоз легень призначено стрептоміцин, рифампіцин, ізоніазид, піразинамід, вітамін С. Через 1 міс від початку лікування хворий почав скаржитись на зниження слуху, шум у вухах. Які з призначених ліків мають такий побічний вплив?

448. Жінка, 55 років, скаржиться на біль у правому підребер’ї з іррадіацією під праву лопатку, пов’язаний із вживанням жирної їжі, нудоту, поганий сон. Хворіє на хронічний холецистит протягом 12 років. Об’єктивно: помірний метеоризм, болючість у точці проекції жовчного міхура, позитивний симптом Ортнера. Температура тіла - 37,7 0С. У крові: л. - 12,7109/л, п. - 16 %, ШОЕ - 27 мм/год. Під час мікроскопічного дослідження другої порції дуоденального вмісту виявлено багато слизу, клітин десквамованого епітелію, лейкоцити. Який антибактеріальний препарат найдоцільніше призначити хворій?

449. Чоловік, 62 років, протягом року лікується в дільничного терапевта з приводу подагри. Лікар вирішив призначити йому препарат, який пригнічує синтез сечової кислоти. Який з наведених препаратів було призначено хворому?

450. Чоловік, 20 років, скаржиться на пекучий стесний біль у надчеревній ділянці, печію, відрижку кислим. Об’єктивно: стан задовільний. Під час пальпації визначається болючість у надчеревній ділянці. ФГДС з морфологією біоптатів патології з боку слизової оболонки не виявила. Призначення якого препарату буде найбільш ефективним?

451. У жінки, 42 років, що протягом 5 років хворіє на неспецифічний виразковий коліт, під час ректороманоскопії виявлено виражений запальний процес у нижніх відділах кишечника, псевдополіпозні зміни слизової оболонки. У крові: ер. - 3,01012/л, л. - 9,8109/л, ШОЕ - 52 мм/год. Які препарати є патогенетичними при даній хворобі?

452. У чоловіка, 32 років, який перебуває під наглядом лікаря протягом 2 років з приводу ревматизму та мітральної вади серця, після переохолодження заболіло горло, було діагностовано ангіну. Яке лікування треба призначити хворому для поточної профілактики ревматизму?

453. У юнака, 18 р., уперше діагностовано виразку цибулини дванадцятипалої кишки. Тест на *Helicobacter Pylori* - позитивний, рН шлункового соку - 2,0. Яка схема лікування є найбільш доцільною в даному випадку?

454. Хворий на хронічний вірусний гепатит, 32 років, скаржить на тупий, ниючий біль у правому підребер'ї, нудоту, сухість. Розмір печінки за Курловим - 13-12-11 см, селезінка збільшена на 2 см. АсАТ - 3,2 мкмоль/(год.л), АлАТ - 4,8 ммоль/(год.л). Серологічне дослідження: HBeAg, висока концентрація ДНК - HBV. Який з наведених нижче лікарських засобів є препаратом вибору в лікуванні даного хворого?

455. Жінка 41 року, протягом 8 років хворіє на хронічний холецистит. Турбує майже постійний монотонний ниючий біль або відчуття тяжкості у правому підребер'ї, відчуття гіркоти у роті зранку, закреп. Під час пальпації живота відмічається незначна болючість у точці проекції жовчного міхура. Об'єм міхура після жовчогінного сніданку зменшився лише на 15% (за даними УЗД). Призначення яких лікарських засобів найбільш доцільне?

456. Початок хвороби у дівчини, 18 р., був раптовим: озноб, температура тіла 39,0 °C, головний біль, критичне погіршення стану протягом декількох годин. Об'єктивно: стан у край тяжкий, адинамія, протрація, температура тіла 36,0 °C, численна геморагічна висипка на кінцівках, тулубі, сідницях. Менінгеальний синдром помірний, ЧСС 130 за 1 хв, АТ - 60/20 мм рт.ст. Напередодні 3 дні відчувала легкій біль у горлі, закладання носа. Який антибіотик буде препаратом першого вибору?

457. Чоловік, 27 років, 12 років хворіє на виразкову хворобу з локалізацією виразки в дванадцятипалій кишці. Теперішнє погіршення стану спостерігається протягом 2 тиж. Яка патогенетично обумовлена схема терапії для цього хворого?

458. Жінка, 49 р., скаржиться на біль у плечових суглобах та суглобах кистей, що посилюється під час рухів, обмеження рухливості, короткочасну ранішню скутість. На рентгенограмі плечових суглобів: звуження суглобової щілини, субхондральний остеосклероз, остеофіти у нижньовнутрішньому відділі головки плечової кістки. Яка найбільш доцільна базисна терапія?

459. У пацієнта, 27 років, який зловживає алкоголем, діагностовано правобічну нижньочасткову пневмонію. На рентгенограмі - інфільтративні зміни справа в нижніх відділах легені. Раніше захворювань бронхолегеневої системи не спостерігалось. З якого препарату слід розпочинати антибактеріальну терапію?

460. Жінка, 51 року, хворіє на суглобову форму ревматоїдного артрити з ураженням дрібних суглобів кистей, приймає нестероїдні протизапальні засоби, але захворювання прогресує, з'явився біль у колінних та гомілково-стопних суглобах, ранішня скутість до 12-ї години дня. Яку комбінацію ліків доцільно призначити хворій?

461. У чоловіка, 60 років, який тривалий час страждає на хронічний обструктивний бронхіт і багато палить, посилився сухий кашель, підвищилася температура тіла до 37,50С, з'явилися загальна слабкість і втомлюваність. Клініко-рентгенологічних даних пневмонії не виявлено. ОФВ1 - 70 % від норми. ШОЕ - 37 мм/год. Провести бактеріологічне і мікробіологічне дослідження неможливо. Включення якого з антибіотиків у комплексне лікування є виправданим?

462. У чоловіка, 46 років, виявлено пневмонію із множинними порожнинами розпаду в обох легенях. Лікування пеніциліном було неефективним. З бронхопульмонального лаважного вмісту було висіяно золотистий стафілокок, який має стійкість до метициліну. Призначення якого з антибактеріальних засобів є оптимальним в даній ситуації?

463. Після клініко-рентгенологічного і лабораторного обстеження хворого, 35 років, було встановлено попередній діагноз: атипова пневмонія [Д10] мікоплазмової етіології, середньої тяжкості, ЛН 1. Із препаратів якої групи доцільніше розпочати лікування даного хворого?

464. У хворого, 60 років, під час обстеження виявлено хронічний аутоімунний гастрит із секреторною недостатністю. Який препарат найбільш показаний даному хворому?

465. У хворої на ревматоїдний артрит, 27 років, протягом 7 міс об'єктивно спостерігають набряки ліктьових, променево-зап'ясткових, колінних та гомілково-стопних суглобів, ревматоїдні вузлики в ділянці ліктьових суглобів. У крові: ШОЕ - 56 мм/г, СРБ (+++). На рентгенограмах суглобів - виражений остеопороз. Який препарат слід використати для базисної терапії в даній ситуації?

466. У пацієнта, 56 років, виявлено помірну іктеричність шкіри і склер, збільшення розмірів печінки і селезінки. Три роки тому лікувався з приводу гепатиту В. У крові: HbsAg, HbeAg (+). Висока концентрація ДНК-НВV. Який із наведених засобів найбільш ефективний для базової терапії захворювання?

467. Хворому, 42 років, встановлено діагноз неспецифічного виразкового коліту. З якого препарату потрібно почати лікування?

468. До терапевтичного відділення поступила хвора 28 років зі скаргами на голодні болі, відчуття важкості за грудиною, печію. Лікар призначив препарат з групи M1-холіноблокаторів. Яка фармакодинамічна властивість гастроцепіну примусила лікаря зробити цей вибір?

469. Хворий 45 років, що страждає на психічне захворювання, тривалий час знаходився на лікуванні психотропними засобами. Він звернувся до лікаря із скаргами на порушення координації рухів, тремор у руках, сонливість. Яка група препаратів можуть викликати такий симптомокомплекс?

470. У вагітної виник гострий трахеобронхіт. Для лікування цієї інфекції був призначений антибіотик з групи пеніцилінів. Визначте, який з наведених антибактеріальних засобів

471. Жінка в період вагітності тривалий час без контролю лікаря приймала антибіотик. Через деякий час у неї погіршився апетит, з'явилися нудота, пронос, зміни слизових оболонок ротової порожнини та шлунково-кишкового тракту. З часом виникла жовтяниця. У новонародженого відмічено порушення росту кісток. Який препарат приймала жінка?

472. Жінка 50 років одержала з позитивним результатом курс терапії оксациліном з приводу гнійного запалення кисті правої руки. Але на початку лікування їй вводили бензилпеніцилін, який виявився неефективним. Як пояснити добру терапевтичну дію оксациліну в порівнянні з бензилпеніциліном?

473. Хворий звернувся до лікаря зі скаргами на забарвлення сечі та слізної рідини в червоний колір. З анамнезу відомо, що він лікується з приводу легеневого туберкульозу. З застосуванням якого протитуберкульозного засобу пов'язане дане явище?

474. Хворому 45 років на пневмонію був призначений антибіотик з групи пеніцилінів. При проведенні проби на індивідуальну переносимість до антибіотику стан хворого різко погіршився: хворий покритися холодним потом, з'явилась ядуха, втратив свідомість. Пульс 130 за хв., АТ - 80/40 мм.рт.ст. Яким із перелічених препаратів краще лікувати хворого?

475. У хворої 18 років скарги на біль в епігастрії після прийому кислої їжі без чіткої залежності від часу її прийому. Хворіє 10 років. Об'єктивно: обкладений язик осугою і розлитий біль в епігастрії. Яку із перерахованих груп препаратів слід включити у лікування хворої?

476. У хворої після проведення ФГЕДС виявлено дуодено-гастральний рефлюкс і гіпертрофію складок пілороантрального відділу. В аналізі шлункового вмісту - вільна соляна кислота відсутня у всіх порціях. Які із середників повинні бути включені у лікування хворої?