

ЗАВАНТАЖЕНО З САЙТУ ТЕСТУВАННЯ.УКР

Дитяча терапевтична стоматологія - база тестів 2010 року

Категорія: **Бази тестів українською мовою 2010 року**

Кількість запитань: **297**

1. У хлопчика 9 років в 46 зубі в межах "сліпої" ямки виявлено каріозну порожнину в межах плащового пігментованого дентину. Зондування дна безболісне, під час препарування емалево-дентинного сполучення виникає біль. Перкусія 46 - безболісна. Найбільш вірогідний діагноз?

*** А) Хронічний середній карієс**

- В) Гострий середній карієс
- С) Хронічний фіброзний пульпіт
- Д) Хронічний періодонтит
- Е) Місцева гіпоплазія

2. Дитина 3-х років скаржиться на наявність порожнини в 84 зубі. Об'єктивно: в зубі на жувальній поверхні каріозна порожнина в межах плащового дентиту. Дентин розм'якшений, зондування стінок порожнини болісне, перкусія безболісна. Визначити діагноз.

*** А) Гострий середній карієс.**

- В) Хронічний поверхневий карієс.
- С) Гострий поверхневий карієс.
- Д) Гострий глибокий карієс.
- Е) Хронічний глибокий карієс.

3. Хвора 42 років скаржиться на наявність виразок у порожнині рота та болі під час прийому гарячої та гострої їжі на протязі тижня. Об'єктивно: на слизовій оболонці щок велика ділянка гіперемії, в якій виявляються поверхневі дефекти епітелію до 5 мм в діаметрі і "перламутрові" папули у вигляді мережива навколо. Який найбільш вірогідний діагноз?

*** А) Червоний плоский лишай, ерозивно-виразкова форма**

- В) Лейкоплакія, ерозивна форма
- С) Червоний вовчак, ерозивна форма
- Д) Червоний плоский лишай, ексудативно-гіперемічна форма
- Е) Вульгарна пухирчатка

4. Хлопчик 9-ми років скаржиться на біль, що виник вчора у постійному молярі на нижній щелепі зліва і посилюється при накушуванні. Присутнє відчуття “зуба, що виріс”, зуб раніше не лікувався. Об’єктивно: коронка зуба змінена в кольорі, незначно зруйнована. Перкусія різко болісна. Слизова оболонка в області проекції верхівок зуба гіперемійована, болісна при пальпації. Назвіть найбільш вірогідний діагноз?

*** А) Загострення хронічного періодонтиту.**

В) Гострий серозний періодонтит.

С) Гострий гнійний періодонтит.

Д) Гострий гнійний періостит.

Е) острый гнойный пульпит.

5. При обстеженні дитини 5-ми років був встановлений діагноз гострого загального пульпіту 74 зуба. Який метод лікування найбільш раціональний в данному випадку?

А) Вітальна ампутація.

*** В) Екстерпація пульпи.**

С) Девітальна ампутація .

Д) Біологічний метод.

Е) Видалення зуба.

6. Батьки 5-місячної дитини скаржаться на відмову дитини від їжі, наявність виразки на піднебінні. Дитина народилась недоношеною, годування штучне. Об'єктивно: на межі твердого і м'якого піднебіння - характерне виразкове заглиблення овальної форми з чіткими краями, вкрите жовто-сірим нальотом і обмежене гіперемійованим валиком, що виступає над поверхнею слизової оболонки порожнини рота. Яка найбільш вірогідна причина розвитку захворювання у пацієнта?

*** А) Механічна травма**

- В) Алергічна реакція
- С) Стафілококова інфекція
- Д) Вірусна інфекція
- Е) Стрептококова інфекція

7. Батьки 5-місячної дівчинки скаржаться на відмову дитини від їжі, наявність виразки на піднебінні. Дитина народилась недоношеною, годування штучне. Об'єктивно: на межі твердого і м'якого піднебіння - виразкове заглиблення овальної форми з чіткими краями, вкрите жовто-сірим нальотом і обмежене гіперемійованим валиком, що виступає над поверхнею слизової оболонки порожнини рота. Які з перелічених груп препаратів Ви застосуєте для епітелізації афти?

*** А) Кератопластичні**

- В) Противірусні
- С) Протигрибкові
- Д) Антисептики
- Е) Антибіотики

8. Під час профілактичного огляду школярів молодших класів у хлопчика 7-ми років на слизовій оболонці щоки по лінії змикання зубів виявлені нашарування сіро-білого кольору , які не знімаються. Слизова злегка гіперемійована, безболісна при пальпації. Хлопчик емоційно неврівноважений, закусює щоки. Який діагноз найбільш вірогідний?

*** А) М'яка форма лейкоплакії**

- В) Хронічний рецидивуючий афтозний стоматит
- С) Хронічний кандидозний стоматит
- Д) Червоний плиткий лишай
- Е) Багатоформна ексудативна ерітема

9. Батьки 6-місячної дитини скаржаться на відмову дитини від їжі, наявність білуватих нашарувань в порожнині рота. Дитина неспокійна. Об'єктивно: на набряклій, гіперемійованій оболонці губів, щік, язика сироподібний нальот сірувато-білого кольору, що легко знімається, після його видалення ерозій немає. Який діагноз найбільш вірогідний?

*** А) Гострий кандидозний стоматит**

- В) Багатоформна ексудативна ерітема
- С) Гострий герпетичний стоматит
- Д) Червоний плиткий лишай
- Е) М'яка форма лейкоплакії

10. Хлопчик 12 років скаржиться на підвищення температури тіла до 38°C , слабкість, головний біль, біль в роті, наявність пухирців і виразок. Захворювання почалося гостро три дні тому. Хлопчик переніс пневмонію, одержував антибіотики. Об'єктивно: слизова оболонка порожнини рота гіперемійована, набрякла. На слизовій оболонці губів, язика, щік спостерігається велика кількість ерозій, які вкриті фібринозним нальотом. Губи вкриті товстими бурими кірками. На тильній поверхні долоні - папули з двуконтурним забарвленням. Який діагноз найбільш вірогідний?

*** А) Багатоформна ексудативна ерітема**

- В) Гострий герпетичний стоматит
- С) Хронічний рецидивуючий афтозний стоматит
- Д) рецидивуючий герпетический стоматит
- Е) синдром Стівенса-Джонсона

11. Батьки 5-річної дитини виявили у неї рухливість зубів і кровоточивість ясен. При обстеженні: слизова оболонка набрякла, гіперемійована, легко кровоточить, рухливість зубів I-II степені. При огляді виявлено також гіперкератоз долоней. Яке додаткове обстеження органів ротової порожнини необхідно провести ?

*** А) Рентгенологічне**

- В) Електроодонтометричне
- С) Біопотенціалометрію
- Д) Бактеріологічне
- Е) Вітальне забарвлення

12. Дівчинка 12 років скаржиться на підвищення температури тіла до $38,8^{\circ}\text{C}$, різку слабкість, головний біль, біль в роті, наявність виразок. Захворювання почалось гостро два дні тому. Дівчинка перенесла важку форму грипу з ускладненнями, одержувала антибіотики та сульфаніламід.
Об'єктивно: слизова оболонка порожнини рота гіперемійована, набрякла. На слизовій оболонці губів, щік, язика, ясен спостерігається велика кількість ерозій, що вкриті фібринозним нальотом. Спостерігається ураження слизової оболонки носа, очей і статевих органів. Висипання на шкірі локалізуються на тильному боці долонь, передплічч. Який діагноз найбільш вірогідний?

*** А) Синдром Стивенса-Джонсона**

- В) Хронічний рецидивуючий афтозний стоматит
- С) Хронічний рецидивуючий герпес
- Д) Виразково-некротичний стоматит
- Е) Багатоформна ексудативна еритема

13. У хлопчика 12 років в 24 зубі виникає біль при прийомі солодкої і холодної їжі. Об'єктивно: на жувальній поверхні 24 каріозна порожнина у межах плащового дентину, виповнена світлим, розм'яким дентином. Зондування емалево-дентинного сполучення болісне, від холодового подразника - короткочасний біль. Перкусія 24 - безболісна. Який діагноз Ви поставите?

*** А) Гострий середній карієс**

- В) Хронічний глибокий карієс
- С) хронический фиброзный пульпит
- Д) Гострий глибокий карієс
- Е) Хронічний середній карієс

14. У хлопчика 12 років в ділянці 36 виникає тривалий біль від прийому гарячої їжі. Об'єктивно: коронка 36 зуба брудно-сірого кольору, глибока каріозна порожнина виповнена розм'якшеним дентином. Є сполучення з пульповою камерою, глибоке зондування болюче. Тепловий подразник викликає біль, який повільно стихає. Перкусія 36 безболісна. Який діагноз найвірогідніший?

*** А) Хронічний гангренозний пульпіт**

- В) Хронічний глибокий карієс
- С) Хронічний фіброзний пульпіт
- Д) Хронічний гранулюючий періодонтит
- Е) Хронічний гіпертрофічний пульпіт

15. У хлопчика 12 років в ділянці 36 виникає тривалий біль від прийому гарячої їжі. Об'єктивно: коронка 36 зуба брудно-сірого кольору, глибока каріозна порожнина виповнена розм'якшеним дентином. Є сполучення з пульповою камерою, глибоке зондування болюче. Тепловий подразник викликає біль, який повільно стихає. Перкусія 36 безболісна. Перкусія безболісна. Який метод лікування доцільно застосувати?

*** А) Вітальну екстирпацію**

- В) Девітальну ампутацію
- С) Екстракцію зуба
- Д) Девітальну екстирпацію
- Е) Вітальну ампутацію

16. Під час огляду у дитини 9 років в пришийковій ділянці 12, 11, 21, 22 виявлено крейdneyноподібні плями, які з'явилися 2 тижня тому. Плями - без блиску, з поверхнею, яка забарвлюється метиленовим синім. Холодовий подразник реакції уражених зубів не викликає. Встановіть діагноз

*** А) Карієс в стадії плями**

- В) Флюороз
- С) Системна гіпоплазія
- Д) Поверхневий карієс
- Е) Осередкова гіпоплазія

17. Під час планової санації у дитини 6 років виявлено на апроксимально-дистальній поверхні 84 зуба каріозна порожнина, виповнена розм'яким пігментованим дентином. Зондування дна порожнини болюче в одній точці, після некротомії екскаватором виник біль і незначна кровотеча. Температурне подразнення викликає больову реакцію. Перкусія 84 безболісна. Встановіть діагноз.

*** А) Хронічний фіброзний пульпіт**

- В) Гострий глибокий карієс
- С) Хронічний глибокий карієс
- Д) Хронічний періодонтит
- Е) Хронічний гангренозний пульпіт

18. У дівчинки 14 років скарги на різкий біль при кусанні на 15 зуб. Анамнез: 2 тижні тому зуб лікувався з приводу гострого діфузного пульпіту методом вітальної екстірпації. Кореневий канал 15 зуба запломбован гутаперчевим штифтом з цинк-евгеноловою пастою. На рентгенограмі: в 15 зубі канал запломбований до рентгенологічної верхівки, патологічних змін в навколоверхівкових тканинах немає. Об'єктивно: 15 зуб запломбований; перкусія різко болюча. Слизова оболонка в ділянці 15 зуба дещо гіперемійована. Про яке ускладнення щодо 15 зуба йде мова?

*** А) Гострий верхівковий періодонтит**

- В) Загострення хронічного періодонтиту
- С) Гострий маргінальний періодонтит
- Д) Гострий діфузний пульпіт
- Е) Гострий серозний періостит

19. Дівчинці 15 років; скаржиться на розростання ясен в ділянці фронтальних зубів. Спостерігаються несправжні кишені, ясна рихлі, кровоточать. Встановлено попередній діагноз - гіпертрофічний гінгівіт. З чим найчастіше пов'язані проліферативні процеси в яснах дівчинки?

*** А) Горманальною дисфункцією**

- В) Ендокринними порушеннями
- С) Гіповітамінозом
- Д) Нервово-трофічними змінами
- Е) Захворюваннями органів травлення

20. У 10-річного хлопчика в порожнині рота виявлено виразковий гінгівіт, пародонтальні кишені, патологічну рухливість всіх зубів, оголення коренів зубів. При рентгенологічному обстеженні виявлено деструкцію альвеолярного паростка лакунарного типу. Клінічно проявляється нецукровий діабет, гепатоспленомегалія, екзофтальм, Рентгенологічно- осередкова деструкція площинних кісток. Визначте попередній діагноз?

*** А) Хронічний гістіоцитоз**

- В) Синдром Папійона-Лефевра
- С) Циклічна нейтропенія
- Д) Гіпоімунглобулінемія
- Е) Постійна нейтропенія

21. Дівчинці 8 років. Під час огляду порожнини рота на різцях верхньої і нижньої щелеп, паралельно ріжучому краю, а також на жувальних поверхнях 16, 26, 36, 46 зубів спостерігаються дефекти емалі у вигляді плям і борозенок. З анамнезу виявилось, що дитина хворіла на тяжку форму токсичної диспепсії у віці 8 місяців. Встановіть попередній діагноз:

*** А) Системна гіоплазія**

- В) Флюороз
- С) Ерозія емалі
- Д) Поверхневий карієс
- Е) Осередкова гіоплазія

22. Мать ребенка 3 лет жалуется на слюнотечение, язвочки, боль во рту у ребенка, отказ от еды, Т-39С. Объективно: гиперемия, отечность десен, десневые сосочки кровоточат . На языке, губах, небе отмечается до 20 мелких эрозий, покрытых белесоватым налетом. Регионарные лимфоузлы увеличены, болезненные, мягкоэластической консистенции. Ваш предполагаемый диагноз?

*** А) Острый герпетический стоматит**

- В) Острый грибковый стоматит
- С) Многоформная экссудативная эритема
- Д) Гингивостоматит Венсана
- Е) -рецидивирующий герпетический стоматит

23. Родители ребенка 4 месяцев жалуются на появление у ребенка белого налета во рту и отказ от кормления. Объективно: общее состояние удовлетворительное, Т-37,1С. Определяется белый творожистый налет на слизистой щек, губ, твердом небе. Налет легко снимается, слизистая под ним гиперемирована. Какой дополнительный метод обследования подтвердит диагноз?

*** А) Микробиологический**

- В) Иммунофлюоресцентный
- С) Цитологический
- Д) Иммунологический
- Е) Вирусологический

24. Ребенок 13 лет жалуется на периодическое (1 раз в 3 месяца) появление болезненных образований во рту. На слизистой оболочке нижней губы определяются 2 эрозии размером 0,8х1 см на инфильтрированном основании с приподнятыми плотноватыми краями, покрытые белесовато-серым налетом. В анамнезе - экссудативный диатез, хронический холецистит. Ваш предполагаемый диагноз?

*** А) Хронический рецидивирующий афтозный стоматит**

В) Рецидивирующий герпетический стоматит

С) Стоматит Венсана

Д) Многоформная экссудативная эритема

Е) Стоматит Сеттона

25. Девочка 13 лет обратилась с жалобами на боль, кровоточивость десен. Заболела 2 дня назад. Объективно: ребенок бледен, температура тела 38,5 С. Подчелюстные лимфоузлы слева увеличены и болезненны, не спаяны с подлежащими тканями. Десневые сосочки и краевая часть десны в области 33, 34, 35, 36, 37 зубов гиперемированы, изъязвлены, покрыты некротическим налетом. На зубах отложение мягкого зубного налета. Поставьте диагноз.

*** А) Язвенно-некротический гингивит**

В) Острый катаральный гингивит.

С) Хронический гипертрофический гингивит

Д) Хронический катаральный гингивит

Е) -

26. У дитини двох місяців діагностовано гострий кандидозний стоматит середньої важкості. Які препарати з перелічених Ви використаєте для місцевого лікування дитини в першу чергу?

*** А) Протигрибкові**

- В) Антибіотики
- С) Антисептики
- Д) Протівірусні
- Е) Кератопластичні

27. В клинику обратился ребенок 7 лет с целью санации полости рта Родился и проживал в местности, где содержание фтора 2.5 мг/л. При осмотре было выявлено, что на вестибулярной поверхности 11 21 31 41 16 26 36 46 имеются темные пятна. Из анамнеза выяснено, что зубы прорезались пораженными. Поставьте правильный диагноз :

*** А) флюороз**

- В) гиперплазия эмали
- С) гипоплазия эмали
- Д) эрозия зубов
- Е) несовершенный амелогенез

28. Девочка 8 лет жалуется на кровоточивость десен. Ребенок болеет сахарным диабетом. Объективно: десневые сосочки в области зубов верхней и нижней челюстей гиперемированы, отечны, покрывают коронку на 1/3. Какие методы исследования необходимо провести для определения степени тяжести заболевания?

*** А) рентгенография**

- В) Реопародонтография
- С) вакуумная проба
- Д) индекс ПМА
- Е) стоматоскопия

29. Ребенок 6 лет жалуется на болезненность и сухость губ. Заболевание развилось два дня тому назад после длительного пребывания на открытом воздухе. Имеется незначительная отечность, гиперемия губ, легкая инфильтрация, чешуйки на красной кайме губ. Поверхность губ сухая.

Поставьте диагноз заболевания:

*** А) метеорологический хейлит**

- В) Актинический хейлит
- С) Экзематозный хейлит
- Д) Эксофолиативный хейлит
- Е) Гранулярный хейлит

30. Ребенок в возрасте 1 года вялый, беспокойный, температура 37,7 С, отказывается от приема пищи. Объективно: слизистая щек, предверия полости рта, язык гиперемированы, покрыты творожистым белым налетом. Какие лекарственные средства необходимо назначить в первую очередь?

*** А) Противогрибковые**

- В) Антибиотики
- С) Противовирусные
- Д) Противоаллергические
- Е) Антисептики

31. Мама ребенка 6,5 лет обратилась с целью контроля результатов герметизации фиссур 16, 26. 36, 46, которая была проведена 6 месяцев назад. Герметик сохранился в 36, 46, а в 16 и 26 не сохранился. Какова дальнейшая тактика врача.

*** А) Повторить герметизацию фиссур**

- В) Профилактическое пломбирование
- С) Апликации раствором ремодента
- Д) Покрытие зубов фторлаком
- Е) Электрофорез 1% р-ом фтористого натрия

32. Ребенок 15 лет жалуется на боли от термических раздражителей в зубе на верхней челюсти слева. Объективно: 26 зуб не изменен в цвете, кариозная полость в пределах околопульпарного дентина, полость зуба вскрыта, глубокое зондирование болезненно. Определите оптимальный метод лечения.

*** А) Витальная экстирпация**

- В) Биологический метод
- С) Девитальная ампутация
- Д) Витальная ампутация
- Е) Девитальная экстирпация

33. Мальчик 12-ти лет жалуется на кратковременную боль от холодного в зубе на нижней челюсти справа. Объективно: в 46 на медиальной поверхности кариозная полость в пределах околопульпарного дентина, не сообщающаяся с полостью зуба, со светлым размягченным дентином на дне и стенках. Реакция на холод болезненная, быстропроходящая. Какой наиболее вероятный диагноз?

*** А) Острый глубокий кариес**

- В) Острый средний кариес
- С) Острый ограниченный пульпит
- Д) Острый диффузный пульпит
- Е) Хронический фиброзный пульпит

34. Дитині 5 років. Батьки звернулись з метою санації дитини. При обстеженні в 85 зубі виявлена каріозна порожнина в межах біляпульпарного дентину. Зондування дна каріозної порожнини і перкусія безболісне. На слизовій оболонці в ділянці 85 зуба нориця. Визначте діагноз.

*** А) Хронічний гранулюючий періодонтит**

- В) Хронічний гранулематозний періодонтит
- С) Хронічний фіброзний періодонтит
- Д) Хронічного фіброзний пульпіт
- Е) Хронічний глибокий карієс

35. Дитина 10 років скаржиться на біль в горлі, кашель, і високу (38 С) температуру тіла протягом 2 днів. При об'єктивному обстеженні виявлений гострий катаральний стоматит. Мигдалики набряклі, гіперемійовані, вкриті жовто-сірим нальотом, який знімається легко і має кришковуватий характер. Підщелепні, шийні лімфовузли значно збільшені у розмірах, болісні при пальпації. При лабораторному дослідженні виявлено лейко- і моноцитоз. Встановіть найбільш імовірний діагноз.

*** А) Інфекційний мононуклеоз**

- В) Дифтерія
- С) Скарлатина
- Д) Краснуха
- Е) Кір

36. Дитина 12-ти років влітку скаржиться на біль у горлі, головний біль і підвищення температури тіла до 38,5С, нежить, кашель. Об'єктивно:слизова оболонка порожнини рота гіперемійована, набрякла, на піднебінні і піднебінних дужках виявлено 10-15 ерозій розміром до 0,5 мм, які не вкриті нальотом і мають червоне дно. Регіонарні лімфатичні вузли збільшені, болісні при пальпації. Визначте найбільш імовірний діагноз

*** А) Герпетична ангіна.**

- В) Гострий герпетичний стоматит.
- С) Багатоформна ексудативна еритема.
- Д) Хронічний рецидивуючий афтозний стоматит.
- Е) Інфекційний мононуклеоз.

37. У 10-річної дитини під час профілактичного огляду на горбах 44 зубу виявлені блискучі плями білувато-жовтого кольору з чіткими обрисами. При зондуванні емалі шерохуватість не визначається. В анамнезі - передчасне видалення 84 зубу з приводу ускладненого карієсу. Визначте попередній діагноз.

*** А) Місцева гіоплазія емалі.**

- В) Гострий початковий карієс.
- С) Системна гіоплазія емалі.
- Д) Флюороз зубів.
- Е) Хронічний початковий карієс.

38. Хворий Н., 4,5 років скаржиться на різкій біль слизової оболонки рота, зумовлений появою маленьких “виразочок”. Один тиждень тому переніс харчове отруєння. Висип в порожнині рота з’явився вперше. Спочатку висип виник на губах, а через 15-16 годин _ на язиці і під язиком висипала група пухирців, хворіє другу добу, Т 38,80С. Встановити діагноз.

*** А) гострий герпетичний стоматит**

- В) ерозивний стоматит
- С) хронічний рецидив-афтозний стоматит
- Д) гострий псевдомембранозний кандидоз
- Е) оперізувальний лішай

39. У дівчинки 9 років при визначенні гігієнічного індексу за Федоровим - Володкіною зафарбувалось 3/4 поверхні кожного зуба. Який стан гігієни порожнини рота у даної дитини буде визначений при обчисленні індексу?

*** А) дуже поганий**

- В) хороший.
- С) задовільний
- Д) незадовільний
- Е) поганий.

40. Батьки дівчинки 3 років скаржаться на рухомість зубів. Об'єктивно: зуби рухомі, ясеневі сосочки набряклі, синюшні, спостерігаються патологічні кишені з гнійним виділенням. Відмічається підвищене ороговіння шкіри, особливо долоней і підшов. Визначте попередній діагноз.

*** А) Хвороба Папійона - Лефевра**

- В) Хвороба Такахара
- С) Хвороба Гоше
- Д) Хвороба Німмона - Піка
- Е) Хвороба Таратинова

41. Дитина 13 років скаржиться на висипання в порожнині рота та на шкірі, Підвищення температури до 38С, слабкість. Об'єктивно: слизова оболонка порожнини рота гіперемійована, вкрита ерозіями, губи покриті масивними кірками. На шкірі плями і пухирі. Відмічається ураження кон'ктиви та слизової оболонки носа. Визначте попередній діагноз.

*** А) Синдром Стівенса - Джонсона**

- В) Синдром Лайєла
- С) Гострий герпетичний стоматит
- Д) Багатоформна ексудативна ерітема.
- Е) красний плоский лишай

42. Хлопчик 9 років скаржиться на біль у горлі, підвищення температури.. Об'єктивно: катаральний гінгівіт, нальот на язиці, гіперемія піднебінних дужок, гіпертрофія мигдаликів, неприємний запах із рота, лімфаденіт. За даними педіатра-збільшення печінки, селезінки, виразний моноцитоз. Визначте попередній діагноз.

*** А) Інфекційний мононуклеоз**

- В) Гострий герпетичний стоматит
- С) Багатоформна ексудативна ерітема.
- Д) герпетическая ангина
- Е) Синдром Стівенса - Джонсона

43. Дівчинка 10 років скаржиться на наявність каріозної порожнини в зубі, біль під час їжі. Об'єктивно: в 46 на жувальній поверхні каріозна порожнина з вузьким вхідним отвором в межах біляпульпарного дентину, реакція на холодний подразник болісна, швидко проходить, зондування дна болісне, перкусія безболісна. Визначте діагноз.

*** А) Гострий глибокий карієс.**

В) Хронічний глибокий карієс.

С) Гострий середній карієс.

Д) гострий обмежений пульпіт

Е) Хронічний фіброзний пульпіт

44. Хлопчик 8 років скаржиться на біль в зубі під час їжі. Об'єктивно: в 55 на апроксимальній поверхні глибока каріозна порожнина, яка сполучається з порожниною зуба. Зондування сполучення різко болісне, відмічається кровоточивість, перкусія безболісна. Визначте діагноз.

*** А) Хронічний фіброзний пульпіт.**

В) Хронічний гіпертрофічний пульпіт.

С) Хронічний гангренозний пульпіт.

Д) Хронічний гранулюючий періодонтит

Е) -хронический фиброзный периодонтит

45. Хлопчик 8 років скаржиться на біль в зубі під час їжі. Об'єктивно: в 55 на апроксимальній поверхні глибока каріозна порожнина, яка сполучається з порожниною зуба. Зондування сполучення різко болісне, відмічається кровоточивість, перкусія безболісна. Яку пасту необхідно накласти в перше відвідування?

*** А) Параформальдегідну**

В) Миш'ковисту.

С) Резорцин – формалінову.

Д) Тимолову.

Е) Кальційвмістну.

46. Хлопчик 9 років скаржиться на біль в зубі під час їжі. Об'єктивно: в 55 на апроксимальній поверхні глибока каріозна порожнина, яка сполучається з порожниною зуба. Зондування сполучення різко болісне, відмічається кровоточивість, перкусія безболісна. Який метод лікування необхідно застосовувати в даному випадку?

*** А) Девітальна ампутація.**

В) Девітальна екстерпація.

С) Вітальна ампутація.

Д) Вітальна екстерпація.

Е) Біологічний метод.

47. Дівчинка 14 років скаржиться на наявність каріозної порожнини. Об'єктивно: в 26 глибока каріозна порожнина, сполучається з порожниною зуба, реакція на холод, зондування, перкусія безболісні, слизова оболонка без змін. На рентгенограмі - розширення періодонтальної щілини в ділянці верхівки піднебінного кореня. Визначте діагноз.

*** А) Хронічний фіброзний періодонтит.**

В) Хронічний гранулюючий періодонтит.

С) Хронічний гранулематозний періодонтит.

Д) Загострення хронічного фіброзного періодонтиту.

Е) Загострення хронічного гранулюючого періодонтиту.

48. Хлопчик 11 років скаржиться на наявність каріозної порожнини в зубі на нижній щелепі. Об'єктивно: в 46 на жувальній поверхні каріозна порожнина в межах плащового дентину з вузьким входним отвором, дентин розм'якшений, реакція на холодний подразник злегка болісна, зондування чутливе по емалево - дентинному сполученню. Визначте попередній діагноз.

*** А) Гострий середній карієс.**

В) Гострий глибокий карієс.

С) Хронічний середній карієс.

Д) Гострий поверхневий карієс.

Е) Хронічний глибокий карієс.

49. Дівчинка 8 років скаржиться на біль в порожнині рота під час їжі. Об'єктивно: на перехідній складці у фронтальному відділі нижньої щелепи ерозія овальної форми, вкрита жовтуватим нальотом, ерозія з облямовкою червоного кольору розміром 5х7 мм. Така ерозія була рік тому. Визначте діагноз.

*** А) Хронічний рецидивуючий афтозний стоматит.**

В) рецидивуючий герпетичний стоматит.

С) Синдром Бехчета.

Д) Афта Сетона.

Е) Гострий герпетичний стоматит.

50. Батьки дитини 6 місяців скаржаться на наявність нальоту в порожнині рота у дитини. Об'єктивно: слизова оболонка порожнини рота гіперемійована, вкрита білим нальотом, що нагадує зсіле молоко, наліт легко знімається. Визначте діагноз.

*** А) Гострий кандидозний стоматит.**

В) Хронічний кандидозний стоматит.

С) Гострий герпетичний стоматит.

Д) Рецидивуючий герпетичний стоматит

Е) м'яка форма лейкоплакии

51. Батьки дитини 6 місяців скаржаться на наявність нальоту в порожнині рота у дитини. Об'єктивно: слизова оболонка порожнини рота гіперміювана, вкрита білим нальотом, що нагадує зсіле молоко, наліт легко знімається. Що являється збудником даного захворювання.

*** А) Гриби роду Candida.**

В) Вірус простого герпеса.

С) Палочка Лефлера.

Д) Вірус Коксакі.

Е) вірус Епштейна-Барра

52. Больной 12-ти лет жалуется на кровоточивость десен, подвижность зубов. Болеет с 4-х лет. Объективно: десна в области всех зубов гиперемирована, отечна, кровоточит при инструментальном обследовании. Корни зубов оголены на 1/3, покрыты белесоватым налетом. Зубы подвижны 2-й степени. Зубодесневые карманы глубиной 4-5 мм. При внешнем осмотре выявлена сухость и утолщение поверхностного слоя кожных покровов в области ладоней, подошв, имеются трещины. Какой наиболее вероятный диагноз?

*** А) Синдром Папийона-Лефевра**

В) Болезнь Хенда-Шуллера-Кристчена

С) Генерализованный пародонтит

Д) Болезнь Леттерера-Зиве

Е) Локализованный пародонтит

53. Під час профілактичного огляду у 6-річної дитини на спинці язика поряд із зонами підвищеного зроговіння ниткоподібних сосочків виявлені ділянки десквамації епітелію, що мають вигляд овальних червоних плям. Грибоподібні сосочки гіпертрофовані. Суб'єктивні відчуття відсутні. В анамнезі у дитини - дисбактеріоз кишечника. Визначте найбільш імовірний діагноз.

*** А) Десквамативний глосит**

- В) Кандидозний глосит
- С) Гострий катаральний глосит
- Д) Ромбоподібний глосит
- Е) Герпетичне ураження язика

54. Батьки 6-ти-річної дитини звенулися з скаргами на відмову дитини від їжі і наявність сіро-жовтого нальоту в порожнині рота протягом року. Дитина відзначає різку сухість і печію в роті. Об'єктивно: на набряклій, гіперемійованій оболонці губів, щік - нальот жовтого і світло сірого кольору. На язиці нальот зв'язаний з тканиною, не знімається з поверхні і знаходиться на інфільтрованій основі. У дитини хронічний бронхіт, систематичне лікування антибіотиками. Який діагноз найбільш вірогідний?

*** А) Хронічний кандидозний стоматит**

- В) Гострий герпетичний стоматит
- С) Хронічний рецидивуючий афтозний стоматит
- Д) Багатоформна ексудативна ерітема
- Е) Гострий кандидозний стоматит

55. Хлопчик 12 років скаржиться на підвищення температури тіла до 38 С, слабкість, головний біль, біль в роті, наявність пухирців і виразок. Захворювання почалося гостро три дні тому. Хлопчик переніс пневмонію, одержував антибіотики. Об'єктивно: слизова оболонка порожнини рота гіперемійована, набрякла. На слизовій оболонці губів, язика, щ.ік спостерігається ерозії великих розмірів, які вкриті фібринозним нальотом. Губи вкриті товстими бурими кірками. На тильній поверхні долоні - папули з двуконтурним забарвленням. Що з перелічених засобів потрібно використати в першу чергу при проведенні місцевого лікування?

*** А) Знеболювальні**

- В) Протизапальні
- С) Протівірусні
- Д) Протимікробні
- Е) Протигрибкові

56. У хлопчика 11 років в ділянці 24 зуба виникає біль при прийомі солодкої і холодної їжі. Вперше біль виник три тижня тому. Об'єктивно: на жувальній поверхні 24 каріозна порожнина середньої глибини, виповнена світлим, розм'яким дентином. Зондування емалево-дентинного сполучення болісне,, від холодового подразника - короткочасний біль. Перкусія 24 - безболісна Який пломбувальний цемент найбільш доцільний для постійної пломби?

*** А) Склоіономірний**

- В) Сілікофосфатний
- С) Фенолятний
- Д) Сілікатний
- Е) Полікарбоксилатний

57. 8-річному хлопчикові встановлено діагноз: хронічний фіброзний пульпіт 21 зуба. Лікування проведено екстирпаційним методом. Виберіть матеріал для кореневої пломби:

*** А) Кальційвмісний матеріал**

- В) Склоіономірний цемент
- С) Цинк-евгенолова паста
- Д) Резорцин-формалінова паста
- Е) Фосфат-цемент

58. Ребенок 12 лет жалуется на боли от холодного и попадания пищи в зубе на нижней челюсти справа. При осмотре: в 46 на медиальной поверхности кариозная полость в пределах околопульпарного дентина, не сообщаящаяся с полостью зуба, со светлым размягченным дентином на дне и стенках. Зондирование дна болезненно в одной точке, перкуссия безболезненна. Реакция на холод болезненная, быстро проходящая. Какой наиболее вероятный диагноз?

*** А) Острый глубокий кариес**

- В) Острый средний кариес
- С) Острый ограниченный пульпит
- Д) Острый диффузный пульпит
- Е) Хронический простой пульпит

59. У ребенка 5 лет жалуется на периодические возникающие боли в зубе нижней челюсти слева во время еді Объективно: в 74 глубокая кариозная полость, сообщающаяся с полостью зуба, зуб изменен в цвете, глубокое зондирование болезненное, перкуссия - безболезненна. Десна в области 74 без изменений. Ваш предполагаемый диагноз?

*** А) Хронический гангренозный пульпит**

- В) Хронический фиброзный пульпит
- С) Хронический гипертрофический пульпит
- Д) Хронический периодонтит
- Е) Хронический глубокий кариес

60. Девочка 11-ти лет жалуется на кровоточивость десен во время чистки зубов и приеме пищи. Беспокоит в течении года. Десна на верхней и нижней челюсти отечна, застойно гиперемирована. Гигиеническое состояние полости рта неудовлетворительное. Прикус ортогнатический. При рентгенологическом исследовании пародонта патологических изменений не обнаружено. Ваш предварительный диагноз?

*** А) Хронический катаральный гингивит**

- В) Острый катаральный гингивит
- С) Генерализованный пародонтит
- Д) Локализованный пародонтит
- Е) Гипертрофический гингивит

61. Батьки 8-річної дитини скаржаться на зміну кольору та наявність дефектів коронкової частини зубів, які нещодавно прорізались. На вестибулярній поверхні емалі фронтальних зубів та горбах перших постійних молярів визначаються плями точкові заглиблення та борозни. Прозористість емалі збережена. Визначте найбільш імовірний діагноз.

*** А) Системна гіоплазія емалі**

- В) Місцева гіоплазія емалі
- С) Хронічний поверхневий карієс
- Д) Хронічний середній карієс
- Е) Флюороз зубів

62. У 5,5-річної практично здорової дитини під час препарування каріозної порожнини в 84 зубі з приводу гострого середнього карієсу був помилково оголений медіально-щічний ріг пульпи. Виберіть оптимальний метод лікування у даному випадку.

*** А) Біологічний метод**

- В) Девітальна ампутація
- С) Девітальна екстирпація
- Д) Вітальна ампутація
- Е) Вітальна екстирпація

63. Дитина 7,5 років скаржиться на біль під час їжі у нижньому кутньому лівому зубі. Об'єктивно: на жувальній поверхні 74 зуба виявлена каріозна порожнина, локалізована у межах навколопульпарного дентину, заповнена розм'якшеним дещо пігментованим дентином. Зондування дна каріозної порожнини болісне. Під час некротомії екскаватором виник різкий біль, з'явилась кровоточивість, у проекції медіально-щічного рогу пульпи визначено сполучення між каріозною порожниною та порожниною зуба. Перкусія зуба безболісна. Виберіть найбільш імовірний діагноз.

*** А) Хронічний фіброзний пульпіт**

В) Хронічний гангренозний пульпіт

С) Гострий глибокий карієс

Д) Хронічний періодонтит

Е) Гострий обмежений пульпіт

64. Батьки 5,5-річної дитини скаржаться на самочинний біль у верхніх кутніх зубах зліва, що виник минулої ночі. На медіальній контактній поверхні 64 зуба виявлена каріозна порожнина, заповнена розм'якшеним дентином світло-коричневого кольору, локалізована у межах навколопульпарного дентину. Зондування каріозної порожнини різко болісне по всьому дну. Перкусія зубу слабо болісна. Слизова оболонка альвеолярного паростку у проекції коренів 64 зубу не змінена. Визначте попередній діагноз.

*** А) Гострий дифузний пульпіт**

В) Гострий обмежений пульпіт

С) Загострення хронічного пульпіту

Д) Хронічний фіброзний пульпіт

Е) Гострий серозний періодонтит

65. Ребенок 13-ти лет обратился с жалобами на болезненность нижней губы которая беспокоит в течение 2 месяцев Об-но: слизистая оболочка нижней губы гиперемирована, выводные протоки малых слюнных желез расширены определяется симптом росы Поставьте диагноз.

*** А) Гландулярный хейлит.**

- В) Метеорологический хейлит.
- С) Микробный хейлит.
- Д) Эксфолиативный хейлит.
- Е) Контактно-аллергический хейлит.

66. Дитина 10,5 років скаржаться на постійний біль у 21 зубі протягом доби. який був запломбований рік тому з приводу глибокого каресу Об'єктивно: 21 зуб змінений у кольорі , перкусія - різко болісна. Слизова оболонка альвеолярного паростку у цій ділянці дещо набрякла, гіперемійована, болісна при пальпації. Визначте попередній діагноз

*** А) Загострення хронічного періодонтиту**

- В) Гострий серозний періодонтит
- С) Гострий гнійний періодонтит
- Д) Пульпіт ускладнений періодонтитом
- Е) Гострий гнійний пульпіт

67. Практично здорова дитина 9-ти років скаржиться на перелом коронкової частини і біль у правому верхньому передньому зубі. Об'єктивно: коронкова частина 11 зуба відсутня на 1/3, пульпа точково оголена, має червоний колір, різко болісна і кровоточива при зондуванні. Перкусія зуба дещо болісна. З моменту травми пройшло декілька годин. Виберіть оптимальний метод лікування у даному випадку.

*** А) Біологічний метод**

- В) Вітальна ампутація
- С) Девітальна ампутація
- Д) Вітальна екстирпація
- Е) Девітальна екстирпація

68. Дитина 8,5 років, практично здорова, скаржиться на біль у передньому верхньому лівому зубі внаслідок його травматичного ушкодження три години тому. Об'єктивно: коронкова частина 21 зуба відсутня майже на половину, значно пульпа оголена, червоного кольору, різко болісна і кровоточива при зондуванні. Перкусія 21 зуба значно болісна. Виберіть оптимальний метод лікування у даному випадку.

*** А) Вітальна ампутація**

- В) Вітальна екстирпація
- С) Девітальна ампутація
- Д) Девітальна екстирпація
- Е) Біологічний метод

69. Дитина 14 років скаржиться на кровоточивість ясен при чищенні зубів і вживанні твердої їжі протягом останніх двох років. Об'єктивно: слизова оболонка ясен в ділянці 31,32,33,41,42 і 43 зубів набрякла, дещо гіперемійована, має цианотичне забарвлення. Ясенний край валикоподібно потовщений. Визначається скупченість передніх зубів нижньої щелепи. Яке додаткове дослідження необхідне для визначення остаточного діагнозу?

*** А) Рентгенографія**

- В) Реопародонтографія
- С) Проба Писарєва-Шиллера
- Д) Проба Кулаженко
- Е) Подлярографія

70. У дитини 8-ми років каріозна порожнина на жувальній поверхні 16 зуба в межах біляпульпарного дентину. Зондування дна каріозної порожнини болісне, дентин розмякшений слабо пігментований Від холодового подразника виникає біль що швидко проходить Виберіть лікувальну пасту у даному випадку

*** А) Гідроокискальційвмісну**

- В) Резорцин формалінову
- С) Параформальдегідну
- Д) Миш'яковисту
- Е) Тимолову

71. Дитина 8 років з'явилася до лікаря-стоматолога з метою санації. При обстеженні було виявлено високу інтенсивність каріозного процесу (кп+КПВ=7), індекс Федорова-Володкіної становив 3,0 бали, Якій оцінці відповідає гігієнічний стан порожнини рота дитини?

*** А) Поганий стан**

- В) Добрий стан
- С) Задовільний стан
- Д) Незадовільний стан
- Е) Дуже поганий стан

72. У дівчинки 4,5 років під час профілактичного огляду було виявлено глибоку каріозну порожнину в 55 зубі на жувальній поверхні. Каріозна порожнина сполучається з порожниною зуба. Глибоке зондування (в ділянці вустів кореневих каналів) болісне. На перкусію зуб не реагує, .На рентгенограмі змін у періапикальних тканинах не виявлено Який найбільш імовірний діагноз?

*** А) Хронічний гангренозний пульпіт**

В) Хронічний гіпертрофічний пульпіт

С) Хронічний гранулюючий пульпіт

Д) Хронічний фіброзний пульпіт

Е) Хронічний фіброзний періодонтит

73. При обстеженні дітей у школі, лікар-стоматолог виявив у дівчинки 11 років в ділянці шийок 13, 14, 15, 23, 24, 25 зубів масивне відкладення зубного нальоту, після видалення якого було виявлено ділянки емалі білого кольору без природного блиску. що фарбуються метиленовим синім Який найбільш ймовірний діагноз?

*** А) Гострий початковий карієс**

В) Гіпоплазія емалі

С) Флюороз зубів

Д) Гострий поверхневий карієс

Е) Хронічний початковий карієс

74. У хлопчика 5 років - підвищення температури тіла до 39,2С, біль у горлі, головний біль, нудота. Об'єктивно: слизова оболонка м'якого піднебіння, піднебінних дужок яскраво-гіперемійована, чітко відмежована від оточуючих тканин. Язик сухий, набряклий, його бічні поверхні вільні від нальоту, червоного кольору, грибоподібні сосочки помітно збільшені у розмірах. Шкіра обличчя, окрім блідого носогубного трикутника, гіперемійована, вкрита мілкими п'ятнистими висипаннями. Підщелепні лімфатичні вузли болісні при пальпації. Визначте збудника даного захворювання.

*** А) Гемолітичний стрептокок**

- В) Вірус Коксакі
- С) Вірус герпесу
- Д) Паличка Борде-Жанду
- Е) Паличка Леффлера

75. Ребенку 14 лет. Жалуется на косметический дефект в области передних зубов.. Объективно: эмаль 11, 12, 21, 22, 31, 32, 41, 42 зубов в области режущего края истончена, параллельно режущему краю определяется бороздчатое углубление эмали шириной 1,5 мм опоясывающее зуб. Бугры 16, 26, 36, 46 недоразвиты, конической формы. Укажите наиболее вероятный диагноз.

*** А) Системная гипоплазия**

- В) Несовершенный дентиногенез
- С) Несовершенный амелогенез
- Д) Местная гипоплазия
- Е) Дисплазия Стентона-Капдепона

76. 7-ми місячна дівчинка направлена на консультацію до стоматолога у зв'язку з наявністю виразки порожнини рота. Народилась передчасно. Годування - сумішами з пляшечки з гумовою соскою. Об-но: на межі твердого і м'якого піднебіння виявлено язву розмірами 0,8 на 1,0 см, овальної форми, вкрита жовто-сірим нальотом, оточена валикоподібним інфільтратом. Визначте попередній діагноз.

*** А) Афта Беднара**

В) Афта Сеттона

С) Туберкульозна виразка

Д) Гострий герпетичний стоматит

Е) Гострий кандидозний стоматит

77. Дитина 10-ти років скаржиться на гострий, самочинний, приступоподібний біль у зубі на верхній щелепі зліва. На дистальній контактній поверхні 26 зуба виявлена каріозна порожнина, заповнена світлим розм'якшеним дентином, локалізована в межах біляпульпарного дентину. Зондування дна каріозної порожнини різко болісне, перкусія зуба безболісна. Від холодного виникає тривалий приступ болю. В анамнезі у дитини алергія на лідокаїн. Виберіть оптимальну пасту для використання в перше відвідування.

А) Йодоформна.

В) Тимолова.

С) Формакрезолова.

*** Д) Параформальдегідна**

Е) Цинкевгенолова.

78. При профілактичному огляді хлопчика 8-ми років виявлено крейдоподібні плями вестибулярній поверхні 11 та 21 зубів, які локалізовані в пришийковій ділянці. Плями мають матову поверхню. Суб'єктивні скарги у дитини відсутні. Поставте найбільш імовірний діагноз.

*** А) Гострий початковий карієс**

- В) Плямиста форма флюорозу.
- С) Місцева гіпоплазія емалі.
- Д) Гострий поверхневий карієс.
- Е) Хронічний початковий карієс.

79. Дитині 5-ти років встановлено діагноз хронічного середнього карієсу 74 зубу. Який із перерахованих матеріалів є оптимальним для пломбування каріозної порожнини?

*** А) Склоіномерний цемент**

- В) Сілікатний цемент.
- С) Силікофосфатний цемент.
- Д) Цинк-фосфатний цемент
- Е) Полікарбоксилатний цемент

80. Хлопчика 11 років періодично непокоїть біль і кровоточивість ясен , значна рухомість зубів. З раннього дитинства страждає на запальні процеси різної локалізації, спостерігається циклічність загострень - 24 дні. Об-но: ясенні сосочки набряклі, гіперемійовані, ц ианотичні. Визначаються пародонтальні кишені глибиною до 4-5 мм, рухомість зубів - 2ступеня . Індекс РМА - 100 % . Рентгенологічно виявлено резорбцію міжальвеолярних перегородок на половину їх висоти біля всіх зубів. Консультація якого фахівця Вам необхідна у даному випадку?

*** А) Гематолога**

В) Ендокринолога

С) Психоневролога

Д) Педіатра

Е) Гастроентеролога

81. 7-річний хлопчик скаржиться на біль у куточках рота під час розмови і приймання їжі. Хворіс протягом місяцяЧасто хворіє на простудні захворювання.Об-но: загальний стан задовільний, температура тіла 36,6 градусів. В куточках рота тріщини вкриті білуватим нальотом з гіперемійованими, дещо виступаючими над поверхнею краями. Тонус кругового м'яза рота знижений, куточки рота опущені. Слизова оболонка порожнини рота без патологічних змін. Яку мазь необхідно призначити для етіотропного лікування у даному випадку?

*** А) Клотримізолу**

В) Гідрокортизонову

С) Бонафтонову

Д) Гентаміцинову

Е) Солкосерилову

82. У дівчинки 2-х років, яка хворіє 4-й день, підвищена температура тіла до 38 гр Вона вередує, відмовляється від їжі. Висипання в порожнині рота з'явилися вчора. При огляді : підщелепні лімфовузли болісні, дещо збільшені. В порожнині рота на слизовій оболонці губ, щік, м'якого піднебіння - численні ерозії , вкриті білуватим нальотом, визначається катаральний гінгівіт. Яку мазь Ви використаєте для етіотропного місцевого лікування?

*** А) Ацикловірову**

В) Флуцинар

С) Гідрокортизонову

Д) Клотримазолову

Е) Солкосерилову

83. 13-річний хлопчик звернувся до лікаря -стоматолога зі скаргами на кровоточивість ясен, гнилісний запах з рота, підвищену втомлюваність, підвищення температури тіла до 37,8 Хворіє другий день. В анамнезі - переохолодження тиждень тому. Об-но: ясна гіперемійовані, набряклі, ясенні сосочки виразкуваті, вкриті брудно-сірим нальотом. Пальпація різко болісна. Зуби вкриті значним шаром м'якого зубного нальоту . Визначте збудника даного захворювання ?

*** А) Фузобактерії, спірохети**

В) Стрептококи

С) Дріжджеподібні гриби

Д) Вірус герпесу

Е) Вірус Коксакі

84. Хлопчик, віком 7,5 років впав, вдарився лицем і травмував верхні передні зуби. Об-но: Коронки 11 і 12 зубів відсутні на 1/3. Порожнина зубів відкрита. Під час зондування - біль по лінії відлому коронок 11 і 12 зубів, їх перкусі безболісна. Слизова оболонка в ділянці 11 і 12 зубів злегка гіперемійована. Який додатковий метод обстеження доцільно використати?

*** А) Рентгенографію**

В) Електроодонтометрію

С) Термометрію

Д) Стоматоскопію

Е) Біопотенціалометрію

85. У девочки 4 лет жалобы на острую самопроизвольную боль в зубе на верхней челюсти справа, усиливающуюся при приеме пищи. Боль появилась 2 дня назад. Объективно: в 55 глубокая кариозная полость с размягченным дентином. Полость зуба не вскрыта. Зондирование дна полости незначительно болезненно. . Перкуссия болезненна. Ваш предполагаемый диагноз?

*** А) Острый пульпит, осложненный периодонтитом**

В) Острый гнойный пульпит

С) Острый общий (серозный) пульпит

Д) Обострение хронического гангренозного пульпита

Е) Острый гнойный периодонтит

86. У мальчика . 8,5 лет было диагностировано обострение хронического пульпита 65 зуба. Укажите основные этапы выбранного Вами метода лечения, предшествующие наложению постоянной пломбы.

*** А) Девитальная ампутация пульпы, мумифицирующая паста**

В) Проводниковое обезболивание, экстирпация пульпы. Пломбирование корневых каналов.

С) Проводниковое обезболивание, ампутация пульпы, на устья каналов – цинк – эвгеноловая паста

Д) Механическая и медикаментозная обработка и пломбирование каналов.

Е) Девитальная ампутация пульпы, на устья каналов – кальцийсодержащая паста

87. У дитини 4-х років декілька місяців тому з'явилися порожнини в кутніх зубах нижньої щелепи. На жувальних поверхнях 85 і 75 зубів виявлені каріозні порожнини в межах плащового дентину з нависаючими краями емалі вповнені розм'якшеним, дещо пігментованим дентином. Поставте попередній діагноз.

*** А) Гострий середній карієс.**

В) Хронічний середній карієс.

С) Гострий глибокий карієс.

Д) Хронічний глибокий карієс.

Е) Хронічний фіброзний пульпіт.

88. У 3-річної дитини декілька місяців тому почали руйнуватись передні зуби верхньої щелепи. На вестибулярній поверхні у пришийковій ділянці 52, 51, 61, 62 зубів виявлені каріозні порожнини в межах плащового дентину. Дно вкрито розм'якшеним дентином світло-жовтого кольору. Під час некротомії екскаватором на рівні емалево-дентинного сполучення з'явилась болісність. Поставте попередній діагноз.

*** А) Гострий середній карієс.**

В) Гострий поверхневий карієс.

С) Хронічний середній карієс.

Д) Гострий глибокий карієс.

Е) Хронічний поверхневий карієс.

89. Батьки 6-річної дитини звернулись до стоматолога з метою санації ротової порожнини. На дистальній контактній поверхні 85 зуба виявлена каріозна порожнина в межах плащового дентину. Дно і стінки щільні, пігментовані при зондуванні безболісні, на холодне зуб не реагує, перкусія зуба безболісна. Поставте попередній діагноз.

*** А) Хронічний середній карієс.**

В) Гострий середній карієс.

С) Хронічний глибокий карієс.

Д) Хронічний періодонтит.

Е) Хронічний фіброзний пульпіт.

90. Дитина 13 років скаржиться на короткочасний біль від холодного у верхньому лівому кутньому зубі. На жувальній поверхні 27 зуба виявлена каріозна порожнина з невеликим входним отвором. Після зняття нависаючих країв емалі розм'якшений, світлий дентин був легко видалений екскаватором в межах плащового дентину. Поставте попередній діагноз.

*** А) Гострий середній карієс.**

В) Хронічний середній карієс.

С) Гострий глибокий карієс.

Д) Гострий поверхневий карієс.

Е) Хронічний поверхневий карієс.

91. Дитина 13 років скаржиться на наявність порожнин в передніх зубах верхньої щелепи. На медіальних контактних поверхнях 11 і 21 зубів виявлені каріозні порожнини в межах плащового дентину, виповнені щільним пігментованим дентином. Зондування дна каріозних порожнин безболісне, перкусія зубів безболісна, реакція на термічні подразники відсутня. Виберіть оптимальний пломбувальний матеріал для постійних пломб.

*** А) Композитний матеріал.**

В) Силікатний цемент.

С) Силікофосфатний цемент.

Д) Цинкфосфатний цемент.

Е) Склоіономерний цемент

92. Батьки 5-річної дитини скаржаться на наявність нориці у ділянці лівих кутніх зубів верхньої щелепи. Коронкова частина 64 зубу значно зруйнована, зондування вустів кореневих каналів слабо болісне супроводжується значною кровоточивістю. Перкусія зубу безболісна. на набряклій цианотичній слизовій оболонці альвеолярного паростка у ділянці 64 зубу визначається нориця. Поставте попередній діагноз.

*** А) Хронічний гранулюючий періодонтит.**

- В) Хронічний гангренозний пульпіт.
- С) Загострення хронічного періодонтиту.
- Д) Хронічний фіброзний пульпіт.
- Е) Хронічний гіпертрофічний пульпіт.

93. Батьки у дитини 3-х років відмічають постійний біль у передніх зубах верхньої щелепи. Об'єктивно: коронкова частина 61 зубу має сірий колір, зруйнована. Зондування вуста кореневого каналу болісне, супроводжується кровоточивістю. Перкусія зуба різко болісна. На гіперемійованій, набряклій, болісній при пальпації слизовій оболонці в ділянці 61, 62 зубів визначається нориця. Поставте попередній діагноз.

*** А) Загострення хронічного періодонтиту.**

- В) Гострий гнійний періодонтит.
- С) Гострий дифузний пульпіт.
- Д) Хронічний гранулюючий періодонтит.
- Е) Загострення хронічного пульпіту.

94. Дитина 9 років скаржиться на наявність болісних виразок у ротовій порожнині, підвищення температури тіла до 38,0 С, слабкість, головний біль. В анамнезі харчова і медикаментозна алергія. На гіперемійованій і набряклій слизовій оболонці губ, щік і язика визначаються великі ерозивні поверхні з нерівними обрисами, вкриті фібринозним нальотом. По краю деяких з них виявлені залишки пухирів, симптом Никольського негативний. Губи покриті масивними кров'янисто-бурими кірками. Шкіра не ушкоджена. Поставте попередній діагноз.

*** А) Багатоформна ексудативна еритема.**

В) Хронічний рецидивуючий афтозний стоматит.

С) Рецидивуючий герпетичний стоматит

Д) Гострий герпетичний стоматит.

Е) Синдром Стівенса-Джонсона

95. На прийом до лікаря звернулась мати з дитиною 8-ми років з скаргами на зміну кольору передніх зубів в пришийковій ділянці. Гігієнічний індекс дорівнює 2,8, слина в'язка, КПВ+кп = 10 , на вестибулярній поверхні 21 | 12 в пришийковій ділянці крейдоподібні плями , забарвлюються 2% розчином метиленового синього. Ваш діагноз :

*** А) Вогнищева демінералізація.**

В) Гострий поверхневий карієс .

С) Ерозія емалі.

Д) Флюороз емалі

Е) Гіпоплазія емалі

96. Батьки 11-річної дитини скаржаться на наявність у ротовій порожнині декількох болісних виразок, які з'являються тричі на рік. На набряклій слизовій оболонці нижньої губи і язика виявлено дві афти овальної форми діаметро до 0,7см з гіперемійованою облямівкою. Афти вкриті нальотом білувато-сірого кольору, різко болісні при пальпації. Края афт дещо припіднімаються над оточуючою слизовою оболонкою. В анамнезі у дитини харчова алергія. Поставте попередній діагноз.

*** А) Хронічний рецидивуючий афтозний стоматит.**

- В) Рецидивуючий герпетичний стоматит
- С) Гострий герпетичний стоматит.
- Д) Багатоформна ексудативна еритема.
- Е) Медикаментозний стоматит.

97. Хлопчик 11 років скаржиться на наявність каріозної порожнини в зубі на нижній щелепі справа. Об'єктивно: В 46 каріозна порожнина в межах плащового дентину, дентин щільний, пігментований, реакція на холододовий подразник, зондування, перкусія безболісні. Визначте попередній діагноз.

*** А) Хронічний середній карієс**

- В) Гострий середній карієс
- С) Гострий глибокий карієс
- Д) Хронічний глибокий карієс
- Е) Хронічний поверхневий карієс

98. Дічинка 9 років скаржиться на наявність каріозної порожнини в зубі, біль в зубі, який швидко проходить після усунення подразника. Об'єктивно: в 36 каріозна порожнина в межах біляпульпарного дентину, з вузьким вхідним отвором дентин розм'якшений, реакція на холодний подразник болісна, швидко проходить, зондування дна болісне, перкусія безболісна. Визначте попередній діагноз

*** А) Гострий глибокий карієс**

- В) Гострий середній карієс
- С) Хронічний середній карієс
- Д) Хронічний глибокий карієс
- Е) Хронічний простий пульпіт

99. Дівчинка 11 років скаржиться на біль в зубі на верхній щелепі під час прийому їжі, який швидко проходить після усунення подразника. Об'єктивно: в 46 каріозна порожнина в межах біляпульпарного дентину, дентин розм'якшений, зондування дна болісне, перкусія безболісна. Використання якої пасти найбільш оптимальне в даному випадку?

*** А) Кальційвмісна паста**

- В) Тимолова паста
- С) Резорцин-формалінова паста
- Д) Йодоформна паста
- Е) Цинк-евгенолова

100. Хлопчик 11 років скаржиться на біль в зубі від солодкого, кислого.

Об'єктивно: в 21 на апроксимально-вестибулярній поверхні — крейдоподібна пляма з шершавою поверхнею, під час зондування визначається розм'якшення тканин зуба в центрі плями. Визначте попередній діагноз.

*** А) Гострий поверхневий карієс**

В) Гострий середній карієс

С) Початковий карієс

Д) Гіпоплазія емалі

Е) Флюороз емалі

101. Під час профілактичного огляду у дитини 10 років після зняття назубних нашарувань виявили на вестибулярній поверхні 11 та 21 ділянки емалі крейдоподібного кольору в пришийковій частині, поверхня їх гладка, щільна безболісна при зондуванні. Під час обробки 2% метиленовим синім ці ділянки зафарбовуються в синій колір. Визначте діагноз.

*** А) Початковий карієс**

В) Поверхневий карієс

С) Гіпоплазія емалі

Д) Флюороз емалі

Е) Середній карієс

102. Під час профілактичного огляду у дівчинки 11 років виявлено незначну гіперемію, ціаноз, набряк ясен, ясеневі сосочки розпушені, не прилягають щільно до шийок зубів, Г І за Федоровим-Володкіною — 4,0 бала, проба Шилера Пісарєва позитивна. Визначте попередній діагноз.

*** А) Хронічний катаральний гінгівіт**

В) Гіпертрофічний гінгівіт

С) Гострий катаральний гінгівіт

Д) Виразково-некротичний гінгівіт Е

103. Батьки з дитиною 1,5 року звернулись до лікаря-стоматолога зі скргами на підвищення температури тіла до 38°C, погіршення загального стану, наявність висипань в порожнині рота. Хворіє 3 день, висипання з'явилися день тому. Об'єктивно: загальний стан середнього ступеню важкості, t° —37,8°. На шкірі обличчя три пухиря. Слизова оболонка порожнини рота гіперемійована. На язиці, щоках, піднебінні ерозії (15-20). Підщелепні лімфатичні вузли збільшені, болісні при пальпації. Визначте попередній діагноз.

*** А) Гострий герпетичний стоматит**

- В) Хронічний рецидивуючий стоматит
- С) Багатоформна ексудативна ерітема
- Д) Виразково-некротичний стоматит
- Е) Гострий кандидозний стоматит

104. Хлопчик 7 років скаржиться на наявність зруйнованого зуба на нижній щелепі. Об'єктивно: коронка 75 зруйнована на 2/3, каріозна порожнина сполучається з порожниною зуба, реакція на холод, зондування безболісні, перкусія безболісна. На слизовій оболонці в області проекції кореня рубець від нориці. На R-грамі — ділянка деструкції в області біфуркації з нечіткими контурами. Визначте діагноз.

*** А) Хронічний гранулюючий періодонтит**

- В) Хронічний фіброзний періодонтит
- С) Хронічний гранульоматозний періодонтит
- Д) Хронічний фіброзний пульпіт
- Е) Хронічний гангренозний пульпіт

105. Мати дитини 1,5 року звернулася зі скаргами на наявність виразок у дитини в порожнині рота, слинотечу, в'ялість дитини, блювоту, підвищення температури до 39 градусів. Дитина хворіє другий день, захворіла раптово. Об'єктивно ясна гіперемійовані, набряклі. На слизовій оболонці язика, щік, губ знаходяться ерозії овальної форми, діаметром 2-3 мм, покритих білісоватим нальотом, болісні при пальпації. На шкірі обличчя навколо губ 4 міхурці, наповненні напівпрозорим вмістом. Підщелепові лімфовузли збільшені. Який попередній діагноз?

*** А) Гострий герпетичний стоматит.**

В) Гострий грибовий стоматит.

С) Багатоформна ексудативна ерітема.

Д) Медикоментозний стоматит.

Е) Рецидивуючий герпетичний стоматит

106. Дитина 3-х років скаржиться на наявність порожнини в зубі на нижній щелепі. Об'єктивно: в 84 зубі на жувальній поверхні каріозна порожнина в межах плащового дентиту. Дентин розм'якшений, зондування стінок порожнини болісне, перкусія безболісна. Визначте діагноз.

*** А) Гострий середній карієс.**

В) Хронічний поверхневий карієс.

С) Хронічний фіброзний пульпіт.

Д) Гострий глибокий карієс.

Е) Хронічний глибокий карієс.

107. Батьки дитини 8 років звернули увагу на наявність плям на передній поверхні 21 зуба. Зі слів батьків у дитини в 3 роки була травма 51, 61 зубів. Об'єктивно: пляма середньої величини, крейдоподібна, має чіткі межі. Виберіть найбільш імовірний діагноз.

*** А) Місцева гіоплазія**

- В) Карієс в стадії плями
- С) Флюороз
- Д) Системна гіоплазія
- Е) Вогнищева гіоплазія

108. Хворому 7 років. Скарги на болі під час їди в ділянці 36 зуба. Об'єктивно: в 36 зубі глибока каріозна порожнина, порожнина зуба закрита, зондування дна різко болюче. Болі від температурних подразників швидко проходять перкусія негативна. Виберіть пасту для лікування даного зуба.

*** А) На основі гідроокису кальцію**

- В) Параформальдегідна паста
- С) Резорцин-формалінова паста
- Д) З додаванням кортикостероїдів
- Е) Тимолова паста

109. Хворому 5 років. Діагноз: глибокий хронічний карієс на контактних та жувальних поверхнях 75, 74, 84, 85 зубів. Який пломбувальний матеріал необхідно використати?

*** А) Срібна амальгама**

- В) Силідонт
- С) Евікрол
- Д) Силіцин
- Е) Інфантид

110. Батьки хлопчика 5 років звернулись до стоматолога - педіатра з метою санації дитини. При клінічному обстеженні порожнини рота в 65 зубі виявлена каріозна порожнина в межах біляпульпарного дентину. порожнина зуб закрита, зондування не болюче, на термічні подразники не реагує, перкусія безболісна. Спостерігається симптом вазопарезу. На рентгенограмі в періапикальній ділянці резорбція кісткової тканини з нечіткими контурами. Визначте діагноз.

*** А) Хронічний гранулюючий періодонтит**

В) Хронічний фіброзний періодонтит

С) Хронічний гранулюючий остит

Д) Хронічний гранульоматозний періодонтит

Е) Радикалярна киста

111. Мати 4-річного хлопчика звернулась до стоматолога зі скаргами на наявність темної плями на поверхні нижнього зуба зліва у дитини. Об'єктивно: виявлена каріозна порожнина в межах плащового дентину на жувальній поверхні 74 зуба, заповнена пігментованим дентином стінок. Після препарування - дно каріозної порожнини щільне, зондування злегка болісне. Реакція на температурні подразники негативна. На перкусію зуб не реагує. Виберіть найбільш імовірний діагноз.

*** А) Хронічний середній карієс**

В) Гострий середній карієс

С) Хронічний поверхневий карієс

Д) Хронічний глибокий карієс

Е) Хронічний періодонтит

112. У хлопчика 11 років скарги на короткочасний біль від холодного в зубі на нижній щелепі зліва. Об-но: в 36 на медіальній поверхні каріозна порожнина в межах навколо-пульпарного дентину, що не сполучається з порожниною зуба, виповнена світлим, розмягченим дентином. Зондування дна 36 зуба болісне, перкусія безболісна, реакція на холодний подразник швидко зникає після його усунення. Який діагноз найбільш вірогідний?

*** А) Гострий глибокий карієс**

В) Гострий вогнищевий пульпіт

С) Гострий дифузний пульпіт

Д) Хронічний фіброзний пульпіт

Е) Гострий середній карієс

113. У хлопчика 6,5 років скарги на біль в 75 зубі під час їжі. Об-но: на медіально-апроксимальній поверхні 75 зуба глибока каріозна порожнина, виповнена пігментованим, розмягченим дентином. Зондування дна відчутне. Під час некротомії на дні виявлено точку сполучення з порожниною зуба, яка кровоточить і болісна при дотику. Який діагноз найбільш вірогідний?

*** А) Хронічний фіброзний пульпіт**

В) Хронічний гангренозний пульпіт

С) Хронічний фіброзний періодонтит

Д) Гострий глибокий карієс

Е) Гострий дифузний пульпіт

114. У дівчинки 13 років скарги на біль від холодного в 46 зубі. Півроку тому зуб було запломбовано, пломба випала і зуб почав реагувати на термічні подразники. Об-но: на жувальній поверхні 46 зуба глибока каріозна порожнина, виповнена розмягченим дентином. Зондування дна болісне, реакція на холодний подразник болісна, але швидко зникає після його усунення. Виберіть найбільш оптимальну лікувальну пасту.

*** А) Гидрокискальцій-вмісна**

- В) Тимолова
- С) Йодоформна
- Д) Кортикостероїдна
- Е) Цинк-евгенолова

115. Хворий Б., 14 років звернувся до лікаря зі скаргами на відчуття оскомини в ділянці 24, 14 зуба в пришийковій ділянці на щічній поверхні біла виявлено крейдоподібну пляму з нерівними але чіткими контурами. Поверхня плями гладка, фарбується розчином метиленового синього. Який ймовірний діагноз?

*** А) Початковий карієс**

- В) Плямиста форма флюорозу
- С) Поверхневий карієс
- Д) Місцева гіпоплазія
- Е) Системна гіпоплазія

116. Девочке 13 лет после обследования был поставлен диагноз хронического гипертрофического гингивита, фиброзная форма. Какие лекарственные препараты необходимо назначить в первую очередь?

*** А) Склерозирующие**

- В) Противовоспалительные
- С) Протеолитические ферменты
- Д) Кортикостероиды
- Е) Противогрибковые

117. У девочки 14 лет жалобы на косметический дефект из-за нарастания десны на зубы. Беспокоит в течение года. При осмотре: коронки зубов верхней и нижней челюсти на 1/3 покрыты десной, кровоточащей при прикосновении. Определяются ложные десневые карманы до 4 мм. Гигиеническое состояние полости рта неудовлетворительное, прикус ортогнатический, на рентгенограмме патологических изменений в альвеолярной кости не обнаружено. Ваш предполагаемый диагноз?

*** А) Хронический гипертрофический гингивит**

- В) Хронический катаральный гингивит
- С) Хронический генерализованный пародонтит
- Д) Хронический локализованный пародонтит
- Е) Фиброматоз десен

118. Хлопчик 11 років скаржитися на біль в зубі при прийомі теплої чи гарячої їжі. Об'єктивно: В 26 глибока каріозна порожнина виповнена розм'ягшеним дентимом з неприємним запахом. Порожнина зуба відкрита, зондування її безболісне. Зуб сірого кольору, реакція на холодний подразник, перкусія безболісні. Визначте діагноз?

*** А) Хронічний гангренозний пульпіт.**

- В) Хронічний фіброзний періодонтит.
- С) Хронічний гранульоматозний періодонтит.
- Д) Хронічний простий пульпіт.
- Е) Хронічний гранулюючий періодонтит.

119. Ребенок 10 лет жалуется на покраснение и припухлость губ. Болеет несколько лет.Объективно: губы отечны, увеличены в размерах, рот полуоткрыт. На гиперемированной красной кайме, в зоне Клейна, множество влажных чешуек и желто-коричневых корочек, после удаления которых обнажается ярко-красная, гладкая поверхность. Кожа губ, углы рта без патологических изменений. Ваш предполагаемый диагноз?

*** А) эксфолиативный хейлит**

В) Актинический хейлит

С) Экзематозный хейлит

Д) Микотический хейлит

Е) Аллергический хейлит

120. У ребенка 5-ти лет жалобы, со слов матери, на боль при глотании, слабость, повышение t (тела до 39,5(С, припухшие “железы” под подбородком. Объективно: состояние ребенка тяжелое, t - 38,8(С. Слизистая полости рта резко гиперемирована, отечна с кровоизлияниями, изъязвлениями. Зев резко гиперемирован, лакуны расширены с участками некроза. Увеличенные, плотные, болезненные лимфоузлы как регионарные, так и шейные, затылочные. Каков Ваш предполагаемый диагноз?

*** А) Инфекционный мононуклеоз**

В) Острый герпетический стоматит

С) Язвенно-некротический гингивостоматит

Д) Герпетическая ангина

Е) Лакунарная ангина

121. У ребенка 7 лет боли при приеме пищи и от горячего в зубе на верхней челюсти слева. Объективно: на медиально-жевательной поверхности 64 зуба глубокая кариозная полость с размягченным дентином, после удаления которого обнаружено сообщение с полостью зуба. Глубокое зондирование в устьях корневых каналов болезненно. При сравнительной перкуссии - незначительная болезненность, цвет зуба не изменен. Подчелюстные лимфоузлы увеличены, слабоболезненны. Ваш предварительный диагноз?

*** А) Хронический гангренозный пульпит**

- В) Хронический простой пульпит
- С) Обострение хронического пульпита
- Д) Острый гнойный пульпит
- Е) Острый гнойный периодонтит

122. У дитини 8 років при огляді ротової порожнини на вестибулярній поверхні 11 12 в пришийковій ділянці виявлено плями білого кольору з нерівними краями, поверхня гладка, забарвлюється барвником. Ваш діагноз.?

*** А) Вогнищева демінералізація**

- В) Гіпоплазія емалі
- С) Поверхневий карієс
- Д) Ерозія емалі
- Е) Зуби Фурньє

123. Ребенок 9 лет жалуется на кратковременные боли от сладкого в 22 зубе . Объективно : на вестибулярной поверхности 22 зуба дефект в пределах эмали . Зондирование безболезненное . Поставьте диагноз ?

*** А) Острый поверхностный кариес .**

- В) Флюороз эмали .
- С) Гипоплазия эмали .
- Д) Острый начальный кариес .
- Е) Острый средний кариес .

124. У підлітка 14 років температура тіла 38 С, біль в суглобах та м'язах, головний біль, загальна слабкість. Скаржиться на біль під час їди та розмови. Об'єктивно: губи набряклі, в окремих ділянках вкриті кров'яними кірками. Слизова оболонка порожнини рота набрякла, гіперемійована, багато ерозій неправильної форми, покритих фібринозним нальотом. На шкірі кистей рук та передпліччя - папули. Виберіть найбільш ймовірний діагноз.

*** А) Багатоформна ексудативна еритема**

- В) Міхурниця
- С) Гострий герпетичний стоматит
- Д) Синдром Стивенса-Джонсона
- Е) Вроджений бульозний епідермоліз

125. Дівчинка 6 років. Скарги на неправильне розташування нижніх зубів. Об'єктивно: обличчя симетричне, пропорційне. В порожнині рота: всі різці на верхній і нижній щелепі постійні, перші постійні моляри прорізались, ключ оклюзії збережений, 12 і 22 зуби повернуті навколо осі і розташовані вестибулярно. Вкажіть можливу причину даної деформації.

*** А) Раннє прорізування постійних зубів**

- В) Шкідливі звички: смоктання пальців, закусування нижньої губи
- С) Затримка резорбції коренів молочних зубів
- Д) Звуження зубного ряду верхньої щелепи
- Е) Затримка прорізування постійних зубів

126. Дитина 10 років звернулась до стоматолога зі скаргами на постійний біль, ниючого характеру в ділянці 21 зуба, який посилюється при накушуванні на зуб. Об'єктивно: в 21 зубі - пломба. Вертикальна перкусія болісна. Слизова оболонка в ділянці причинного зуба гіперемійована, набрякла, при пальпації болісна. На рентгенограмі 21 зуба кореневий канал запломбований на 1/2 довжини. Незначнерозширення періодонтальної щілини. Виберіть найбільш ймовірну причину даного захворювання?

*** А) Неповна obturaція кореневого каналу**

В) Гостра травма періодонту

С) Хронічна травма періодонту

Д) Неправильна медикаментозна обробка кореневого каналу

Е) --

127. У жіночій консультації було проведено бесіди з вагітними жінками про значення характеру харчування для закладки та розвитку зубів майбутньої дитини. На якому тижні внутрішньоутробного розвитку починається закладка фолікулів тимчасових зубів у плода?

*** А) На 7-му тижні**

В) На 15-му тижні

С) На 18-му тижні

Д) На 4-му тижні

Е) На 12-му тижні

128. Дівчинка 13 років скаржиться на наявність порожнини в зубі. Зуб раніше лікувався. Об'єктивно: у 26 глибока каріозна порожнина, яка сполучається з порожниною зуба. Реакція на холодний подразник, зондування, перкусія - безболісні. На рентгенограмі - розширення періодонтальної щілини. Визначте діагноз.

*** А) Хронічний фіброзний періодонтит.**

В) Хронічний гранулюючий періодонтит.

С) Хронічний гранульоматозний періодонтит.

Д) Хронічний гангренозний пульпіт.

Е) -- Хронічний фіброзний пульпіт

129. Батьки дитини 1.5 місячного віку скаржаться на наявність білуватих нашарувань на слизовій щік, губ у дитини. Об'єктивно: слизова оболонка губ, щік гіперемована, вкрита сироподібними нашаруваннями, які легко знімаються. Назвіть збудника даного захворювання.

*** А) Гриби роду Candida.**

В) Спірохета Венсана.

С) Веретеноподібна паличка.

Д) Паличка Леффлера.

Е) Диплококи Нейссера.

130. Хлопчик 7 років скаржиться на підвищення температури тіла до 38 (С, головний біль, біль у горлі. Об'єктивно: на злегка гіперемованій слизовій оболонці м'якого піднебіння, передніх піднебінних дужках, на мигдаликах - ерозії. Підщелепні лімфатичні вузли ледь збільшені, безболісні. Який збудник даного захворювання.

*** А) Вірус Коксаки .**

В) Вірус простого герпесу.

С) Вірус Епштейна-Барра.

Д) Паличка Леффлера

Е) -- Паличка Борде-Жанду

131. Хлопчик 6 років скаржиться на наявність порожнини в зубі, який раніше лікувався. Об`єктивно: В 85 каріозна порожнина в межах плащового дентину, дентин щільний пігментований, зондування дна та стінок, реакція на термічний подразник, перкусія безболісні. Під час препарування відмічається чутливість по емалево-дентинному сполученню. Визначте діагноз.

*** А) Хронічний середній карієс.**

В) Хронічний глибокий карієс.

С) Гострий середній карієс.

Д) Гострий глибокий карієс.

Е) Хронічний поверхневий карієс.

132. Дівчинка 12 років скаржиться на наявність каріозної порожнини в зубі. Об`єктивно: В 36 каріозна порожнина І кл. за Блекум з широким вхідним отвором, в межах біляпульпарного дентину. Дентин щільний, пігментований. Реакція на холодний подразник чутлива, перкусія безболісна. Визначте діагноз.

*** А) Хронічний глибокий карієс.**

В) Хронічний середній карієс.

С) Гострий глибокий карієс.

Д) Гострий середній карієс.

Е) --

133. Лікар педіатр направив на консультацію стоматолога дівчинку 6 років. Захворіла день тому, температура 38,2 (С, нежить, кашель. В порожнині рота на слизовій оболонці щік, на рівні молярів плями білувато-жовтого кольору, розміром з булавочну головку, що виступають над рівнем слизової оболонки. На слизовій м'якого піднебіння яскраво-червоні плями неправильної форми. Визначте попередній діагноз.

*** А) Зміни слизової оболонки порожнини рота при корі.**

- В) Зміни слизової оболонки порожнини рота при === мононуклеозі.
- С) Зміни слизової оболонки порожнини рота при дифтерії.
- Д) Зміни слизової оболонки порожнини рота при вітряній віспі.
- Е) Зміни слизової оболонки порожнини рота при скарлатині.

134. Хлопчик 13 років скаржиться на наявність порожнини в зубі. Об'єктивно: у 26 глибока каріозна порожнина, сполучається з порожниною зуба, реакція на термічний подразник, зондування, перкусію безболісні. Стоматолог визначив діагноз: хронічний періодонтит. Який додатковий метод обстеження необхідно провести для уточнення діагнозу?

*** А) Рентгенографія**

- В) ЕОД
- С) Термометрія
- Д) Реографія
- Е) --

135. Під час профілактичного огляду у хлопчика 8 років було виявлено по лінії змикання зубів ділянки гіперкератозу сірувато-білого кольору, які не знімаються. Був поставлений діагноз - м`яка лейкоплакія. Хлопчик постійно закушує щоки. З чого потрібно почати лікування?

*** А) Усунення шкідливої звички.**

- В) Призначення седативних препаратів.
- С) Призначення полівітамінів.
- Д) Призначення кератопластичних препаратів.
- Е) --

136. Батьки дитини 2-х місячного віку скаржаться на наявність сироподібних нашарувань на слизовій щік, язиці. Після огляду лікар-стоматолог визначив діагноз: гострий кандидозний стоматит середнього ступеня важкості. З призначення яких препаратів потрібно розпочати місцеве лікування?

*** А) Протигрибкових.**

- В) Кератопластичних.
- С) Антисептичних.
- Д) Ферментативних.
- Е) Противірусних.

137. Хлопчик 7,5 років впав, вдарився лицем і травмував верхні передні зуби. Об'єктивно: коронки 11 і 12 зубів відсутні на 1/4. Порожнина зубів закрита. Під час зондування - біль по лінії відлому коронок 11 і 12 зубів, їх перкусія безболісна. Слизова оболонка в ділянці 11 і 12 зубів злегка гіперемійована. На рентгенограмі 11 і 12 зубів: цілісність тканин зубів і альвеолярного паростка. Яка тактика лікаря-стоматолога буде найкращою в даному випадку в перші години після травми?

*** А) Спостереження за станом пульпи.**

- В) Виготовлення штучної коронки.
- С) Пломбування фотополімерами.
- Д) Встановлення парапульпарних штифтів.
- Е) Пломбування композитами.

138. Дівчинці 1 рік і 2 місяці. На вестибулярній поверхні 52,51,61,62 обширні каріозні порожнини в межах емалі. Зондування злегка болісне, перкусія 52,51,61,62 безболісна. Яка тактика лікування доцільна в даному випадку?

*** А) Імпрегнація сріблом**

- В) Пломбування фосфат-цементом
- С) Ремінералізуюча терапія
- Д) Покриття фтор-лаком
- Е) Пломбування амальгамою

139. Девочка 6 месяцев направлена на консультацию по поводу язвы на небе, которая появилась 3,5 месяца назад. Из анамнеза: родилась недоношенной, вскармливание искусственное. Объективно: на твердом небе слева при переходе на мягкое определяется язва размером 1,3х0,8см овальной формы, покрытая желто-серым налетом с выраженным инфильтрационным валом. Поставьте диагноз.

*** А) Афта Беднара**

- В) Рецидивирующий афтозный стоматит
- С) Острый герпетический стоматит
- Д) Афта Сеттона
- Е) Врожденный сифилис

140. Ребенок 4 лет жалуется на боли в зубе на верхней челюсти во время еды. При осмотре: в 65 - кариозная полость на дистально-апроксимальной поверхности в пределах плащевого дентина с пигментированным размягченным дентином на дне и стенках. Зондирование стенок болезненное, перкуссия безболезненная, реакция на холод - кратковременная. Полость зуба закрыта. Каков наиболее вероятный диагноз?

*** А) Острый средний кариес**

- В) Хронический периодонтит
- С) Острый глубокий кариес
- Д) Хронический средний кариес
- Е) Хронический фиброзный пульпит

141. Ребенок 10 месяцев беспокоен, отказывается от пищи. Заболел 2 дня назад. Находится на лечении у педиатра по поводу пневмонии, получал антибиотики, сульфаниламиды. Объективно: слизистая оболочка полости рта гиперемизованная, отечная, белесоватый налет на слизистой щек, губ, твердого и мягкого неба, который снимается, на некоторых участках - с образованием эрозий. Подчелюстные лимфоузлы увеличены. Каков наиболее вероятный диагноз?

*** А) Острый кандидозный стоматит**

В) Острый герпетический стоматит

С) Десквамативный глоссит

Д) Аллергический стоматит

Е) Хронический кандидозный стоматит

142. Дівчинка 10 років скаржиться на наявність каріозної порожнини в зубі на нижній щелепі. Об'єктивно: в 26 каріозна порожнина в межах біляпульпарного дентину, дентин щільний, пігментований, реакція на холодний подразник відчутна, зондування, перкусія безболісні. Визначте попередній діагноз.

*** А) Хронічний глибокий карієс**

В) Гострий середній карієс

С) Гострий глибокий карієс

Д) Хронічний середній карієс

Е) Хронічний простий пульпіт

143. Девочка 7 лет заболела остро 3 дня назад. Температура $40,3^{\circ}\text{C}$. На коже лица, шеи, груди, спины, предплечий, голеньях - красно-багровая папулезная сыпь и единичные пузыри диаметром до 4-5 см, наполненные серозным содержимым. В полости рта: на слизистой оболочке, на языке имеются обширные эрозии, покрытые белесоватым налетом, резко болезненные при дотрагивании. Губы отечны, гиперемированы, покрыты кровянистыми корками. Конъюнктивит. На коже век - кровянистые корочки и пузырьки. Периферические лимфоузлы увеличены незначительно. Каков наиболее вероятный диагноз?

*** А) Синдром Стивенса-Джонсона**

- В) Коревого стоматит
- С) Многоформная экссудативная эритема
- Д) Острый герпетический стоматит
- Е) Синдром Лайелла

144. Батьки 7-річної дитини скаржаться на косметичний дефект передніх зубів верхньої щелепи, які прорізалися ураженнями. Під час об'єктивного обстеження на ріжучих краях 11, 21 і на горбах 16, 26, 36, 46 виявлені білі блискучі плями. При їх зондуванні шерехатість не визначається. Яке додаткове дослідження необхідне?

*** А) Забарвлення метиленовим синім**

- В) Забарвлення розчином Люголя
- С) Електроодонтометрія
- Д) Рентгенографія
- Е) ---

145. Батьки 9-річної дитини скаржаться на косметичний дефект переднього правого верхнього зуба, який прорізався з ураженою емаллю. В анамнезі - передчасне видалення 62 зуба з приводу ускладнення карієса. На вестибулярній поверхні 22 зуба виявлена пляма білувато-жовтого кольору з чіткими обрисами. Емаль над нею не втратила блиск, при її зондуванні шерехатість не визначається. Поставте попередній діагноз.

*** А) Місцева гіоплазія емалі.**

В) Системна гіоплазія емалі.

С) Флюороз.

Д) Гострий поверхневий карієс.

Е) Хронічний поверхневий карієс.

146. Батьки 12-річної дитини скаржаться на наявність білих плям на передніх зубах верхньої щелепи, які з'явилися пізніше тому. На вестибулярній поверхні у пришийковій ділянці 13, 12, 11, 21, 22, 23 виявлені крейдоподібні плями. Емаль над ними втратила блиск, при зондуванні - піддатлива, шерехата. В анамнезі - короткочасний біль від хімічних подразників. Поставте попередній діагноз.

*** А) Гострий початковий карієс**

В) Хронічний початковий карієс

С) Гострий поверхневий карієс

Д) Системна гіоплазія емалі

Е) Флюороз зубів

147. Дитина 6 років скаржиться на біль під час їжі у нижньому правому кутньому зубі. На дистальній контактній і жувальній поверхнях 84 зуба виявлена каріозна порожнина, заповнена розм'якшеним дещо пігментованим дентином. Зондування дна болісне, перкусія зуба безболісна. Під час некротомії екскаватором визначено сполучення з порожниною зуба, зондування якого супроводжується різким болем і кровоточивістю. Поставте попередній діагноз.

*** А) Хронічний фіброзний пульпіт.**

- В) Гострий глибокий карієс.
- С) Гострий дифузний пульпіт.
- Д) Хронічний періодонтит.
- Е) Хронічний глибокий карієс.

148. Дитина 7 років скаржиться на самочинний біль у верхніх правих кутніх зубах. На медіальній контактній і жувальній поверхнях 55 зуба виявлена каріозна порожнина, заповнена розм'якшеним світлим дентином, локалізована в межах біляпульпарного дентину. Зондування дна різко болісне, перкусія зуба дещо болісна. Слизова оболонка альвеолярного паростку в проекції коренів 55 зуба не ушкоджена, рентгенологічних змін у цій ділянці не виявлено. Поставте діагноз.

*** А) Гострий дифузний пульпіт.**

- В) Хронічний фіброзний пульпіт.
- С) Хронічний гангренозний пульпіт.
- Д) Загострення хронічного періодонтиту.
- Е) Гострий глибокий карієс.

149. Дитина 7,5 років скаржиться на наявність каріозної порожнини, зміну кольору переднього правого зуба верхньої щелепи. На медіальній контактній поверхні 11 виявлена каріозна порожнина, заповнена розм'якшеним дентином, локалізована в межах біляпульпарного дентину. Визначається сполучення між каріозною порожниною і порожниною зуба, зондування якого безболісне. Перкусія зуба безболісна. Виберіть оптимальний матеріал для кореневої пломби.

*** А) Гідроокискальційвмісна паста**

- В) Формокрезолова паста
- С) Резорцин-формалінова паста
- Д) Йодоформна паста
- Е) Тимолова паста

150. Дитина 12 років скаржиться на кровоточивість ясен під час чищення зубів протягом декількох років. Слизова оболонка ясен в ділянці 31, 32, 33, 41, 42, 43 ціанотична, набрякла, ясенний край валикоподібно потовщений. Відзначається скупченість нижніх фронтальних зубів. На рентгенограмі в ділянці 31, 32, 33, 41, 42, 43 кортикальна пластинка визначається по всій довжині. Поставте діагноз.

*** А) Катаральний гінгівіт**

- В) Гіпертрофічний гінгівіт
- С) Локалізований пародонтит
- Д) Генералізований пародонтит
- Е) -

151. Дитина 13 років скаржиться на розростання і кровоточивість ясен під час чищення зубів. Слизова оболонка ясен в ділянці нижніх і верхніх фронтальних зубів набрякла, має ціанотичний відтінок. Ясенні сосочки округлої форми, збільшені у розмірах, перекривають коронкові частини зубів на 1/3, легко кровоточать при дотику. Яке додаткове дослідження необхідне для визначення остаточного діагнозу?

*** А) Рентгенографія**

В) Проба Писарєва-Шиллера

С) Проба Кулаженко

Д) Реопародонтографія

Е) ---

152. Дівчинка 5 років скаржиться на наявність каріозної порожнини в зубі. Об'єктивно: в 84 каріозна порожнина в межах плащового дентину, який легко знімається шарами, реакція на холод, зондування, перкусія безболісна препарування каріозної порожнини чутливе по емальово-дентинному сполученню. Визначте попередній діагноз.

*** А) Гострий середній карієс**

В) Хронічний середній карієс

С) Гострий глибокий карієс

Д) Хронічний глибокий карієс

Е) Гострий поверхневий карієс

153. У хлопчика 7 років під час профілактичного огляду виявлено по ріжучому краю постійних центральних різців та горбах перших постійних молярів зменшення товщини емалі, жовтого кольору, емаль гладка і реакція на холод, зондування, перкусія безболісні. Зміни в зубах помітили під час їх прорізування. Визначте попередній діагноз.

*** А) Гіоплазія емалі**

- В) Флюороз емалі
- С) Початковий карієс
- Д) Поверхневий карієс
- Е) Клиноподібний дефект емалі

154. Дівчинка 12 років з'явилась до лікаря-стоматолога з метою профілактичного огляду. Об'єктивно: зуби інтактні, прикус відкритий, слизова оболонка в області папілярної та маргинальної частини гіперемійована з ціанотичним відтінком, відмічається збільшення ясенних сосочків, які закривають 1/3 висоти коронки фронтальних зубів верхньої щелепи, форма ясенних сосочків округла. Визначте попередній діагноз.

*** А) Гіпертрофічний гінгівіт**

- В) Хронічний катаральний гінгівіт
- С) Гострий катаральний гінгівіт
- Д) Фіброматоз ясен
- Е) ----

155. Підліток 14 років скаржиться на біль в порожнині рота під час їжі, головний біль, слабкість, підвищення температури тіла до 38°C, наявність висипань. Об'єктивно: на шкірі обличчя та рук — еритематозні плями, папули з двуконтурним забарвленням. Червона облямівка губ набрякла, вкрита кров'яними кірками, слизова порожнини рота набрякла, гіперемійована, з множинними ерозіями, покритими сіруватим нашаруванням з обривками покришок пухирів. Підщелепні лімфовузли збільшені, болісні при пальпації. Визначте попередній діагноз.

*** А) Багатоформна ексудативна еритема**

- В) Гострий герпетичний стоматит
- С) Хронічний рецидивуючий герпетичний стоматит
- Д) Інфекційний мононуклеоз
- Е) Виразково-некротичний стоматит

156. Дівчинка 6 років скаржиться на біль в зубі під час їжі. Об'єктивно: в 85 на жувальній поверхні глибока каріозна порожнина, дентин розм'якшений, порожнина зуба відкрита, при зондуванні кровоточить, болісна. Реакція на холодний подразник болісна, перкусія безболісна. Визначте попередній діагноз.

*** А) Хронічний простий пульпіт**

- В) Хронічний гіпертрофічний пульпіт
- С) Хронічний гангренозний пульпіт
- Д) Гострий серозний пульпіт
- Е) Гострий гнійний пульпіт

157. Дівчинка 6 років скаржиться на ниючий біль в зубі на нижній щелепі, що посилюється при накусуванні. Об'єктивно: В 84 глибока каріозна порожнина, що сполучається з порожниною зуба, зондування безболісне, перкусія болісна, слизова оболонка гіперемійована, набрякла. Який додатковий метод обстеження необхідно провести для уточнення діагнозу?

*** А) Внутрішньоротова рентгенографія**

В) Електроодонтодіагностика

С) Термометрія

Д) Телерентгенографія

Е) Панорамна рентгенографія

158. Дівчинка 12 років скаржиться на наявність каріозної порожнини в зубі на верхній щелепі. Об'єктивно: в 26 глибока каріозна порожнина, сполучається з порожниною зуба, реакція на холодний подразник, зондування, перкусія— безболісні. На рентгенограмі — розширення періодонтальної щілини дистального кореня. Визначте попередній діагноз.

*** А) Хронічний фіброзний періодонтит**

В) Хронічний гранулюючий періодонтит

С) Хронічний гранульоматозний періодонтит

Д) Хронічний простий пульпіт

Е) Хронічний гангренозний пульпіт

159. Хлопчик 13 років скаржиться на відчуття важкості в зубі, біль від гарячого, неприємний запах із рота. Об'єктивно: коронка 46 сірого кольору. В 46 глибока каріозна порожнина, сполучається з порожниною зуба, поверхнєве зондування безболісне, глибоке - болісне, перкусія - безболісна, слизова оболонка без змін. Визначте попередній діагноз.

*** А) Хронічний гангренозний пульпіт**

- В) Хронічний простий пульпіт
- С) Хронічний фіброзний періодонтит
- Д) Хронічний гранулюючий періодонтит
- Е) Загострення хронічного періодонтиту

160. Пацієнтка ., 14-ти років, звернулась до стоматолога зі скаргами на кровоточивість ясен, неприємний запах з рота . Об'єктивно : слизова ясен гіперемована, пастозна, відзначається кровоточивість. Проба Шиллєрова - Писарєва позитивна. Індекс РМА становить 70%, ГІ по Фед. - Володк. дорівнює 3. На рентгенограмі фронтального відділу щелеп картикальна пластинка збережена . Ваш діагноз ?

*** А) Хронічний генералізований катаральний гінгівіт**

- В) Хронічний генералізований пародонтит
- С) Гострий генералізований катаральний гінгівіт
- Д) Хронічний генералізований гіпертрофічний гінгівіт
- Е) Загострення хронічного генералізованого парадонтиту

161. Дільничим педіатором до стоматолога направлено дитину 2 - х років із скаргами на появу висипань в порожнині рота .Підвищення температури тіла до 38,5 С, нежить, кашель, блювота. Об'єктивно: температура тіла 37,20 С, шкірні покриви бліді, дитина в'яла, адинамічна. На фоні гіперемованої СОПР є 12 - 16 афт., катаральний гінгівіт, регіонарний аденіт.Визначте діагноз:

*** А) Гострий герпетичний стоматит.**

- В) Рецидивуючий герпетичний стоматит
- С) Хронічний рецидивуючий афтозний стоматит.
- Д) Багатоформна ексудативна ерітема
- Е) Гострий кандидозний стоматит

162. Хлопчик 8-ми років скаржиться на гострий короткочасний біль у 11 від холодного і солодкого. Об'єктивно: в 11 каріозна порожнина на медіоконтактній поверхні в межах емалево-дентинного сполучення, виповнена розм'якшеним вологим дентином, який легко знімається пластами. Краї емалі білого кольору, підриті, крихкі. Поверхнєве зондування неболюче, термометрія позитивна, перкусія негативна. Виберіть пломбувальний матеріал.

*** А) Склоіономерний цемент**

- В) Силіко-фосфатний цемент
- С) Композитний матеріал
- Д) Срібна амальгама
- Е) Силікатний цемент

163. Дитина 8 років скаржиться на біль в 75 при вживанні гарячої їжі. Об'єктивно: 75 змінений в кольорі, каріозна порожнина заповнена некротичними масами з неприємним запахом, порожнина зуба відкрита, зондування вічок каналів болюче, перкусія негативна. Який найбільш імовірний діагноз?

- * А) Хронічний гангренозний пульпіт**
- В) Загострення хронічного пульпіту
- С) Хронічний гіпертрофічний пульпіт
- Д) Хронічний фіброзний пульпіт
- Е) Загострення хронічного періодонтиту

164. Батьки дівчинки 5 років звернулись до стоматолога - педіатра з метою санації дитини. Після клінічного обстеження був поставлений діагноз: хронічний глибокий карієс 54 зуба. Виберіть пломбувальний матеріал для відновлення анатомічної форми зуба:

- * А) Склоіономерний цемент**
- В) Цинк-фосфатний цемент
- С) Силікатний цемент
- Д) Композитний матеріал
- Е) Силікофосфатний цемент

165. Родители ребенка 5 лет обратились с жалобами на периодически возникавшие боли в зубе нижней челюсти .Объективно : 85 зуб изменен в цвете, на жевательной поверхности кариозная полость, сообщающаяся с полостью зуба, зондирование и перкуссия безболезненны . На слизистой оболочке в области 85 зуба - свищ . Поставьте диагноз .

- * А) Хронический гранулирующий периодонтит .**
- В) Хронический гангренозный пульпит .
- С) Хронический гранулематозный периодонтит .
- Д) Хронический фиброзный пульпит
- Е) Хронический фиброзный периодонтит .

166. У дитини 6,5 років під час профілактичного огляду виявлено каріозну порожнину на дистально-апроксимальній поверхні 65 в межах плащового дентину. Дно та стінки пігментовані, щільні, при зондуванні безболісні, на холодне зуб не реагує, перкусія безболісна. Під час препарування відзначається болісність на рівні емалево-дентинного сполучення. Який найбільш вірогідний діагноз?

*** А) Хронічний середній карієс**

В) Гострий середній карієс

С) Хронічний глибокий карієс

Д) Хронічний фіброзний пульпіт

Е) Хронічний гранулюючий періодонтит

167. Під час огляду у дитини 9 років в пришийковій ділянці 12, 11, 21, 22 виявлено крейdneyноподібні плями, які з'явились 2 тижня тому. Плями - без блиску, з поверхнею, яка забарвлюється метиленовим синім. Холодовий подразник реакції уражених зубів не викликає. Якою має бути тактика лікаря відносно уражених зубів ?

*** А) Ремінералізуюча терапія**

В) Імпрегнаційна терапія

С) Зішліфування пошкоджених ділянок

Д) Диспансерне спостереження

Е) -

168. Ребенок 4 лет практически здоров, обратился с целью санации.

Объективно: на жевательной поверхности 75 кариозная полость в пределах плащевого дентина, выполненная размягченным дентином. Эмалево-дентинное соединение болезненно при зондировании. Каков наиболее оптимальный материал для постоянной пломбы?

*** А) Стеклоиономерный цемент**

- В) фосфатный цемент
- С) силикофосфатный цемент
- Д) Композитный материал
- Е) силикатный цемент

169. Дитина 6 років звернулась до стоматолога-педіатра з метою

профілактичного обстеження. Об'єктивно: Порожнина рота санована. 16, 26, 36, 46 зуби інтактні, прорізались 3 місяці тому. Який з відомих методів попередження карієсу доцільно використати?

*** А) Герметизація фісур зубів**

- В) Аплікації 10\% розчином глюконату кальцію
- С) Ионофорез 1\% раствором NaF
- Д) Покрытие фтористым лаком
- Е) Прием препарата "Витафтор"

170. Дитина 9 років скаржиться на біль під час їжі у лівому передньому зубі верхньої щелепи. На медіальній контактній поверхні 22 зуба виявлена каріозна порожнина, заповнена розм'якшеним світлим дентином, яка сполучається з порожниною зуба. Зондування сполучення різко болісне, супроводжується помірною кровоточивістю. Перкусія зуба безболісна. Реакція на термічні подразники болісна. Виберіть оптимальний матеріал для кореневої пломби.

*** А) Гідроокискальційвмісна паста.**

В) Тимолова паста.

С) Йодоформна паста.

Д) Резорцин-формалінова паста.

Е) Формакрезолова паста.

171. У дитини 7 років під час профілактичного огляду на медіальній контактній поверхні 65 зуба виявлена каріозна порожнина, локалізована у межах навколопульпарного дентину, заповнена розм'якшеним, пігментованим дентином. В результаті некротомії екскаватором визначено сполучення між каріозною порожниною і порожниною зуба, зондування якого різко болісне, супроводжується помірною кровоточивістю. Реакція на термічні подразники болісна, тривала. Яку лікувальну пасту слід використати у перше відвідування?

*** А) Параформальдегідну.**

В) Цинкевгенолову.

С) Миш'яковисту.

Д) Гідроокискальційвмісну.

Е) Тимолову.

172. Дитина 14 років скаржиться на кровоточивість ясен при чищенні зубів протягом року. Об'єктивно: ясенні сосочки набряклі, ціанотичні дещо збільшені в розмірах. Яке додаткове дослідження необхідно для уточнення діагнозу?

*** А) Рентгенографія**

- В) Реопарадонтотографія
- С) Проба Шиллера-Пісарєва
- Д) Клінічний аналіз крові
- Е) Проба Ясиновського

173. Батьки 7-річної дитини скаржаться на жовтий колір щойно прорізававшихся передніх зубів верхньої щелепи. Таке ж саме забарвлення мають 16,26,36 і 46 зуби. В анамнезі – прийом тетрацікліну на 5 місяці життя з приводу пневмонії. Визначте попередній діагноз.

*** А) Системна гіоплазія емалі.**

- В) Флюороз зубів.
- С) Місцева гіоплазія емалі.
- Д) Гострий початковий карієс.
- Е) Хронічний початковий карієс.

174. Дитина 14,5 років скаржиться на біль в яснах та їх кровоточивість під час чищення зубів і вживання їжі, неприємний запах з рота. Протягом останнього тижня дитина хворіла на грип. Об'єктивно: слизова оболонка ясен в ділянці передніх зубів нижньої щелепи набрякла, гіперемійована, кровоточить при дотику. Ясенні сосочки вкриті брудно-сірим нальотом, виразкуваті. Прикус глибокий. Відзначаються значні нашарування м'якого зубного нальоту. Визначте попередній діагноз.

*** А) Виразково-некротичний гінгівіт.**

- В) Катаральний гінгівіт.
- С) Гіпертрофічний гінгівіт
- Д) Локалізований пародонтит.
- Е) Генералізований пародонтит.

175. Ребенок 14 лет обратился на прием с жалобами на необычный вид языка. Объективно: на поверхности языка глубокие борозды, которые располагаются симметрично в продольном и поперечном направлении. Дно и боковые поверхности складок покрыты сосочками, они гипертрофированы. Язык увеличен в размере. Поставьте диагноз:

*** А) Складчатый язык**

- В) Черный волосатый язык
- С) Острый катаральный глоссит
- Д) Десквамативный глоссит
- Е) Ромбовидный глоссит

176. Дитина 3 місяців хворіє протягом двох днів, неспокійна, відмовляється від їжі, температура тіла нормальна. Об'єктивно: слизова оболонка порожнини рота гіперемійована, набрякла. На спинці язика і слизовій оболонці щік визначається сироподібний плівчастий наліт білого кольору. Після його видалення залишається яскраво гіперемійована поверхня з точковими крововиливами. Визначте попередній діагноз.

*** А) Гострий кандидозний стоматит.**

- В) М'яка форма лейкоплакії.
- С) Гострий герпетичний стоматит.
- Д) Герпетична ангіна.
- Е) Червоний плоский лишай.

177. Дитина 6 років скаржиться на біль у верхньому кутньому правому зубі під час їжі. На дистальній контактній і жувальній поверхнях 54 зубу виявлена каріозна порожнина, розташована у межах навколопульпарного дентину, яка сполучається з порожниною зубу. Зондування сполучення різко болісне, супроводжується кровоточивістю. Перкусія зубу безболісна. Визначте попередній діагноз.

*** А) Хронічний фіброзний пульпіт.**

В) Гострий дифузний пульпіт.

С) Хронічний гангренозний пульпіт.

Д) Гострий обмежений пульпіт.

Е) --

178. Дитина 8,5 років скаржиться на біль під час їжі у нижньому кутньому правому зубі. На жувальній поверхні 46 зубу виявлена каріозна порожнина, заповнена розм'якшеним дентином світло-коричневого кольору, локалізована у межах навколопульпарного дентину. У проекції медіально-щічного рогу пульпи визначено точкове сполучення між каріозною порожниною і порожниною зубу, зондування якого супроводжується різким болем і кровоточивістю. Реакція на термічні подразники болісна, тривала. Перкусія зубу безболісна. Визначте попередній діагноз.

*** А) Хронічний фіброзний пульпіт.**

В) Гострий дифузний пульпіт.

С) Хронічний гангренозний пульпіт.

Д) Хронічний гіпертрофічний пульпіт.

Е) Гострий обмежений пульпіт.

179. Дитина 6,5 років скаржиться на біль і відчуття паління у кутах рота, що затруднює його відкривання. Об`єктивно: у кутах рота виявлені ерозії з інфільтрованими краями, вкриті нальотом сірувато-білого кольору. В цих ділянках відзначається також гіперемія і мацерація шкіри. Прикус глибокий. В анамнезі у дитини - дисбактеріоз кишечника. Визначте попередній діагноз.

*** А) Кандидозний хейліт.**

В) Екзематозний хейліт.

С) Ексфоліативний хейліт.

Д) Метерологічний хейліт.

Е) Атопічний хейліт.

180. Дитина 7,5 років, практично здорова, скаржиться на перелом коронкової частини і біль у передньому правому верхньому зубі. Об`єктивно: коронкова частина 11 зубу відсутня на 2/3, пульпа оголена, має червоний колір, при зондуванні - різко болісна і кровоточить, перкусія зубу болісна. З моменту травми пройшло 2 години. Виберіть оптимальний метод лікування.

*** А) Вітальна ампутація.**

В) Девітальна ампутація.

С) Вітальна екстирпація.

Д) Девітальна екстирпація.

Е) Біологічний метод.

181. Батьки 2,5-річної дитини скаржаться на руйнування передніх зубів верхньої щелепи протягом декількох місяців. На контактних і вестибулярних поверхнях 52,51,61,62 зубів виявлені каріозні порожнини в межах плащового дентину, заповнені розм'якшеним пігментованим дентином, який легко знімається екскаватором. Визначте попередній діагноз.

*** А) Гострий середній карієс.**

- В) Хронічний глибокий карієс
- С) Гострий глибокий карієс.
- Д) Хронічний середній карієс.
- Е) Хронічний поверхневий карієс.

182. Дитина 1,5 років хворіє протягом трьох днів, відмовляється від їжі, млява, слабка. Відзначається підвищення температури тіла до $39,0^{\circ}\text{C}$, рвота, болісні виразки у ротовій порожнині. Об'єктивно: на слизовій оболонці губ, щік і піднебіння виявлені численні ерозії колоподібної форми з гіперемійованою облямівкою, розміром 0,2-0,5 мм, вкриті фібринозним нальотом. В деяких ділянках ерозії зливаються. Відзначається гострий катаральний гінгівіт. Регіонарні лімфовузли збільшені, болісні при пальпації. Який найбільш імовірний діагноз.

*** А) Гострий герпетичний стоматит.**

- В) Гострий кандидозний стоматит.
- С) Герпетична ангіна.
- Д) Багатоформна ексудативна еритема.
- Е) Хронічний рецидивуючий афтозний стоматит.

183. Дитина 13-ти років скаржиться на біль від холодного у нижньому лівому кутньому зубі протягом декількох місяців. На жувальній поверхні 37 зуба виявлена каріозна порожнина з навислими краями емалі, розташована в межах навколопульпарного дентину, заповнена світлим розм'якшеним дентином. Зондування дна дещо болісне. Від холодного виникає короточасний біль. Визначте попередній діагноз.

*** А) Гострий глибокий карієс.**

- В) Хронічний фіброзний пульпіт.
- С) Гострий середній карієс.
- Д) Хронічний гангренозний пульпіт
- Е) Хронічний глибокий карієс.

184. Дитина 15 років скаржиться на підвищення температури до $39,5-40,0^{\circ}\text{C}$, рвоту, головний біль і біль у горлі, особливо при ковтанні. Об'єктивно: слизова оболонка порожнини рота набрякла, гіперемійована. Визначений гострий катаральний гінгівіт. Мигдалики гіпертрофовані, вкриті нальотом жовто-сірого кольору, який не розповсюджується за межі лімфоїдної тканини і легко знімається. Підщелепні, шийні, потиличні лімфовузли значно збільшені у розмірі з перших днів захворювання, болісні при пальпації. Печінка і селезінка збільшені. Який найбільш імовірний діагноз?

*** А) Інфекційний мононуклеоз.**

- В) Скарлатина.
- С) Дифтерія.
- Д) Герпетична ангіна.
- Е) Кір.

185. Ребенок 7 лет жалуется на наличие полости в зубе на верхней челюсти справа, боль при приеме пищи. На жевательной поверхности 55 зуба кариозная полость, сообщающаяся с полостью зуба. Зондирование болезненно, перкуссия безболезненна, реакция на холод длительная. Ваш предварительный диагноз?

*** А) Хронический фиброзный пульпит**

- В) Хронический периодонтит
- С) Хронический глубокий кариес
- Д) Хронический гангренозный пульпит
- Е) Хронический гипертрофический пульпит

186. Дитина 11 років скаржиться на наявність каріозної порожнини у лівому верхньому кутньому зубі, яка з'явилась півроку тому. На медіальній контактній поверхні 26 зуба - каріозна порожнина, розташована у межах плащового дентину. Дно і стінки каріозної порожнини щільні, пігментовані, при зондуванні - безболісні. Реакція на термічні подразники відсутня. Перкусія зуба безболісна. Визначте попередній діагноз.

*** А) Хронічний середній карієс.**

- В) Хронічний глибокий карієс.
- С) Гострий середній карієс.
- Д) Гострий глибокий карієс.
- Е) Хронічний періодонтит.

187. Хворий 11-ти років скаржиться на рухливість зубів, кровоточивість ясен. Хворіє з 3 років. Об'єктивно: ясна в області всіх зубів гіперемовані, набряклі, кровоточать при інструментальному обстеженні. Корені зуби оголені на $\frac{1}{3}$, вкриті білим нальотом. Рухливість зубів 2 ступеню. Зубо-ясеневі кишені глибиною 4 - 5мм. При зовнішньому огляді спостерігається сухість і потовщення шкірних покривів в області долонь, передньої третини передпліч, підошовних поверхонь, є тріщини. Який найбільш ймовірний попередній діагноз?

*** А) Синдром Папійона-Лефевра.**

- В) Хвороба Гоше
- С) Хвороба Леттерера-Зиве
- Д) Хвороба Хенда-Шуллера-Кристчена.
- Е) Хвороба Німана-Піка

188. У дитини 12 років 24 години тому травмований 21 зуб. Об'єктивне обстеження: відлам коронки 21 зуба на $\frac{1}{3}$. Пульпа відкрита, при зондуванні виступає кров, термометрія позитивна, перкусія безболісна. Який метод лікування показаний.

*** А) Вітальна ампутація.**

- В) Девітальна ампутація.
- С) Вітальна екстирпація.
- Д) Девітальна екстирпація.
- Е) Біологічний метод.

189. У дівчинки 6 років скарги на гострий самовільний біль у зубі на верхній щелепі праворуч, що підсилюється при вживанні гарячої їжі. Біль з'явився день тому. Об'єктивно: у 55 глибока каріозна порожнина виповнена розм'якшеним дентином, після його видалення легко відкривається порожнина зуба, глибоке зондування якої болісне. Перкусія позитивна. Ваш попередній діагноз?

*** А) Гострий гнійний пульпіт.**

- В) Загострення хронічного пульпіту.
- С) Гострий гнійний періодонтит.
- Д) Гострий серозний пульпіт.
- Е) Пульпіт, ускладнений періодонтитом.

190. У мальчика 1 года и 3-х месяцев на вестибулярной поверхности 52,51,61,62 зубов обширные кариозные полости в пределах эмали. Зондирование слабо болезненное. Перкуссия 52,51,61,62 зубов безболезненная. Какая лечебная тактика целесообразна в этой ситуации?

*** А) Серебрение**

- В) Пломбирование фотополимером.
- С) Покрытие фтор-лаком.
- Д) Пломбирование фосфат-цементом.
- Е) Пломбирование амальгамой.

191. Во время профилактического осмотра у ребенка 4-х лет на жевательной поверхности 54 зуба обнаружена глубокая кариозная полость, выполненная плотным дентином, не сообщающаяся с полостью зуба. Зондирование, перкуссия и термометрия 54 зуба – безболезненные. Индекс кп-1, индекс гигиены – 1,9. Какой пломбировочный материал наиболее подходит для постоянной пломбы в 54 зуб?

*** А) Стеклоиономерный цемент.**

В) Силикатный цемент.

С) Силикофосфатный цемент.

Д) Химический композит.

Е) Фотополимерный композит.

192. Ребенок 10 лет при падении ударился зубами о ступеньки. К врачу обратился через 2 суток после травмы. Отмечает резкую боль от холодного. Объективно: в 11 зубе поперечный дефект на 2/3 коронки со значительным обнажением пульпы. Определяется резкая болезненность при зондировании. Перкуссия болезненна, зуб подвижный. Десна слегка гиперемирована. Какой метод лечения вы используете в данном случае?

*** А) Витальная экстирпация**

В) Девитальная экстирпация

С) Биологический метод

Д) Витальная ампутация

Е) Девитальная ампутация

193. У ребенка 10 лет в 36 зубе на жевательной поверхности глубокая кариозная полость со светлым, размягченным дентином, зондирование дна несколько болезненно, на холодную воду боль быстрпроходящая. Был диагностирован острый глубокий кариес. При лечении случайно был вскрыт рог пульпы. Ваша тактика в данной ситуации?

*** А) Наложение гидроксикальцийсодержащей пасты**

- В) Витальная ампутация пульпы
- С) Витальная экстирпация пульпы
- Д) Девитальная ампутация
- Е) Девитальная экстирпация

194. Больной 13 лет жалуется на возникшую вчера острую самопроизвольную кратковременную боль приступообразного характера в области 36, которая усиливается при приеме пищи. Объективно: в 36 глубокая кариозная полость на жевательной поверхности. Полость зуба закрыта, зондирование дна болезненное в одной точке. От холодового раздражителя возникает медленно проходящая боль. Реакция на перкуссию безболезненная. Ваш предварительный диагноз?

*** А) Острый ограниченный пульпит**

- В) Острый глубокий кариес
- С) Острый диффузный пульпит
- Д) Гиперемия пульпы
- Е) Обострение хронического пульпита

195. Ребенок 8-ми лет жалуется на постоянную ноющую боль в 46 зубе, усиливающую при накусывании, которая появилась вчера. Раннее была боль от холодного. Объективно: в 46 на жевательной поверхности глубокая кариозная полость, полость зуба закрыта, зондирование и реакция на t раздражители безболезненны. Перкуссия болезненна, отмечается незначительная подвижность. Десна в области 46 гиперемирована, отечна, пальпация болезненна. На Ro-грамме около верхушки несформированных корней изменений нет. Ваш предварительный диагноз?

*** А) Острый серозный периодонтит**

- В) Острый гнойный пульпит
- С) Острый общий серозный пульпит
- Д) Острый гнойный периодонтит
- Е) Обострение хронического периодонтита

196. Ребенок 12-ти лет жалуется на кровоточивость в зубе во время приема пищи и чистки зубов. Зуб ранее болел. Объективно: в 36 зубе глубокая полость, сообщающаяся с полостью зуба, выполненная разрастаниями красного цвета. При зондировании определяется болезненность и легкая кровоточивость, перкуссия безболезненна, незначительная боль от температурных раздражителей. Ваш предварительный диагноз?

*** А) Хронический гипертрофический пульпит**

- В) Хронический гранулирующий периодонтит
- С) Хронический папилит
- Д) Десневой полип
- Е) Хронический простой пульпит

197. У девочки 13 лет жалобы на выпадение пломбы в 21 зубе. В анамнезе: 2 года назад была травма зуба. Находилась на лечении. Пломба часто выпадает. Объективно: в 21 зубе дефект 1/3 коронки в поперечном направлении. Перкуссия безболезненна. Зуб в цвете не изменен. На Ro-грамме: корневой канал запломбирован на 1 мм отступя от верхушки, пломбировочный материал плотно прилегает к стенкам корневого канала. Какова Ваша тактика?

*** А) Восстановить дефект фотополимером**

- В) Перепломбировать корневой канал
- С) Провести резекцию верхушки корня
- Д) Провести операцию удаления зуба
- Е) Покрыть зуб искусственной коронкой

198. Больной 14 лет обратился с жалобами на боль и кровоточивость десен. Заболел 4 дня назад. Объективно: общее состояние удовлетворительное, отмечается бледность кожных покровов, температура 38С, подчелюстные лимфоузлы болезненные при пальпации, слегка увеличенные, не спаянные с подлежащими тканями. В области 44, 45, 46,47 зубов отмечается наличие грязно-серого налета, нарушение целостности десневых сосочков и краевой десны, обильное отложение зубного налета. Ваш предварительный диагноз?

*** А) Язвенно-некротический гингивит**

- В) Острый герпетический гингивит
- С) Острый катаральный гингивит
- Д) Хронический катаральный гингивит
- Е) Гипертрофический гингивит

199. Під час профілактичного огляду у 6-річної дитини на горбах 36 і 46, які нещодавно прорізались, виявлені білі плями з чіткими обрисами.

Транспарентність емалі в цих ділянках збережена, при її зондуванні шерохуватість не визначається. Яке додаткове дослідження необхідне?

*** А) Фарбування метиленовим синім**

- В) Фарбування йодовмісними розчинами
- С) Електроодонтометрія
- Д) Рентгенографія
- Е) Візіорадіографія

200. Дитина 10 років скаржиться на біль і кровоточивість під час їжі у лівому кутньому зубі верхньої щелепи. На жувальній поверхні 26 зуба виявлена каріозна порожнина, заповнена тканиною червоного кольору. При її поверхневому зондуванні визначається болючість і помірна кровоточивість. Більш глибоке зондування спричиняє різкий біль. Перкусія зуба безболісна. Визначте попередній діагноз.

*** А) Хронічний гіпертрофічний пульпіт**

- В) Хронічний фіброзний пульпіт
- С) Хронічний гангренозний пульпіт
- Д) Хронічний гранулюючий періодонтит
- Е) Хронічний фіброзний періодонтит

201. Дитина 9 років скаржиться на біль під час їжі у лівому передньому зубі верхньої щелепи. На медіальній контактній поверхні 22 зубу виявлена каріозна порожнина, заповнена розм'якшеним світлим дентином, яка сполучається з порожниною зубу. Зондування сполучення різко болісне, супроводжується помірною кровоточивістю. Перкусія зубу безболісна. Реакція на термічні подразники болісна, тривала. Визначте найбільш імовірний діагноз.

*** А) Хронічний фіброзний пульпіт**

В) Хронічний гангренозний пульпіт

С) Хронічний гіпертрофічний пульпіт

Д) Загострення хронічного фіброзного пульпіту

Е) Загострення хронічного гангренозного пульпіту

202. Батьки 2-х-річної дитини скаржаться на наявність нориць з гнійними виділеннями у ділянці передніх зубів верхньої щелепи. Об'єктивно: коронкові частини 51,52,61 і 62 зубів значно зруйновані, зондування вустів кореневих каналів слабо болісне, супроводжується виразною кровоточивістю. Перкусія зубів безболісна. На тлі пастозної ціанотичної оболонки альвеолярного паростку у цій ділянці визначаються рубці і нориці. Визначте найбільш імовірний діагноз.

*** А) Загострення хронічного гранулюючого періодонтиту**

В) Загострення хронічного гранулематозного періодонтиту

С) Загострення хронічного фіброзного періодонтиту

Д) Хронічний гранулематозний періодонтит

Е) Хронічний гранулюючий періодонтит

203. Дівчина 13,5 років скаржиться на біль та кровоточивість ясен під час чищення зубів і вживання їжі, неприємний запах з рота. Протягом останнього тижня хворіла на ангіну. Об'єктивно: слизова оболонка ясен у ділянці передніх зубів верхньої та нижньої щелеп набрякла, гіперемійована. Верхівки ясенних сосочків некротизовані, легко кровоточать при дотику. Відзначаються значні нашарування м'якого зубного нальоту. Визначте збудника даного захворювання.

*** А) Анаеробна мікрофлора**

- В) Вірус герпесу
- С) Стрептококи
- Д) Стафілококи
- Е) Дріжжеподібні гриби

204. Дитина 12 років скаржиться на оголення шийок передніх зубів нижньої щелепи і кровоточивість ясен при чищенні зубів протягом декількох років. Об'єктивно: ясенний край в ділянці 31 і 41 зубів дещо набряклий, має цианотичне забарвлення. Прикус ортогнатичний, вуздечка нижньої губи - вкорочена. Рентгенологічно в цій ділянці визначається остеопороз верхівок міжзубних перетинок і деструкція кортикальної пластинки альвеоли. Визначте найбільш імовірний діагноз.

*** А) Локалізований пародонтит**

- В) Хронічний катаральний гінгівіт
- С) Хронічний атрофічний гінгівіт
- Д) Хронічний гіпертрофічний гінгівіт
- Е) Генералізований пародонтит

205. Батьки скаржаться на наявність у ротовій порожнині 8-річної дитини болісного утворення, що перешкоджає прийому їжі. Подібні скарги відзначаються двічі на рік. Об'єктивно: на слизовій оболонці нижньої губи виявлено ерозію розміром до 0,7 см округлої форми, яка вкрита нальотом сірувато-жовтого кольору. Ерозія має гіперемійовану облямівку, болісна при пальпації. В анамнезі у дитини – хронічний холецистохолангіт. Визначте попередній діагноз.

*** А) Хронічний рецидивуючий афтозний стоматит**

- В) Багатоформна ексудативна ерітема
- С) Синдром Бехчета
- Д) Синдром Стівенса-Джонсона
- Е) Травматична ерозія

206. Дитина 6 років скаржиться на біль і наявність висипань на губах. Об'єктивно: на набряклій, гіперемійованій червоній облямівці і шкірі губ визначаються численні дрібні пухирці, які в окремих ділянках зливаються між собою, ерозії і кров'янисті кірочки. Відзначається також та мацерація шкіри в уражених ділянках. Визначте попередній діагноз.

*** А) Екзематозний хейліт**

- В) Актинічний хейліт
- С) Атопічний хейліт
- Д) Ексфоліативний хейліт
- Е) Метерологічний хейліт

207. Хлопчику 1,8 років. Перебував на лікуванні в інфекційному відділенні. Отримував ампіцилін. На 6-й день лікування у дитини, під час огляду, в порожнині рота були виявлені білі нальоти у вигляді сироподібних плівок на гіперерованій слизовій оболонці в ділянці ясеневих валиків, щік і на язиці. Плівки знімаються, оголюючи гіпереровану поверхню. Загальний стан задовільний, температура тіла 36,7С. Визначте попередній діагноз.

*** А) Гострий кандидозний стоматит**

- В) Медикаментозний стоматит
- С) Хронічний кандидозний стоматит
- Д) Гострий герпетичний стоматит
- Е) М'яка форма лейкоплакії

208. Дівчинці 1 рік 6 місяців. На вестибулярній поверхні 52, 51, 61, 62 зубів розлогі каріозні порожнини в межах емалі. Зондування злегка болісне, перкусія 52,51,61,62 зубів безболісна. Яка тактика лікування доцільна?

*** А) Імпрегнація сріблом**

- В) Пломбування амальгамою
- С) Ремінералізуюча терапія
- Д) Покриття фтор-лаком
- Е) Пломбування фосфат-цементом

209. Хлопчик 8 років скаржиться на біль в ділянці 36 зуба протягом одного дня, увечері і при вживанні холодної води. Біль в зубі виникає періодично, тривалістю до 2-3 хвилини, з більш тривалими безболісними проміжками. 36 зуб раніше лікувався біологічним методом з приводу випадкового розкриття порожнини зуба. Перкусія 36 зуба безболісна, слизова в ділянці 36 зуба без змін. Який метод лікування доцільно застосувати?

*** А) Вітальна ампутація**

- В) Вітальна екстирпація
- С) Екстракція зуба
- Д) Девітальна екстирпація
- Е) Біологічний

210. Під час профілактичного огляду у дівчинки 7,5 років в 65 зубі виявлено зруйновану на 1/3 коронкову частину рожевого кольору. Перкусія 65 зуба безболісна, пальпація по перехідній складці злегка болісна, нориця. На рентгенограмі - розрідження кісткової тканини в ділянці верхівок та біфуркації коренів, кортикальна пластинка фолікулу 25 зуба зруйнована. Вкажіть лікувальну тактику?

*** А) Видалення зуба**

- В) Девітальна ампутація
- С) Девітальна екстирпація
- Д) Фізіотерапевтичний
- Е) Вітальна екстирпація

211. У ребенка 10-и лет при профилактическом осмотре на вестибулярной поверхности 11 зуба обнаружен дефект твердых тканей зуба в виде чашеобразного углубления. Эмаль в области дефекта гладкая, блестящая, красителями не окрашивается. В анамнезе в возрасте 3-х лет вколоченный вывих 51 зуба. Укажите наиболее вероятный диагноз.

*** А) Местная гипоплазия**

- В) Острый начальный кариес
- С) Очаговая гипоплазия эмали
- Д) Острый поверхностный кариес
- Е) Флюороз зубов

212. У хворого 9-ти років біля ріжучого краю на вестибулярній поверхні 11 виявлена пляма молочного кольору, безболісна при зондуванні та дії температурних подразників. Встановлено діагноз місцева гіпоплазія емалі 11. Яке лікування даного захворювання Ви запропонуєте?

*** А) Курс ремінералізуючої терапії**

- В) Профілактична гігієна порожнини рота
- С) Зішліфовування плями
- Д) Герметизація ураженої ділянки
- Е) Косметичне пломбування

213. Батьки дитини 6-ти років звернулися до дитячого стоматолога з метою профілактичного обстеження дитини. Порожнина рота санована. Нещодавно, зі слів батьків, у дитини прорізались 36 і 46. Який з методів профілактики карієсу найбільш доцільно використати в перші 1,5-2 роки після прорізування вказаних зубів?

*** А) Герметизацію фісур**

- В) Сріблення фісур
- С) Покриття зубів фторлаком
- Д) Аплікації розчином ремоденту
- Е) Полоскання фторидом натрію

214. У дівчинки 8,5 років після клінічного обстеження поставлено діагноз: гнійний дифузний пульпіт 54 зуба. Виберіть метод лікування:

*** А) Видалення зуба**

- В) Девітальна ампутація
- С) Девітальна екстирпація
- Д) Вітальна ампутація
- Е) Вітальна екстирпація

215. Дитина 12-ти років скаржиться на кровотечу, біль при вживанні їжі в 46 зубі. В анамнезі - сильний біль в минулому. Об'єктивно: II клас за Блекум, каріозна порожнина глибока та сполучена з порожниною зуба, частково виповнена розростанням пульпи, доторкання до тканини пульпи болісне, виникає кровотеча. На 46 45 44 зубах значне відкладення м'якого білого нальоту. Ваш діагноз?

*** А) Хронічний гіпертрофічний пульпіт.**

- В) Хронічний папіліт
- С) Хронічний простий пульпіт.
- Д) Хронічний гангренозний пульпіт.
- Е) Хронічний гранулюючий періодонтит

216. У 6-ти річної дівчинки під час огляду виявлено глибоку каріозну порожнину в 85 зубі. Перкусія і зондування безболісні. Після видалення розм'яклого дентину виникло сполучення з порожниною зуба. Глибоке зондування безболісне. . На рентгенограмі 85 зуба вогнище деструкції кісткової тканини в області біфуркації, кортикальна пластинка 35 без патологічних змін. Для кореневої пломби в наведеній ситуації найбільш доцільно використати:

*** А) Цинк-евгенолова паста**

- В) Резорцин-формалінова паста
- С) Склоіономірний цемент.
- Д) Фосфат-цемент.
- Е) Кальційвмісну пасту.

217. У дитини 7 років на апроксимальній поверхні 55 зуба глибока каріозна порожнина, яка сполучається з порожниною зуба. З анамнезу встановлено, що 3-4 місяці тому були нічні самовільні болі. При зондуванні дна каріозної порожнини виявляється біль та кровоточивість. Термометрія позитивна. Перкусія 55 зуба безболісна. Оберіть найбільш раціональний метод лікування.

*** А) Девітальна ампутація.**

В) Девітальна екстирпація.

С) Біологічний метод.

Д) Вітальна ампутація.

Е) Вітальна екстирпація.

218. Ребенок 5 лет жалуется на самопроизвольные боли в зубе на верхней челюсти справа, усиливающиеся ночью и при приеме холодного. Подобная боль в зубе была полгода назад. В 65 зубе глубокая полость, сообщающаяся с полостью зуба. Зондирование болезненно, перкуссия безболезненна. От холодной воды возникает медленно проходящая боль. Ваш предварительный диагноз?

*** А) Обострение хронического пульпита**

В) Острый серозный периодонтит

С) Обострение хронического периодонтита

Д) Острый диффузный пульпит

Е) Острый гнойный пульпит

219. Дитина 15 років скаржиться на стовщення нижньої губи. Об'єктивно: нижня губа майже вдвічі збільшена в об'ємі. Її червона облямівка суха, вкрита лусочками. Шкіра в ураженій ділянці бліда. Пальпаторно визначається м'який набряк. Визначте попередній діагноз.

*** А) Макрохейліт**

- В) Алергічний хейліт
- С) Метеорологічний хейліт
- Д) Актинічний хейліт
- Е) Атопічний хейліт

220. При профилактическом осмотре у мальчика 9 лет обнаружена глубокая кариозная полость в 75, сообщающаяся с полостью зуба. Зондирование болезненно, от холодной воды медленно проходящая боль. Перкуссия безболезненна. Проводится метод девитальной ампутации. Какую лечебную пасту целесообразно наложить на устья корневых каналов в данном случае?

*** А) Мумифицирующую**

- В) Антисептическую
- С) содержащую ферменты
- Д) Одонтотропную
- Е) Противовоспалительную

221. При профилактическом осмотре у ребенка 3,5 лет обнаружена глубокая кариозная полость в 75 зубе на жевательной поверхности, дентин размягчен, слабопигментированный. Определяется сообщение с полостью зуба, зондирование болезненно, от холодной воды боль медленно проходящая. Перкуссия безболезненна.. Какой метод лечения целесообразно провести в данном случае?

*** А) Девитальная ампутация**

В) Девитальная экстирпация

С) Биологический метод

Д) Витальная ампутация

Е) Витальная экстирпация

222. Ребенок 10 лет лечится по поводу пульпита 44 зуба. На рентгенограмме: корень 44 зуба в виде двух параллельных полосок плотной тени постепенно суживающихся в направлении верхушки и имеет вид раструба, корневой канал в этой области сливается с участком просветления округлой формы ограниченного равномерной полоской плотной тени в виде полушара. Определите стадию формирования корня в данном случае?

*** А) Стадия незаконченного роста корня в длину**

В) Стадия несформированной верхушки корня

С) Стадия сформированного корня и периодонта

Д) Стадия несформированного периодонта

Е) Стадия незакрытой верхушки корня

223. Ребенок 2 лет на приеме у стоматолога по поводу высыпаний и болезненности полости рта при приеме пищи, которые появились вчера. Объективно: температура тела 37,5°, кожные покровы чистые. Подчелюстные лимфоузлы болезненны. В полости рта: на слизистой оболочке губ, языка эрозии округлой формы диаметром 1-3 мм, болезненные, покрытые белесоватым налетом. Десна гиперемирована, отечна. Ваш предварительный диагноз?

*** А) Острый герпетический стоматит**

- В) Синдром Стивенса-Джонсона
- С) Рецидивирующий афтозный стоматит
- Д) Многоформная экссудативная эритема
- Е) Рецидивирующий герпетический стоматит

224. Пациенту 13 лет. Жалобы на боль и кровоточивость из десен во время чистки зубов. Объективно: десна в области всех зубов гиперемирована, отечна, РМА=46%, гигиенический индекс по Грину-Вермильону 2,5 балла. Предварительный диагноз: обострение хронического генерализованного катарального гингивита. С каким активным компонентом Вы будете рекомендовать зубную пасту в данном случае?

*** А) С хлоргексидином**

- В) С глицерофосфатом кальция
- С) С монофторфосфатом
- Д) С витаминами А, Д, Е
- Е) С комплексом микроэлементов

225. Дитина 8 років скаржиться на наявність пігментованої плями на вестибулярній поверхні 26 зуба. Об'єктивно в пришийковій ділянці 26 зуба виявлено дефект емалі. Зондування безболісне, емаль шерехата. Який найбільш вірогідний діагноз.

*** А) Хронічний поверхневий карієс**

- В) Флюороз зубів
- С) Хронічний середній карієс.
- Д) Хронічний початковий карієс.
- Е) Місцева гіоплазія емалі.

226. Під час санації порожнини рота у дитини 10-ти років на вестибулярній поверхні в пришийковій ділянці 21, 12 виявлені крейдяні плями. Поверхня емалі матова гладка, больова реакція на температурні подразники відсутня. Який додатковий метод обстеження підтвердить діагноз.

*** А) Вітальне зафарбовування**

- В) Ортопантомографія
- С) Внутрішньоротова рентгенографія
- Д) ЕОД.
- Е) Стоматоскопія в ультрафіолетовому світлі.

227. У дитини 6 місяців діагностовано двобічну бронхопневмонію. Назначено антибіотики широкого спектру дії. Знаходиться на штучному вигодовуванні, наявні розлади травлення (диспепсія). Які групи зубів можуть зазнати патологічних змін (гіоплазія емалі).

*** А) Фронтальні постійні різці**

- В) Премоляри
- С) Ікла
- Д) Другі постійні моляри
- Е) Зуби будуть незмінні

228. Ребенок 13 лет жалуется на повышение температуры до $39,5^{\circ}\text{C}$, рвоту, боль в горле. Объективно: слизистая оболочка полости рта отечна, гиперемирована. Миндалины гипертрофированы, покрыты желто - серым налетом, который легко снимается. Подчелюстные и шейные лимфоузлы увеличены в размерах, болезненные при пальпации. Печень и селезенка увеличены. Поставьте предварительный диагноз.

*** А) Инфекционный мононуклеоз**

- В) Корь
- С) Скарлатина
- Д) Герпетическая ангина
- Е) Дифтерия

229. Ребенок 9-ти лет жалуется на боли от сладкого, кислого в зубе на верхней челюсти слева. Объективно: на жевательной поверхности 26 - кариозная полость в пределах эмали.. Какой оптимальный материал необходим для пломбирования 26?

*** А) Композит.**

- В) Стеклоиономер.
- С) Силико-фосфатный цемент.
- Д) Силикатный цемент
- Е) Цинк-фосфатный цемент.

230. Дівчинка 12 років, скаржиться на короткочасний біль від солодкого та холодного у кутньому зубі нижньої щелепи . Об'єктивно: на жувальній поверхні 36 зуба каріозна порожнина з нависаючими краями емалі, розташована в межах навколопульпарного дентину. Дентин дна і стінок м'який , зондування дна дещо болісне, перкусія безболісна, термічні подразники викликають біль, який швидко зникає після усунення подразника. Який найбільш імовірний діагноз?

*** А) Гострий глибокий карієс.**

- В) Хронічний фіброзний пульпіт.
- С) Гіперемія пульпи.
- Д) Хронічний середній карієс.
- Е) Хронічний глибокий карієс.

231. Дівчинка 13 років скаржиться на появу плям на передніх зубах верхньої щелепи, які з'явилися кілька місяців тому. При об'єктивному обстеженні - на вестибулярній поверхні у пришийковій ділянці 13,12,11,21,22 і 23 зубів виявлені крейдоподібні плями. Емаль над ними втратила блиск, при зондуванні - безболісна. Поставте попередній діагноз.

*** А) Гострий початковий карієс.**

- В) Флюороз зубів.
- С) Хронічний початковий карієс.
- Д) Системна гіоплазія емалі.
- Е) Гострий поверхневий карієс.

232. Дитині 2 місяці, неспокійна, погано спить, відмовляється від їжі. Температура тіла - субфебрильна. Об'єктивно: на гіперемійованій слизовій оболонці язика, губ, щік, піднебіння спостерігається сироподібний наліт, який легко знімається тампоном. Регіональні лімфатичні вузли дещо збільшені і болючі при пальпації. Симптоми якого захворювання Вам представлені?

*** А) Гострий псевдомембранозний кандидозний стоматит.**

- В) Хронічний атрофічний кандидозний стоматит
- С) Гострий герпетичний стоматит.
- Д) Дифтерія .
- Е) Стоматит при корі.

233. Дитині 8 років поставлено діагноз: хронічний фіброзний пульпіт 11 зуба, ускладнений періодонтитом і проведено лікування методом вітальної екстирпації. Який матеріал доцільно використати для завершення апексогенезу?

*** А) пасту на основі гідроксид кальцію**

- В) гутаперчеві штифти
- С) матеріали на основі штучних смол
- Д) резорцин-формалінову пасту
- Е) цинкооксидевгенолову пасту

234. У дитини 7,5 років під час профілактичного огляду на жувальній поверхні 36 зуба у дистальній частині фісури виявлена каріозна порожнина з невеликим вхідним отвором, зонд застряє у розм'якшеному дентині. Виберіть сучасну лікувальну тактику у даному випадку.

*** А) Профілактичне пломбування**

- В) Неінвазивна герметизація
- С) Інвазивна герметизація
- Д) ART-методика
- Е) Імпрегнація розчином нітрату срібла

235. Дитина 7,5 років скаржиться на наявність каріозних порожнин у зубах. На жувальній поверхні 46 і 36 зубів виявлені каріозні порожнини з невеликим вхідним отвором. Після зняття нависаючих країв емалі, розм'якшений дентин був легко видалений екскаватором. Зондування дна каріозної порожнини болісне. Реакція на холодові подразники швидко зникає після усунення їх дії. Визначте попередній діагноз.

*** А) Гострий глибокий карієс**

В) Гострий поверхневий карієс

С) Хронічний середній карієс

Д) Хронічний глибокий карієс

Е) Гострий середній карієс

236. Дитина 9,5 років скаржиться на біль під час їжі у правому кутньому нижньому зубі. На жувальній поверхні 46 зуба визначена глибока каріозна порожнина заповнена розм'якшеним дентином світло-коричневого кольору, що сполучається з порожниною зуба. Зондування сполучення різко болісне, супроводжується помірною кровоточивістю. Перкусія зуба безболісна. Визначте попередній діагноз.

*** А) Хронічний фіброзний пульпіт**

В) Хронічний гангренозний пульпіт

С) Хронічний гіпертрофічний пульпіт

Д) Гострий серозний пульпіт

Е) Гострий гнійний пульпіт

237. Дитина 14,5 років скаржиться на руйнування лівого кутнього зуба верхньої щелепи. Об'єктивно: на медіальній-контактній і жувальній поверхні 26 зуба виявлена каріозна порожнина у межах навколопульпарного дентину, що сполучається з порожниною зуба. Зондування і перкусія безболісні. . На рентгенограмі 26 зуба біля верхівок коренів визначається вогнище розрідження кісткової тканини з чіткими обрисами. Визначте найбільш імовірний діагноз.

*** А) Хронічний гранулематозний періодонтит**

В) Хронічний гранулюючий періодонтит

С) Хронічний фіброзний періодонтит

Д) Хронічний гангренозний пульпіт

Е) Хронічний фіброзний пульпіт

238. Дитина 15 років скаржиться на наявність каріозної порожнини у зубі верхньої щелепи. Об'єктивно: на жувальній поверхні 16 зуба виявлена каріозна порожнина заповнена розм'якшеним дентином, яка сполучається з порожниною зуба, зондування безболісне. На рентгенограмі в ділянці верхівок коренів 16 зуба відзначається нерівномірне розширення періодонтальної щілини.. Визначте діагноз.

*** А) Хронічний фіброзний періодонтит**

В) Хронічний гранулюючий періодонтит

С) Хронічний гранулематозний періодонтит

Д) Хронічний гангренозний пульпіт

Е) Хронічний фіброзний пульпіт

239. Дитина 11 років скаржиться на біль у горлі, що посилюється при ковтанні, підвищення температури тіла до 38,5 С, головний біль, слабкість. Об'єктивно: на набряклій і гіперемійованій слизовій оболонці мигдаликів, м'якого піднебіння і піднебінних дужках виявляються численні болісні дрібні ерозії. Підщелепні лімфатичні вузли збільшені, болісні при пальпації. Визначте можливого збудника даного захворювання.

*** А) Вірус Коксакі**

- В) Вірус герпеса
- С) Вірус Епштейна-Барра
- Д) Гемолітичний стрептокок
- Е) Паличка Лефлера

240. Дитина 8,5 років скаржиться на сухість і свербіння губ протягом останньої доби. Хлопчик має шкідливу звичку утримувати у роті кулькову ручку. Об'єктивно: червона облямівка і шкіра губ набрякла, яскраво гіперемійована. Відзначається помірне лущення ураженої ділянки. Визначте найбільш імовірний діагноз.

*** А) Контактний алергічний хейліт**

- В) Метерологічний хейліт
- С) Атопічний хейліт
- Д) Ексфоліативний хейліт
- Е) Екзематозний хейліт

241. Ребенок 13 лет. Жалобы на наличие кариозной полости в 26 зубе. Об-но: в зубе глубокая кариозная полость, выполненная пигментированным дентином, сообщающаяся с пульповой камерой. Зондирование и перкуссия безболезненны. На R- грамме расширение периодонтальной щели. Ваш диагноз:

*** А) Хронический фиброзный периодонтит**

В) Хронический гангренозный пульпит

С) Хронический гранулирующий периодонтит

Д) Хронический простой пульпит

Е) Хронический гранулематозный периодонтит

242. Во время проведения профилактического осмотра в детском саду у ребенка 3,5 лет обнаружена кариозная полость на апроксимальной поверхности 54 зуба. Объективно: кариозная полость с широким входом, дентин плотный, пигментированный. Зондирование дна и стенок полости безболезненное. Перкуссия зуба безболезненна. Поставьте диагноз

*** А) Хронический средний кариес**

В) Острый средний кариес

С) Хронический глубокий кариес

Д) Острый глубокий кариес

Е) Хронический поверхностный кариес

243. У ребенка 8 лет при плановой санации полости рта на жевательной поверхности 36 зуба выявлена кариозная полость с узким входом в границах плащевого дентина. Дентин дна и стенок кариозной полости мягкий, светлый. Зондирование дна полости безболезненно, зондирование эмалево-дентинной границы болезненно. Реакция на холод болезненна, быстро проходит. Поставьте диагноз .

*** А) Острый средний кариес**

- В) Хронический средний кариес
- С) Острый поверхностный кариес
- Д) Хронический поверхностный кариес
- Е) Острый глубокий кариес

244. Пацієнт 12 років звернувся зі скаргами на біль у зубі на верхній щелепі, що посилюється при накушуванні. Із анамнезу -3 дні тому закінчено лікування 21 з приводу гострого пульпіту. Канал запломбований фосфат-цементом. Об'єктивно: пломба з композиційного матеріалу, реакція зуба на температурні подразники негативна, перкусія позитивна.. На R-грамі незначний надлишок пломбувального матеріалу за верхівкою кореня. Визначте тактику лікаря стоматолога.

*** А) Призначення фізіотерапевтичного лікування**

- В) Спостереження за хворим
- С) Розпломбування каналу
- Д) Резекція верхівки кореня
- Е) Призначення медикаментозного лікування

245. На прийом до стоматолога привели 7 річного хлопчика у якого на горбках перших великих кутніх зубів виявлені гладкі ,крейдянні плями,що не забарвлюються метиленовим синім .Із анамнезу стало відомо , що на 3 місяці життя дитина перенесла гостре інфекційне захворювання. Поставте ймовірний діагноз:

*** А) Гіпоплазія емалі**

В) Карієс в стадії плями

С) Гіперплазія

Д) Флюороз

Е) Ерозія емалі

246. При стоматологічному обстеженні дитини виявлено аномальну форму центральних різців : бочковидна форма , напівмісяцева виїмка по різучому краю. З анамнезу встановлено ,що під час вагітності мати хворіла сифілісом.У дитини окрім аномалії зубів виявляється глухота і паренхіматозний кератит. Як називається ця аномалія розвитку зубів?

*** А) Зуби Гетчінсона**

В) Зуби Пфлюгера

С) Клиновидний дефект

Д) Флюороз(деструктивна форма)

Е) Ерозія твердих тканин

247. У ребенка 12 лет жалобы на кратковременную боль от холодного в зубе на нижней челюсти справа. Об-но: в 46 на медиальной поверхности кариозная полость в границах около-пульпарного дентина, не сообщается с полостью зуба, заполнена светлым, размягченным дентином. Зондирование дна 36 зуба болезненное, перкуссия безболезненная, реакция на холодовой раздражитель быстро исчезает после прекращения его действия. Какой наиболее вероятный диагноз?

*** А) Острый глубокий кариес.**

- В) Острый очаговый пульпит.
- С) Острый диффузный пульпит.
- Д) Хронический фиброзный пульпит.
- Е) Острый средний кариес.

248. У мальчика 13-ти лет жалобы на боль от холодного в 46 зубе. Об-но: на жевательной поверхности 46 зуба глубокая кариозная полость в пределах светлого размягченного околопульпарного дентина. Зондирование дна кариозной полости болезненное по всей поверхности, реакция на холодовой раздражитель резко болезненна, быстро исчезает после прекращения его действия. Выберите оптимальную лечебную пасту:

*** А) Гидроксикальций-содержащая.**

- В) Тимоловая.
- С) Йодоформная.
- Д) резорцин-фориалиновая
- Е) Цинк-евгеноловая.

249. Девочка 13 лет жалуется на покраснение, сухость и чувство жжения губ, образование на них корочек. В анамнезе - вредная привычка облизывать и прикусывать нижнюю губу. Подобное состояние наблюдается у ребенка в течение 2-х лет в зимний период. Об-но: На гиперемизированной и сухой красной кайме губ прозрачные корочки сероватого цвета. Кожа и слизистая оболочка губ не изменена. Ваш диагноз?

*** А) Метеорологический хейлит.**

В) Гландулярный хейлит.

С) Контактный аллергический хейлит.

Д) Эксфолиативный хейлит.

Е) Микробный хейлит.

250. У ребенка 3 лет вчера появились высыпания и болезненность в полости рта при приеме пищи.Объективно: общее состояние удовлетворительное, t тела 37,50, подчелюстные лимфоузлы увеличены, болезненны при пальпации. На слизистой оболочке губ, языка несколько эрозий округлой формы, диаметром 1-3 мм, с венчиком гиперемии, покрытые белесоватым налетом. Десна гиперемизированы, отечны. Какие препараты Вы назначите в первую очередь в данном случае?

*** А) Противовирусные**

В) Противовоспалительные

С) Противогрибковые

Д) Кератопластики

Е) Антисептики

251. У ребенка 9 лет при санации полости рта в 85 зубе на жевательной поверхности выявлена кариозная полость, сообщающаяся с полостью зуба. При зондировании возникает резкая боль, умеренная кровоточивость. От холодной воды медленно проходящая боль. Перкуссия зуба безболезненна. Выберите оптимальный метод лечения.

*** А) Девитальная ампутация**

- В) Витальная экстирпация
- С) Девитальная экстирпация
- Д) Витальная ампутация
- Е) Биологический метод

252. У ребенка 8 лет в 75 зубе на дистально-апроксимальной поверхности глубокая кариозная полость, сообщающаяся с полостью зуба. Зондирование болезненно, перкуссия безболезненна, от холодной воды медленно проходящая боль. Зуб разрушился несколько месяцев назад, не лечился. Какой метод лечения вы проведете в данном случае?

*** А) Девитальная ампутация**

- В) Биологический метод
- С) Витальная экстирпация
- Д) Витальная ампутация
- Е) Девитальная экстирпация

253. Ребенок 8-ми лет жалуется на боль, усиливающуюся при накусывании в 21 зубе. Месяц назад произошел отлом части коронки зуба в результате падения. К врачу не обращался. Об-но: в 21 зубе в области медиального угла имеется дефект коронки на 1/3 ее высоты. Полость зуба открыта, зондирование и реакция на термический раздражитель безболезненны. Перкуссия резко болезненна. Десна в области 21 отечна, гиперемирована. Ваш предварительный диагноз?

*** А) Обострение хронического периодонтита**

- В) Обострение хронического пульпита
- С) Острый серозный периодонтит
- Д) Острый гнойный периодонтит
- Е) пульпит, осложненный периодонтитом

254. Ребенок 6 лет жалуется на боль в 65 зубе от холодного и горячего во время приема пищи, Об-но: на апроксимально-медиальной поверхности 65 зуба глубокая кариозная полость, сообщающаяся с полостью зуба, пульпа кровоточит, резко болезненна при зондировании. От холодного - медленно проходящая боль. Ваш предварительный диагноз?

*** А) Хронический фиброзный пульпит**

- В) Хронический гангренозный пульпит
- С) Обострение хронического периодонтита
- Д) Хронический гипертрофический пульпит
- Е) Хронический гранулирующий периодонтит

255. Ребенок 13 лет жалуется на острую боль в зубе на верхней челюсти справа, усиливающуюся при накусывании. Об-но: на апроксимально-дистальной поверхности 16 зуба глубокая кариозная полость, не сообщающаяся с полостью зуба, реакция на термические раздражители, зондирование безболезненно, перкуссия резко болезненна, зуб подвижен, слизистая в области 16 зуба гиперемирована, отечна. После некротомии вскрыта полость зуба с получением капли гноя. На рентгенограмме - изменений в периодонте не выявлено. Ваш предварительный диагноз?

*** А) Острый гнойный периодонтит**

- В) Обострение хронического периодонтита
- С) Острый гнойный пульпит
- Д) Острый серозный периодонтит
- Е) Острый серозный пульпит

256. Ребенок 13 лет жалуется на боль, усиливающуюся при накусывании в зубе на нижней челюсти справа. Об-но: 46 изменен в цвете, на жевательной поверхности глубокая кариозная полость, зондирование и перкуссия болезненны, десна в области 46 зуба гиперемирована, отечна, определяется свищ с гнойным отделяемым. На рентгенограмме: деструкция костной ткани в области вершины корня без четких границ. Ваш диагноз?

*** А) Обострение хронического гранулирующего периодонтита**

- В) Обострение хронического гангренозного пульпита
- С) Обострение хронического фиброзного пульпита
- Д) Обострение хронического гранулематозного периодонтит
- Е) Обострение хронического фиброзного периодонтита

257. У ребенка 7 лет нарушено общее состояние, температура тела до 38,0(С. Объективно: на слизистой щек обнаружены пятна белого цвета, размером с булавочную головку, выступающие над уровнем слизистой оболочки. На небе розовые пятна. Поставьте диагноз.

*** А) Корь**

- В) Ветряной оспа
- С) Скарлатина
- Д) Дифтерия
- Е) Инфекционный мононуклеоз

258. Ребенок 7,5 лет явился к школьному врачу-стоматологу для профилактического осмотра. Объективно: на жевательных поверхностях 16, 26, 36, 46 зубов глубокие, узкие фиссуры. Гигиенический индекс по Федоровой-Володкину 1,5. РМА – 0\%. Какой метод профилактики рекомендован?

*** А) Герметизация фиссур**

- В) Обработка фторлаком
- С) Электрофорез фторида натрия
- Д) Импрегнация азотнокислым серебром
- Е) Аппликация ремодентом

259. У 6 летнего ребенка во время осмотра выявлена кариозная полость в 74 зубе. Объективно: На жевательной поверхности 74 кариозная полость в пределах плащевого дентина, дно и стенки пигментированы, размягчены, при зондировании безболезненны, на холодное зуб не реагирует, перкуссия безболезненна. Какое дополнительное исследование показано?

*** А) Рентгенография.**

- В) Трансиллюминация.
- С) ортопантомография
- Д) телерентгенография
- Е) Люминесценции.

260. Ребенок 14 лет жалуется на боль при приеме горячей пищи в зубе на нижней челюсти. Объективно: На жевательной поверхности 46 зуба кариозная полость в пределах околопульпарного дентина, полость зуба вскрыта. Глубокое зондирование резко болезненно. Реакция на термические раздражители болезненна. Поставьте диагноз.

- * А) Хронический гангренозный пульпит.**
- В) Хронический фиброзный пульпит.
- С) Хронический гипертрофический пульпит.
- Д) Острый диффузный пульпит.
- Е) Острый очаговый пульпит.

261. Ребёнок 9 лет получил травму верхнего центрального резца. Ребенок практически здоров. Травма получена 2 часа назад. Объективно: перелом коронки 11 зуба, пульпа точечно оголена, резко болезненна, кровоточит, перкуссия зуба болезненна. Выберите метод лечения.

- * А) Биологический метод .**
- В) Девитальная ампутация.
- С) Витальная экстирпация.
- Д) Девитальная экстирпация.
- Е) Витальная ампутация

262. Дитина 12 років звернулась до лікаря-стоматолога з метою санації ротової порожнини. Інтенсивність карієсу відповідає високому рівню (КПВ = 6). Індекс Green-Vermilliona дорівнює 1,7 . Які пасти доцільно призначити для індивідуальної гігієни ротової порожнини у даному випадку?

- * А) Пасти, що містять сполуки фтору**
- В) Пасти, що містять ферменти
- С) Пасти, що містять антисептики
- Д) Пасти, що містять сольові добавки
- Е) Пасти, що містять екстракти трав

263. Дитина 10,5 років скаржиться на появу болісних висипань на губах. Червона облямівка губ набрякла, гіперемійована, вкрита тріщинками і численними кров'янистими кірочками. На шкірі верхньої губи визначаються дрібні пухирці з серозним вмістом, що зливаються між собою в окремих ділянках. Спостерігається також мацерація та мокнуття шкіри, особливо у кутах рота. Визначте попередній діагноз.

*** А) Екзематозний хейліт**

В) Метеорологічний хейліт

С) Атопічний хейліт

Д) Актинічний хейліт

Е) Ексфоліативний хейліт

264. Дитина 14 років скаржиться на сухість і лущення губ, особливо в осінньо-зимовий період. Об'єктивно: червона облямівка губ суха, інфільтрована, вкрита численними лусочками. Шкіра губ ущільнена, пігментована, визначається посилення її малюнка, лущення, а також радіальні тріщин. Водночас, відзначається сухість, ліхенізація і екскоріація шкіри обличчя. Визначте попередній діагноз.

*** А) Атопічний хейліт**

В) Ексфоліативний хейліт

С) Актинічний хейліт

Д) Метеорологічний хейліт

Е) Контактний алергічний хейліт

265. Дитина 11 років скаржиться на відчуття сухості і стягування губ, які вона постійно облизує. Об'єктивно: червона облямівка губ суха, інфільтрована гіперемійована, вкрита численими тонкими лусочками. Шкіра губ не ушкоджена. Визначте попередній діагноз.

*** А) Метеорологічний хейліт**

- В) Атопічний хейліт
- С) Ексфолюативний хейліт
- Д) Контактний алергічний хейліт
- Е) Екзематозний хейліт

266. У 8,5 річної дитини під час профілактичного огляду на дистальній контактній поверхні 54 зуба була виявлена каріозна порожнина у межах плащового дентину, заповнена розм'якшеним пігментованим дентином. У процесі некротомії екскаватором виник різкий біль, а в проекції медіально-щічного рогу пульпи виявлено сполучення з порожниною зуба, що кровоточить. Визначте найбільш імовірний діагноз.

*** А) Хронічний фіброзний пульпіт**

- В) Хронічний гангренозний пульпіт
- С) Гострий травматичний пульпіт
- Д) Гострий обмежений пульпіт
- Е) Гострий дифузний пульпіт

267. Батьки 7,5-річної дитини звернулись до лікаря-стоматолога з метою санації порожнини рота. Об'єктивно: КПВ+кп = 4, індекс Гріна-Вермільона дорівнює 2,5. Фісури перших постійних молярів відкриті, інтактні, непігментовані. Який метод первинної профілактики карієсу доцільно застосувати у даному випадку?

*** А) Неінвазивну герметизацію**

- В) Інвазивну герметизацію
- С) Аплікації фторовмісними лаками
- Д) Аплікації антибактеріальними лаками
- Е) Аплікації кальційвмісними гелями

268. Батьки 5-річної дитини звернулися до лікаря-стоматолога з метою профілактичного огляду. Об'єктивно: кп=5, слизова оболонка ясен блідо-рожевого кольору, індекс Федорова-Володкіної дорівнює 2,5. Зубну щітку якої жорсткості слід рекомендувати для індивідуальної гігієни порожнини рота у даному випадку?

*** А) М'яку зубну щітку**

- В) Середню зубну щітку
- С) Жорстку зубну щітку
- Д) Дуже м'яку зубну щітку
- Е) Дуже жорстку зубну щітку

269. Під час профілактичного огляду в 11-літньої дитини на вестибулярній поверхні і буграх 15 зуба виявлені плями білого кольору з чіткими контурами. Транспарентність емалі в ділянках поразки збережена, при її зондуванні шорсткість не відзначається. В анамнезі - передчасне видалення 55 зуба внаслідок ускладненого карієсу. Визначите найбільш ймовірний діагноз:

*** А) Місцева гіпоплазія емалі**

- В) Вогнищева гіпоплазія емалі
- С) Флюороз зубів
- Д) Хронічний початковий карієс
- Е) Гострий початковий карієс

270. Оглядаючи дитину 5 років, лікар знайшов множинні крейдоподібні цятки, ясно-жовтого кольору, що уражають емаль більшості зубів верхньої і нижньої щелеп. При висушуванні плями здобувають матовий відтінок і глянсову поверхню. При фарбуванні 2 \% метиленового синього, фарбування не відбувається. Дитина проживає в місцевості з вмістом фтору у воді 2,0 мг/л. Який попередній діагноз?

*** А) Флюороз зубів**

- В) Системна гіпоплазія емалі
- С) Мармурова хвороба
- Д) Недосконалий амелогенез
- Е) Недосконалий дентиногенез

271. Дитина 6 років скаржиться на ниючий біль, що виникає в зубі під час їжі та вдихання холодного повітря. Об'єктивно: на апроксимальній поверхні 75 - каріозна порожнина в межах біляпульпарного дентина, яка сполучається з порожниною зуба. Зондування сполучення болісне. Після термодіагностики біль триває певний час. Вкажіть ймовірний діагноз.

*** А) Хронічний фіброзний пульпіт**

- В) Хронічний гіпертрофічний пульпіт
- С) Гострий серозний пульпіт
- Д) Гострий гнійний пульпіт
- Е) Хронічний гангренозний пульпіт

272. Під час санації порожнини рота у дитини 4 років в 64 виявлена каріозна порожнина в межах колопульпарного дентину, виповнена розм'якшеним дентином, яка не сполучається з порожниною зуба. Зондування дна каріозної порожнини безболісне. Реакція на термічні подразники та на перкусію відсутня. На слизовій оболонці ясен у проекції верхівок коренів 64 - слід від нориці. Вкажіть ймовірний діагноз.

*** А) Хронічний гранулюючий періодонтит**

- В) Хронічний фіброзний періодонтит
- С) Хронічний фіброзний пульпіт
- Д) Хронічний гангренозний пульпіт
- Е) Хронічний грануломатозний періодонтит

273. Хлопчик 13 років скаржиться на зміну кольору та неприємні відчуття під час надавлювання на зуб нижньої щелепи зліва. Об'єктивно: в 36 каріозна порожнина, виповнена пломбою. Після її видалення - зондування дна каріозної порожнини безболісне. Реакція зуба на термічні подразники та перкусію відсутня. При рентгенологічному дослідженні: в ділянці верхівок 36 - вогнище розрідження кісткової тканини круглої форми з чіткими обрисами, діаметр якого - 4мм. Вкажіть ймовірний діагноз.

*** А) Хронічний грануломатозний періодонтит**

- В) Хронічний фіброзний періодонтит
- С) Хронічний фіброзний пульпіт
- Д) Хронічний гранулюючий періодонтит
- Е) Хронічний гангренозний пульпіт

274. Мати дівчинки 4 років скаржиться на підвищення температури тіла у дитини до 39оС, кашель, нежить. Регіональні лімфатичні вузли збільшені. При огляді ротової порожнини на гіперемійованій слизовій оболонці щік у ділянці кутніх зубів виявлені точкові плями, розміром за шпилькову головку, що нагадують бризки вапна. Під час пальпації уражених ділянок відчувається нерівність слизової оболонки. Вкажіть ймовірний діагноз.

*** А) Стоматит при корі**

- В) Стоматит при вітряній віспі
- С) Стоматит при краснусі
- Д) Багатоформна ексудативна еритема
- Е) Гострий герпетичний стоматит

275. Дитина 12 років скаржиться на сухість губ та виникнення на них лусочок. Об'єктивно: червона облямівка губ від середини до зони Клейна вкрита лусочками сірувато-коричневого кольору. Лусочки легко відпадають, прилегла слизова оболонка дефекту не має. Вкажіть ймовірний діагноз.

*** А) Ексфоліативний хейліт**

- В) Контактний алергічний хейліт
- С) Метеорологічний хейліт
- Д) Гландулярний хейліт
- Е) Мікробний хейліт

276. Дитина 8 років скаржиться на нічні болі в ділянці 75, біль під час жування та вживання холодної їжі. Об'єктивно: на апроксимально - медіальній поверхні 75 каріозна порожнина в межах біляпульпарного дентину, виповнена розм'якшеним пігментованим дентином, пульпова камера закрита, зондування дна різко болюче, перкусія позитивна, термопроба різко позитивна. Для лікування був обраний метод девітальної ампутації . Виберіть речовину для муміфікації пульпи.

*** А) Резорцин - формалінова рідина.**

- В) розчин нітрату срібла.
- С) Розчин хлоргексидину.
- Д) розчин гідрохінону.
- Е) розчин гіпохлориду натрію.

277. У клініку звернулася дитина 7-ми років з метою санації порожнини рота. Народилася і проживала у місцевості, де вміст фтору у воді становить 2,5 мг/л. При огляді на вестибулярних поверхнях 11, 21, 31, 41 і на горбах 16, 26, 36, 46 виявлені симетрично розташовані темні плями. З анамнезу з'ясовано, що зуби прорізалися ураженими. Визначте найбільш імовірний діагноз.

*** А) Флюороз зубів**

- В) Недосконалий одонтогенез
- С) Недосконалий амелогенез
- Д) Системна гіпоплазія емалі
- Е) Місцева гіпоплазія емалі

278. Дитина 9-ти років скаржиться на ниючий біль в зубі, що посилюється при надавлюванні на зуб. Місяць тому зуб лікувався з приводу пульпіту. Об'єктивно: в 36 пломба, перкусія різко болісна, слизова оболонка гіперемійована, набрякла. На рентгенограмі змін немає. Який найбільш імовірний діагноз?

*** А) Гострий серозний періодонтит.**

В) Загострення хронічного пульпіту.

С) Гострий дифузний пульпіт.

Д) Гострий гнійний пульпіт.

Е) Загострення хронічного періодонтиту.

279. Дівчинка 12-ти років скаржиться на печіння і болючість язика, особливо при вживанні гострої їжі. Об'єктивно: на кінчику та спинці язика спостерігаються овальні червоні плями. У ділянках ураження відсутні ниткоподібні сосочки. Дівчинка відзначає, що плями періодично збільшуються і мають мігруючий характер. Вкажіть ймовірний діагноз.

*** А) Десквамативний глосит**

В) Ромбоподібний глосит

С) Складчастий язик

Д) Волосатий язик

Е) Малиновий язик

280. Ребенок 2-х лет на приеме у стоматолога по поводу высыпаний и болезненности при приеме пищи, которые появились вчера. Объективно: t тела 37,5°, кожные покровы чистые, подчелюстные лимфоузлы болезненны. В полости рта: на слизистой оболочке губ, языка эрозии округлой формы диаметром 1-3 мм, болезненные, покрытые белесоватым налетом. Десна на верхней и нижней челюстях гиперемирована, отечна, кровоточит при прикосновении. Ваш диагноз?

*** А) Острый герпетический стоматит**

- В) Синдром Стивенса-Джонсона
- С) Рецидивирующий афтозный стоматит
- Д) Многоформная экссудативная эритема
- Е) Рецидивирующий герпетический стоматит

281. Ребенок 5-ти лет жалуется на самопроизвольные боли в зубе на верхней челюсти справа, усиливающиеся ночью и при приеме холодного. В 65 зубе глубокая полость, сообщающаяся с полостью зуба. Зондирование болезненно, перкуссия безболезненна. От холодной воды возникает медленно проходящая боль. Ваш предварительный диагноз?

*** А) Обострение хронического пульпита**

- В) Острый периодонтит
- С) Обострение хронического периодонтита
- Д) Острый серозный пульпит
- Е) Острый гнойный пульпит

282. У девочки 11-ти лет жалобы на кровоточивость в зубе на нижней челюсти во время приема пищи и чистки зубов. Зуб ранее болел, к врачу не обращались. При осмотре: в 46 зубе глубокая полость, сообщающаяся с полостью зуба, которая заполнена разrostаниями красного цвета. При зондировании определяется легкая кровоточивость и болезненность, перкуссия безболезненна, от холодного возникала незначительная боль. Какой наиболее вероятный диагноз?

*** А) Хронический гипертрофический пульпит**

В) Хронический гранулирующий периодонтит

С) Хронический папилит

Д) Десневой полип

Е) Хронический простой пульпит

283. Мальчик 13-ти лет жалуется на боли в зубе на верхней челюсти от теплого, горячего, неприятный запах при отсасывании из зуба. Объективно: 24 зуб изменен в цвете, определяется глубокая кариозная полость, сообщающаяся с полостью зуба, глубокое зондирование болезненно. Перкуссия безболезненна. Ваш диагноз?

*** А) Хронический гангренозный пульпит**

В) Хронический периодонтит

С) Хронический фиброзный пульпит

Д) Обострение хронического пульпита

Е) Обострение хронического периодонтита

284. Ребенок 8,5 лет, практически здоров, жалуется на боль в переднем верхнем левом зубе вследствие его травматического повреждения три часа назад. Объективно: коронковая часть 21 зуба отсутствует практически наполовину, пульпа значительно обнажена, красного цвета, резко болезненна и кровоточит при зондировании. Перкуссия 21 зуба значительно болезненна. Выберите оптимальный метод лечения в данном случае.

*** А) Витальной ампутация**

- В) Витальной экстирпация
- С) Девитальная ампутация
- Д) Девитальная экстирпация
- Е) Биологический метод

285. Мальчик 14-ти лет жалуется на острую самопроизвольную боль в зубе на верхней челюсти справа. Боль продолжается трое суток, усиливается ночью, носит пульсирующий характер, отдает в висок. Объективно: в 15 зубе кариозная полость в пределах околопульпарного дентина. Дентин размягченный, грязно-серого цвета. Зондирование болезненно по всему дну полости, перкуссия 15 зуба болезненна. Каков диагноз?

*** А) Острый гнойный пульпит**

- В) Острый диффузный пульпит
- С) Острый очаговый пульпит
- Д) Острый периодонтит
- Е) Обострение хронического периодонтита

286. Ребенок 13-ти лет жалуется на возникшую вчера острую самопроизвольную кратковременную боль приступообразного характера в области 36, которая усиливается при приеме пищи. Объективно в 36 глубокая кариозная полость на жевательной поверхности. Полость зуба закрыта, зондирование дна болезненное в одной точке. От холодного раздражителя возникает непродолжительная боль. Определите диагноз:

*** А) Острый ограниченный пульпит**

- В) Острый глубокий кариес
- С) Острый диффузный пульпит
- Д) Хронический фиброзный пульпит
- Е) Обострение хронического пульпита

287. У девочки 13-ти лет кровоточивость десен и подвижность передних зубов в течение последнего месяца. Об-но: слизистая оболочка десен в области нижних резцов и клыков отечна, гиперемирована, кровоточит при дотрагивании. Подвижность этих зубов I степени, пародонтальные карманы - 3 мм. На ортопантограмме - убыль костной ткани межальвеолярных перегородок на 1/3 длины их высоты. Определяется скученность фронтальных зубов нижней челюсти. ГИ -4,2. Какие местные лечебные мероприятия проводят в первую очередь?

*** А) Профессиональная гигиена.**

- В) Противовоспалительная терапия.
- С) Ортодонтическое лечение.
- Д) Физиотерапевтическое лечение.
- Е) Антибактериальная терапия.

288. Підліток віком 16-ти років скаржиться на неприємний запах з рота, загальну слабкість, підвищення температури тіла до 37,60С, що з'явилась два дні тому. Щойно перехворів ангіною. Об'єктивно: стан гігієни порожнини рота незадовільний, зуби вкриті шаром м'якого зубного нальоту. Ясна гіперемовані, ясенні сосочки вкриті брудно-сірим нальотом. Встановіть діагноз

*** А) Виразково-некротичний гінгівіт**

- В) Гострий катаральний гінгівіт
- С) Гіпертрофічний гінгівіт
- Д) Хронічний катаральний гінгівіт
- Е) Десквамативний гінгівіт

289. Підліток віком 16-ти років скаржиться на неприємний запах з рота, загальну слабкість, підвищення температури тіла до 37,60С, що з'явилась два дні тому. Щойно перехворів ангіною. Об'єктивно: стан гігієни порожнини рота незадовільний, зуби вкриті шаром м'якого зубного нальоту. Ясна гіперемовані, ясенні сосочки, вкриті брудно-сірим нальотом. Визначте збудника даного захворювання:

*** А) Фузобактерії, спірохети**

- В) Стрептококи
- С) Вірус герпесу
- Д) Стафілокок
- Е) Дріжджоподібні гриби

290. Девочка 12-ти лет жалуется на отечность, покраснение и чувство зуда губ. Болеет бронхиальной астмой. Подобное состояние наблюдается у ребенка в течение 3-х лет в зимний период. Об-но: на красной кайме губ и прилегающей коже эритема с четкими границами и отечность, мелкие трещинки, имеются признаки лихенизации губ. Наблюдаются следы расчесов на коже губ, щек и лба в виде царапин и корочек. Слизистая полости рта без патологических изменений. Поставьте диагноз?

*** А) Атопический хейлит.**

В) Контактный аллергический хейлит.

С) Метеорологический хейлит.

Д) Эксфолиативный хейлит.

Е) Микробный хейлит.

291. Батьки 5-ти річної дитини звернули увагу на нерівномірну забарвленість спинки язика і звернулися до дитячого стоматолога. Об`єктивно: порожнина рота санована, кп=4, на спинці і бокових поверхнях язика - ділянки десквамації епітелію, що межують із зонами гіпертрофії та підвищеного ороговіння ниткоподібних сосочків. В анамнезі - алергія на деякі харчові продукти. Встановіть клінічний діагноз.

*** А) Десквамативний глосит**

В) Туберкульозний глосит

С) Кандидозний глосит

Д) Герпетичне ураження язика

Е) Гострий катаральний глосит

292. Дівчинка 11,5 років на плановій санації поскаржилася на біль у губах під час вживання їжі, що періодично з`являється і раптово вщухає. Об`єктивно: слизова оболонка губ у зоні Клейна гіперемійована, набрякла, суха, під час розмови відзначається виділення мількіх крапельок слизового секрету. Визначте попередній діагноз.

*** А) Простий glandулярний хейліт**

В) Мікробний хейліт

С) Екзематозний хейліт

Д) Контактний алергічний хейліт

Е) Ексфоліативний хейліт

293. У дівчинки 11-ти років під час огляду виявлено наступне: інтенсивність карієсу КПВз=3, ГІ за Гріном-Вермілліоном - 1,6, РМА=20\%. Дівчинка 1-2 рази за рік хворіє на простудні захворювання. Скільки разів на рік дівчинка повинна відвідувати стоматолога, якщо середній показник інтенсивності карієсу в регіоні у даній віковій групі складає 4.

*** А) 1**

В) 1-2

С) 2

Д) 2-3

Е) 3-4

294. Хлопчик 12-ти років скаржиться на постійний, інтенсивний пульсуючий біль в зубі, що посилюється при накушуванні. Об'єктивно: лице асиметричне за рахунок колатерального набряку м'яких тканин, підщелепні лімфовузли збільшені, болісні при пальпації. В 26 - глибока каріозна порожнина, яка не сполучається з порожниною зуба. Реакція на термічні подразники, зондування безболісні, перкусія різко болюча, зуб рухомий. На рентгенограмі 26: змін у періодонті немає. Визначте діагноз.

*** А) Гострий гнійний періодонтит**

- В) Гострий серозний періодонтит
- С) Загострення хронічного періодонтиту
- Д) Гострий гнійний пульпіт
- Е) Пульпіт, ускладнений періодонтитом

295. Дівчинка 6-ти років з'явилася до лікаря-стоматолога з метою завершення лікування 75 з приводу загострення хронічного гранулюючого періодонтиту. Скарги відсутні. Об'єктивно: герметична пов'язка в 75 збережена, перкусія зуба безболісна, слизова оболонка в ділянці 75 без патологічних змін, безболісна при пальпації. Який матеріал доцільно використати для пломбування корневих каналів у даному випадку?

*** А) Цинк-евгенолова паста**

- В) Сілер із гутаперчевим штифтом
- С) Кальційвмісна паста
- Д) Склоіономерний цемент
- Е) Йодоформна паста

296. Ребенок 4-х лет заболел остро, Температура 39 градусов, головная боль, тошнота, боли при глотании. При осмотре полости рта слизистая оболочка мягкого неба и миндалины резко гиперемированы. Язык в первый день заболевания был обложен сероватым налетом, на вторые сутки произошло самоочищение языка. На третьи сутки язык имеет гладкую поверхность, малиновую окраску, грибовидные сосочки гиперемированы. Выскажите предположительный диагноз.

A) Герпангина

*** B) Скарлатина**

C) Ветряная оспа .

D) Корь

E) Дифтерия .

297. Дівчина 14-ти років скаржиться на наявність естетичного дефекту у вигляді білих плям на зубах. За місцем проживання вміст фтору в питній воді складає 2 мг/л. Об'єктивно: вестибулярні поверхні всіх зубів на верхній і нижній щелепі вкриті плямами білого кольору з нечіткими контурами. Який найбільш ймовірний діагноз?

*** A) Флюороз**

B) Місцева гіоплазія

C) Системна гіоплазія

D) Множинний карієс

E) Недосконалий амелогенез