

ЗАВАНТАЖЕНО З САЙТУ ТЕСТУВАННЯ.УКР

Патологическая анатомия

Категорія: **Тестовые задания для подготовки к итоговой государственной
аттестации - лечебное дело, 6 курс**

Кількість запитань: **58**

- 1. Гипертонический криз характеризуется всеми перечисленными признаками, кроме:**
- 2. Изменения почек при гипертонической болезни называются:**
- 3. Первичная злокачественная опухоль пищевода чаще всего является:**
- 4. Опухоль крукенберга представляет собой:**
- 5. Для брюшного тифа наиболее характерно:**
- 6. Составными элементами сифилитической гуммы являются все нижеперечисленные, кроме:**
- 7. Образное название печени при хроническом венозном полнокровии:**
- 8. При «мускатной» гиперемии в печени развиваются все нижеперечисленные изменения, кроме:**
- 9. При наличии у умершего гноящейся раны бедра и регионарного тромбофлебита обнаружены множественные гнойники в органах. такое осложнение называется:**
- 10. Амилоидозом может осложниться:**
- 11. Казеозный некроз встречается:**
- 12. На слизистой оболочке полости рта развивается следующий вид фибринозного воспаления:**
- 13. Гипертрофией называется:**
- 14. К проявлениям декомпенсации гипертрофированного сердца относится:**
- 15. Лейкемическим инфильтратом называется:**

16. На вскрытии обнаружена картина остеопороза с очагами деструкции костной ткани. в костном мозге имеется пролиферация атипических плазматических клеток. в почках - скопления амилоидных масс в строме пирамид, в клубочках, сосудах, в просвете канальцев - белковые цилиндры. речь идет:

17. У больного с клинической картиной лейкоза в пунктате грудины обнаружено, наряду с наличием миелоцитов, промегакариоцитов и мегакариоцитов, преобладание клеток эритробластического ряда: пронормоцитов и нормоцитов. наиболее вероятный диагноз:

18. Образное название селезенки при лимфогранулематозе:

19. Гистологическим признаком рака на месте (carcinoma in situ) является:

20. При дизентерии (шигеллезе) в начальной стадии в толстой кишке имеет место:

21. Характерным морфологическим признаком холеры является:

22. На вскрытии обнаружена флегмона слепой кишки при неизмененном червеообразном отростке. в слизистой оболочке кишки крупная язва с грязным зеленовато-желтым дном и подрывными краями. указанная картина характерна для:

23. Для туберкулезной гранулемы характерны:

24. Благоприятный исход туберкулезной гранулемы:

25. При дифтерии во входных воротах воспаление имеет характер:

26. При токсической дифтерии в сердце развивается:

27. При менингококковом менингите типичным воспалением является:

- 28. Осложнением менингококкового менингита является:**
- 29. Проявлением бактериального шока при молниеносной менингококцемии является:**
- 30. Для первично-сморщенных почек при гипертонической болезни характерны все нижеперечисленные признаки, кроме:**
- 31. Сроком полной организации инфаркта миокарда, положенным экспертами в основу классификации ишемической болезни сердца, является:**
- 32. К морфологическим изменениям кардиомиоцитов при декомпенсированном пороке сердца относятся:**
- 33. При атеросклерозе в брюшном отделе аорты выявляются все нижеперечисленные изменения, кроме:**
- 34. Исходом ишемического инфаркта головного мозга может быть:**
- 35. Карнификация легкого при крупозной пневмонии является:**
- 36. При пневмофиброзе и эмфиземе легких в сердце развивается:**
- 37. При бронхоэктатической болезни в стенке бронхоэктаза обнаруживают все нижеперечисленные изменения, кроме:**
- 38. Наиболее часто к силикозу присоединяется:**
- 39. Наиболее характерными изменениями сосудов в дне хронической язвы желудка являются:**
- 40. Одним из основных гистологических признаков вирусного гепатита является:**
- 41. К признакам первой стадии токсической дистрофии печени относится:**

42. Цирроз печени характеризуется всеми перечисленными признаками, кроме:
43. Гиалиноз гломерулярного аппарата почек обычно не выявляется:
44. К наиболее частым изменениям поджелудочной железы при сахарном диабете относятся:
45. Морфологическим проявлением диабетической макроангиопатии является:
46. Морфологическими проявлениями диабетической нефропатии являются:
47. Обратимой стадией дезорганизации при ревматизме является:
48. Эндокардит при ревматизме встречается в форме:
49. Осложнением острого бородавчатого эндокардита митрального клапана может быть:
50. Возможным исходом ревматического миокардита является:
51. Образным названием сердца при ревматическом перикардите является:
52. Ревматический перикардит может быть:
53. К характерным морфологическим изменениям при узелковом периартериите относится:
54. Феномен «проволочных петель» в почках развивается:
55. Формами деструктивного аппендицита являются все нижеперечисленные, кроме:
56. Морфологическими признаками хронического аппендицита являются все нижеперечисленные, кроме:

57. Клинико-морфологическими формами острого холецистита являются все нижеперечисленные, кроме:

58. При гистологическом исследовании желчного пузыря обнаружен склероз стенки с лимфогистиоцитарной инфильтрацией и атрофия слизистой оболочки. поставьте диагноз: