

ЗАВАНТАЖЕНО З САЙТУ ТЕСТУВАННЯ.УКР

Нормальная физиология

Категорія: **Тестовые задания для подготовки к итоговой государственной аттестации - лечебное дело, 6 курс**

Кількість запитань: **55**

- 1. С потенциалом покоя возбудимой клетки при повышении концентрации калия во внеклеточной среде произойдет:**
- 2. Наиболее существенным изменением при воздействии блокатором быстрых натриевых каналов будет:**
- 3. При поражении передних рогов спинного мозга будет наблюдаться:**
- 4. Для того чтобы заблокировать тормозные парасимпатические влияния на сердце, вы назначите:**
- 5. Для того чтобы заблокировать симпатические влияния на сердце, вы назначите:**
- 6. Из перечисленных расстройств при поражении в области гипоталамуса может наблюдаться:**
- 7. Наиболее ярким проявлением при полной блокаде ретикулярной формации будет:**
- 8. Резко повышенный диурез при пониженной плотности суточной мочи характерен для поражения:**
- 9. При поражениях базальных ганглиев из перечисленных проявлений возможно:**
- 10. У больного - двусторонняя гиперплазия коры надпочечников. наряду с другими обследованиями, вы будете проводить обследование головного мозга. назовите область, которая вас будет особенно интересовать:**
- 11. У больного с гемофилией:**
- 12. У больного с тромбоцитопенией:**

- 13. При гипертонической (сопровожающейся повышением осмолярности крови) гипергидратации:**
- 14. В ответ на потребление большого количества поваренной соли из перечисленных гормонов будет выделяться в увеличенных количествах:**
- 15. При гипопроотеинемии будут наблюдаться:**
- 16. Может ли наблюдаться трансфузионный шок, связанный с резус-несовместимостью, при переливании крови от резус-отрицательного донора резус-положительному реципиенту?**
- 17. Может ли наблюдаться трансфузионный шок, связанный с резус-несовместимостью, при переливании эритроцитарной массы от резус-отрицательного донора резус-положительному реципиенту?**
- 18. Можно ли перелить 1 л крови i группы реципиенту с iv группой?**
- 19. При пневмотораксе у взрослого:**
- 20. При тромбоэмболии легочной артерии:**
- 21. У больного в артериальной крови парциальное давление кислорода - 70 мм рт. ст., объемная концентрация кислорода -20 об%. ваш диагноз:**
- 22. Больному установлен электрокардиостимулятор. можно ли регулировать силу сокращений сердца, меняя амплитуду стимула?**
- 23. При повышении тонуса блуждающего нерва из перечисленных изменений на экг будет:**
- 24. Под действием препарата, блокирующего медленные кальциевые каналы, частота сердечных сокращений:**

25. Минутный объем правого желудочка:

26. По экг о деятельности сердца из перечисленных показателей можно судить:

27. У больного - повышенная кислотность желудка. больному может быть назначен препарат группы:

28. Внутривенное введение секретина будет сопровождаться повышением уровня:

29. При дуоденальном зондировании выявлено повышение содержания лейкоцитов в самой концентрированной порции желчи. можно думать о патологии:

30. У больного резко повышен уровень гастрина в крови. для этого состояния характерно:

31. При введении в двенадцатиперстную кишку соляной кислоты в крови резко повысится уровень:

32. Торможение активности желудка в ответ на попадание жирной пищи в двенадцатиперстную кишку уменьшится при дефиците гормона:

33. Секреция желчи в ответ на попадание кислой пищи в двенадцатиперстную кишку уменьшится при дефиците гормона:

34. Человек потреблял в сутки 100 г белка. при этом у него наблюдалось азотистое равновесие. затем он перешел на рацион с суточным содержанием белка 500 г. если на 3-й неделе такой диеты определить у него азотистый баланс, обнаружится:

35. Вы составляете суточный рацион для больного, страдающего ожирением, с целью добиться снижения массы тела. его суточные энергозатраты составляют около 2500 ккал. в составленном вами рационе имеется: белков - 150 г, углеводов - 600 г, жиров - 200 г. будет ли достигнута цель?

36. Для определения основного обмена из перечисленных показателей следует измерять:

37. Для осуществления управляемой гипотермии взрослому человеку необходимо ввести:

38. У больного имеется значительная протеинурия. назовите отдел поражения:

39. Под действием препарата, подавляющего активный транспорт натрия в дистальных канальцах почек, диурез:

40. Инулин - вещество, удаляемое исключительно путем фильтрации. у больного снижен клиренс инулина. это означает, что у него, скорее всего, поражены:

41. При разрушении задней доли гипофиза можно ожидать:

42. При некоторых отравлениях глюкоза появляется в моче, несмотря на нормальный уровень в крови. это означает, что точкой приложения данных токсических веществ являются:

43. Укажите поражение, при котором назначение ингибиторов ангиотензин-превращающего фермента может привести к дальнейшему ухудшению функции почек:

44. У больного методом тональной аудиометрии обнаружено резкое повышение порога восприятия звуков в диапазоне 15000— 20000 гц. наиболее вероятно повреждение:

45. Вам принесли для расшифровки ээг. взглянув на нее, вы обнаружили дельта-ритм во всех отведениях. в первую очередь вас будет интересовать:
46. Для расширения зрачка с целью осмотра глазного дна вы закапаете в глаза:
47. У больного поражена затылочная доля коры головного мозга. для оценки степени функционального повреждения необходимо применить:
48. При исследовании остроты зрения оказалось, что больной хорошо видит отдаленные предметы, но с трудом читает книгу с мелким шрифтом. очки с какими линзами вы ему выпишите?
49. Если воздушная звуковая проводимость нарушена, а костная нет, то поражение может локализоваться в:
50. У больного нарушены механизмы фоторецепции палочек. при этом будет наблюдаться:
51. У больного периодически возникают неконтролируемые судорожные движения левой руки. патологический очаг расположен:
52. Введение атропина приведет к большему увеличению частоты сердечных сокращений:
53. При регистрации экг имеются значительные помехи («наводка») в стандартных отведениях ii и iii, но не i. электрод может быть плохо наложен:
54. Выберите функциональную остаточную емкость легких, если: общая емкость легких = 5000 мл, жизненная емкость легких = 3500 мл, резервный объем вдоха = 2000 мл, дыхательный объем = 500 мл:
55. При отравлении метгемоглобинообразующим ядом парциальное давление кислорода в артериальной крови: