

ЗАВАНТАЖЕНО З САЙТУ ТЕСТУВАННЯ.УКР

# **Спланхнология. Центральная нервная система и органы чувств. Сосуды и нервы головы и шеи.**

---

Категорія: **Анатомия человека**

Кількість запитань: **1316**

1. Где находится уздечка языка ?
2. В языке различают следующие основные части:
3. К собственным мышцам языка относят следующие
4. В каждом зубе различают следующие части
5. Какие части различают в стенке трахеи:
6. . Следующие образования ограничивают зев
7. Различают следующие мышцы мягкого неба:
8. В языке различают следующие основные части:
9. К собственным мышцам языка относят следующие:
10. В каждом зубе различают следующие части:
11. Формула постоянных зубов выглядит так:
12. Формула молочных зубов выглядит так:
13. Проток околоушной слюнной железы открывается в:
14. В глотку открываются следующие отверстия:
15. Кольцо Пирогова образуют следующие миндалины:
16. В глотке выделяют следующие части:
17. Как располагается дно желчного пузыря в норме:
18. В таламусе содержатся центры:

19. К мышцам глотки относятся следующие:
20. В гипоталамусе содержатся центры:
21. В пищеводе различают следующие части:
22. Какие функции присущи промежуточному мозгу:
23. . На какие части разделяется нефрон?
24. К структурам конечного мозга относят:
25. Где размещается слепое отверстие языка ?
26. де размещаются листовидные сосочки ?
27. Какие поверхности отсутствуют в полушариях мозга:
28. Где размещаются желобовидные сосочки ?
29. Где размещаются грибовидные сосочки ?
30. Какие поверхности имеет язык ?
31. Где размещается срединная борозда языка ?
32. Что принадлежит к частям конечного мозга:
33. Где размещается подъязычный сосочек ?
34. Где находится верхняя граница спинного мозга
35. Где находится нижняя граница спинного мозга
36. Чем заканчивается спинной мозг

- 37. Лицевой нерв имеет:**
- 38. Лицевой нерв проходит через:**
- 39. Нерв барабанная струна проходит через:**
- 40. VII пара, лицевой нерв имеет:**
- 41. Где размещается подъязычная складка ?**
- 42. Средняя артерия мозга отходит от:**
- 43. Базиллярная артерия отходит от:**
- 44. Задняя артерия мозга отходит от:**
- 45. Где заложено ядро отводящего нерва?**
- 46. К эпителиуму относятся следующие образования:**
- 47. К гипоталамусу относятся образования:**
- 48. Метаталамус содержит в себе следующие структуры:**
- 49. Где выходит с мозга отводящий нерв?**
- 50. Дно третьего желудочка составляют:**
- 51. Третий желудочек непосредственно соединяется с:**
- 52. Где располагаются ядра IX пары черепных нервов?**
- 53. Собственно лицевой нерв имеет следующие волокна:**
- 54. Сколько ядер имеет языкоглоточный нерв?**

55. Для X пары черепных нервов характерно:
56. Сколько ядер имеет тройничный нерв?
57. Какие органы, которые покрыты со всех сторон брюшиной :
58. Укажите части пищевода:
59. Тощая кишка покрыта брюшиной:
60. Тощая кишка на латинском языке называется
61. .Mesenterium - это название:
62. Каким эпителием выстлана слизистая оболочка трахеи:
63. В правой подвздошной ямке лежит:
64. Со всех сторон брюшиной покрыты:
65. Желудок называется:
66. Сколько хрящевых колец в правом главном бронхе:
67. Назовите оболочки общего желчного протока:
68. Какую форму имеют легкие:
69. Какие части различают в легких:
70. Какие поверхности различают в легких
71. Слизистая оболочка ободочной кишки имеет такие образования
72. . В эпигастральном надчревном участке проецируются

73. . Тощая и подвздошная кишки проецируются в:
74. Какие складки образует слизистая оболочка прямой кишки?
75. . На диафрагмальной поверхности печени различают такие связки:
76. Сгруппированные лимфатические узелки расположены в:
77. . Вена ворот
78. . Желчный проток образуется от слияния:
79. Желчный проток объединяется с:
80. Желчный пузырь на латинском языке называется
81. Панкреатические островки в поджелудочной железе размещены основным образом в:
82. Поджелудочная железа по отношению к брюшине расположена
83. Ductus choledochus - это проток:
84. Поджелудочный (главный) проток открывается в:
85. Глотка имеет такие соединения:
86. Зев ограничен
87. Нисходящая ободочная кишка покрыта брюшиной
88. Прямая кишка покрыта брюшиной
89. Какие части имеет ротовая полость

90. Цифровая формула постоянных зубов:
91. Различают такие части зуба
92. . Цифровая формула молочных зубов имеет такой вид:
93. В языке различают такие части:
94. Наружный нос имеет следующие части:
95. Ductus choledochus - это проток:
96. Поджелудочный (главный) проток открывается в
97. . Глотка имеет такие соединения
98. Различают такие внешние признаки толстой кишки:
99. Зев ограничен
100. Нисходящая ободочная кишка покрыта брюшиной
101. Прямая кишка покрыта брюшиной:
102. Какие части имеет ротовая полость:
103. Цифровая формула постоянных зубов:
104. Различают такие части зуба:
105. Цифровая формула молочных зубов имеет такой вид:
106. . В языке различают такие части:
107. Наружный нос имеет следующие части:

**108. . Какие Вы знаете околоносовые полости:**

**109. . Какие вы знаете носовые ходы:**

**110. . Нижний носовой ход соединяется с орбитой через:**

**111. Средний носовой ход соединяется с:**

**112. Верхний носовой ход соединяется с:**

**113. Как расположен средний носовой ход по отношению к носовым раковинам:**

**114. Какие Вы знаете парные хрящи гортани:**

**115. Какие Вы знаете непарные хрящи гортани:**

**116. Какими за количеством осей есть суставы гортани?**

**117. Какие мышцы суживают голосовую щель:**

**118. Какая мышца расширяет голосовую щель:**

**119. Какая мышца напрягает голосовые связки:**

**120. Какая мышца расслабляет голосовые связки:**

**121. . На уровне какого шейного позвонка находится у взрослого человека верхняя граница гортани:**

**122. На уровне какого позвонка находится нижняя граница гортани у взрослого человека:**

**123. На уровне какого позвонка у взрослых находится нижняя граница трахеи:**

**124. На уровне какого позвонка расположена бифуркация трахеи:**

- 125. Следующие образования ограничивают зев**
- 126. Различают следующие мышцы мягкого неба:**
- 127. Начало пищевода у взрослых людей располагается на уровне:**
- 128. Желудок проектируется на переднюю брюшную стенку в:**
- 129. Желудок имеет следующие связки:**
- 130. В мышечной оболочке желудка различают слои:**
- 131. Печень проектируется на переднюю брюшную стенку в:**
- 132. В тонкой кишке выделяют следующие отделы**
- 133. Для ободочной кишки характерны такие признаки:**
- 134. Поджелудочная железа имеет следующие части:**
- 135. Островки Лянгерганса в поджелудочной железе расположены преимущественно в:**
- 136. Левая продольная борозда печени содержит следующие образования:**
- 137. Правая продольная борозда печени содержит следующие образования:**
- 138. Наружный нос имеет следующие части:**
- 139. Полость носа имеет следующие отверстия**
- 140. Полость носа имеет следующие стенки:**
- 141. В полости носа различают следующие функциональные области:**

- 142. Скелет наружного носа составляют хрящи:**
- 143. Гортань у взрослых людей расположена на уровне тел:**
- 144. Скелет гортани образуют хрящи::**
- 145. В гортани различают следующие непарные хрящи:**
- 146. В гортани различают следующие парные хрящи:**
- 147. Различают следующие прерывные соединения в гортани (суставы):**
- 148. В гортани различают следующие группы мышц**
- 149. Полость гортани имеет следующие отделы:**
- 150. В гортани находятся складки:**
- 151. Бифуркация трахеи у взрослых людей располагается на уровне тел:**
- 152. Вход в гортань ограничен:**
- 153. . Хрящи трахеи соединяются между собой следующими связками:**
- 154. Легкие имеют следующие края:**
- 155. В правом легком различают следующие доли:**
- 156. В левом легком различают следующие доли:**
- 157. Корень правого легкого сверху вниз составляют:**
- 158. Корень левого легкого сверху вниз составляю**
- 159. В левом легком различают следующие долевыe бронхи:**

- 160. В состав одного ацинуса входят:**
- 161. Parietalная плевра имеет следующие отделы:**
- 162. . Полостью плевры называют:**
- 163. Синусом плевры называют:**
- 164. Средостением называют:**
- 165. Различают следующие отделы средостения:**
- 166. . В заднем нижнем средостении расположенные:**
- 167. В переднем нижнем средостении расположены:**
- 168. Почечное ложе образуют следующие мышцы:**
- 169. В нефрон входят следующие образования в следующем порядке:**
- 170. Почка имеет следующие оболочки ( изнутри к верху):**
- 171. Мочевыводящие пути составляют:**
- 172. Стенку уретры составляют следующие оболочки снаружи:**
- 173. Сужения мочеточника имеют следующую локализацию:**
- 174. В мочеточнике различают следующие части (сверху вниз):**
- 175. К внутренним мужским половым органам относят:**
- 176. Предстательная железа состоит из следующих долей|:**
- 177. В мужской уретре различают следующие части**

- 178. Яичко имеет следующие оболочки:**
- 179. Половой член имеет следующие части:**
- 180. К наружным наружным женским половым органам относятся следующие:**
- 181. К внутренним женским половым органам относятся следующие:**
- 182. Наружное отверстие мочи в женском организме открывается:**
- 183. В маточной трубе различают следующие части:**
- 184. В стенке матки различают следующие слои:**
- 185. Различают следующие части матки:**
- 186. Яичник имеет следующие связки:**
- 187. На верхнем этаже брюшины различают следующие основные образования:**
- 188. Малый сальник образован следующими связками?**
- 189. Сальниковое отверстие ограничено:**
- 190. В средней части полости брюшины различают следующие основные образования:**
- 191. В нижнем этаже брюшины различают такие углубления:**
- 192. Укажите органы, покрытые брюшиной со всех сторон (расположенные интраперитонеально):**
- 193. Прямая кишка покрыта брюшиной :**

- 194. Повреждение какого органа чаще всего наблюдается при проникающем ранении живота:**
- 195. Какая зона коркового слоя надпочечников продуцирует глюкокортикоиды:**
- 196. Какая зона коркового слоя надпочечников продуцирует минералокортикоиды:**
- 197. Какая зона коркового слоя надпочечников продуцирует половые гормоны:**
- 198. Мозговая часть надпочечников вырабатывает следующие гормоны:**
- 199. . Основная причина возникновения паховой грыжи у детей:**
- 200. Переднее средостение содержит все, кроме:**
- 201. Заднее средостение содержит все, кроме:**
- 202. . Где расположена вилочковая железа:**
- 203. В состав гепатодуоденальной связки не входит:**
- 204. Передняя стенка пахового канала образована:**
- 205. Как располагается тело и шейка желчного пузыря в норме:**
- 206. Назовите слои нижней стенки желчного пузыря:**
- 207. Укажите объем желчного пузыря в норме:**
- 208. Назовите слои верхней стенки желчного пузыря:**
- 209. При радикальной операции по поводу рака поперечно-ободочной кишки при удалении лимфатических узлов пересекают:**

- 210. При радикальной операции по поводу рака нисходящей ободочной кишки следует пересекать:**
- 211. Повреждение какого органа чаще всего наблюдается при проникающем ранении правой половины живота:**
- 212. Повреждение какого органа чаще всего наблюдается при закрытой травме живота:**
- 213. Мозговая часть надпочечников производит гормоны:**
- 214. . Каждая из следующих структур располагается в составе печеночно-двенадцатиперстной связки, за исключением:**
- 215. Какой из ниже перечисленных гормонов гипофиза преимущественно стимулирует сокращение матки?**
- 216. Каждый из ниже перечисленных органов устлан переходным эпителием, за исключением:**
- 217. На какие части разделяется мужская уретра?**
- 218. В состав пародонта входят?**
- 219. Кардиальная часть желудка размещена на уровне позвонков:**
- 220. Мышечная оболочка желудка имеет такие слои:**
- 221. Двенадцатиперстная кишка проецируется в:**
- 222. Двенадцатиперстная кишка имеет такие части:**
- 223. Двенадцатиперстная кишка покрыта брюшиной:**
- 224. В двенадцатиперстной кишке различают складки:**

**225. На слизистой оболочке тонкой кишки различают такие образования:**

**226. Печень проектируется в таких областях:**

**227. . Различают такие поверхности печени:**

**228. В правой продольной борозде печени находится:**

**229. В левой продольной борозде печенки размещается:**

**230. Печень по-латыни называется:**

**231. Поджелудочная железа по-латыни называется:**

**232. Поджелудочная железа имеет такие части:**

**233. В воротах печени определяют (справа налево) :**

**234. Вены печени выходят из печени:**

**235. Толстая кишка имеет такие отделы:**

**236. Свободная часть жира всасывается из полости тонкой кишки:**

**237. Пееровые бляшки находятся в:**

**238. Круглая связка печени образовалась в результате облитерации:**

**239. Переднюю стенку сальникового отверстия образовал:**

**240. Глубина введения желудочного зонда определяется по расстояния:**

**241. В нижний носовой ход открывается:**

**242. Размеры правой и левой почки на рентгенограмме в норме:**

243. Чем отличаются клубочки коркового слоя от клубочков с юкстамедулярным размещением?
244. Какие из нижченазванных мышц расширяют голосовую щель?
245. Какой у ниженазванных образований находится в среднем средостении?
246. Анатомический участок, где возможно повреждение мочеточника при удалении матки в:
247. Все образования являются оболочками мошонки, за исключением:
248. Оплодотворение яйцеклетки происходит в норме в:
249. Мужские половые клетки образуются:
250. Тельца Гассала находятся в:
251. Сжатие входа влагалища осуществляет:
252. Какие хрящи гортани являются непарными? :
253. Какие хрящи гортани являются парными? :
254. На каком уровне трахея разделяется на главные бронхи?:
255. . Какая длина правого главного бронха (см) ? :
256. Трахея фиброзно- мышечная трубка, длиной в среднем (см) :
257. Ширина трахеи приблизительно(мм):
258. Основная морфологическая единица легочной ткани:
259. В состав легочного сегмента входят компоненты:

260. За формой легочный сегмент напоминает:
261. Какая длина левого главного бронха(см)? :
262. Длина пищевода взрослого человека (см):
263. Пищевод состоит из физиологических сужений:
264. Пищевод состоит из изгибов:
265. В шейном отделе, по отношению к трахее, пищевод находится:
266. Какие органы относятся к пищеварительной системе?
267. Назвать стенки ротовой полости.
268. На какие отделы разделяется ротовая полость?
269. В состав мягкого неба входит все кроме:
270. К мышцам мягкого неба принадлежит все кроме:
271. Каким эпителием покрыта слизистая оболочка мягкого неба?
272. Из верхнечелюстного отростка развивается все кроме:
273. Из нижнечелюстного отростка развивается все кроме:
274. Чем образовано твердое небо?
275. Из каких отделов состоит пищеварительный канал
276. Чем образована верхняя стенка ротовой полости
277. Чем образована нижняя стенка ротовой полости.

278. Чем образованы боковые стенки ротовой полости?
279. Какие мышцы образуют мягкое небо?
280. Какими костями образована верхняя стенка ротовой полости
281. Что такое «заячья губа»?
282. Что являет собой «волчья пасть»?
283. Какой порок развития называется макростомой?
284. Какой порок развития называется микростомой?
285. Что является начальным отделом пищеварительной системы?
286. Через какое анатомическое образование собственно полость рта соединяется с ротоглоткой?
287. Через какое анатомическое образование преддверие соединяется с собственно полостью рта
288. Чем ограничено преддверие спереди и снаружи?
289. Чем ограничено преддверие изнутри и сзади?
290. Что является входом в преддверие?
291. Чем покрыта наружная поверхность губ
292. Чем покрыта внутренняя поверхность губ
293. Чем представлено основание губ
294. Что отделяет ротовую полость от носовой?

295. Что размещено между кожей и щочной мышцей у детей?
296. Что открывается на слизистой оболочке щеки у преддверии рта?
297. Какие органы пищеварительной системы размещены в области головы и шеи
298. Какие органы пищеварительной системы размещены в грудной полости?
299. Какие органы пищеварительной системы размещены в брюшной полости?
300. Какие органы пищеварительной системы размещены в полости таза?
301. Какие анатомические структуры разделяют ротовую полость на два отделы?
302. Какие анатомические образования размещаются в ротовой полости
303. Чем образована диафрагма рта?
304. На какой части языка размещается язычная миндалина ?
305. Какая стенка ротовой полости является одновременно стенкой носовой полости
306. Назвать орган ротовой полости который принимает участие в артикуляции речи
307. Частями зуба являются все кроме:
308. Какая формула молочных зубов?
309. Какая формула постоянных зубов?
310. Из чего развивается эмаль зуб

- 311. Коронка зуба имеет все поверхности, кроме:**
- 312. Тканями зуба являются все кроме:**
- 313. Поверхности коронки зуба все, кроме:**
- 314. Какое количество резцов?**
- 315. Какое количество клыков?**
- 316. Какое количество малых коренных зубов?**
- 317. Какое количество больших коренных зубов?**
- 318. Из каких элементов состоит опорный аппарат зуба**
- 319. Какое строение клыков?**
- 320. Как называется третий верхний моляр?**
- 321. На каком зубе размещен бугорок Карабелли?**
- 322. Корни каких зубов контактируют с носовой полостью?**
- 323. Корни каких зубов контактируют с верхнечелюстной пазухой**
- 324. Корни каких зубов контактируют с каналом нижней челюсти?**
- 325. Что такое прикус?**
- 326. Что такое диастемы?**
- 327. Что такое тремы?**
- 328. Какие зубы имеют коронку долотовидной формы?**

- 329. Какие зубы имеют коронку конической формы с острой верхушкой?**
- 330. Какие зубы являются отсутствующими в формуле молочных зубов?**
- 331. Какие молочные зубы прорезываются первыми?**
- 332. Какие из постоянных зубов прорезываются первыми?**
- 333. В течение какого периода жизни прорезывается зуб мудрости?**
- 334. Какие зубы принимают участие в разрезании пищи?**
- 335. Какие зубы принимают участие в разрывании пищи?**
- 336. Какие зубы принимают участие в дроблении пищи ?**
- 337. Какие зубы принимают участие в растирании пищи?**
- 338. В каком возрасте начинают прорезываться молочные зубы?**
- 339. Сколько молочных зубов имеет ребенок к началу 3-го года жизни?**
- 340. Что такое зубная дуга?**
- 341. Что такое базальная дуга?**
- 342. Что такое альвеолярная дуга?**
- 343. Что такое параконус?**
- 344. Что такое метаконус?**
- 345. Что такое гипоконус?**
- 346. К вкусовым сосочкам языка принадлежат все кроме:**

347. К собственным мышцам языка принадлежат все кроме:
348. Язык имеет все части кроме:
349. К скелетным мышцам языка принадлежат:
350. К малым слюнным железам принадлежат:
351. К большим слюнным железам принадлежат:
352. Где размещается околоушная слюнная железа?
353. Где размещается поднижнечелюстная слюнная железа?
354. Где размещается подъязычная слюнная железа?
355. Какой по характеру секрета является околоушная слюнная железа?
356. Какой по характеру секрета является нижнечелюстная слюнная железа?
357. Какой по характеру секрета является подъязычная слюнная железа?
358. Где открывается протока околоушной слюнной железы?
359. Какие функции выполняет язык?
360. Какая функция подбородочно-язычной мышцы?
361. Какая функция подъязычно-язычной мышцы?
362. Какая функция шилоязычной мышцы?
363. Собственными мышцами языка являются?
364. Какая функция верхней продольной мышцы?

- 365. Какая функция нижней продольной мышцы?.**
- 366. Какая функция поперечной мышцы языка?**
- 367. Какая функция вертикальной мышцы языка?**
- 368. Какие сосочки языка не содержат вкусовые рецепторы?**
- 369. Где открывается протока подъязычной слюнной железы**
- 370. Где открывается протока поднижнечелюстной слюнной железы?**
- 371. Какие вы знаете сосочки языка ?**
- 372. Какие сосочки размещаются на всей поверхности спинки языка ?**
- 373. Какая анатомическая структура делит язык ?**
- 374. Как по автору называется выводная протока околоушной слюнной железы ?**
- 375. Как по автору называется выводная протока поднижнечелюстной слюнной железы ?**
- 376. Средний мозг получает кровоснабжение, в основном, через:**
- 377. Передняя мозговая артерия отходит от:**
- 378. Конец спинного мозга у взрослого находится на уровне межпозвоночного диска между позвонками**
- 379. Двигательные нейроны спинного мозга находятся в**
- 380. Нарушение чувствительности происходит при поражении**

381. Какие сегменты образуют поясничное утолщение спинного мозга?
382. В результате вывиха нижней челюсти у пациента нарушена вкусовая чувствительность передних 2/3 языка и слюноотделения. Травмой какого нерва это вызвано?
383. Спинномозговая жидкость попадает в подпаутинное пространство из
384. У новорожденного спинной мозг доходит до уровня
385. Спинномозговая жидкость возвращается в венозную систему с помощью
386. Промежуточный мозг граничит из латеральной стороны с
387. Через внутреннюю капсулу проходят
388. Ядра каких анализаторов находятся в лобной доле коры мозга?
389. Где находятся центры терморегуляции?
390. Каждое из перечисленных ниже образований является частью лимбической системы, за исключением
391. Где находятся тела II нейронов болевой и температурной чувствительности?
392. Где находятся тела II нейронов мышечно-суставной чувствительности?
393. Где находятся тела II нейронов болевой и температурной чувствительности?
394. В зрительном бугре находятся тела III нейронов следующих видов чувствительности:

395. У больного нарушена мышечно-суставная чувствительность в нижних конечностях. Что поражено?
396. Для слухового пути характерное все ниженазванное, за исключением
397. Какие образования сегментарного уровня составляют симпатический отдел вегетативной нервной системы?
398. Все названы ниже мозговые центры являются односторонними, за исключением?
399. Где размещается корковый центр обонятельного анализатора?
400. Все следующие утверждения относительно функций водянистой влаги верны, за исключением?
401. Как называется наружная оболочка глазного яблока?
402. Укажите специализированные виды чувствительности?
403. Какой из названных ниже нервов или сосудов не проходит в полости пещеристой пазухи?
404. Где локализуется корковый центр зрительного анализатора?
405. Какая мышца глаза иннервируется отводящим нервом?
406. Какая мышца глаза иннервируется блоковым нервом?
407. Сколько слоев различают в коже?
408. Сколько пар ножек имеет мозжечок?
409. С чем соединяется барабанная полость при помощи слуховой трубы?

- 410. В какой последовательности от барабанной перепонки размещаются слуховые косточки?**
- 411. В какой стенке барабанная полость продолжается в сосцевидную пещеру?**
- 412. Внутреннее ухо состоит из:**
- 413. Чем заканчивается барабанная лестница?**
- 414. Где находятся ядра VIII пар ЧМН?**
- 415. Назовите подкорковый центр слуха?**
- 416. В какой структуре полушарий головного мозга человека размещается центр зрения?**
- 417. Какая топография центра одновременного поворота головы и глаз?**
- 418. Какая топография центра практических навыков, сложных целеустремленных движений человека?**
- 419. Какая топография коркового конца проприоцептивного анализатора?**
- 420. Какая топография центра общей чувствительности - болевой, температурной, осязательной?**
- 421. Какая топография коркового конца слухового анализатора?**
- 422. Какая топография коркового конца вестибулярного анализатора?**
- 423. Какая топография коркового конца обонятельного анализатора?**
- 424. Какая топография коркового конца центра стереогнозии?**
- 425. Какая топография слухового центра устной речи у человека?**

426. Какая топография зрительного центра письменной речи у человека?
427. Какая топография центра устной речи у человека?
428. Какая топография центра письменной речи у человека?
429. Спинномозговая жидкость находится в:
430. Каких анатомических образований нет в продолговатом мозге:
431. Центры каких рефлексов находятся в продолговатом мозге:
432. Ядра каких черепных нервов находятся в продолговатом мозге:
433. Что отделяет мозговой мост от продолговатого мозга:
434. Где содержится нежный пучок:
435. Что содержится в толще олив продолговатого мозга:
436. Укажите, во что переходит сверху нежный пучок продолговатого мозга:
437. Больной жалуется на боль в деснах и зубах верхней челюсти. О воспалении какого нерва идет речь?
438. Какие из перечисленных ядер локализуются в мозжечке:
439. Какие образования принадлежат к среднему мозгу:
440. Какие из перечисленных ядер не содержатся в среднем мозге:
441. Какое название имеет полость среднего мозга:
442. Гиппокамп принимает участие в формировании:

**443. Какие части есть в зрительном бугре:**

**444. Чем образованы боковые стенки полости III желудочка:**

**445. В каком отделе головного мозга находятся боковые желудочки:**

**446. Какое название имеет боковая борозда мозга:**

**447. Где расположена внутренняя капсула:**

**448. Через внутреннюю капсулу проходят:**

**449. Лучистость мозолистого тела образована:**

**450. Где содержится корковый центр обоняния:**

**451. Спинномозговая жидкость находится:**

**452. Где локализуются вегетативные ганглии симпатической части вегетативной нервной системы:**

**453. Какое физиологическое влияние имеет возбуждение симпатической части вегетативной нервной системы:**

**454. Какое физиологическое влияние имеет возбуждение парасимпатической части вегетативной нервной системы:**

**455. Где расположены симпатические центры вегетативной нервной системы:**

**456. В какой доле расположены корковые центры вегетативной части нервной системы:**

**457. При повреждении ядер таламуса наблюдается:**

**458. В продолговатом мозге расположены следующие ядра черепных нервов:**

**459. Следующие образования составляют границу между спинным и продолговатым мозгом:**

**460. К собственно заднему мозгу относятся следующие образования:**

**461. В мосте расположены следующие ядра главных нервов:**

**462. В мосте различают следующие части:**

**463. Латеральную петлю составляют следующие образования:**

**464. Крышу четвертого желудочка составляют:**

**465. В среднем мозге различают следующие образования:**

**466. В покрывке ножек мозга различают следующие ядра:**

**467. В промежуточном мозге различают следующие основные части:**

**468. Через заднюю ножку внутренней капсулы мозга проходят следующие пути:**

**469. В покрывке ножек мозга располагаются следующие пути:**

**470. Таламический мозг содержит в себе следующие основные части:**

**471. Крышу III желудочка образуют:**

**472. Переднюю стенку III желудочка образуют:**

**473. К производным конечного мозга относятся следующие структуры:**

**474. Боковые желудочки имеют следующие отделы:**

**475. Различают следующие стенки переднего рога бокового желудочка:**

- 476. К периферическому отделу обонятельного мозга относятся следующие структуры:**
- 477. К центральному отделу обонятельного мозга относятся следующие образования**
- 478. Центры речи расположены в:**
- 479. Артериальный круг мозга образуют следующие артерии:**
- 480. Производные мягкой мозговой оболочки:**
- 481. Различают следующие образования паутинной оболочки:**
- 482. Различают следующие производные твердой мозговой оболочки:**
- 483. Ядра каких анализаторов располагаются в средней лобной извилине?**
- 484. Задние рога спинного мозга содержат следующие ядра**
- 485. Что является структурно функциональной единицей нервной системы**
- 486. Что является морфологическим эквивалентом рефлекса**
- 487. Из каких элементов состоит рефлекторная дуга**
- 488. В какой последовательности возникали формы нервной системы во время ее исторического развития**
- 489. Что являет собой рефлекторная дуга**
- 490. Какие нейроны размещены в спинномозговых узлах**
- 491. Как называются рецепторы, размещенные в мышцах, связках, суставах**

492. Как называется место контакта двух нейронов
493. Из каких зародышевых структур развивается нервная система
494. Что принадлежит к центральной нервной системе
495. Назовите составные части периферического отдела нервной системы
496. Назовите виды синапсов
497. Из каких частей состоит нервная клетка
498. Что такое динамическая поляризованность нервной клетки
499. Какие типы нейронов за их морфофункциональной характеристикой Вы знаете
500. Виды рецепторов в зависимости от их локализации
501. Где находятся тела чувствительных нервных клеток
502. Как называется продолжение спинного мозга ниже мозгового конуса
503. Где заканчивается внутренняя часть конечной нити спинного мозга
504. Где заканчивается внешняя часть конечной нити спинного мозга
505. Какие части имеет конечная нить
506. Какие утолщения имеет спинной мозг
507. Что является границей, которая разделяет спинной мозг на две симметричных половины
508. Какие борозды проходят по передней поверхности спинного мозга

509. Какие борозды проходят по задней поверхности спинного мозга
510. Чем образованы корешки спинного мозга
511. Чем образованы задние корешки спинного мозга
512. Чем образованы передние корешки спинного мозга
513. Какими за функцией есть задние корешки спинного мозга
514. Какими за функцией есть передние корешки спинного мозга
515. Назовите место проникновения в спинной мозг задних корешков
516. Назовите место выхода из спинного мозга передних корешков
517. Какая полость проходит в середине спинного мозга
518. Чем заканчивается нижний конец центрального канала
519. С чем сообщается центральный канал сверху
520. Где находится спинной мозг
521. Назовите место выхода из позвоночного канала корешков спинного мозга
522. Как образуется спинномозговой нерв
523. На какие ветви разделяется спинномозговой нерв
524. Назовите оболочки спинного мозга
525. Между чем находится эпидуральное пространство
526. Между чем находится субдуральное пространство

527. Между чем находится подпаутинное пространство
528. Между каким образованием натянута зубчатая связка
529. Что находится в подпаутинном пространстве
530. Какая за функцией передняя ветвь спинномозгового нерва
531. Какая за функцией задняя ветвь спинномозгового нерва
532. Из каких веществ состоит спинной мозг
533. Что такое серое вещество спинного мозга
534. Что такое белое вещество спинного мозга
535. Что образует серое вещество спинного мозга
536. Назовите части столбов серого вещества спинного мозга
537. На каком уровне находятся боковые рога спинного мозга
538. Что образует серое вещество спинного мозга на поперечном срезе
539. Назовите рога серого вещества спинного мозга
540. Какие нейроны размещаются в задних рогах спинного мозга
541. В каких рогах спинного мозга размещаются двигательные соматические нейроны
542. Чем соединены между собой передние рога спинного мозга
543. Чем соединены между собой задние рога спинного мозга

544. Какое вещество находится вокруг эпендимы центрального канала спинного мозга
545. Какие ядра образуют нейроны передних рогов спинного мозга
546. Из чего состоят передние корешки спинного мозга
547. Какие ядра образуют клетки задних рогов спинного мозга
548. Из чего состоят задние корешки спинного мозга
549. Где находятся передние канатики белого вещества спинного мозга
550. Из каких клеток состоят боковые рога спинного мозга
551. Что образуют нервные клетки в боковых рогах спинного мозга
552. Где находится ретикулярная формация в шейном отделе спинного мозга
553. Где находится ретикулярная формация в грудном отделе спинного мозга
554. На какие части разделено белое вещество спинного мозга
555. Где находится передний канатик белого вещества
556. Где находится боковой канатик белого вещества
557. Где находится задний канатик белого вещества
558. Чем соединены между собой передние (правый и левый) канатики белого вещества
559. Назовите системы пучков белого вещества

560. Какие за функцией щепотки находятся преимущественно в передних канатиках
561. Какие за функцией пучки находятся в задних канатиках
562. Какие за функцией пучки находятся в боковых канатиках
563. Какой путь не находится в передних канатиках
564. Какой путь не находится в боковых канатиках
565. Какие пучки проходят в задних канатиках
566. Назовите восходящие проводящие пути боковых канатиков спинного мозга
567. Назовите нисходящие проводящие пути боковых канатиков спинного мозга
568. Что такое сегмент спинного мозга
569. Какие различают сегменты спинного мозга за местом их нахождения
570. Сколько есть шейных сегментов спинного мозга
571. Сколько есть грудных сегментов спинного мозга
572. Сколько есть поясничных сегментов спинного мозга
573. Сколько есть крестцовых сегментов спинного мозга
574. Сколько есть копчиковых сегментов спинного мозга
575. Сколько есть сегментов в спинном мозге
576. На каком уровне относительно к позвоночнику находятся верхние шейные сегменты спинного мозга

577. На уровне какого позвонка находится X грудной сегмент спинного мозга?
578. Шейное утолщение размещается на уровне следующих позвонков?
579. Какие нейроны находятся в боковых рогах спинного мозга:
580. Какие образования сегментарного уровня составляют симпатический отдел вегетативной нервной системы?
581. Какой сегмент спинного мозга размещен на уровне третьего грудного позвонка?
582. Сегментом спинного мозга есть:
583. Где находятся тела II нейронов мышечно-суставного чувства коркового направления?
584. Спинномозговая жидкость попадает в подпаутинное пространство через:
585. Сколько нейронов входят в состав простой рефлекторной дуги:
586. В результате травмы поврежден восьмой грудной позвонок. Какой сегмент спинного мозга расположен на уровне данного позвонка у больного?
587. Какой сегмент спинного мозга расположен на уровне десятого грудного позвонка у человека?
588. На какие части разделено белое вещество спинного мозга?
589. Из каких клеток состоят боковые рога спинного мозга?
590. Где локализуются передние канатики белого вещества спинного мозга?
591. Какие анатомические структуры образуют границу между спинным и продолговатым мозгом:

**592. Укажите место спинномозговой пункции.**

**593. В результате травмы поврежден четвертый шейный позвонок. Какой сегмент спинного мозга расположен на уровне этого позвонка у больного?**

**594. Окончание спинного мозга во взрослого человека находится на уровне межпозвоночного диска между позвонками.**

**595. Какие образования характерны для серого вещества спинного мозга:**

**596. Нарушение чувствительности происходит при поражении:**

**597. Двигательные нейроны спинного мозга находятся в:**

**598. Нарушение чувствительности происходит при поражении:**

**599. На уровне какого позвонка находится X грудной сегмент спинного мозга?**

**600. Шейное утолщение находится на уровне следующих позвонков?**

**601. Поясничное утолщение находится на уровне следующих позвонков?**

**602. Шейное утолщение лучше выражено на уровне следующих позвонков?**

**603. Пояснично-крестцовое утолщение лучше всего выделяется на уровне следующих позвонков?**

**604. При рождении у детей спинной мозг протягивается к уровню:**

**605. Какие нейроны находятся в задних рогах спинного мозга:**

**606. Какие нейроны находятся в передних рогах спинного мозга:**

**607. Какие нейроны находятся в боковых рогах спинного мозга:**

- 608. Где находится передний канатик белого вещества?**
- 609. Где находится боковой канатик белого вещества?**
- 610. Где находится задний канатик белого вещества?**
- 611. Чем соединяются между собой передние (правый и левый) канатики белого вещества?**
- 612. Какие за функцией пучки находятся преимущественно в передних канатиках?**
- 613. Какие за функцией пучки находятся в задних канатиках?**
- 614. Где находится ретикулярная формация в грудном отделе спинного мозга?**
- 615. Из чего состоит спинномозговой ганглий?**
- 616. Из чего состоят задние корешки спинного мозга?**
- 617. Где расположены симпатические центры вегетативной нервной системы:**
- 618. Где локализуются вегетативные ганглии симпатической части вегетативной нервной системы:**
- 619. На уровне какого позвонка находится XI грудной сегмент спинного мозга?**
- 620. Спинномозговая жидкость находится в:**
- 621. Какие образования сегментарного уровня составляют симпатичный отдел вегетативной нервной системы?**
- 622. Где находятся тела II нейронов болевой и температурной чувствительности?**

623. Отток спинномозговой жидкости совершается в венозную систему через:
624. Коленный рефлекс исчезает при?
625. Какие образования сегментарного уровня составляют симпатичный отдел вегетативной нервной системы?
626. Где находятся тела III нейронов болевой и температурной чувствительности?
627. В шейном отделе сегменты спинного мозга расположены относительно соответствующего им по счету позвонка выше на:
628. На уровне какого позвонка находится VII грудной сегмент спинного мозга?
629. Какой сегмент спинного мозга расположен на уровне седьмого грудного позвонка у человека?
630. В верхнегрудном отделе сегменты спинного мозга расположены относительно соответствующего им по счету позвонка выше на:
631. В среднегрудном отделе сегменты спинного мозга расположены относительно соответствующего им по счету позвонка выше на:
632. Какой сегмент спинного мозга расположен на уровне второго шейного позвонка у человека?
633. Какой сегмент спинного мозга расположен на уровне третьего грудного позвонка у человека?
634. Что характерно для серого вещества спинного мозга?
635. Укажите правильное утверждение относительно количества сегментов:

**636. Какую функцию выполняет спинной мозг?**

**637. Как называется отросток нейрона, который проводит нервные импульсы от тела нейрона к клетке?**

**638. Что принадлежит центральной нервной системе:**

**639. Спинномозговая жидкость находится в:**

**640. Сколько сегментов различают в спинном мозгу?**

**641. Что характерно для серого вещества спинного мозга?**

**642. Какой сегмент спинного мозга расположен на уровне третьего шейного позвонка у человека?**

**643. Какой сегмент спинного мозга расположен на уровне второго грудного позвонка у человека?**

**644. В нижнегрудном отделе сегменты спинного мозга расположены относительно соответствующего им по счету позвонка выше на:**

**645. Где расположены центральные отделы симпатической вегетативной нервной системы:**

**646. Сегментом спинного мозга является:**

**647. Передние рога спинного мозга содержат следующие ядра:**

**648. Задние рога спинного мозга содержат следующие ядра:**

**649. В таламусе находятся тела III нейронов следующих видов чувствительности:**

**650. Где находятся тела II нейронов мышечно-суставной чувствительности?**

651. Где находятся тела I нейронов болевой и температурной чувствительности?
652. Отток спинномозговой жидкости совершается в венозную систему через:
653. Спинномозговая жидкость попадает в подпаутинное пространство из
654. Вегетативные ядра спинного мозга находятся в
655. Собственные ядра спинного мозга находятся в:
656. Двигательные нейроны спинного мозга находятся в:
657. Опухолью повреждены пирамиды продолговатого мозга в котором из путей больного нарушится проведение нервных импульсов?
658. Добавочный нерв выходит из черепа вместе с:
659. Парасимпатические волокна входят в состав следующих черепных нервов:
660. Все названные ниже образования не проходят через верхнюю глазничную щель за исключением:
661. Через какое отверстие черепа проходит верхнечелюстной нерв?
662. Через какое отверстие черепа проходит nervus mandibularis?
663. Где находятся преддверные ядра VIII пары черепных нервов?
664. Через какое анатомическое образование черепа проходит блуждающий нерв?
665. Через какое отверстие черепа проходит VIII пара черепных нервов?
666. Лицевой нерв выходит из полости черепа через:

667. Укажите уровень расположения ядра подъязычного нерва:
668. Назовите локализацию ядер добавочного нерва?
669. Обозначенные структуры являются ядрами языкоглоточного нерва за исключением:
670. К чувствительным черепным нервам относятся?
671. Какие нервы относятся к двигательным черепным нервам?
672. Все черепно-мозговые нервы имеют ядра в головном мозге, кроме:
673. Какие черепные нервы имеют парасимпатические волокна?
674. Где располагаются ядра III и IV пар черепных нервов?
675. Где располагаются ядра VI пары черепных нервов?
676. Где располагаются ядра VII пары черепных нервов?
677. Какое ядро локализуется в ретикулярной формации продолговатого мозга между нижним оливным и двойным ядром?
678. Какое ядро располагается в ретикулярной формации, в латеральных отделах нижней половины ромбовидной ямки:
679. Корешки какого черепного нерва отходят от головного мозга из sulcus lateralis posterior вместе с X-XI парами черепных нервов?
680. Корешки какого черепного нерва отходят от головного мозга от дорсолатеральной борозды продолговатого мозга?

681. Корешки какого черепного нерва выходят из головного мозга с задней латеральной борозды продолговатого мозга вместе с IX-X парами и в борозде располагаются ниже относительно X пары?
682. Корешки какого черепного нерва отходят от продолговатого мозга между пирамидой и оливой?
683. Какое название имеет VII пара черепных нервов?
684. Какое название имеет IX пара черепных нервов?
685. Какое название имеет X пара черепных нервов?
686. Какое название имеет XI пара черепных нервов?
687. Какое название имеет XII пара черепных нервов?
688. Какое название имеет VIII пара черепных нервов?
689. Какое название имеет VI пара черепных нервов?
690. Какое название имеет V пара черепных нервов?
691. Откуда получает секреторную иннервацию поднижнечелюстная слюнная железа?
692. Какой нерв обеспечивает чувствительную иннервацию поднижнечелюстной слюнной железы?
693. Какое количество узлов имеет шейный отдел симпатического ствола и как они называются?
694. Укажите образования, от которых начинаются общие сонные артерии

- 695. На каком уровне происходит деление общей сонной артерии на внутреннюю и наружную сонные артерии?**
- 696. Назовите топографическое образование, в котором проходит язычная артерия.**
- 697. Назовите ветви, через которые анастомозируют наружная и внутренняя сонные артерии.**
- 698. Назовите артерию, кровоснабжающую зубы нижней челюсти.**
- 699. Назовите ветви, через которые анастомозируют наружная и внутренняя сонные артерии.**
- 700. Назовите ветви внутренней сонной артерии, отходящие в сонном канале височной кости**
- 701. Назовите топографическое образование, в котором проходит язычная вена.**
- 702. Каким по функции является диафрагмальный нерв?**
- 703. Как называется смешанный нерв шейного сплетения?**
- 704. Продолжением каких синусов является внутренняя яремная вена?**
- 705. Какие вены формируют яремную венозную дугу?**
- 706. Где расположено тело второго нейрона зрительного пути?**
- 707. Где расположено тело третьего нейрона зрительного пути?**
- 708. Задняя соединительная артерия отходит от:**
- 709. Передняя артерия сосудистого сплетения отходит от:**

**710. Какая из нижеперечисленных артерий не ответвляется от внутренней сонной артерии ?**

**711. Какая из нижеперечисленных артерий не ответвляется от внутренней сонной артерии ?**

**712. Какая из нижеперечисленных артерий не ответвляется от внутренней сонной артерии ?**

**713. Какая из нижеперечисленных артерий не ответвляется от подключичной артерии ?**

**714. Позвоночная артерия входит у полость черепа через:**

**715. Глазничный нерв выходит из полости черепа через:**

**716. Верхнечелюстной нерв выходит из полости черепа через:**

**717. Нижнечелюстной нерв выходит из полости черепа через:**

**718. Глазная артерия входит в орбиту через:**

**719. Нижняя щитовидная артерия есть ветвью одной из нижеперечисленных артерий:**

**720. Восходящая шейная артерия есть ветвью одной из нижеперечисленных артерий:**

**721. Правый лимфатический проток собирает лимфу из всех нижеприведенных органов, за исключением:**

**722. Корешки какого черепного нерва отходят от головного мозга от дорсо-латеральной борозды продолговатого мозга?**

- 723. Корешки какого черепного нерва выходят из головного мозга с задней латеральной борозды продолговатого мозга вместе с IX и X парами и в борозде располагаются ниже относительно X пары?**
- 724. Корешки какого черепного нерва отходят от продолговатого мозга между пирамидой и оливой?**
- 725. Какое название имеет VII пара черепных нервов?**
- 726. Какое название имеет IX пара черепных нервов?**
- 727. Какое название имеет X пара черепных нервов?**
- 728. Какое название имеет XI пара черепных нервов?**
- 729. Какое название имеет XII пара черепных нервов?**
- 730. Какое название имеет VIII пара черепных нервов?**
- 731. Какое название имеет VI пара черепных нервов?**
- 732. Какое название имеет V пара черепных нервов?**
- 733. Добавочный нерв выходит из черепа вместе с:**
- 734. Парасимпатические волокна входят в состав следующих черепных нервов:**
- 735. Лицевой нерв имеет ядро:**
- 736. Лицевой нерв проходит через:**
- 737. Нерв барабанная струна проходит через:**
- 738. VII пара, лицевой нерв имеет ядро:**

739. Все названные ниже образования не проходят через верхнюю глазничную щель за исключением:
740. Через какое отверстие черепа проходит верхнечелюстной нерв?
741. Через какое отверстие черепа проходит нижнечелюстной нерв?
742. Где находятся преддверные ядра VIII пары черепных нервов ?
743. Через какое анатомическое образование черепа проходит блуждающий нерв?
744. Через какое отверстие черепа проходит VIII пара черепных нервов?
745. Лицевой нерв выходит из полости черепа через:
746. Для V пары черепных нервов - тройничного нерва характерно:
747. Назовите локализацию ядер добавочного нерва?
748. Обозначенные структуры являются ядрами языкоглоточного нерва за исключением:
749. К чувствительным черепным нервам относятся?
750. Какие нервы относятся к двигательным черепным нервам?
751. Все черепно-мозговые нервы имеют ядра в головном мозге, кроме:
752. Какие черепные нервы имеют парасимпатические волокна?
753. Где располагаются ядра III и IV пар черепных нервов?
754. Где располагаются ядра VI пары черепных нервов?

**755. Где располагаются ядра VII пары черепных нервов?**

**756. Где располагаются ядра IX пары черепных нервов?**

**757. Собственно лицевой нерв имеет следующие волокна:**

**758. Сколько ядер имеет языкоглоточный нерв?**

**759. Какое ядро локализуется в ретикулярной формации продолговатого мозга между нижним оливным и двойным ядром?**

**760. Какое ядро располагается в ретикулярной формации, в латеральных отделах нижней половины ромбовидной ямки:**

**761. Блуждающий нерв выходит из полости черепа вместе с:**

**762. Для X пары черепных нервов характерно:**

**763. Грудной проток собирает лимфу из всех нижеперечисленных органов, за исключением:**

**764. Для X пары черепных нервов характерно:**

**765. Все нижеперечисленные артерии есть ветви наружной сонной артерии, за исключением:**

**766. Грудной проток собирает лимфу из всех нижеприведенных органов, за исключением:**

**767. Правый лимфатический проток собирает лимфу из всех нижеперечисленных органов, за исключением:**

**768. Для X пары черепных нервов характерно:**

**769. Правый лимфатический проток собирает лимфу из всех нижеприведенных органов, за исключением:**

**770. Правый лимфатический проток собирает лимфу из всех нижеприведенных органов, за исключением:**

**771. Какой нерв иннервирует подбородочно-подъязычную мышцу?**

**772. Грудной проток собирает лимфу из всех нижеперечисленных органов, за исключением:**

**773. Каким нервом иннервируется грудино-подъязычная мышца?**

**774. Для X пары черепных нервов характерно:**

**775. Каким нервом иннервируется грудино-щитовидная мышца?**

**776. Каким нервом иннервируется щитоподъязычная мышца?**

**777. В который из перечисленных синусов впадает большая вена мозга?**

**778. Каким нервом иннервируется передняя лестничная мышца?**

**779. Для X пар черепных нервов характерно:**

**780. Для X пар черепных нервов характерно:**

**781. Каким нервом иннервируется длинная мышца шеи?**

**782. Какой нерв иннервирует подбородочно-подъязычную мышцу?**

**783. Каким нервом иннервируется длинная мышца головы?**

**784. Какая мышца иннервируется блуждающим нервом?**

785. Каким нервом иннервируется латеральная прямая мышца головы?
786. Какая мышца иннервируется шейным сплетением?
787. Что иннервирует диафрагмальный нерв в грудной полости?
788. Какую мышцу иннервирует шейная петля?
789. Где располагается шейная петля.
790. Какую мышцу иннервирует шейная петля?
791. Каким нервом иннервируется щито-подъязычная мышца?
792. Грудной проток собирает лимфу из всех нижченазванных органов, за исключением:
793. Грудной проток собирает лимфу из всех нижченазванных органов, за исключением:
794. Какая мышца иннервируется мышечными ветвями шейного сплетения?
795. Правый лимфатический проток собирает лимфу из всех ниженазванных органов, за исключением:
796. Какую мышцу иннервирует шейная петля?
797. Какая мышца иннервируется мышечными ветвями шейного сплетения?
798. Что иннервируется надключичным нервом?
799. Что иннервирует большой ушной нерв?
800. Какая мышца иннервируется мышечными ветвями шейного сплетения?

- 801. Где на шее локализуются кожные ветви шейного сплетения?**
- 802. Что иннервирует малый затылочный нерв?**
- 803. Какая мышца иннервируется мышечными ветвями шейного сплетения?**
- 804. Какая мышца иннервируется мышечными ветвями шейного сплетения?**
- 805. Какая мышца иннервируется мышечными ветвями шейного сплетения?**
- 806. Какие волокна содержат нервы шейного сплетения?**
- 807. Какую мышцу иннервирует шейная петля?**
- 808. Чем спереди прикрыто шейное сплетение?**
- 809. Какая мышца иннервируется мышечными ветвями шейного сплетения?**
- 810. Иннервация гортани осуществляется ветвями:**
- 811. Какое из этих ядер относится к блуждающему нерву?**
- 812. Какая мышца иннервируется мышечными ветвями шейного сплетения?**
- 813. Какая мышца иннервируется блуждающим нервом?**
- 814. Блуждающий нерв выходит из черепа через следующее отверстие:**
- 815. Какие а нижеуказанных нервов иннервируют мышцы, которые лежат ниже подъязычной кости?**
- 816. Какая мышца иннервируется блуждающим нервом?**
- 817. Все нижеименованные артерии являются ветвями наружной сонной артерии за исключением:**

- 818. Назовите анатомические структуры, которые кровоснабжает поверхностная височная артерия.**
- 819. Какая мышца иннервируется блуждающим нервом?**
- 820. Назовите ветви крыловидно-небного отдела верхнечелюстной артерии.**
- 821. Какие из нижеперечисленных узлов расположены на уровне середины персневидного хряща гортани?**
- 822. Какой нерв иннервирует нижнее брюшко лопаточно-подъязычной мышцы?**
- 823. Иннервация гортани осуществляется ветвями:**
- 824. Где выходят на основу мозга V пара черепных нервов:**
- 825. Какое из нижеперечисленных ядер относится к блуждающему нерву?**
- 826. Все мышцы глотки иннервируются от блуждающего нерва, за исключением**
- 827. Нерв барабанная струна выходит из полости черепа через:**
- 828. Вкусовая и общая чувствительность части корня языка, иннервация мышц гортани осуществляется через:**
- 829. Где выходят на основу мозга корешки VIII пары черепных нервов:**
- 830. Где выходят на основу мозга корешки VII пары черепных нервов:**
- 831. Где выходят на основу мозга корешки V пары черепных нервов:**
- 832. Где локализуются ядра VIII пары черепных нервов?**

- 833. Какие структуры сегментарного уровня составляют парасимпатический отдел вегетативной нервной системы?**
- 834. Какую функцию обеспечивает парасимпатическая иннервация глаза ?**
- 835. Укажите уровень размещения ядра подъязычного нерва:**
- 836. Назовите локализацию ядер добавочного нерва.**
- 837. Все названы ниже ядра являются ядрами языкогортанного нерва за исключением :**
- 838. Лицевой нерв имеет следующее ядро:**
- 839. VII пара, лицевой нерв имеют следующее ядро:**
- 840. Сколько ядер имеет лицевой нерв?**
- 841. Собственно лицевой нерв имеет следующее ядро:**
- 842. Какие симптомы наблюдаются при раздражении симпатических волокон, которые иннервируют глазное яблоко?**
- 843. Какое из ниженазванных ядер относится к блуждающему нерву?**
- 844. Блоковым нервом иннервируется:**
- 845. Парасимпатические волокна входят в состав следующих нервов:**
- 846. Парасимпатическая часть вегетативной нервной системы имеет связь с мозгом через все из нижеперечисленных нервов, за исключением:**
- 847. Какие симптомы наблюдаются при раздражении парасимпатических волокон, которые иннервируют глазное яблоко?**

848. Какую функцию обеспечивает парасимпатическая иннервация глаза ?
849. Какие симптомы наблюдаются при раздражении парасимпатических ядер III пар черепных нервов, которые иннервируют глазное яблоко?
850. Раздражение двигательных ядер III пар черепных нервов, которые иннервируют глазное яблоко будет сопровождаться:
851. Где заложены сомато-двигательные ядра глазодвигательного нерва?
852. Где локализуются парасимпатические ядра глазодвигательного нерва?
853. Где локализуются ядра блокового нерва?
854. Ядра лицевого нерва локализуются в:
855. Промежуточному нерву принадлежит ядро:
856. Парасимпатические волокна глазодвигательного нерва перерываются в:
857. Сколько ядер имеет языкоглоточный нерв?
858. Какие черепные нервы содержат парасимпатические ядра:
859. Где содержатся ядра III и IV пар черепных нервов:
860. Какая мышца глаза иннервируется блоковым нервом?
861. Промежуточному нерву принадлежит ядро:
862. Каким нервом иннервируется грудино-ключично-сосцевидная мышца?
863. Для V пары черепных нервов - тройничного нерва характерно:
864. Какой черепной нерв иннервирует собственно жевательную мышцу?

865. Каким черепным нервом иннервируется трапецевидная мышца?
866. Какой черепно-мозговой нерв иннервирует надчерепную мышцу?
867. Двигательные волокна языкоглоточного нерва формируют ветви, которые иннервируют:
868. Разрыв IV пары черепных нервов возле верхней орбитальной щели будет сопровождаться:
869. Корешки какого черепно-мозгового нерва отходят от головного мозга из переднелатеральной борозды продолговатого мозга?
870. Двигательные волокна языкоглоточного нерва формируют ветви, которые иннервируют:
871. Где локализуются ядра VI пары черепных нервов:
872. Где локализуются ядра VII пары черепных нервов:
873. Для V пары черепных нервов - тройничного нерва характерно:
874. Где локализуются ядра IX пары черепных нервов:
875. Для V пары черепных нервов характерно:
876. Для V пары черепных нервов - тройничного нерва характерно:
877. Для XI пары черепных нервов характерно:
878. Для XI пары черепных нервов характерно:
879. Для XII пары черепных нервов характерно:
880. Укажите уровень размещения ядра подъязычного нерва:

881. Назвать локализацию ядер добавочного нерва.
882. Какая мышца глаза иннервируется отводящим нервом?
883. Нерв барабанная струна, как составная часть лицевого нерва образована преганглионарными парасимпатическими волокнами, которые идут от:
884. Нижнечелюстной нерв для жевательных мышц является:
885. Нерв барабанная струна проходит через:
886. Зубы нижней челюсти иннервирует:
887. Кожу подбородка иннервируют:
888. Переднее брюшко двубрюшной мышцы иннервирует нерв:
889. Какой нерв отходит от нижнего альвеолярного нерва у места вхождения его в нижнечелюстной канал?
890. VII пара, лицевой нерв имеет:
891. Корешки какого черепного нерва отходят от головного мозга между средней мозжечковой ножкой и оливой?
892. Промежуточный нерв содержит следующие волокна:
893. В лицевом канале от лицевого нерва отходит следующая ветвь:
894. В лицевом канале от лицевого нерва отходит следующая ветвь:
895. Большой каменистый нерв выходит на переднюю поверхность пирамиды височной кости через:

**896. Большой каменистый нерв, пройдя по одноименной борозде, а затем через рваное отверстие входит в:**

**897. Большой каменистый нерв, пройдя через крыловидный канал, входит в:**

**898. Нерв барабанная струна в барабанной полости:**

**899. Какой с названных ниже нервов или сосудов не проходит в полости пещеристого синуса?**

**900. Какая мышца глаза иннервируется отводящим нервом?**

**901. Какая мышца глаза иннервируется блоковым нервом?**

**902. Какие структуры сегментарного уровня составляют парасимпатический отдел вегетативной нервной системы?**

**903. Через какое отверстие черепа проходит верхнечелюстной нерв?**

**904. Верхнечелюстной нерв является:**

**905. Скуловой нерв иннервирует:**

**906. Нижнечелюстной нерв является:**

**907. Язычные ветви входят в язык снизу, проходят через его толщу вверх и иннервируют:**

**908. Парасимпатические волокна какого нерва переключаются в крыловиднонебном узле?**

**909. Через какое отверстие нерв барабанная струна выходит из барабанной полости?**

- 910. Обозначенные структуры являются ядрами языкоглоточного нерва за исключением:**
- 911. Какой нерв иннервирует заднюю треть слизистой оболочки языка?**
- 912. Какие из перечисленных утверждений верны?**
- 913. Укажите мышцы, которые иннервирует добавочный нерв:**
- 914. Укажите анатомические структуры, которые иннервирует подъязычный нерв:**
- 915. Для XII пары черепных нервов характерно:**
- 916. Какой нерв иннервирует зубы верхней челюсти?**
- 917. Большой каменистый нерв выходит из полости черепа через:**
- 918. Стременной нерв:**
- 919. Стременной нерв иннервирует:**
- 920. Двубрюшный нерв, как ветвь собственно лицевого нерва, иннервирует:**
- 921. Околоушное сплетение делится на ветви («Большая гусинная лапка»):**
- 922. Околоушное сплетение делится на ветви («Большая гусинная лапка»):**
- 923. Чувствительные узлы языкоглоточного нерва локализуются:**
- 924. Двигательные волокна языкоглоточного нерва образуют ветви, которые иннервируют:**
- 925. Разрыв III пары черепных нервов возле верхней орбитальной щели будет сопровождаться:**

**926. Барабанный нерв образуют:**

**927. Барабанный нерв проходит:**

**928. Барабанный каналец, в котором проходит барабанный нерв начинается в:**

**929. Барабанный нерв в барабанной полости:**

**930. Барабанный нерв к слуховой трубе:**

**931. Парасимпатические волокна малого каменистого нерва подходят к:**

**932. Парасимпатические волокна большого каменистого нерва подходят к:**

**933. Парасимпатические волокна барабанной струны подходят к:**

**934. Какой нерв иннервирует надчерепную мышцу?**

**935. Назовите черепной нерв, который иннервирует мышцу гордецов?**

**936. Какой черепной нерв иннервирует круговую мышцу глаза?**

**937. Какой черепной нерв иннервирует мышцу, сморщивающую бровь:**

**938. Какой черепной нерв иннервирует носовую мышцу?**

**939. Какой черепной нерв иннервирует медиальную крыловидную мышцу?**

**940. Какой черепной нерв иннервирует латеральную крыловидную мышцу?**

**941. Какую мышцу иннервирует тройничный нерв?**

**942. Какой черепной нерв иннервирует двубрюшную мышцу (переднее брюшко)?**

943. Какую мышцу иннервирует тройничный нерв?
944. Какой черепной нерв иннервирует челюстно-подъязычную мышцу?
945. Какую мышцу иннервирует тройничный нерв?
946. Какой нерв иннервирует подбородочно-подъязычную мышцу?
947. Какую мышцу иннервирует шейная петля?
948. Какую мышцу иннервирует тройничный нерв?
949. Какую мышцу иннервирует лицевой нерв?
950. Какая мышца иннервируется шейным сплетением?
951. Какую мышцу иннервирует шейная петля?
952. Какая мышца иннервируется блуждающим нервом?
953. Какую мышцу иннервирует шейная петля?
954. Какую мышцу иннервирует шейная петля?
955. Какой нерв иннервирует верхнее брюшко лопаточно-подъязычной мышцы?
956. Ветвь какого черепного нерва повреждена при потере общей чувствительности передних двух третей слизистой оболочки языка?
957. Функция какой пары черепных нервов нарушена при потере чувствительности в области задней трети слизистой оболочки языка?
958. Ядра какой пары черепных нервов повреждены при одностороннем птозе, нарушении аккомодации, расширенных зрачках.

**959. Малый и большой каменистые нервы осуществляют парасимпатическую иннервацию желез в каждом из нижеперечисленных участков за исключением:**

**960. Какой из нижеперечисленных нервов осуществляет иннервацию задней трети слизистой оболочки языка?**

**961. Повреждение тройничного нерва вызывает:**

**962. Общая чувствительность от передних 2/3 слизистой оболочки языка передается через:**

**963. Вкусовая иннервация надгортанника и корня языка осуществляется через:**

**964. Чувство температуры и боли из области головы передается к мозгу:**

**965. Все из нижеперечисленных нервов есть кожными ветвями верхнечелюстного нерва, за исключением:**

**966. Большинство нервов на лице есть ветвями:**

**967. Все мышцы глотки иннервируются от блуждающего нерва, за исключением**

**968. Повреждение парасимпатического крыловиднонебного узла проявляется потерей:**

**969. Нижняя ветвь глазодвигательного нерва иннервирует:**

**970. Блоковой нерв иннервирует:**

**971. Верхнечелюстной нерв иннервирует:**

**972. Двигательные ветви лицевого нерва иннервируют:**

- 973. Для поврежденного корешка добавочного нерва типичным есть:**
- 974. Повреждения парасимпатического поднижнечелюстного узла проявляется потерей:**
- 975. Болевое раздражение с кончика языка переходит на нейроны следующего узла:**
- 976. Какие из нижеперечисленных нервов имеют парасимпатические волокна, что подходят к ресничному узлу?**
- 977. Парасимпатические волокна входят в состав следующих нервов.**
- 978. Какие из нижеперечисленных нервов имеют парасимпатические волокна, что подходят к ушному узлу?**
- 979. Парасимпатическая часть вегетативной нервной системы имеет связи с мозгом через все из нижеперечисленных нервов, за исключением:**
- 980. Нарушение функции ушного парасимпатического узла сопровождается потерей:**
- 981. Повреждения парасимпатического поднижнечелюстного узла проявляется потерей:**
- 982. Повреждения парасимпатического крыловиднонебного узла проявляется потерей:**
- 983. Парасимпатическая часть вегетативной нервной системы имеет связи с мозгом через все из нижеперечисленных нервов, за исключением:**
- 984. Повреждения парасимпатического крыловидно-небного узла проявляется потерей:**

**985. Повреждения ресничного узла проявляется потерей:**

**986. Повреждения ресничного узла проявляется потерей:**

**987. Парасимпатическая часть вегетативной нервной системы имеет связи с мозгом через все из нижеперечисленных нервов, за исключением:**

**988. Какие из нижеперечисленных узлов расположены кпереди от поперечного отростка VI шейного позвонка ?**

**989. Какие из нижеперечисленных узлов расположены в поднижнечелюстном треугольнике?**

**990. Какая из нижеперечисленных артерий не ответвляется от подключичной артерии ?**

**991. Грудной проток собирает лимфу из всех нижеприведенных органов, за исключением:**

**992. Все нижеперечисленные анатомические структуры не проходят через верхнюю орбитальную щель за исключением:**

**993. Все нижеперечисленные анатомические структуры не проходят через верхнюю орбитальную щель за исключением:**

**994. =Отводящего нерва;**

**995. Какие из перечисленных утверждений верны:**

**996. В составе скулового нерва проходят:**

**997. Скуловой нерв является:**

**998. Щечный нерв является:**

- 999. Какая из нижеперечисленных артерий не ответвляется от подключичной артерии ?**
- 1000. Средняя менингеальная артерия проходит в полость черепа через:**
- 1001. Надлопаточная артерия есть ветвью одной из нижеперечисленных артерий:**
- 1002. Поверхностная шейная артерия есть ветвью одной из нижеперечисленных артерий:**
- 1003. Все нижеперечисленные артерии есть ветви наружной сонной артерии, за исключением:**
- 1004. К чему можно прижать общую сонную артерию для остановки кровотечения?**
- 1005. Какие образования мозга кровоснабжает передняя мозговая артерия?**
- 1006. Какая ветвь внутренней сонной артерии образует анастомоз с ветвями позвоночной артерии?**
- 1007. Какие структуры нервной системы относятся к периферическому отделу симпатической нервной системы?**
- 1008. Какие волокна содержит блуждающий нерв?**
- 1009. Какие нервы проходят через внутренний слуховой проход?**
- 1010. Каким по функции является обонятельный нерв?**
- 1011. Через какие отверстия волокна обонятельного нерва входят в полость черепа?**

1012. Где расположены обонятельные рецепторы?
1013. Где расположен первый нейрон обонятельного анализатора?
1014. Что относится к центральной части обонятельного мозга?
1015. Где в центральной нервной системе находятся ядра зрительного нерва?
1016. Каким по функции является глазодвигательный нерв?
1017. Укажите место выхода глазодвигательного нерва из мозга.
1018. Какие ветви образует глазодвигательный нерв при входе в глазницу?
1019. Что иннервирует верхняя ветвь глазодвигательного нерва?
1020. Что иннервирует нижняя ветвь глазодвигательного нерва?
1021. Какие волокна идут в составе глазодвигательного нерва?
1022. Где находятся тела четвертых нейронов зрительного пути?
1023. Каким нервом по функции является блоковый нерв?
1024. Где выходит из головного мозга блоковый нерв?
1025. Каким по функции является отводящий нерв?
1026. От каких участков сетчатки проходят импульсы в зрительном тракте?
1027. Сколько двигательных ядер имеет тройничный нерв?
1028. Сколько чувствительных ядер имеет тройничный нерв?
1029. Укажите локализацию двигательного ядра тройничного нерва.

1030. Какие по функции являются ядра тройничного нерва?
1031. Что иннервируют двигательные волокна тройничного нерва?
1032. Что иннервируют двигательные волокна тройничного нерва?
1033. Как называется первая ветвь тройничного нерва?
1034. Как называется третья ветвь тройничного нерва?
1035. Какой нерв проходит через овальное отверстие черепа?
1036. Какой нерв проходит через круглое отверстие черепа?
1037. Что иннервирует слезный нерв?
1038. Какие нервы являются преганглионарными волокнами ресничного узла?
1039. Какие чувствительные ветви отдает нижнечелюстной нерв?
1040. Что иннервирует ушно-височный нерв нижнечелюстного нерва?
1041. Волокна какого нерва являются преганглионарными к крылонебному узлу?
1042. Какую иннервацию обеспечивают постганглионарные волокна, которые отходят от крыловидно-небного узла?
1043. Что иннервируют постганглионарные нервные волокна, которые отходят от крыловидно-небного узла?
1044. Повреждение какого ядра ствола мозга приведёт к нарушению функции поднижнечелюстной и подъязычной слюнных желез?
1045. Какой нерв иннервирует нижнюю косую мышцу глаза?

**1046. Каким по функции является зрительный нерв?**

**1047. Сегментом спинного мозга является:**

**1048. К мозговому стволу относят следующие отделы головного мозга:**

**1049. В военкомате у мальчика 19 лет было обнаружено опущение почки. На уровне каких позвонков расположены почки ?**

**1050. . Во время тяжелых родов состоялся разрыв лобкового симфиза. Какой орган может быть достоверно травмирован ?**

**1051. При обследованные мужчины 70 лет обнаружена опухоль правой почки. Какой орган расположен над почкой?**

**1052. При операции на почках хирургу нужно выделить ножку почки. Что выходит из почечных ворот?**

**1053. При операции на почках хирургу нужно выделить ножку почки. Что входит в почечные ворота?**

**1054. При рентгенологическом исследовании у пациента обнаружено, что правая почка расположена на уровне IV-V поясничных позвонков. Является ли нормальной такая скелетотопия почки?**

**1055. В состав семенного канатика входит все, кроме:**

**1056. Во время оперативного вмешательства на органах брюшной полости хирург обнаружил кишку, которая имеет жировые подвески, ленты и выпячивания. Какой это отдел кишки?**

**1057. В каком отделе нефрона производится первичная моча?**

**1058. При введении уретрального катетера уролог должен помнить, что более узкой всего частью мужской мочи является:**

**1059. При введении эндоскопа с целью бронхоскопии врач должен помнить, что бифуркация трахеи находится на уровне:**

**1060. Через какие анатомические образования гной может распространяться на бедро из клетчатого пространства, которое размещено впереди мочевого пузыря?**

**1061. Ребенок проглотил острую маленькую пластинку и она попала до гортани. Ларингоскопически было определено, что пластинка порезала участок рядом с рожкообразным хрящом, это:**

**1062. Во время тщательного исследования легких больной 45 лет установлен, что абсцесс находится на нижней поверхности частицы и эта поверхность обращена к fissura horizontalis. Это частица:**

**1063. У ребенка 4 месяцев в lig. umbilicale medianum обнаружена полость с жидкостью в месте отхождения этой связки от участка мочевого пузыря, который есть его:**

**1064. У женщины 60 лет во время операции установлено, что фибромиома матки растет между листками широкой связки сбоку возле дна матки, то есть она лежит в:**

**1065. У мужчины 60 лет при обследовании обнаружено, что закрыто левое отверстие протока, которое открывается на семенном бугорке, это ductus:**

**1066. У больного затронута моторная функция языка. С патологией какого нерва это связано?**

**1067. Больной 30 лет, с воспалением пульпы зуба, обратился к врачу с жалобами на головные боли и слизевые выделения из носа. После осмотра ему установили диагноз - пульпит, усложненный синуситом. К какой из параназальных пазух, попала инфекция от корня зуба?**

**1068. Больной 35 лет, обратился к приемному покою с жалобами на насморк и головную боль в течение 5 дней. После обследования ему установили диагноз - гайморит (воспаление верхнечелюстной пазухи). Сквозь какой носовой ход инфекция попала к этой пазухе?**

**1069. Больной 18 лет, обратился в больницу с жалобами на шум и болевые ощущения в ухе. Объективно - у больного острое респираторное заболевание, ринит. Сквозь какое отверстие глотки инфекция попала в барабанную полость и вызывала ее воспаление?**

**1070. Больной госпитализирован с воспалением легких. При обследовании, врач установил, что нижняя граница правого легкого по среднеключичной линии находится на уровне VIII ребра. На каком уровне, в норме, расположен нижний край правого легкого по среднеключичной линии?**

**1071. Больного 50 лет, госпитализировано по поводу почечной колики. После обследования ему установили диагноз - камни в почечной лоханке. На уровне какого поясничного позвонка проектируется лоханка почки?**

**1072. Больного 65 лет, прооперировано по поводу опухоли мочеточника. Во время операции обнаружено, что опухоль проросла к брыжейке тонкой кишки. Какой отдел мочеточника поражен опухолью?**

**1073. У больного 43 лет после перенесенного воспаления брюшины наблюдается воспаление одной из оболочек яичка. Какая из оболочек яичка наиболее достоверно воспалена?**

**1074. При обследовании у больного 42 лет обнаружено воспаление в участке синуса придатка яичка. Какая из оболочек яичка достоверно повреждена?**

**1075. При обследовании больного 32 лет обнаружена опухоль предстательной железы, которая локализована между обоими семявыбрасывающими протоками. Какая частица предстательной железы поражена?**

**1076. В результате ранения у пострадавшей обнаружено повреждение передней части матки. Положение матки anteversio. Какая часть матки повреждена?**

**1077. У больной 23 лет в результате небрежного проведения манипуляции возникло повреждение в участке наиболее глубокого отдела свода влагалища. Какой это отдел?**

**1078. У женщины 68 лет обнаружена опухоль влагалища диаметром 1 см, которая находится в участке excavatio rectouterina. В какой части влагалища она расположена?**

**1079. У больного 53 лет после ранения в участке промежности отмечается произвольное мочеотделение. Какая мышца повреждена?**

**1080. У больного 37 лет обнаружена водянка яичка. Между какими образованиями накапливается серозная жидкость в патологических случаях.**

**1081. . При осмотре полости рта стоматолог нашел кариозную полость на поверхности коронки второго малого коренного зуба, обращенного к первому моляру. Назовите пораженную поверхность коронки.**

**1082. Стоматолог при осмотре полости рта ребенка нашла короткую уздечку верхней губы. На какие зубы сделает негативные последствия эта аномалия развития?**

**1083. На каком органе брюшной полости возможно оперативное вмешательство без рассечения брюшины?**

- 1084. Хронический насморк осложнился воспалением лобовой пазухи. Через какой носовой ход попала инфекция к этому синусу?**
- 1085. При лабораторном исследовании в крови больного отмечено повышение уровня сахара. Какая из эндокринных желез поражена?**
- 1086. У больного аппендицитом червеобразный отросток расположен в ретроцекальном положении. С воспалением каких органов следует проводить дифференциальную диагностику?**
- 1087. Рентгенологически установлено скопление гноя в верхнечелюстной пазухе дело. В какой носовой ход выделяется гной?**
- 1088. Женщина поступила в гинекологическое отделение с подозрением на внематочную (трубную) беременность. Кровоизлияние при разрыве маточной трубы - в excavatio recto-uterina. Через какое из анатомических образований возможно сделать пункцию этого анатомического образования?**
- 1089. Рентгенологически установлено скопление гноя в верхнечелюстной пазухе справа. В какой носовой ход выделяется гной?**
- 1090. У больного воспалительный процесс в участке околоушной слюнной железы. Каким образом воспалительный процесс может проникнуть в криловидно-небную ямку?**
- 1091. У больного травма свода черепа. Какие синусы могут быть повреждены?**
- 1092. Больной поступил в Лор-отделение с диагнозом гайморит (воспаление верхнечелюстной пазухи). Каким образом инфекция могла проникнуть в гайморову пазуху?**
- 1093. У больного обнаружено воспаление нижнего язычкового сегмента. На какой синус плевры может распространиться воспалительный процесс?**

- 1094. При обследовании больного преклонных лет, был установлен сопутствующий диагноз “Блуждающая почка”. Изменения в каких структурах почки, наиболее достоверно, приводят к этому состоянию?**
- 1095. У больной пиелонефритом женщины 42 лет , при обследовании обнаружено нарушение действия форникального аппарата почек. В какой части почки в норме расположена эта структура?**
- 1096. При проведении артериографии (обследование состояния артериального русла почки), врач должен знать, что сегментарное строение почки определяется делением на ветви а.renalis. Сколько сегментарных ветвей окончательно образуется в одной почке?**
- 1097. При обследовании мочевого пузыря с помощью цистоскопии (осмотр слизистой оболочки), врач заметил участок, свободный от складок. Какое название он имеет?**
- 1098. На прием к врачу обратился больной с мочекаменной болезнью. При обследовании обнаружена обтурация камнями конечного отдела правого мочеточника. Какое название имеет этот отдел мочеточника?**
- 1099. . На прием к врачу обратилась мать мальчика 7 лет с жалобами на плотное образование сзади яичка и его придатка. Врач успокоил мать и объяснил, что это нормальное рудиментарное образование, связанное с развитием мужских половых органов, особенно хорошо развитое у детей.**
- 1100. Какоеназваниеэтогообразования?**
- 1101. При проведении цистоскопии, врач должен помнить, что мужская уретра с точки зрения подвижности, имеет фиксированную и подвижную части. Что образует границу между ними**
- 1102. . Женщина 32 годов, обратилась к гинекологу. Врач поставил диагноз: “Опущение матки после родов”. Какие связки укрепляют матку в норме?**

**1103. Больному мужчине 60 лет, после операции нужно вывести мочу катетером. В каком месте уретры возможно сделать прорыв при недостаточно умелой манипуляции (наиболее суженная в норме часть)?**

**1104. У больного фолликулярная ангина усложнилась острым отитом (воспалением среднего уха). Какие существуют анатомические предпосылки для этого?**

**1105. . При проведении аппендэктомии перед хирургом поставлено задание отыскать илеоцекальный угол. Внешними ориентирами для этого является**

**1106. . Рентгенологически установлено скопление гноя в верхнечелюстной пазухе справа. В какой носовой ход выделяется гной?**

**1107. К стоматологу обратился больной с воспалением ячейки второго верхнего коренного зуба. Какая часть зуба будет поражена в первую очередь?**

**1108. В стоматологическую поликлинику обратился больной с воспалением альвеолярного отростка верхней челюсти (остеомиелит). Какая ткань зуба может пострадать при этом заболевании в первую очередь?**

**1109. Женщине 58-ми лет проведено полное удаление матки с придатками, после чего выделение мочи прекратилось. При цистоскопии: пузырь мочи не содержит, из устьев мочеточников моча не поступает. Какой отдел мочевыделительной системы был поврежден при операции?**

**1110. У мужчины 52-х лет при поднятии избыточного веса возникло грыжевое выпячивание в подвздошном участке. Через какое анатомическое образование вероятнее всего возникло грыжевое выпячивание?**

**1111. Юноша 18-ти лет доставлен в больницу с признаками внутреннего кровотечения. Во время игры в футбол получил удар в участке левого подреберья. Повреждение которого из органов, которые проектируются в данный участок, может повлечь сильное кровотечение.**

**1112. Хирургу необходимо вскрыть у больного гнойник околоушной слюнной железы. Почему нельзя для этого применить вертикальные разрезы**

**1113. В травматологическое отделение доставлен мужчина с закрытой травмой живота справа и подозрением на разрыв печени. В котором из приведенных образований брюшины следует ожидать накопления крови**

**1114. Определение размеров печени позволило установить, что по правой срединноключичной линии верхняя ее граница находится на уровне IV межреберья, нижний ее край выступает из под реберной дуги на 4 см. Оцените размеры печени.**

**1115. В больницу доставлен раненый огнестрельным оружием с сильным кровотечением. При осмотре хирургом установлено, что пулевой канал прошел через переднюю стенку живота, свода желудка и вышел на уровне IX ребра по левой срединной подмышечной линии. Какой орган пострадал вместе с ранением желудка?**

**1116. При оперативном вмешательстве в брюшной полости хирургу необходимо проникнуть в сальниковую сумку. Как может проникнуть хирург в эту часть полости брюшины, не в нарушение целостности малого сальника?**

**1117. В больницу доставили больного с тяжелым химическим ожогом пищевода. Спустя некоторое время у больного появились симптомы воспаления брюшины. В какой части пищевода его стенка повреждена больше всего?**

**1118. У пациентки 45 лет - опухоль гладкой мышечной оболочки матки размером 5 см, которая влечет давление на мочевой пузырь, вызывая более частое мочеиспускание. Наиболее вероятная локализация опухоли:**

**1119. У больного после инсульта наблюдается отсутствие волевых движений мышц туловища справа. При обследовании обнаружено, что гематома находится слева в задней ножке внутренней капсулы рядом с коленом. Какой ведущий путь поврежден у больного?**

**1120. При обследовании у пострадавшего обнаружен правосторонний паралич нижней конечности. Какая часть центральной нервной системы повреждена в результате травмы?**

**1121. В результате патологического процесса нарушена функция центрального звена эфферентной части симпатического отдела вегетативной нервной системы. Указать, где возможна локализация патологического процесса в спинном мозге?**

**1122. При полиомиелите, наблюдается вялый паралич нижних конечностей, атрофия мышц. Где локализованы двигательные ядра, которые поражены патологией?**

**1123. В результате травмы поврежден 12 грудной позвонок. Какой сегмент спинного мозга расположен на уровне данного позвонка у больного?**

**1124. У больного потеряна мышечно-суставная чувствительность в нижних конечностях. Что поражено?**

**1125. В результате травмы поврежден первый грудной позвонок. Какой сегмент спинного мозга расположен на уровне этого позвонка у больного?**

**1126. Какие симптомы наблюдаются при раздражении симпатических волокон, которые иннервируют глазное яблоко?**

**1127. У больного фолликулярная ангина осложнилась острым отитом (воспалением среднего уха). Какие существуют анатомические предпосылки для этого?**

**1128. У мужчины 40 лет в результате удара по голове появились нарушение слуха и парез мимических мышц. Врач поставил ему диагноз - гематома мосто-мозжечкового угла. В мосто-мозжечковом угле от ствола головного мозга отходят:**

**1129. У больного воспаление среднего уха осложнилось мастоидитом. В дальнейшем возникла угроза гнойного тромбоза ближайшей венозной пазухи. Какой?**

**1130. При гнойном отите гной распространился в ячейки сосковидного отростка и дальше осложнился менингитом. В какую ямку черепа распространился гной из барабанной полости?**

**1131. У больного после простудного заболевания возникло нарушение слезовыделения. Какой вегетативный узел больше всего при этом пострадал?**

**1132. У больного 52 лет внезапно появилась асимметрия лица. Вся поражена половина лица недвижная, носогубная складка сглаженная, глазная щель расширена; глаз не закрывается, угол рта опущен. Поражением какого нерва вызван указанный синдром?**

**1133. Больному 60 лет трудно формировать и продвигать пищевой комок, нарушен процесс глотания еды. При этом язык неподвижен, речь стала невозможной. Причиной этого могло стать поражение:**

**1134. Больной не может на одной половине лица поднять бровь, полностью закрыть глаз, обнажить зубы. Какой нерв поражен?**

**1135. У больного наблюдается асимметрия лица, особенно при попытке выполнить активное сокращение мышц лица. О повреждении какого нерва должен думать врач?**

**1136. У женщины 25 лет после обезболивания под глазом появилась подкожная гематома. Ветвь какой артерии была травмирована при обезболивании?**

**1137. Ребенок 5 лет поступил в ЛОР-отделение клинической больницы с диагнозом: гнойное воспаление среднего уха (тимпанит). Заболевание началось с воспаления носоглотки. Через какой канал височной кости инфекция попала в барабанную полость?**

- 1138. Хирургу необходимо вскрыть у больного гнойник околоушной слюнной железы. Почему нельзя для этого применить вертикальные разрезы?**
- 1139. В какое образование черепа будет распространяться кровоизлияние, если разрушен венозный сосуд в области яремного отверстия?**
- 1140. Больной 82 лет жалуется на потерю вкусовой чувствительности. Всестороннее обследование установило корковую локализацию патологического процесса. Где именно?**
- 1141. У больного определяется выраженное нарушение восприятия запахов. Поражение какого отдела нервной системы лежит в основе этого нарушения?**
- 1142. У больного отмечается выраженное нарушение функции таламуса. Функциональная активность какого анализатора будет сохранена?**
- 1143. У больного обнаружено повреждение волокон IX пар черепно-мозговых нервов. Какой вид вкусовой чувствительности будет понижаться в этих условиях?**
- 1144. У больного обнаружено повреждение волокон VII пар черепно-мозговых нервов. Какой вид вкусовой чувствительности будет понижаться в этих условиях?**
- 1145. У больного в результате травмы нарушена иннервация жевательных мышц. Где может локализоваться поражение?**
- 1146. Какой из отделов мозга имеет наиболее характерное восходящее неспецифическое активирующее влияние на кору больших полушарий?**
- 1147. Пациенту нужно выполнить операцию удаления верхнего третьего большого коренного зуба. Какой нерв нужно обезболить для выполнения операции?**

**1148. В результате нейрохирургического вмешательства у животного возникло расширение зрачка и паралич аккомодации. Разрушение каких нервных центров было выполнено?**

**1149. У животного при подготовке демонстрационного эксперимента было проведено нейрохирургическое вмешательство, в результате которого кошка потеряла способность к аккомодации и конвергенции глаз. Какие нервные структуры были повреждены?**

**1150. Больная жалуется на боль в левой половине нижней челюсти и нижних зубов, что отдает в левый височный участок и наружный слуховой проход. Кроме этого у нее обнаружено болезненность при нажатии в точке проекции левого подбородочного отверстия. Поражение каких нервов является причиной этих симптомов?**

**1151. Пациент жалуется на нападения кратковременную боль в левой верхней челюсти и зубах, которая отдает в подглазничный участок. Объективно: отмечается болезненность при пальпации в области левого подглазничного отверстия. Поражение какого нерва имеет место?**

**1152. Больной жалуется, на боль в деснах и зубах верхней челюсти. О воспалении какого нерва идет речь?**

**1153. У больного с травмой головы хирург-стоматолог обнаружил, что тромб, который образовался в сигмовидной пазухе, достиг яремного отверстия и перешел на луковицу внутренней яремной вены. У больного наблюдается нарушение глотания, снижения частоты сердечных сокращений, судороги m. sternocleidomastoideus и m. trapezius, тяжелое дыхание. Хирург установил, что это вызвано раздражением черепных нервов, которые лежат рядом с луковицей внутренней яремной вены? Какие это пары черепных нервов?**

**1154. Мимические мышцы способствуют изменению выражения лица. Повреждение какого нерва может приводить к отсутствию мимики?**

- 1155. С целью дифференциальной диагностики менингита проводят исследование спинномозговой жидкости. В каком месте люмбальная пункция наиболее безопасна?**
- 1156. После перенесенного энцефалита у больного наблюдаются остаточные явления в виде пареза лицевого нерва слева. Нарушение иннервации каких мышц при этом может быть обнаружено?**
- 1157. Во время рентгеноскопического исследования органов грудной полости, у больного наблюдалась неподвижность перикарда справа. Какой нерв поврежден?**
- 1158. Какую артерию можно повредить при проведении проводниковой анестезии в участке отверстия нижней челюсти?**
- 1159. В результате травмы у больного разорвался отводящий нерв. Какой из перечисленных симптомов наблюдается?**
- 1160. Мимические мышцы способствуют изменению выражения лица. Повреждение какого нерва может вызывать отсутствие мимики?**
- 1161. Больная жалуется на боль в левой половине нижней челюсти и нижних зубов, что отдают в левый височный участок и наружный слуховой проход. Кроме этого у нее обнаружено болезненность при нажатии в точке проекции левого подбородочного отверстия. Поражение каких нервов является причиной этих симптомов?**
- 1162. Пациент жалуется на кратковременную боль в верхней челюсти и зубах слева, которые отдают в подглазничный участок. Объективно: отмечается боль при нажатии в области левого подглазничного отверстия. Какой нерв поражен?**
- 1163. В результате вывиха нижней челюсти у пациента нарушены вкусовая чувствительность передних 2/3 языка и слюноотделение. Травмой какого нерва это вызвано?**

**1164. Какие признаки характерны для серого вещества спинного мозга:**

**1165. Какие нейроны находятся в задних рогах спинного мозга:**

**1166. Какие нейроны находятся в передних рогах спинного мозга:**

**1167. Какие нейроны находятся в боковых рогах спинного мозга:**

**1168. После перенесенной черепно-мозговой травмы у больного отсутствует обоняние и ощущение вкуса. Какие корковые центры конечного мозга пострадали?**

**1169. Ребенок, 7 лет, часто болеет ОРЗ, у него сильно увеличена глоточная миндалина. Она закрывает глоточное отверстие (tuba auditiva), что приводит к снижению слуха у ребенка. На какой стенке барабанной полости открывается tuba auditiva?**

**1170. При осмотре пострадавшего в дорожном происшествии врач установил поражение наружной стенки глазницы. Пострадавший потерял возможность отведения глазного яблока на травмированной стороне. Какой нерв мог быть пораженным в данном случае?**

**1171. У пострадавшего есть травма мягких тканей и теменных костей в области стреловидного шва, которая сопровождается сильным кровотечением? Какое образование черепа повреждено?**

**1172. Больной 82 лет жалуется на потерю вкусовой чувствительности. Всестороннее обследование установило корковую локализацию патологического процесса. Где именно?**

**1173. Больной 15 лет жалуется на сильную боль в глазах, голове, расплывчатость букв после длительного чтения на близком расстоянии. Поражение какой мышцы глаза имеет место в данном случае?**

**1174. Гнойное поражение клиновидной пазухи и задних ячеек решетчатого лабиринта вызывали у больного 39 лет проблемы со зрением. Офтальмолог определил выпадение медиальных полей зрения. Какая часть зрительного анализатора повреждена?**

**1175. У больного 12 лет воспалительный процесс во внутреннем ухе вызывал выраженное поражение оболочек мозга. Врач допустил, что процесс распространился через соединение между субарахноидальным пространством головного мозга и предлимфатическим пространством внутреннего уха. Это состоялось через:**

**1176. У больного 69 лет при гнойной инфекции носовой полости возник абсцесс лобной частицы мозга. Врач установил, что наиболее достоверный путь распространения инфекции в переднюю черепную ямку из носовой полости был:**

**1177. У больного 67 лет при воспалении жирового тела глазницы возник тромбофлебит v. ophthalmicae, это привело к повреждению пещеристой пазухи. Через какое отверстие черепа v. ophthalmicae попадают в пещеристую пазуху**

**1178. У больного определяется выраженное нарушение восприятия запахов. Поражение какого отдела нервной системы лежит в основе этого нарушения?**

**1179. У больного отмечается выраженное нарушение функции со стороны таламуса. Функциональная активность какого анализатора сохранена**

**1180. У больного обнаружено повреждение волокон IX пар черепно-мозговых нервов. Какой вид вкусовой чувствительности будет сниженным в этих условиях?**

**1181. У больного обнаружено повреждение волокон VII пар черепно-мозговых нервов. Какой вид вкусовой чувствительности будет сниженным в этих условиях?**

**1182. Какой из отделов мозга имеет на коре больших полушарий наиболее характерное восходящее неспецифическое активирующее влияние?**

**1183. В больного отмечается понижение слуха на левое ухо. В каком образовании локализованы ядра пораженного нерва?**

**1184. После обследования больному поставлен диагноз: синдром паркинсонизма. Какие структуры головного мозга втянуты в патологический процесс?**

**1185. У больного, в результате длительного хронического заболевания головного мозга, возникли непроизвольные движения, нарушился тонус мышц туловища. На нарушение какого проводящего пути указывают эти симптомы?**

**1186. Больная Г., 41 год, попала в инфекционное отделение больницы с высокой температурой тела. Объективно выражены менингеальные симптомы. Установлено большое количество лейкоцитов в спинномозговой жидкости, которую получили в результате пункции. Пункция какого пространства была проведена?**

**1187. Больной П., 68 лет, попал в инфекционное отделение с менингеальными симптомами после укуса клеща. Для подтверждения диагноза была проведена спинномозговая пункция между III-IV поясничными позвонками. Какие анатомические образования пройдет игла для пункции до того, как появится liquor?**

**1188. Больная А, в 75 г., доставленная в офтальмологическое отделение больницы с жалобами на ухудшение зрения. При объективном исследовании установлено наличие опухоли мозга, расположенной в участке левого зрительного тракта. Какие нарушения зрения будут наблюдаться у больной?**

- 1189. У больной Г., в 62 г., в участке gyrus angularis образовалась гематома. После проведенного лечения больная не может читать и понимать написанное (алексия), но зрительная функция не нарушена. Ядро какого анализатора было повреждено?**
- 1190. У пациента в результате черепно-мозговой травмы снижена кожная чувствительность. Какой участок коры большого мозга может быть поражен?**
- 1191. У женщины обнаружено нарушение со стороны касательной чувствительности. Какой участок мозга поврежден?**
- 1192. Ребенок 5 лет поступил в ЛОР-отделение клинической больницы с диагнозом: гнойное воспаление среднего уха (тимпанит). Заболевание началось с воспаления носоглотки. Через какой канал височной кости инфекция попала в барабанную полость?**
- 1193. В больного поражен один из отделов мозга, который имеет на кору больших полушарий наиболее характерное восходящее неспецифическое активирующее влияние. Какой это отдел?**
- 1194. У больного воспаления среднего уха осложнилось мастоидитом. В дальнейшем возникла угроза гнойного тромбоза ближайшей венозной пазухи. Какой?**
- 1195. При гнойном отите гной распространился в ячейки сосковидного отростка и дальше осложнился менингитом. В какую ямку черепа распространился гной из барабанной полости?**
- 1196. Повреждение какого отдела проводящего пути зрительного анализатора приведет к отсутствию чувствительности к световым раздражителям медиальной половины сетчатки правого глаза и латеральной левого?**

**1197. Воспаление барабанной полости осложнилось воспалением твердой мозговой оболочки. Через какую стенку барабанной полости инфекция может попасть в полость черепа**

**1198. Какая из мышц глазного яблока укорочена при косоглазии, которое совпадает?**

**1199. У мужчины 40 лет в результате удара по голове появились нарушение слуха и парез мимических мышц. Врач поставил ему диагноз - гематома мосто-мозжечкового угла. В мосто-мозжечковом углу от ствола головного мозга отходят:**

**1200. Больной перенес тяжелое заболевание [грипп], после чего появились стойкие изменения базальной температуры тела. Наиболее достоверно это связано с:**

**1201. Обнаружена патология среднего уха. Какие структуры входят в состав среднего уха?**

**1202. Больной 25 лет планируется операция: резекция правой доли щитовидной железы. Какие артерии кровоснабжают щитовидную железу?**

**1203. Больному, 19 лет, планируется операция: удаление небных миндалин. Повреждение какой артерии, топографически связанной с небными миндалинами, может вызывать осложнение - артериальное кровотечение?**

**1204. В больницу после автокатастрофы поступил юноша 18 лет. В травматологическом отделении выявлены многочисленные травмы мягких тканей лица в области медиального угла глаза, которые сопровождались массивным кровотечением. Какой артериальный анастомоз формируется в этом регионе?**

**1205. В какую полость черепа будет распространяться кровоизлияние, если разрушен венозный сосуд в области яремного отверстия?**

**1206. В результате драки мужчина, 25 лет, получил ножевое ранение шеи с повреждением наружной сонной артерии. Для временной остановки кровотечения эффективным методом является пальцевое прижатие общей сонной артерии к поперечному отростку шестого шейного позвонка. В каком треугольнике шеи нужно осуществить пальцевое прижатие сонной артерии для остановки кровотечения?**

**1207. В связи с наличием злокачественной опухоли на языке, больному следует ее удалить. В каком месте легко найти язычную артерию и перевязать ее?**

**1208. Во время операции хирург производит срединный разрез поверхностных слоев шеи над рукояткой грудины. Ветви какого венозного анастомоза должен перевязать хирург для остановки кровотечения?**

**1209. Куда будет распространяться кровоизлияние, если разрушен венозный сосуд в области яремного отверстия?**

**1210. Мужчина 70 лет при бритье срезал гнойник в области сосцевидного отростка. Через 2 дня он был доставлен в больницу с диагнозом «воспаление оболочек головного мозга». Как инфекция проникла в полость черепа?**

**1211. Потерпевшему 37 лет была нанесена травма острым предметом в нижнюю область сонного треугольника шеи. Какой сосуд при этом был поврежден?**

**1212. Потерпевший доставлен в больницу с травмой подбородка значительным кровотечением в участке перелома. Повреждение какой артерии достовернее всего имело место?**

**1213. При проведении оперативного вмешательства на шее хирургу нужно выделить наружную сонную артерию. Что является анатомическим ориентиром для установления места начального отдела указанного сосуда в участке шеи?**

**1214. При проведении хирургического вмешательства в участке трепанационного треугольника по поводу гнойного мастоидита поврежден сосуд, что привело к образованию гематомы позади ушной раковины.**

**1215. У больного 40 лет в результате ножевого ранения шеи началось кровотечение из общей сонной артерии, которая проходит в сонном треугольнике в составе сосудисто-нервного пучка. Какие составляющие формируют этот пучок?**

**1216. У больного воспаление среднего уха осложнилось мастоидитом. После возникла угроза гнойного тромбоза ближайшей венозной пазухи. Какой?**

**1217. У больного воспаление среднего уха осложнилось мастоидитом. В дальнейшем возникла угроза гнойного тромбоза ближайшей венозной пазухи. Какой?**

**1218. У больного раком, на спинке языка возникло сильное кровотечение вследствие поражения опухолью дорсальной артерии языка. Какой сосуд перевязывает врач для остановки кровотечения?**

**1219. У больного раком, на спинке языка возникло сильное кровотечение вследствие поражения опухолью сосуда. Какого?**

**1220. У больного, 26 лет, выявлен большой фурункул мягких тканей лица возле корня носа и нижнего века. Опасным осложнением этого заболевания может быть распространение инфекции по венозным анастомозам этого региона к пазухам твердой мозговой оболочки. Какая из пазух вероятнее всего может воспалиться?**

**1221. У мужчины 40 лет с флегмоной лица гнойное воспаление и значительный отек мягких тканей стали причиной передавливания просвета лицевой вены и ретроградное (обратное) направление тока венозной крови. Инфицирование какой венозной пазухи возможно?**

**1222. У пострадавшего 23 лет ножевое ранение яремной венозной дуги. Определите место ранения.**

**1223. У потерпевшего в аварии наблюдается кровотечение из мягких тканей кпереди от угла нижней челюсти. Какой сосуд надо перевязать для остановки кровотечения?**

**1224. При операции на мягких тканях шеи с правой стороны нарушилась регулярная двигательная экскурсия правого свода диафрагмы. Это произошло в результате повреждения нерва.**

**1225. У ребенка М., 6 лет, гнойное воспаление среднего уха усложнилось гнойным воспалением ячеек сосцевидного отростка. Возникла необходимость трепанации (вскрытия) сосцевидного отростка. О близком расположении какого венозного синуса следует помнить хирургу, чтобы избежать его повреждения?**

**1226. У ребенка повреждена нижняя губа в области правого угла рта. Из раны тонкой струйкой изливается алая кровь. Ветви какой артерии повреждены при травме?**

**1227. У травмированного кровотечение из раны в области головы. В каком месте следует прижать сонную артерию для временной остановки кровотечения?**

**1228. Больной 60 лет при падении получил травму головы и был доставлен в больницу. При обследовании обнаружена подкожная гематома височного участка. Повреждение какого сосуда привело к появлению гематомы?**

**1229. Больной попал в клинику с ранением в области шеи. При обследовании обнаружен поврежденный нерв, расположенный кпереди от передней лестничной мышцы. Какой нерв поврежден?**

**1230. Больной, 24 лет, обратился к врачу с жалобой на боль под нижней челюстью справа, хирург стоматолог обнаружил камень в поднижнечелюстной железе. Удаляя его, он предотвращал кровотечение из артерии?**

**1231. Больной, 43 лет, обратился с жалобой на опухоль на корне языка. Хирург стоматолог обнаружил злокачественную опухоль. Планируя операцию, он решил перевязать артерию, которая проходит в треугольнике Пирогова. Это?**

**1232. Больному 67 лет для изготовления функционально полноценного протеза необходимо удалить левый верхний клык. После инфраорбитальной анестезии у больного появилась гематома в переднем участке лица, которая быстро увеличивалась. Было установлено, что травмирована артерия, которая является ветвью?**

**1233. В результате воспаления десен у больной 60 лет определяется отек, боль и кровотечение десен нижней челюсти с нарушением акта жевания. Какие сосуды при этом будут страдать?**

**1234. Во время операции резекции языка при макроглоссии хирург-стоматолог с гемостатической целью накладывает зажимы на корень языка. Какая артерия при этом пережимается?**

**1235. Во время операции удаления гемангиомы верхней губы в участке угла рта, какую артерию нужно пережимать помощнику хирурга?**

**1236. Врач-стоматолог, обезболивая (анестезируя) нижнечелюстной нерв в участке овального отверстия, случайно повредил артерию, которая проходит через остистое отверстие. Какая артерия была повреждена?**

**1237. Женщина 58 лет обратилась к врачу с жалобами на нарушение вкусовой чувствительности языка. При обследовании с помощью ЯМР у нее выявлено небольшое кровоизлияние в участке продолговатого мозга. Повреждения каких ядер продолговатого мозга могло вызвать нарушение вкуса у больной?**

**1238. К врачу обратился больной с жалобами на повышенную болевую чувствительность кожи ушной раковины и наружного слухового прохода. Какой нерв раздражается в данном случае?**

**1239. К врачу обратился пациент с жалобами на повышенную болевую чувствительность кожи позади ушной раковины и наружного слухового прохода. Объективно: пальпация позади грудинно-ключично-сосцевидной мышцы болезненная. Раздражение какого из нервов может дать такую клиническую картину?**

**1240. Какую артерию можно повредить при выполнении проводниковой анестезии в участке отверстия нижней челюсти?**

**1241. На прием к врачу обратился музыкальный работник с жалобами на ухудшение вокальных возможностей. При обследовании выявлена патология иннервации m.cricothyroideus, который напрягает голосовые связки. Какой из нервов осуществляет ее иннервацию?**

**1242. После правостороннего перелома в области передней трети нижней челюсти определяется кровоизлияние в области подбородка. Повреждением какой артерии оно вызвано?**

**1243. После проведенной операции на шее больной утратил чувствительность на ее передней поверхности. Какая ветвь шейного сплетения была повреждена во время операции?**

**1244. После удаления второго большого коренного зуба верхней челюсти у больного отмечается кровотечение из альвеолярной лунки, из системы какой артерии наблюдается кровотечение?**

**1245. При удалении липомы у больного около крыла носа хирург-стоматолог повредил сосуд, что привело к образованию подкожной гематомы. Какой сосуд поврежден?**

**1246. У больного 27 лет при обследовании было выявлено изменение секреторной функции околоушной слюнной железы, которое связано с нарушениями ее вегетативной иннервации. Какой из узлов вегетативной нервной системы отдает для нее послеузловые парасимпатические волокна?**

**1247. У больного 35 лет при обследовании слезного аппарата было установлено изменение секреторной функции слезной железы, которое связано с нарушением ее вегетативной иннервации. Из каких вегетативных ганглиев осуществляется ее симпатическая и парасимпатическая иннервация?**

**1248. У больного ботулизмом нарушена секреция слюны, слез, слизи, которая приводит к резкой сухости слизистых оболочек, чем объясняются кератиты, фарингиты, глоситы. В каком узле лежат тела постганглионарных симпатических волокон, которые иннервируют железы носовой полости, неба, слезной железы?**

**1249. У больного Л. 27 лет остеомиелит нижней челюсти в патологический процесс задействована артерия, которая проходит в толще *mandibula*. В результате воспаления у больного возник отек лица в участке нижней челюсти. Какая артерия поражена?**

**1250. У больного установлен синдром Сладера - невралгия крыло-небного узла: приступы боли в области глаза, зубов, которая распространяется на язык, мягкое небо, ритмическое сокращение мягкого неба (цокающий звук), парестезии лица, шум в ухе. Чем образован *radix sympathicus g. pterygopalatinum*?**

**1251. У женщины 25 лет после обезболивания под глазом появилась подкожная гематома. Ветвь какой артерии была травмирована при обезболивании?**

**1252. Больной 65 лет госпитализирован по поводу кровоизлияния в головной мозг. После осмотра выявлено, что место кровоизлияния локализовано на латеральной поверхности полушарий. Какой сосуд, который питает этот участок мозга, поврежден?**

**1253. Больной жалуется на невозможность плотного смыкания челюстей при жевании. Врач установил атрофию жевательных мышц. Ветви какого черепного нерва иннервируют указанную группу мышц?**

**1254. В больницу госпитализирована больная в тяжелом состоянии с диагнозом - геморрагический инсульт в участке лобной доли правого полушария головного мозга. повреждение какой артерии наиболее вероятно привело к такому состоянию?**

**1255. В ЛОР-отделение попал больной с воспалением слизистой оболочки полости носа и нарушением обоняния. Какая зона слизистой оболочки поражена?**

**1256. В правой орбите была повреждена верхнеглазничная щель, в результате чего возник синдром верхнеглазничной щели. Какие анатомические образования были сдавлены?**

**1257. В результате травмы у больного разорвался отводящий нерв. Какой из перечисленных симптомов наблюдается?**

**1258. В результате травмы черепа с повреждением верхней стенки правой глазницы потерпевший утратил возможность поднимать правое верхнее веко и смотреть вверх. Какой нерв повреждён?**

**1259. В случае опухоли в участке верхних бугорков пластинки четверохолмия произошло выпадение реакции зрачка на свет (зрачковый рефлекс). Функция какого ядра черепных нервов вероятнее всего нарушена?**

**1260. В травматологическое отделение поступил мужчина 36 лет с травмой мягких тканей лица в области медиального угла глаза и массивным кровотечением. Между ветвями каких крупных артериальных стволов формируется анастомоз в этом регионе?**

- 1261. Вследствие травмы у больного поврежден глазодвигательный нерв. Какие из перечисленных симптомов не будут наблюдаться в этом случае?**
- 1262. Какая мышца глазного яблока укорочена при сходящемся косоглазии?**
- 1263. У больного 40 лет врач констатирует неврит VIII пары черепных нервов. В каком узле находятся тела первых нейронов статокINETического анализатора?**
- 1264. Одним из методов снятия острой боли при невралгии тройничного нерва является создание депо анестетика в местах выхода ветвей тройничного нерва. В каком участке нужно ввести анестетик для обезболивания первой ветви тройничного нерва?**
- 1265. После травмы глазницы у больного выявлено сходящееся косоглазие на травмированной стороне. Какой черепной нерв поврежден?**
- 1266. При осмотре травмированного в дорожно-транспортном происшествии врач установил поражения наружной стенки глазницы. Пострадавший утратил возможность отведения глазного яблока на травмированной стороне. Какой нерв мог быть поражен в данном случае?**
- 1267. У больного закупорка выводных протоков слезной железы, что препятствует слезной жидкости омывать переднюю поверхность глазного яблока. Это приводит к воспалению склеры и боли глазного яблока. Какой нерв обеспечивает иннервацию наружной оболочки глазного яблока?**
- 1268. У больного кратковременные приступы боли в участке лба, виска, щеки, верхней губы, которые усиливаются во время еды, разговора, прикосновения к высокочувствительной височной зоне (“курковой зоне”). Отмечается болезненность точек: супраинфраорбитальной, ментальной. Неврит какого нерва у больного?**

- 1269. У больного на фоне разрыва A. carotis interna в пещеристой пазухе наблюдается пульсирующий экзофтальм (синхронность с пульсом), выслушивается дующий шум (через глазное яблоко), расширения глазной щели и зрачка. Какие пары черепных нервов, проходящие в sinus cavernosus вместе с поврежденным сосудом, сжаты гематомой?**
- 1270. У больного наблюдаются ограничения движений глазного яблока вниз и латерально. Самый первый симптом при этой патологии - двоение при взгляде вниз. Какой черепной нерв поврежден?**
- 1271. У больного опухоль в участке верхнего носового хода. Рецепторы какого черепного нерва могут быть поражены?**
- 1272. У больного отмечается выпадение функции восприятия световых раздражителей медиальных половин сетчатки. Какой отдел проводящего пути зрительного анализатора поражен?**
- 1273. У больного установлено снижение остроты зрения, связанное с патологией артериальных сосудов глазного яблока. Какая из перечисленных артерий является главным источником кровоснабжения сетчатки?**
- 1274. У мужчины с сахарным диабетом периодически возникают воспаления сальных желез верхнего века (Glandulae sebaceae (Zeis)) с повреждением корней век, что вызывает у больного боль, зудение. Какой нерв иннервирует кожу верхнего века?**
- 1275. У пациента выявлены боли при пальпации в точках Вале. При воспалении ветвей какого нерва наблюдаются такие симптомы?**
- 1276. У пострадавшего травма черепа с нарушением продырявленной пластинки решетчатой кости. Какой нерв может быть поврежден?**

**1277. Хирург-стоматолог у женщины 24 лет диагностировал гнойное воспаление клиновидной пазухи. Сделано все возможное, чтобы предотвратить втягивание в процесс стенки артерии, которая лежит в пещеристой пазухе и тем самым избежать смертельного кровотечения. Какая?**

**1278. Больная жалуется на боль в левой половине нижней челюсти и нижних зубах, которая иррадирует в наружный слуховой проход. Кроме того у нее болезненность при нажатии в точке проекции левого подбородочного отверстия. Поражения каких нервов является причиной этих симптомов?**

**1279. Больной не может на одной половине лица поднять бровь, закрыть полностью глаз, оскалить зубы. Какой нерв поражен?**

**1280. Вследствие вывиха нижней челюсти у пациента нарушена вкусовая чувствительность передних 2/3 языка и слюноотделение. Травмой какого нерва это вызвано?**

**1281. К врачу обратился больной у которого одна сторона лица неподвижна, глаз не закрывается, угол рта опущен, вытекает слюна. Какой нерв поражен?**

**1282. Мимические мышцы оказывают содействие изменению выражения лица. Повреждение какого нерва может создать явление отсутствия мимики?**

**1283. У больного воспаление внутреннего уха. После обследования врач констатирует поражение VIII пары черепных нервов. В каком узле находятся тела первых нейронов слухового анализатора?**

**1284. Пациент жалуется на приступы кратковременной боли в левой половине верхней челюсти и верхних зубах, которая иррадирует в глазничный участок. Объективно: отмечается боль при нажиме в области левого подглазничного отверстия. Какой нерв поражен?**

**1285. После перенесения менингоэнцефалита у больной выявлены остаточные явления в виде поражения лицевого нерва правой стороны. Нарушение какой группы мышц будет при этой патологии?**

**1286. После перенесения менингоэнцефалита у больной выявлены остаточные явления в виде поражения лицевого нерва правой стороны. Нарушение какой группы мышц будет при этой патологии?**

**1287. При вскрытии глубокого абсцесса щеки был произведен вертикальный разрез, после чего наблюдается парез (нарушение функции) мышц на стороне операции. Ветви какого нерва были перерезаны?**

**1288. При туберальной анестезии иглу продвигают к задненаружной поверхности бугра верхней челюсти и вводят анестетик. Какие при этом ветви нервов обезболиваются?**

**1289. У больного 65 лет при обследовании выявлено изменение секреторной функции околоушной железы, которое связано с патологией нерва, который несет от ушного узла к железе постганглионарные парасимпатические волокна. Какой нерв?**

**1290. У больного нарушена функция жевательных мышц. Какой нерв поврежден?**

**1291. У больного одностороннее слезоотделение во время пищи (синдром “крокодиловых слез”), связанный с парезом лицевого нерва в барабанной полости ишемического генеза. Раздражение какой ветви VII пары черепных нервов является причиной данного синдрома?**

**1292. У больного повреждены волокна VII пары черепно-мозговых нервов. Какой вид вкусовой чувствительности будет нарушен?**

**1293. У больного после проведения мандибулярной анестезии наблюдается свисание и невозможность поднятия нижней челюсти. Что стало причиной этого?**

**1294. У больного с остеомиелитом верхней челюсти выявлены признаки повреждения plexus dentalis superior и нарушение иннервации зубов верхней челюсти. Ветвями какого из нервов образовано это сплетение?**

**1295. У больного, который поступил в неврологическое отделение, при обследовании выявлены отклонения языка в сторону при высывании, атрофические изменения половины языка, нарушение речи, затруднено глотание. Какой нерв поврежден?**

**1296. У женщины 30 лет развился неврит лицевого нерва, который привёл к параличу мимических мышц и ухудшению слуха. Нарушение слуха было следствием паралича?**

**1297. У мужчины 40 лет вследствие удара по голове возникли нарушение слуха и парез мимических мышц. Был поставлен диагноз - гематома мосто-мозжечкового угла. В мосто-мозжечковом углу от ствола головного мозга отходят?**

**1298. У пациента выявлены боли при пальпации в точках Вале. При воспалении ветвей какого нерва наблюдаются такие симптомы?**

**1299. Больная 32 лет жалуется на боль у корня языка и в области небных миндалин. Какой нерв иннервирует эти области?**

**1300. Больной жалуется на боль у корня языка и в области небных миндалин. Какой нерв иннервирует эти области?**

**1301. Больной жалуется на головокружение и потерю слуха правым ухом. Какой нерв поврежден?**

**1302. Больной обратился к врачу с жалобами на нарушение ощущения равновесия, которое появилось после травмы. Какой нерв поврежден?**

**1303. В клинику обратился мужчина 45 лет с жалобами на потерю чувствительности в участке задней 1/3 языка. Функция какой пары черепно-мозговых нервов затронута?**

**1304. После операции на желудке у больного были обнаружены осложнения: замедлилась перистальтика и секреция желез, ослабился сфинктер привратника. Какой нерв был поврежден при операции?**

**1305. После перенесенной черепно-мозговой травмы у больного отсутствует слух. Какие корковые центры конечного мозга пострадали?**

**1306. После ранения мягких тканей ротовой полости больной утратил вкусовую чувствительность задней трети языка. Какой нерв поврежден?**

**1307. Спазм сосудов внутреннего уха приводит к раздражениям окончаний вестибулярной части VIII пары черепных нервов, проявлениями которых являются нарушения равновесия, появление нистагма. Где расположены рецепторы pars vestibularis n.vestibulocochlearis?**

**1308. У больного наблюдается снижение тактильного и вкусового ощущения слизистой оболочки задней трети спинки языка. С патологией какого нерва это связано?**

**1309. У больного наблюдается снижение тактильного и вкусового ощущения слизистой оболочки задней трети спинки языка. С патологией какого нерва это связано?**

**1310. У больного наблюдаются признаки потери слухового сторожевого рефлекса. Какие ядра стволовой части мозга повреждены?**

**1311. У больного потеря слуховой чувствительности вследствие повреждения восьмой пары ЧМН. В каких ядрах находится второй нейрон слухового пути?**

**1312. У больного при высывании языка наблюдается отклонение его верхушки влево. Двигательная иннервация какого черепного нерва затронута в этом случае?**

**1313. У больного с эпидемическим паротитом (свинка) внезапно возникла односторонняя полная глухота, которая связанная с острым гнойным лабиринтитом. Где расположены рецепторы *pars cochlearis* *n.vestibulocochlearis*?**

**1314. У больного, который поступил в неврологическое отделение, при обследовании выявлены отклонения языка в сторону при высывании, атрофические изменения половины языка, нарушение речи, затрудненное глотания. Какой нерв поврежден?**

**1315. У мужчины 40 лет вследствие удара по голове появились нарушения слуха и парез мимических мышц. Врач поставил ему диагноз - гематома мостомозжечкового угла. В мостомозжечковом углу ствола головного мозга выходят?**

**1316. У мужчины в результате черепно-мозговой травмы были повреждены 9-12 пары черепно-мозговых нервов. Укажите, как могла пройти линия перелома по базилярному отделу затылочной кости, которая привела к повреждению нервов?**