

ЗАВАНТАЖЕНО З САЙТУ ТЕСТУВАННЯ.УКР

Лучевая диагностика заболеваний

Категорія: **Радиология**

Кількість запитань: **881**

- 1. Дорожка к корню легкого наблюдается при:**
- 2. Синдром круглой тени характерный для заболеваний:**
- 3. Назовите особенности детских переломов кости.**
- 4. Назовите структуры, окружающие средостение снизу:**
- 5. Назовите структуры, окружающие средостение сверху:**
- 6. Для компрессионного перелома позвонка рентгенологически не характерно:**
- 7. При травме позвоночника чаще встречается перелом:**
- 8. Методика рентгеновского исследования с которой начинают обследование больного при спинальной травме:**
- 9. Лучевая методика, которой можно заменить МРТ при патологии спинного мозга:**
- 10. Какая из названных методик не относится к рентгеноконтрастным?**
- 11. Как называется перелом, при котором линия перелома проходит через зону роста?**
- 12. Какая методика лучевого исследования позволяет наилучше выявлять изменения в костном мозге?**
- 13. Назовите основную методику рентгеновского исследования костей и суставов.**
- 14. Наиболее информативна из лучевых методов исследования позвоночника и спинного мозга:**
- 15. Радионуклидной методикой исследования позвоночника является:**

16. К методике радионуклидного исследования спинного мозга относится
17. Методикой радионуклидного исследования спинного мозга является:
18. Методикой радионуклидного исследования позвоночника является:
19. Методикой рентгеновского исследования спинного мозга является:
20. Оптимальная рентгенологическая методика для изучения грудины:
21. Оптимальная методика для изучения структуры грудины:
22. Позволяет оценить двигательную функцию шейных межпозвоночных дисков проекция:
23. Самая информативная рентгенограмма для изучения свода черепа:
24. Наиболее частая локализация сарком мягких тканей:
25. Наиболее частая локализация остеогенных сарком:
26. При каких опухолях наблюдается «треугольник Кодмэна»?
27. Из перечисленных опухолей не относится к опухолям костей:
28. Из перечисленных опухолей не относится к опухолям костей:
29. Назовите рентгенологические симптомы хронического остеомиелита.
30. Укажите ранний рентгенологический симптом туберкулезного спондилита
31. У детей встречаются чаще:
32. «Пяточная шпора» это

- 33. Чем характеризуется гиперостоз?**
- 34. Назовите рентгеновский симптом вывиха костей сустава**
- 35. Укажите ранний рентгенологический симптом туберкулезного спондилита.**
- 36. Основные рентгенологические признаки гигантоклеточной опухоли.**
- 37. Какой лучевой метод используется для исследования свищевых ходов?**
- 38. Мелкие секвестры характерны для:**
- 39. Назовите прямые рентгеновские симптомы переломов**
- 40. Для литической фазы гигантоклеточной опухоли рентгенологически не характерно:**
- 41. Периостальной фибросаркоме не характерный рентгеновский симптом:**
- 42. Какой рентгеновский симптом не характерный для туберкулезного артрита в постартритической фазе**
- 43. Какой рентгеновский симптом не характерный для туберкулезного артрита в острой фазе**
- 44. Назовите методику рентгеновского исследования свищей при хроническом остеомиелите**
- 45. Какая методика лучевого исследования позволяет наилучше выявлять изменения в костном мозге?**
- 46. Какой из указанных симптомов ревматоидного артрита**
- 47. Назовите рентгеновский симптом не относящийся к гнойному артриту**

- 48. Назовите сроки появления тени костной мозоли на рентгенограмме у взрослых при нормальном заживлении перелома**
- 49. Назовите особенности огнестрельных переломов**
- 50. Назовите особенности переломов у людей пожилого возраста**
- 51. Как называется перелом, при котором линия перелома проходит через зону роста?**
- 52. Назовите рентгеновский симптом вывиха**
- 53. Назовите прямые рентгеновские симптомы переломов**
- 54. Какая из названных методик не относится к рентгеноконтрастным?**
- 55. Назовите основную методику рентгеновского исследования костей и суставов.**
- 56. Назовите основной лучевой метод исследования мягких тканей опорно-двигательной системы**
- 57. Назовите основной лучевой метод исследования костей и суставов**
- 58. Из перечисленных методов наименее информативным в диагностике сарком мягких тканей есть:**
- 59. Саркомы мягких тканей чаще всего метастазируют:**
- 60. Наиболее частая локализация сарком мягких тканей:**
- 61. Из перечисленных опухолей относится к злокачественной опухоли мягких тканей:**
- 62. Наиболее частая локализация гигантоклеточной опухоли:**

63. Наиболее частая локализация остеогенных сарком:
64. Какой из перечисленных клинических синдромов не характерный для саркомы костей
65. Куда чаще всего метастазируют злокачественные опухоли костей?
66. Из перечисленных опухолей в группу костно-мозговых относится:
67. Из перечисленных опухолей не относится к опухолям костей:
68. В каких костях чаще всего развиваются первичные злокачественные опухоли?
69. В каких случаях показана тотальная флюорография?
70. Назовите наиболее ранний рентгенологический симптом остеомиелита.
71. Основные рентгенологические признаки гигантоклеточной опухоли.
72. При каких опухолях наблюдается «треугольник Кодмэна»?
73. Мелкие секвестры характерны для:
74. Какое контрастное вещество используют для пневмоартрографии?
75. В какой последовательности развивается картина остеомиелита?
76. Назовите не прямые рентгенологические признаки перелома кости.
77. Чем характеризуется гиперостоз?
78. Назовите рентгенологические признаки перелома кости.
79. При какой опухоли наблюдается луковичный периостоз?

80. При каких опухолях наблюдаются периостальные спикулы?
81. Что такое остеосклероз?
82. «Пяточная шпора» это
83. Укажите ранний рентгенологический симптом туберкулезного спондилита.
84. Основные рентгенологические признаки гигантоклеточной опухоли.
85. Назовите рентгенологические симптомы хронического остеомиелита.
86. Назовите наиболее ранний рентгенологический симптом острого остеомиелита.
87. Какой вид периостальной реакции наиболее характерный для сифилитического поражения кости?
88. Какой вид периостальной реакции характерный для хронического остеомиелита кости?
89. Какой вид периостальной реакции характерный для острого остеомиелита кости?
90. Назовите стадии развития гигантоклеточной опухоли.
91. Какой вид периостальной реакции характерный для злокачественной опухоли кости?
92. При какой саркоме наблюдается периостальный козырек?
93. Что такое первично-увеличенный снимок?
94. Какие бывают формы остеопороза?

95. Рентгенографические признаки костного панариция
96. В чем ценность пневмоартрографии?
97. Назовите основные формы миеломной болезни.
98. Признаки злокачественности опухоли кости.
99. Формы остеогенной саркомы.
100. Рентгенологические признаки атрофии кости.
101. Какой лучевой метод используется для исследования свищевых ходов?
102. Назовите особенности огнестрельных переломов.
103. Какое контрастное вещество используется для фистулографии?
104. В какой последовательности развивается картина остеомиелита?
105. Укажите ранний рентгенологический симптом туберкулезного спондилита
106. У детей встречаются чаще:
107. Назовите рентгенологические признаки остеопороза.
108. Периост имеет наибольшую остеобластическую активность в:
109. В длинной кости в норме превалирует корковое вещество в:
110. Из минералов превалирует в составе кости:
111. Интенсивность изображения кости на рентгенограмме определяет:
112. Методикой радионуклидного исследования позвоночника является

- 113. Какая методика рентгеновского исследования спинного мозга?**
- 114. К рентгеновским исследованиям позвоночника не относится:**
- 115. Наиболее информативной методикой лучевого исследования позвоночника и спинного мозга является**
- 116. Какие рентгеновские симптомы характерны для миеломной болезни с поражением костей черепа**
- 117. При аденоме гипофиза не характерный рентгенологический симптом:**
- 118. К непрямым лучевым симптомам опухолей головного мозга не относят**
- 119. Тромбоз мозгового сосуда на КТ становится заметным (ишемическая зона инфаркта):**
- 120. Лучевой диагност не обязан отвечать при травме черепа и головного мозга на вопрос:**
- 121. Какая методика лучевого исследования позволяет наилучше выявлять изменения в костном мозге?**
- 122. К методикам лучевого исследования мозгового кровотока не относят:**
- 123. Для лучевого исследования мозгового кровотока у больших групп населения при диспансерном наблюдении используют:**
- 124. К методикам лучевой визуализации головного мозга относят:**
- 125. К ультразвуковому исследованию черепа и головного мозга относят:**
- 126. К радионуклидному исследованию черепа и головного мозга относят:**
- 127. К магнито-резонансному исследованию черепа и головного мозга относят:**

- 128. К рентгеновским исследованиям черепа и головного мозга относят:**
- 129. К рентгеновским исследованиям черепа и головного мозга не относят:**
- 130. Наиболее информативны методики лучевого исследования ЛОР-органов:**
- 131. Назовите наиболее эффективную методику лучевого исследования для выявления метастазов у позвоночнике**
- 132. Назовите рентгеновские симптомы кальциноза межпозвоночного диска**
- 133. Назовите рентгенологический симптом фиксирующего лигаментоза (болезни Форестье)**
- 134. К рентгеновским симптомам артроза в межпозвоночных суставах не относится**
- 135. К поздним рентгеновским симптомам остеохондроза не относится:**
- 136. К поздним рентгеновским симптомам туберкулезного спондилита не относится:**
- 137. К ранним рентгеновским симптомам туберкулезного спондилита не относится:**
- 138. При компрессионном переломе позвонка рентгенологически не характерно:**
- 139. Какой вид перелома чаще встречается при травме позвоночника?**
- 140. Назовите методику рентгеновского исследования с которой начинают обследование больного при спинальной травме**

- 141. Назовите лучевую методику, которой можно заменить МРТ при патологии спинного мозга:**
- 142. Из лучевых методов исследования позвоночника и спинного мозга наиболее информативна:**
- 143. К радионуклидной методике исследования позвоночника относится**
- 144. К методике радионуклидного исследования спинного мозга относится**
- 145. Назовите методику радионуклидного исследования спинного мозга**
- 146. Назовите методику радионуклидного исследования позвоночника**
- 147. Назовите методику рентгеновского исследования спинного мозга**
- 148. К методикам рентгеновского исследования позвоночника не относится:**
- 149. Назовите наиболее информативную методику лучевого исследования позвоночника и спинного мозга**
- 150. Назовите рентгеновские симптомы миеломной болезни с поражением костей черепа**
- 151. Для аденомы гипофиза не характерный рентгенологический симптом:**
- 152. К непрямым лучевым симптомам опухолей головного мозга не относят**
- 153. Через какое время после тромбоза мозгового сосуда на КТ становится заметной ишемическая зона инфаркта**
- 154. Укажите вопрос на который не обязательно отвечать лучевому диагносту при травме черепа и головного мозга**

- 155. Для исследования мозгового кровотока у больших групп населения при диспансерном наблюдении используют:**
- 156. К основным методикам лучевого исследования мозгового кровотока не относят:**
- 157. К основным методикам лучевой визуализации головного мозга относят:**
- 158. К методикам ультразвукового исследования черепа и головного мозга относят:**
- 159. К методикам радионуклидного исследования черепа и головного мозга относят:**
- 160. К методикам магнито-резонансного исследования черепа и головного мозга относят:**
- 161. К методикам рентгеновского исследования черепа и головного мозга относят:**
- 162. К методикам рентгеновского исследования черепа и головного мозга не относят:**
- 163. Тень костной мозоли на рентгенограмме у взрослых при нормальном заживлении перелома появляется:**
- 164. Какая методика лучевого исследования позволяет наилучше выявлять изменения в суставе?**
- 165. Какая методика лучевого исследования позволяет наилучше выявлять изменения в костном мозге?**
- 166. Укажите ранний рентгенологический симптом туберкулезного спондилита**

- 167. При каких опухолях наблюдается периостальные спикеры?**
- 168. Назовите основные формы миеломной болезни.**
- 169. Мелкие секвестры характерны для:**
- 170. Назовите особенности переломов у людей пожилого возраста**
- 171. Периостальной фибросаркоме не характерный рентгеновский симптом:**
- 172. Периферический рак от туберкулёмы отличается:**
- 173. «Культи» долевого бронха наблюдается при:**
- 174. Дорожка к корню легкого наблюдается при:**
- 175. Центральный рак легкого наиболее часто сопровождается:**
- 176. Периферический рак легкого исходит из бронхов:**
- 177. Какая форма рака легкого встречается чаще?**
- 178. Наиболее частые осложнения легких при пневмокониозе II-III степени:**
- 179. Какая форма туберкулеза сочетается с признаками хронического легочного сердца?**
- 180. Фиброзно-кавернозная форма туберкулеза отличается от цирротической наличием:**
- 181. Для какой клинической формы туберкулеза характерно наличие каверны, фиброза и полиморфных очагов?**
- 182. Для каких округлых образований легких наиболее характерно обызвествление?**

- 183. Рентгенологические признаки формирующейся полости распада:**
- 184. Кавернозный туберкулез наиболее часто развивается из:**
- 185. Какая клиническая форма туберкулеза наиболее часто осложняется распадом?**
- 186. Основной отличительный признак округлого инфильтрата от туберкулемы:**
- 187. Полиморфные очаги в легких наблюдаются при:**
- 188. При милиарном туберкулезе очаги в легких начинают выявляться рентгенологически через:**
- 189. Двухсторонняя ограниченная диссеминация в верхних отделах легких наблюдается при:**
- 190. В каких сегментах легких дольше всего сохраняются очаги при обратном развитии милиарного туберкулеза?**
- 191. С каких отделов начинается рассасывание очагов при милиарном туберкулезе?**
- 192. Характерные размеры очага Гона:**
- 193. Для каких процессов наиболее характерно обызвествление внутригрудных лимфатических узлов?**
- 194. Одностороннее увеличение лимфатических узлов бронхо-легочной группы у подростка более характерно для:**
- 195. Какая форма первичного туберкулеза у детей встречается наиболее часто?**
- 196. Что не влияет на интенсивность тени очагов при туберкулезе?**

- 197. Для дифференциальной диагностики хронической пневмонии и рака легкого необходимо провести:**
- 198. При каких из перечисленных заболеваний развивается хроническая пневмония?**
- 199. Полости при хроническом абсцессе:**
- 200. Для острой абсцедирующей пневмонии характерно до прорыва гнойника:**
- 201. Острый абсцесс легкого формируется:**
- 202. Аспирационная пневмония у тонувших рентгенологически протекает по типу:**
- 203. Аспирационная пневмония при нарушении акта глотания локализуется преимущественно в:**
- 204. Рентгенологические признаки хронической абсцедирующей пневмонии:**
- 205. Рентгенологические признаки острой абсцедирующей пневмонии:**
- 206. Постлучевая пневмония возникает после:**
- 207. Для застойной пневмонии не характерно:**
- 208. Для стафилококковой и стрептококковой пневмонии не характерно:**
- 209. Для полостей распада стафилококковых и стрептококковых пневмоний не характерно:**
- 210. Характерный признак интерстициальной пневмонии:**
- 211. Наиболее частые сроки рассасывания острой пневмонии:**

- 212. При неосложненной долеой пневмонии линейные просветления обусловлены:**
- 213. Для долеой пневмонии в фазе инфильтрации характерно затемнение:**
- 214. Что определяет понятие «перисциссурит»**
- 215. Какое осложнение не характерно для верхнедолевой крупозной пневмонии?**
- 216. Четкий контур затемнения при крупной пневмонии обусловлен:**
- 217. Основной отличительный признак бронхопневмонии от метастазов:**
- 218. Затемнение при бронхопневмонии:**
- 219. При каких из перечисленных заболеваний не развиваются бронхоэктазы?**
- 220. Рентгенологически для циротического туберкулеза легких не характерно:**
- 221. С какой формы туберкулеза чаще развивается фиброзно-кавернозный туберкулез**
- 222. Неравномерное расширение бронхов IV-VII порядка наблюдается при:**
- 223. Для выявления бронхоэктазов оптимальной методикой является:**
- 224. При хроническом бронхите изменения мелких бронхов выявляются при:**
- 225. Хронический бронхит характеризуется:**
- 226. Смещение трахеи в сочетании с ее сдавлением свойственны:**
- 227. Какая методика является оптимальной для выявления дивертикулов трахеи и бронхов?**

- 228. Периферический рак от туберкулемы отличается:**
- 229. «Культия» долевого бронха наблюдается при:**
- 230. Дорожка к корню легкого наблюдается при:**
- 231. Центральный рак легкого наиболее часто сопровождается:**
- 232. Периферический рак легкого исходит из бронхов:**
- 233. Какая форма рака легкого встречается чаще?**
- 234. Наиболее частые осложнения легких при пневмокониозе II-III степени:**
- 235. Какая форма туберкулеза сочетается с признаками хронического легочного сердца?**
- 236. Фиброзно-кавернозная форма туберкулеза отличается от цирротической наличием:**
- 237. Для какой клинической формы туберкулеза характерно наличие каверны, фиброза и полиморфных очагов?**
- 238. Для каких округлых образований легких наиболее характерно обызвествление?**
- 239. Рентгенологические признаки формирующейся полости распада:**
- 240. Кавернозный туберкулез наиболее часто развивается из:**
- 241. Какая клиническая форма туберкулеза наиболее часто осложняется распадом?**
- 242. Основной отличительный признак округлого инфильтрата от туберкулемы:**

- 243. Полиморфные очаги в легких наблюдаются при:**
- 244. При миллиарном туберкулезе очаги в легких начинают выявляться рентгенологически через:**
- 245. Двухсторонняя ограниченная диссеминация в верхних отделах легких наблюдается при:**
- 246. В каких сегментах легких дольше всего сохраняются очаги при обратном развитии милиарного туберкулеза?**
- 247. С каких отделов начинается рассасывание очагов при милиарном туберкулезе?**
- 248. Характерные размеры очага Гона:**
- 249. Для каких процессов наиболее характерно обызвествление внутригрудных лимфатических узлов?**
- 250. Одностороннее увеличение лимфатических узлов бронхо-легочной группы у подростка более характерно для:**
- 251. Какая форма первичного туберкулеза у детей встречается наиболее часто?**
- 252. Что не влияет на интенсивность тени очагов при туберкулезе?**
- 253. Для дифференциальной диагностики хронической пневмонии и рака легкого необходимо провести:**
- 254. При каких из перечисленных заболеваний развивается хроническая пневмония?**
- 255. Полости при хроническом абсцессе:**

256. Острый абсцесс легкого формируется:

257. Аспирационная пневмония у тонувших рентгенологически протекает по типу:

258. Аспирационная пневмония при нарушении акта глотания локализуется преимущественно в:

259. Рентгенологические признаки хронической абсцедирующей пневмонии:

260. Рентгенологические признаки острой абсцедирующей пневмонии:

261. Постлучевая пневмония возникает после:

262. Для застойной пневмонии не характерно:

263. Для стафилококковой и стрептококковой пневмонии не характерно:

264. Для полостей распада стафилококковых и стрептококковых пневмоний не характерно:

265. Характерный признак интерстициальной пневмонии:

266. Наиболее частые сроки рассасывания острой пневмонии:

267. При неосложненной долевой пневмонии линейные просветления обусловлены:

268. Для долевой пневмонии в фазе инфильтрации характерно затемнение:

269. Что определяет понятие «перисциссурит»

270. Какое осложнение не характерно для верхнедолевой крупозной пневмонии?

- 271. Четкий контур затемнения при крупной пневмонии обусловлен:**
- 272. Основной отличительный признак бронхопневмонии от метастазов:**
- 273. Затемнение при бронхопневмонии:**
- 274. При каких из перечисленных заболеваний не развиваются бронхоэктазы?**
- 275. Неравномерное расширение бронхов IV-VII порядка наблюдается при:**
- 276. Для выявления бронхоэктазов оптимальной методикой является:**
- 277. При хроническом бронхите изменения мелких бронхов выявляются при:**
- 278. Хронический бронхит характеризуется:**
- 279. Смещение трахеи в сочетании с ее сдавлением свойственны:**
- 280. Какая методика является оптимальной для выявления дивертикулов трахеи и бронхов?**
- 281. Положение диафрагмы после пульмонэктомии:**
- 282. В каком отделе аорты реже наблюдаются мешковидные аневризмы:**
- 283. Степень и протяженность сужения аорты при коарктации наиболее достоверно определяется при:**
- 284. При дифференциальной диагностике кист средостения и аневризмы аорты наиболее информативны:**
- 285. Назовите структуры, окружающие средостение сзади:**
- 286. При каких заболеваниях сердца и аорты может наблюдаться атрофия от давления в скелете грудной клетки?**

- 287. Постинфарктная аневризма наиболее часто локализуется в:**
- 288. При каком заболевании наблюдается обызвествление по краеобразующим контурам тени сердца?**
- 289. При каких заболеваниях характерно отсутствие пульсации по краеобразующим контурам сердца:**
- 290. При каком заболевании легких формируется хроническое «легочное» сердце?**
- 291. Для «легочного сердца» не характерно:**
- 292. Для какого заболевания свойственна быстрая динамика размеров сердечно-сосудистой тени?**
- 293. При каком заболевании контуры тени сердца с обеих сторон могут быть неровными, зазубренными?**
- 294. При каком заболевании наблюдается локальное выпячивание по контуру левого желудочка?**
- 295. Какой порок сердца сопровождается гипертрофией левого желудочка?**
- 296. Какое заболевание сопровождается обязательным увеличением левого предсердия?**
- 297. При каком заболевании наблюдается удлинение дуги левого желудочка?**
- 298. Стеноз левого атриовентрикулярного отверстия это:**
- 299. Какая методика является оптимальной для уточнения локализации сужения брюшной аорты и состояния коллатералей?**

- 300. Какая методика способствует распознаванию опухолей перикарда?**
- 301. Какая методика способствует распознаванию внутрисердечных опухолей?**
- 302. Оптимальная проекция для изучения грудной аорты:**
- 303. Оптимальная проекция для изучения правого желудочка:**
- 304. Какая проекция является оптимальной для изучения правого предсердия**
- 305. Какой отдел сердца является краеобразующим в прямой проекции по левому контуру в норме?**
- 306. Какой отдел сердца является краеобразующим в прямой проекции по правому контуру в норме?**
- 307. В отдаленные сроки после пульмонэктомии наблюдается:**
- 308. Инородным телам в бронхе не свойственно:**
- 309. Инородное тело чаще локализуется в следующих бронхах:**
- 310. Разрыв легкого не сопровождается:**
- 311. Для свежих травматических повреждений грудной клетки не характерны:**
- 312. Смещение средостения в здоровую сторону наблюдается при:**
- 313. Какое из перечисленных заболеваний наиболее часто приводит к образованию фиброторакса:**
- 314. Выпотной плеврит характеризуется:**
- 315. Изменение формы и интенсивности затемнения при изменениях положения больного наблюдается при:**

- 316. В начальной фазе экссудативного плеврита наибольшее количество жидкости в плевральной полости накапливается в:**
- 317. Бронхогенные кисты локализуются преимущественно:**
- 318. Целомические кисты перикарда наиболее часто локализуются:**
- 319. Какой признак не типичен для невриномы?**
- 320. Наиболее высоким индексом малигнизации отличаются опухоли средостения:**
- 321. Дольчатая структура образований в средостении наблюдается при:**
- 322. Какие патологические образования средостения смещаются при кашле и глотании?**
- 323. В верхнем отделе переднего средостения локализуются:**
- 324. Смещение органов средостения в здоровую сторону наблюдается при:**
- 325. Признаки цирроза доли:**
- 326. Для эмфиземы легких не характерны:**
- 327. Бронхиальная астма рентгенологически проявляется:**
- 328. Эхинококкоз легких характеризуется:**
- 329. Доброкачественным внутрилегочным опухолям свойственна:**
- 330. Для доброкачественных опухолей легких характерны:**
- 331. Для аденомы бронха характерны:**

- 332. Увеличение парастернальных лимфатических узлов характерно для:**
- 333. Толчкообразное смещение органов средостения при глубоком вдохе в сторону поражения наблюдается при:**
- 334. Множественные округлые четко очерченные тени в нижних долях легких размером 1-3 см характерны для:**
- 335. Назовите структуры, окружающие средостение спереди:**
- 336. Для дифференциальной диагностики округлых теней на рентгенограмме легких наименьшее значение имеют признаки:**
- 337. При дифференциальной диагностике округлых теней в пользу рака свидетельствует:**
- 338. Бронхографию проводят при подозрении на:**
- 339. Для массовых профилактических осмотров органов грудной полости используют:**
- 340. Круглая тень с включениями высокой интенсивности в легких характерна для:**
- 341. Круглая тень с включениями высокой интенсивности в легких характерна для:**
- 342. Туберкулез легких чаще всего поражает:**
- 343. Круглой называется тень в легких, размеры которой:**
- 344. Круглая тень с «дорожкой к корню» в легких характерна для:**
- 345. Основным лучевым методом исследования органов дыхания является:**

- 346. Основные положения при исследовании сердца**
- 347. Укажите сердечно-легочной коэффициент в норме**
- 348. Назовите наиболее благоприятные положения для исследования всех отделов аорты**
- 349. Назовите наиболее благоприятные положения для исследования левого желудочка**
- 350. Признаки митральной конфигурации сердца:**
- 351. Назовите дуги правого контура сердца в прямом положении**
- 352. Каково соотношение длины тени сердца и сосудистого пучка в норме на прямом снимке**
- 353. За какое время необходимо сделать серию снимков при ангиокардиографии?**
- 354. Назовите особенности легочного рисунка у детей**
- 355. Для туберкуломы легкого характерно:**
- 356. Назовите признаки каверны**
- 357. К функциональным признакам эмфиземы легких относится**
- 358. Назовите методики лучевого исследования, позволяющие изучить состояние стенки аневризмы грудного отдела аорты**
- 359. Назовите рентгенологический симптом атеросклероза аорты**
- 360. К рентгенологическим симптомам эксудативного перикардита не относится:**

- 361. Назовите рентгенологический симптом слипчивого перикардита**
- 362. К лучевым методикам для оценки миокардиального кровотока не относится:**
- 363. К методикам ультразвукового исследования сердца и сосудов не относится**
- 364. К методикам магнитно-резонансного исследования сосудов относится:**
- 365. К методикам магнитно-резонансного исследования сердца относится:**
- 366. Для какого порока сердца характерно присутствие в легочных полях линий Керли**
- 367. Назовите методику рентгенисследования, которая применяется с целью оценки состояния левого предсердия**
- 368. Укажите расстояние при проведении телерентгенографии:**
- 369. Укажите ширину ретрокардиального пространства в норме в левой косой проекции на высоте глубокого вдоха**
- 370. К вариантам конфигурации сердца не относится:**
- 371. Какая из названных дуг сердечно-сосудистой тени не определяется по левому контуру в передней прямой проекции**
- 372. По правому контуру сердечной тени в передней прямой проекции определяется:**
- 373. Какая из названных проекций не относится к основным рентгенисследованиям сердца и крупных сосудов:**

374. Назовите специальные рентгенологические методики с использованием рентгеноконтрастных веществ, которые не применяются для исследования органов средостения

375. Назовите патологические процессы, которые локализуются преимущественно в заднем отделе средостения

376. Назовите патологические процессы, которые локализуются преимущественно в нижнем этаже среднего отдела средостения

377. Назовите патологические процессы, которые локализуются преимущественно в нижнем этаже переднего отдела средостения

378. «Культи» долевого бронха наблюдается при:

379. Назовите патологические процессы, которые не локализуются преимущественно в среднем этаже переднего отдела средостения

380. Назовите патологические процессы, которые не локализуются преимущественно в верхнем этаже переднего отдела средостения

381. Синдром кольцевидной тени характерный для заболеваний:

382. Синдром круглой тени характерный для заболеваний:

383. Назовите рентгенологический симптом закрытой эхинококковой кисты

384. Назовите патологический процесс, который не дает синдром круглой тени в легочном поле

385. Какая форма рака легкого, согласно классификации Ю.М.Соколова, называется за автором раком Пенкоста

- 386. Назовите доброкачественную опухоль легких, которая наиболее часто встречается на периферии**
- 387. Назовите доброкачественную опухоль легких, для которой характерна центральная локализация**
- 388. Назовите рентгенологический синдром кавернозного туберкулеза легких**
- 389. Назовите дифференциально-диагностические симптомы туберкулемы**
- 390. К последствиям перенесенного инфильтративного туберкулеза не относится:**
- 391. Где чаще всего локализуется туберкулезный инфильтрат?**
- 392. Для какой формы туберкулеза характерно образование «штампованных» каверн?**
- 393. Назовите рентгенологические симптомы хронического-гематогенно-диссеминированного туберкулеза легких**
- 394. Назовите рентгенологические симптомы острого миллиарного туберкулеза легких**
- 395. К осложнениям туберкулеза внутригрудных лимфатических узлов не относится:**
- 396. Назовите рентгенологические симптомы первичного туберкулезного комплекса в стадии кальцинации**
- 397. Назовите рентгенологические симптомы первичного туберкулезного комплекса в стадии организации и уплотнения**

- 398. Назовите рентгенологические симптомы инфильтративно-пневмонической фазы первичного туберкулезного комплекса**
- 399. При течении первичного туберкулезного комплекса отсутствует фаза:**
- 400. Назовите рентгенологические симптомы, не характерные для развития пневмокониозов**
- 401. К рентгеноморфологическим симптомам эмфиземы легких не относится:**
- 402. Назовите рентгенологические симптомы тотального эксудативного плеврита**
- 403. Назовите рентгенологический симптом хронического абсцесса**
- 404. Назовите рентгенологический симптом острого абсцесса**
- 405. Назовите рентгенологический симптом долевой пневмонии в стадии опеченения:**
- 406. К патологически измененному легочному рисунку не относится:**
- 407. Синдром затемнения в легочном поле не дает:**
- 408. К синдрому затемнения в легочном поле не относится:**
- 409. К рентгенологическим синдромам при заболеваниях легких не относится:**
- 410. На каком уровне проходят границы между верхними и нижними долями обеих легких сзади?**
- 411. На каком уровне проходит граница между средней и нижней долями правого легкого спереди**

- 412. На каком уровне проходит граница между верхней и нижней долями левого легкого спереди**
- 413. На каком уровне проходит граница между верхней и средней долями правого легкого спереди?**
- 414. Что является патолого-анатомическим субстратом легочного рисунка?**
- 415. Укажите уровень расположения корней легкого на рентгенограмме органов грудной полости в передней прямой проекции в норме**
- 416. Укажите границы нижних отделов легких**
- 417. Укажите границы верхних отделов легких**
- 418. На каком уровне проводят две горизонтальные линии, которые разделяют легочные поля на отделы?**
- 419. Как называется суммационная тень, расположенная между легочными полями?**
- 420. Как называются симметричные участки рентгенограммы органов грудной полости, расположенные с обеих сторон от срединной тени?**
- 421. Назовите типы ренограмм:**
- 422. Наиболее информативным лучевым методом диагностики кист печени является:**
- 423. В рентгендиагностике острой кишечной непроходимости основная роль принадлежит:**
- 424. В диагностике непроходимости кишечника основное место занимает метод исследования:**

425. Укажите наиболее частую локализацию рака почки?
426. При подозрении на перфорацию полого органа в брюшной полости рентгенологически определяют:
427. При острой патологии живота рентгенологическое исследование необходимо начинать с:
428. В случае эндофитного роста злокачественной опухоли методом выбора ранней диагностики является:
429. К осложнениям язвенной болезни желудка относится:
430. К рентгеноморфологическим признакам язвенной болезни желудка не относится:
431. Чрезмерное развитие слизистой оболочки желудка это:
432. За частотой образования среди доброкачественных опухолей первое место занимают:
433. В диагностике варикозного расширения вен пищевода среди лучевых методов самый простой и результативный:
434. За механизмом формирования дивертикулы делят на:
435. Ахалазию пищевода следует дифференцировать с:
436. Для определения толщины стенки пищевода используют:
437. Обзорную и прицельную рентгенографию пищевода проводят в проекциях:
438. Отличительной чертой поликистоза при УЗИ является:
439. Злокачественные опухоли почек представляют собой:

- 440. Основным признаком конкремента почки является:**
- 441. Нормальная лоханка в передне-заднем размере:**
- 442. Соотношение паренхимы и чашечно-лоханочной системы в норме составляет:**
- 443. Нефрокальцинозом наиболее часто сопровождается:**
- 444. При подозрении на гидронефроз наиболее рациональной методикой является:**
- 445. Операбельность рака почки возможна на основании:**
- 446. К аномалиям почек и мочевых путей, которые реже всего осложняются разными заболеваниями, относится:**
- 447. Общим рентгенологическим признаком, характерным для серозной кисты, аденомы, эхинококковой кисты есть все перечисленные, кроме:**
- 448. Поражение туберкулезным процессом почек и мочевыводящих путей наиболее часто происходит:**
- 449. Мочевые пути наиболее часто поражают опухолевые образования:**
- 450. Наиболее частая исходная локализация рака почки и мочевых путей:**
- 451. Характерным симптомом сморщенной почки является:**
- 452. К наиболее частым заболеваниям почек относятся:**
- 453. На качество изображения мочевых путей влияют:**
- 454. На качество изображения мочевых путей при экскреторной урографии влияют:**

- 455. При гидронефрозе наиболее целесообразна:**
- 456. В норме верхний полюс правой почки в сравнении с левой располагается ниже:**
- 457. Почки в здорового человека находятся на уровне:**
- 458. При нефроптозе ведущим методом исследования является:**
- 459. Наиболее достоверную информацию об аплазии почки дает:**
- 460. Наибольшую информацию при туберкулезном папилите дает:**
- 461. При рентгенонегативных конкрементах верхних мочевых путей наиболее информативно использование:**
- 462. Почечную колику на экскреторной урограмме можно заподозрить на основании:**
- 463. С какими заболеваниями необходимо дифференцировать неорганные абдоминальные опухоли у детей?**
- 464. Какие симптомы более характерны для эндометриоза мочевого пузыря?**
- 465. Наибольшее значение в дифференциальной диагностике дистопии и нефроптоза имеют:**
- 466. При нефроптозе лоханка расположена на уровне поясничного позвонка:**
- 467. Какой признак при цистографии не является характерным для опухоли мочевого пузыря?**
- 468. Что не характерно для туберкулеза мочевого пузыря**

- 469. Какой вид обызвествлений характерен для нефрокальциноза?**
- 470. Какой вид обызвествлений характерен для распада при злокачественных опухолях?**
- 471. Какой вид обызвествлений характерен для туберкулезных каверн?**
- 472. Укажите оптимальный неинвазивный метод позволяющий различить солитарную кисту от солидного объемного образования почки:**
- 473. Назовите наиболее характерный рентгенологический признак опухоли лоханки:**
- 474. Назовите наиболее характерный лучевой признак роста объемного образования почки при локализации в корковом веществе?**
- 475. Какая из указанных методик является наиболее информативной в диагностике почечного папиллярного некроза?**
- 476. Какая из рентгеновских методик позволяет правильно поставить диагноз «аплазии почки»?**
- 477. Какой из перечисленных лучевых методов предпочтительнее использовать в начале диагностики заболеваний мочевыделительной системы**
- 478. Какая из перечисленных рентгеновских методик предпочтительнее при установлении диагноза мочекаменной болезни?**
- 479. Какие камни являются рентгенпозитивными?**
- 480. В каких случаях по обзорной урограмме можно без дополнительного исследования поставить диагноз мочекаменной болезни?**

- 481. Какая из урорентгенологических методик является ведущей при подозрении на нефроптоз:**
- 482. Какая из методик является более информативной при диагностике пионефроза?**
- 483. Перегибы мочеточника характерны для:**
- 484. Количество физиологических сужений мочеточника:**
- 485. Тень какой почки на урограммах располагается выше?**
- 486. Основная цель предварительной подготовки перед проведением внутривенной урографии:**
- 487. В каких случаях применяют антеградную пиелографию?**
- 488. Укажите основное преимущество внутривенной урографии перед ретроградной пиелографией?**
- 489. Укажите рентгенологическую методику, позволяющую наиболее детально судить о форме, величине и положении почек:**
- 490. Укажите основное преимущество ретроградной пиелографии перед внутривенной урографией:**
- 491. Укажите основной недостаток ретроградной пиелографии:**
- 492. Назовите рентгенологическую методику, позволяющую судить о функциональном состоянии почек:**
- 493. Средние размеры ширины почек на урограммах у взрослых:**
- 494. Средние размеры длины почек на урограммах у взрослых:**

495. Для диагностики новообразований в молочной железе проводят:

496. При патологических выделениях из молочной железы необходимо провести:

497. Метросальпингография показана в основном при:

498. Назовите метод лучевой диагностики, наиболее часто применяемый в акушерстве и гинекологии:

499. Назовите методики статической радионуклидной визуализации почек:

500. К ультразвуковой методике исследования мочевыделительной системы относится:

501. Для КТ-симптомов эхинококковых кист характерно:

502. К рентгенологическим методикам исследования мочевыделительной системы не относится:

503. Лучевую визуализацию почек и мочевыводящих путей начинают с исследования:

504. Назовите метод лучевой диагностики, позволяющий оценить эндокринную функцию поджелудочной железы

505. К ультразвуковым симптомам острого холецистита не относится:

506. Какая из методик лучевой диагностики наиболее оптимальная для диагностики жировой дистрофии печени?

507. В каком возрасте наиболее часто встречается рак поджелудочной железы?

- 508. В каком отделе поджелудочной железы наиболее часто локализуется злокачественная опухоль?**
- 509. Наиболее информативной методикой при подозрении на рак поджелудочной железы является:**
- 510. Наиболее распространенной методикой исследования при подозрении на объемный процесс в поджелудочной железе является:**
- 511. Петля 12-ти перстной кишки развернута, ее медиальный контур деформирован, ригиден при:**
- 512. Симптом разворачивания петли 12-ти перстной кишки ярче выражен при:**
- 513. Какие аномалии развития желчного пузыря встречаются наиболее часто и могут быть определены с помощью холецистографии?**
- 514. Какая рентгенологическая методика позволяет достоверно определить аномалию развития печени?**
- 515. Какая рентгенологическая методика позволяет одномоментно изучить артериальную и портальную систему печени?**
- 516. В какие сроки после приема желчегонного завтрака происходит максимальное сокращение желчного пузыря?**
- 517. В какие сроки после орального приема контрастного вещества наступает оптимальное контрастирование желчного пузыря?**
- 518. Какие рентгенологические признаки эхинококкоза печени?**
- 519. Какие холецистографические признаки хронического холецистита?**
- 520. Какие рентгенологические признаки острого холецистита?**

- 521. Какие конкременты выявляются при обзорной рентгенографии?**
- 522. На какой минуте после внутривенного введения контрастного вещества при холеграфии появляется фаза гомогенизации?**
- 523. Какая максимальная длина неизмененного желчного пузыря на холецистограмме у взрослых людей?**
- 524. Какой максимальный поперечный размер неизмененного желчного пузыря на холецистограмме у взрослых людей?**
- 525. Появление интенсивной тени желчного пузыря при холецистографии свидетельствует о сохранении:**
- 526. Расположение нормотонического желчного пузыря на рентгенограмме у нормостеников на уровне позвонков:**
- 527. При пероральной холецистографии у взрослых тень желчного пузыря наиболее интенсивная через:**
- 528. В рентгенодиагностике полипов в толстой кишке наиболее эффективна методика:**
- 529. Полипы в толстой кишке обычно локализуются:**
- 530. При метастазировании рака толстой кишки чаще всего поражаются:**
- 531. Наиболее важным признаком, отличающим рак инфильтративного роста от рубцовых процессов в толстой кишке при ирригоскопии является:**
- 532. Рак толстой кишки инфильтративного типа роста чаще всего следует дифференцировать по рентгенологической картине с:**

- 533. Рентгенологическими признаками рака толстой кишки экзофитного типа роста при ирригоскопии является все перечисленное, кроме одного:**
- 534. При раке толстой кишки экзофитный тип роста опухоли более характерен для:**
- 535. Среди доброкачественных опухолей толстой кишки наиболее часты:**
- 536. При туберкулезе кишечника наиболее часто поражается:**
- 537. Наиболее характерным рентгенологическим признаком тонкокишечной непроходимости при обзорном исследовании брюшной полости является:**
- 538. При подозрении на кишечную непроходимость рентгенологическое исследование необходимо начинать с:**
- 539. Для рентгенологической картины болезни Крона не характерны:**
- 540. При болезни Крона гранулематозный воспалительный процесс чаще всего поражает**
- 541. Какой клинический признак отличает болезнь Крона от неспецифического язвенного колита?**
- 542. Какое осложнение не встречается при неспецифическом язвенном колите?**
- 543. Какой из перечисленных рентгенологических симптомов не характерен для неспецифического язвенного колита?**
- 544. Какой отдел кишечника преимущественно поражается при неспецифическом язвенном колите?**
- 545. Для какого заболевания характерен синдром недостаточного опорожнения кишечника?**

- 546. При дивертикулах тонкой кишки рентгенологическими признаками дивертикулита является:**
- 547. Дивертикулы в двенадцатиперстной кишке чаще всего локализуются:**
- 548. Для язвы луковицы двенадцатиперстной кишки не характерно появление осложнений в виде:**
- 549. При дифференциальной диагностике дивертикула двенадцатиперстной кишки и пенетрирующей язвы в пользу дивертикула свидетельствуют все перечисленные рентгенологические симптомы, кроме:**
- 550. Для язв луковицы двенадцатиперстной кишки не характерны:**
- 551. Язвы двенадцатиперстной кишки наиболее часто локализуются:**
- 552. Рентгенологическими признаками «острой» язвы луковицы двенадцатиперстной кишки является все перечисленные, кроме одного:**
- 553. Какое исследование всегда подтверждает существование кровотокащей язвы?**
- 554. При каком осложнении язвенной болезни возникает напряжение передней брюшной стенки?**
- 555. Назовите структуры, окружающие средостение сверху:**
- 556. Среди пороков и аномалий развития двенадцатиперстной кишки реже всего встречаются:**
- 557. Наиболее информативной рентгенологической методикой диагностики хронического колита является:**

558. Толщина стенки толстой кишки рентгенологически может быть изучена с помощью:

559. Для выявления морфологических изменений толстой кишки наиболее эффективна:

560. Для декомпенсированного стеноза выхода из желудка характерна перистальтика:

561. Наиболее эффективной рентгенологической методикой для оценки моторноэвакуаторной функции толстой кишки является:

562. Полное опорожнение тонкой кишки от принятой перорально бариевой взвеси при нормальной ее функции наступает:

563. Для компенсированного стеноза выхода из желудка характерна перистальтика:

564. Наиболее информативным лучевым методом для дифференциации опухоли кишки является:

565. Основными рентгенсимптомами острой кишечной непроходимости есть:

566. При подозрении на острую кишечную непроходимость проводят:

567. Назовите основные методики исследования толстой кишки

568. Назовите методику подготовки пациента к ирригообследованию:

569. Назовите основные методики рентгенологического исследования тонкой кишки

570. Какие газы используют при исследовании кишечника как рентгеннегативные контрасты?

571. Назовите основной рентгенопозитивный контраст для исследования кишечника

572. К основным рентгенологическим симптомам инфильтративных форм рака желудка относится:

573. К основным рентгенологическим симптомам экзофитных форм рака желудка не относятся:

574. К основным рентгенологическим симптомам экзофитных форм рака желудка относятся:

575. К симптомам малигнизации полипа относится:

576. Для полипа желудка не характерный симптом:

577. Стеноз пилорического отдела желудка бывает:

578. К рентгенологическим симптомам пилоростеноза относится

579. Назовите рентгенологический симптом малигнизации язвы желудка

580. Назовите рентгенологический симптом пенетрации язвы желудка или двенадцатиперстной кишки

581. Назовите рентгенологический симптом перфорации язвы желудка или двенадцатиперстной кишки

582. К рентгенфункциональным симптомам язвы желудка не относится:

583. К рентгенморфологическим симптомам язвы желудка не относится:

584. К рентгенфункциональным симптомам хронических гастритов относятся:

- 585. Назовите основную цель исследования желудка при тугом наполнении котрастом:**
- 586. Назовите основные рентгенморфологические симптомы рубцового стеноза пищевода после ожога**
- 587. Назовите рентгенологические симптомы ожога пищевода в острой фазе**
- 588. Где наиболее часто локализуются инородные тела пищевода?**
- 589. Назовите основные рентгенморфологические симптомы инфильтративной формы рака пищевода:**
- 590. К основным рентгенморфологическим симптомам экзофитной формы рака пищевода не относится:**
- 591. Назовите рентгендиагностические симптомы язвы пищевода**
- 592. К рентгенологическим симптомам эзофагита относятся:**
- 593. Через какое время после ожога можно проводить рентгенологическое исследование пищевода?**
- 594. К рентгенологическим симптомам ожога пищевода в острой фазе относят:**
- 595. Назовите основную рентгенологическую методику для выявления рентгенконтрастных инородных тел пищевода**
- 596. Дивертикулы пищевода бывают:**
- 597. К рентгенморфологическим симптомам ахалазии пищевода относят:**
- 598. Назовите рентгенологические симптомы атрезии пищевода**

- 599. Назовите универсальное рентгенологическое контрастное вещество, используемое для исследования пищеварительного тракта**
- 600. Назовите основной лучевой метод исследования пищеварительного тракта**
- 601. Назовите структуры, окружающие средостение сзади:**
- 602. Одиночный дефект наполнения размером 2 см и более неправильной округлой формы, со структурной поверхностью и широким основанием - рентгенологические симптомы:**
- 603. Множественные дефекты наполнения 0,5-1 см в диаметре правильной округлой формы с четкими контурами и гладкой поверхностью на фоне неизменной слизистой - рентгенологические симптомы:**
- 604. Рак желудка чаще локализуется по:**
- 605. Рак желудка чаще локализуется в:**
- 606. Для пенетрации язвенной полости характерно:**
- 607. Для перфорации язвенной полости характерно:**
- 608. Для выявления свободного газа в брюшной полости при перфорации полого органа эффективно исследование больного в положении:**
- 609. Функциональная конвергенция наблюдается при язвенной болезни в период:**
- 610. Воспалительный вал вокруг язвенной полости наблюдается в период:**
- 611. При язвенной болезни язвенная полость в острый период:**

612. Для функциональных нарушений желудка по гипотоническому типу характерна эвакуация:

613. Для функциональных нарушений желудка по гипертоническому типу характерна эвакуация:

614. При функциональных нарушениях желудка по гипертоническому типу тонус его:

615. Для тугого выполнения выходного отдела желудка бариевой взвесью наиболее выгодное положение исследуемого:

616. Тугое заполнение свода желудка бариевой взвесью возможно в положении исследуемого:

617. Выраженное диффузное расширение пищевода характерно для:

618. Из доброкачественных опухолей пищевода чаще встречаются:

619. Для дивертикула пищевода, осложненного дивертикулитом характерно:

620. Для неосложненного тракционного дивертикула пищевода характерна форма:

621. Для неосложненного пульсионного дивертикула пищевода характерна форма:

622. Химические ожоги пищевода чаще поражают:

623. Варикозно расширенные вены в пищеводе чаще локализуется:

624. В острый период язвенной болезни с локализацией процесса в пищеводе характерны функциональные нарушения по:

625. Язвенные полости в пищеводе чаще локализуются в сегменте:
626. Для ахалазии характерно возникновение стойкого сужения просвета в области:
627. При ахалазии кардии характерно изменение просвета пищевода:
628. Стойкое сужение просвета пищевода характерно для:
629. Диффузное сужение просвета пищевода не характерно для:
630. Какую патологию в пищеводе помогает определить методика Ивановой-Подобед:
631. Четвертое физиологическое сужение пищевода располагается на уровне:
632. Третье физиологическое сужение пищевода располагается на уровне:
633. Второе физиологическое сужение пищевода располагается на уровне:
634. Первое физиологическое сужение пищевода располагается на уровне:
635. Условием для наилучшего выявления складок слизистой оболочки пищевода является исследование:
636. Максимальная ширина просвета пищевода при тугом заполнении:
637. Периферический рак от туберкулёмы отличается:
638. Центральный рак легкого наиболее часто сопровождается:
639. Периферический рак легкого исходит из бронхов:
640. Какая форма рака легкого встречается чаще?

- 641. Наиболее частые осложнения легких при пневмокониозе II-III степени:**
- 642. Какая форма туберкулеза сочетается с признаками хронического легочного сердца?**
- 643. Фиброзно-кавернозная форма туберкулеза отличается от цирротической наличием:**
- 644. Для какой клинической формы туберкулеза характерно наличие каверны, фиброза и полиморфных очагов?**
- 645. Для каких округлых образований легких наиболее характерно обызвествление?**
- 646. Рентгенологические признаки формирующейся полости распада:**
- 647. Кавернозный туберкулез наиболее часто развивается из:**
- 648. Какая клиническая форма туберкулеза наиболее часто осложняется распадом?**
- 649. Основной отличительный признак округлого инфильтрата от туберкулемы:**
- 650. Полиморфные очаги в легких наблюдаются при:**
- 651. При миллиарном туберкулезе очаги в легких начинают выявляться рентгенологически через:**
- 652. Двухсторонняя ограниченная диссеминация в верхних отделах легких наблюдается при:**
- 653. В каких сегментах легких дольше всего сохраняются очаги при обратном развитии милиарного туберкулеза?**

- 654. С каких отделов начинается рассасывание очагов при милиарном туберкулезе?**
- 655. Характерные размеры очага Гона:**
- 656. Для каких процессов наиболее характерно обызвествление внутригрудных лимфатических узлов?**
- 657. Одностороннее увеличение лимфатических узлов бронхо-легочной группы у подростка более характерно для:**
- 658. Какая форма первичного туберкулеза у детей встречается наиболее часто?**
- 659. Что не влияет на интенсивность тени очагов при туберкулезе?**
- 660. Для дифференциальной диагностики хронической пневмонии и рака легкого необходимо провести:**
- 661. При каких из перечисленных заболеваний развивается хроническая пневмония?**
- 662. Полости при хроническом абсцессе:**
- 663. Для острой абсцедирующей пневмонии характерно до прорыва гнойника:**
- 664. Острый абсцесс легкого формируется:**
- 665. Аспирационная пневмония у тонувших рентгенологически протекает по типу:**
- 666. Аспирационная пневмония при нарушении акта глотания локализуется преимущественно в:**
- 667. Рентгенологические признаки хронической абсцедирующей пневмонии:**

- 668. Рентгенологические признаки острой абсцедирующей пневмонии:**
- 669. Постлучевая пневмония возникает после:**
- 670. Для застойной пневмонии не характерно:**
- 671. Для стафилококковой и стрептококковой пневмонии не характерно:**
- 672. Для полостей распада стафилококковых и стрептококковых пневмоний не характерно:**
- 673. Характерный признак интерстициальной пневмонии:**
- 674. Наиболее частые сроки рассасывания острой пневмонии:**
- 675. При неосложненной долевой пневмонии линейные просветления обусловлены:**
- 676. Для долевой пневмонии в фазе инфильтрации характерно затемнение:**
- 677. Что определяет понятие «перисциссурит»**
- 678. Какое осложнение не характерно для верхнедолевой крупозной пневмонии?**
- 679. Четкий контур затемнения при крупной пневмонии обусловлен:**
- 680. Основной отличительный признак бронхопневмонии от метастазов:**
- 681. Затемнение при бронхопневмонии:**
- 682. При каких из перечисленных заболеваний не развиваются бронхоэктазы?**
- 683. Рентгенологически для циротического туберкулеза легких не характерно:**

684. С какой формы туберкулеза чаще развивается фиброзно-кавернозный туберкулез
685. Неравномерное расширение бронхов IV-VII порядка наблюдается при:
686. Для выявления бронхоэктазов оптимальной методикой является:
687. При хроническом бронхите изменения мелких бронхов выявляются при:
688. Хронический бронхит характеризуется:
689. Смещение трахеи в сочетании с ее сдавлением свойственны:
690. Какая методика является оптимальной для выявления дивертикулов трахеи и бронхов?
691. Периферический рак от туберкулемы отличается:
692. «Культи» долевого бронха наблюдается при:
693. Дорожка к корню легкого наблюдается при:
694. Центральный рак легкого наиболее часто сопровождается:
695. Периферический рак легкого исходит из бронхов:
696. Какая форма рака легкого встречается чаще?
697. Наиболее частые осложнения легких при пневмокониозе II-III степени:
698. Какая форма туберкулеза сочетается с признаками хронического легочного сердца?
699. Назовите структуры, окружающие средостение спереди:

- 700. Фиброзно-кавернозная форма туберкулеза отличается от цирротической наличием:**
- 701. Для какой клинической формы туберкулеза характерно наличие каверны, фиброза и полиморфных очагов?**
- 702. Для каких округлых образований легких наиболее характерно обызвествление?**
- 703. Рентгенологические признаки формирующейся полости распада:**
- 704. Кавернозный туберкулез наиболее часто развивается из:**
- 705. Какая клиническая форма туберкулеза наиболее часто осложняется распадом?**
- 706. Основной отличительный признак округлого инфильтрата от туберкулемы:**
- 707. Полиморфные очаги в легких наблюдаются при:**
- 708. При милиарном туберкулезе очаги в легких начинают выявляться рентгенологически через:**
- 709. Двухсторонняя ограниченная диссеминация в верхних отделах легких наблюдается при:**
- 710. В каких сегментах легких дольше всего сохраняются очаги при обратном развитии милиарного туберкулеза?**
- 711. С каких отделов начинается рассасывание очагов при милиарном туберкулезе?**
- 712. Характерные размеры очага Гопа:**

713. Для каких процессов наиболее характерно обызвествление внутригрудных лимфатических узлов?

714. Одностороннее увеличение лимфатических узлов бронхо-легочной группы у подростка более характерно для:

715. Какая форма первичного туберкулеза у детей встречается наиболее часто?

716. Что не влияет на интенсивность тени очагов при туберкулезе?

717. Для дифференциальной диагностики хронической пневмонии и рака легкого необходимо провести:

718. При каких из перечисленных заболеваний развивается хроническая пневмония?

719. Полости при хроническом абсцессе:

720. Острый абсцесс легкого формируется:

721. Аспирационная пневмония у тонувших рентгенологически протекает по типу:

722. Аспирационная пневмония при нарушении акта глотания локализуется преимущественно в:

723. Рентгенологические признаки хронической абсцедирующей пневмонии:

724. Рентгенологические признаки острой абсцедирующей пневмонии:

725. Постлучевая пневмония возникает после:

726. Для застойной пневмонии не характерно:

727. Для стафилококковой и стрептококковой пневмонии не характерно:

728. Для полостей распада стафилококковых и стрептококковых пневмоний не характерно:

729. Характерный признак интерстициальной пневмонии:

730. Наиболее частые сроки рассасывания острой пневмонии:

731. При неосложненной долевой пневмонии линейные просветления обусловлены:

732. Для долевой пневмонии в фазе инфильтрации характерно затемнение:

733. Что определяет понятие «перисцисурит»

734. Какое осложнение не характерно для верхнедолевой крупозной пневмонии?

735. Четкий контур затемнения при крупной пневмонии обусловлен:

736. Основной отличительный признак бронхопневмонии от метастазов:

737. Затемнение при бронхопневмонии:

738. При каких из перечисленных заболеваний не развиваются бронхоэктазы?

739. Неравномерное расширение бронхов IV-VII порядка наблюдается при:

740. Для выявления бронхоэктазов оптимальной методикой является:

741. При хроническом бронхите изменения мелких бронхов выявляются при:

742. Хронический бронхит характеризуется:

743. Смещение трахеи в сочетании с ее сдавлением свойственны:

744. Какая методика является оптимальной для выявления дивертикулов трахеи и бронхов?

745. Положение диафрагмы после пульмонэктомии:

746. В каком отделе аорты реже наблюдаются мешковидные аневризмы:

747. Степень и протяженность сужения аорты при коарктации наиболее достоверно определяется при:

748. При дифференциальной диагностике кист средостения и аневризмы аорты наиболее информативны:

749. При каких заболеваниях сердца и аорты может наблюдаться атрофия от давления в скелете грудной клетки?

750. Постинфарктная аневризма наиболее часто локализуется в:

751. При каком заболевании наблюдается обызвествление по краеобразующим контурам тени сердца?

752. При каких заболеваниях характерно отсутствие пульсации по краеобразующим контурам сердца:

753. При каком заболевании легких формируется хроническое «легочное» сердце?

754. Для «легочного сердца» не характерно:

755. Для какого заболевания свойственна быстрая динамика размеров сердечно-сосудистой тени?

756. При каком заболевании контуры тени сердца с обеих сторон могут быть неровными, зазубренными?

- 757. При каком заболевании наблюдается локальное выпячивание по контуру левого желудочка?**
- 758. Какой порок сердца сопровождается гипертрофией левого желудочка?**
- 759. Какое заболевание сопровождается обязательным увеличением левого предсердия?**
- 760. При каком заболевании наблюдается удлинение дуги левого желудочка?**
- 761. Стеноз левого атриовентрикулярного отверстия это:**
- 762. Какая методика является оптимальной для уточнения локализации сужения брюшной аорты и состояния коллатералей?**
- 763. Какая методика способствует распознаванию опухолей перикарда?**
- 764. Какая методика способствует распознаванию внутрисердечных опухолей?**
- 765. Оптимальная проекция для изучения грудной аорты:**
- 766. Оптимальная проекция для изучения правого желудочка:**
- 767. Какая проекция является оптимальной для изучения правого предсердия**
- 768. Какой отдел сердца является краеобразующим в прямой проекции по левому контуру в норме?**
- 769. Какой отдел сердца является краеобразующим в прямой проекции по правому контуру в норме?**
- 770. В отдаленные сроки после пульмонэктомии наблюдается:**
- 771. Инородным телам в бронхе не свойственно:**

772. Инородное тело чаще локализуется в следующих бронхах:

773. Разрыв легкого не сопровождается:

774. Для свежих травматических повреждений грудной клетки не характерны:

775. Смещение средостения в здоровую сторону наблюдается при:

776. Какое из перечисленных заболеваний наиболее часто приводит к образованию фиброторакса:

777. Выпотной плеврит характеризуется:

778. Изменение формы и интенсивности затемнения при изменениях положения больного наблюдается при:

779. В начальной фазе экссудативного плеврита наибольшее количество жидкости в плевральной полости накапливается в:

780. Бронхогенные кисты локализуются преимущественно:

781. Целомические кисты перикарда наиболее часто локализуются:

782. Какой признак не типичен для невриномы?

783. Наиболее высоким индексом малигнизации отличаются опухоли средостения:

784. Дольчатая структура образований в средостении наблюдается при:

785. Какие патологические образования средостения смещаются при кашле и глотании?

786. В верхнем отделе переднего средостения локализуются:

- 787. Смещение органов средостения в здоровую сторону наблюдается при:**
- 788. Признаки цирроза доли:**
- 789. Для эмфиземы легких не характерны:**
- 790. Бронхиальная астма рентгенологически проявляется:**
- 791. Эхинококкоз легких характеризуется:**
- 792. Доброкачественным внутрилегочным опухолям свойственна:**
- 793. Для доброкачественных опухолей легких характерны:**
- 794. Для аденомы бронха характерны:**
- 795. Увеличение парастернальных лимфатических узлов характерно для:**
- 796. Толчкообразное смещение органов средостения при глубоком вдохе в сторону поражения наблюдается при:**
- 797. Множественные округлые четко очерченные тени в нижних долях легких размером 1-3 см характерны для:**
- 798. Синдром кольцевидной тени характерный для заболеваний:**
- 799. Для дифференциальной диагностики округлых теней на рентгенограмме легких наименьшее значение имеют признаки:**
- 800. При дифференциальной диагностике округлых теней в пользу рака свидетельствует:**
- 801. Бронхографию проводят при подозрении на:**

802. Для массовых профилактических осмотров органов грудной полости используют:

803. Круглая тень с включениями высокой интенсивности в легких характерна для:

804. Круглая тень с включениями высокой интенсивности в легких характерна для:

805. Туберкулез легких чаще всего поражает:

806. Круглой называется тень в легких, размеры которой:

807. Круглая тень с «дорожкой к корню» в легких характерна для:

808. Основным лучевым методом исследования органов дыхания является:

809. Основные положения при исследовании сердца

810. Укажите сердечно-легочной коэффициент в норме

811. Назовите наиболее благоприятные положения для исследования всех отделов аорты

812. Назовите наиболее благоприятные положения для исследования левого желудочка

813. Признаки митральной конфигурации сердца:

814. Назовите дуги правого контура сердца в прямом положении

815. Каково соотношение длины тени сердца и сосудистого пучка в норме на прямом снимке

- 816. За какое время необходимо сделать серию снимков при ангиокардиографии?**
- 817. Назовите особенности легочного рисунка у детей**
- 818. Для туберкуломы легкого характерно:**
- 819. Назовите признаки каверны**
- 820. К функциональным признакам эмфиземы легких относится**
- 821. Назовите методики лучевого исследования, позволяющие изучить состояние стенки аневризмы грудного отдела аорты**
- 822. Назовите рентгенологический симптом атеросклероза аорты**
- 823. К рентгенологическим симптомам эксудативного перикардита не относится:**
- 824. Назовите рентгенологический симптом слипчивого перикардита**
- 825. К лучевым методикам для оценки миокардиального кровотока не относится:**
- 826. К методикам ультразвукового исследования сердца и сосудов не относится**
- 827. К методикам магнитно-резонансного исследования сосудов относится:**
- 828. К методикам магнитно-резонансного исследования сердца относится:**
- 829. Для какого порока сердца характерно присутствие в легочных полях линий Керли**
- 830. Назовите методику рентгенисследования, которая применяется с целью оценки состояния левого предсердия**

831. Укажите расстояние при проведении телерентгенографии:

832. Укажите ширину ретрокардиального пространства в норме в левой косой проекции на высоте глубокого вдоха

833. К вариантам конфигурации сердца не относится:

834. Какая из названных дуг сердечно-сосудистой тени не определяется по левому контуру в передней прямой проекции

835. По правому контуру сердечной тени в передней прямой проекции определяется:

836. Какая из названных проекций не относится к основным рентгенисследованиям сердца и крупных сосудов:

837. Назовите специальные рентгенологические методики с использованием рентгеноконтрастных веществ, которые не применяются для исследования органов средостения

838. Назовите патологические процессы, которые локализуются преимущественно в заднем отделе средостения

839. Назовите патологические процессы, которые локализуются преимущественно в нижнем этаже среднего отдела средостения

840. Назовите патологические процессы, которые локализуются преимущественно в нижнем этаже переднего отдела средостения

841. Назовите патологические процессы, которые не локализуются преимущественно в среднем этаже переднего отдела средостения

842. Назовите патологические процессы, которые не локализуются преимущественно в верхнем этаже переднего отдела средостения

843. Назовите структуры, окружающие средостение снизу:
844. Назовите рентгенологический симптом закрытой эхинококковой кисты
845. Назовите патологический процесс, который не дает синдром круглой тени в легочном поле
846. Какая форма рака легкого, согласно классификации Ю.М.Соколова, называется за автором раком Пенкоста
847. Назовите доброкачественную опухоль легких, которая наиболее часто встречается на периферии
848. Назовите доброкачественную опухоль легких, для которой характерна центральная локализация
849. Назовите рентгенологический синдром кавернозного туберкулеза легких
850. Назовите дифференциально-диагностические симптомы туберкулемы
851. К последствиям перенесенного инфильтративного туберкулеза не относится:
852. Где чаще всего локализуется туберкулезный инфильтрат?
853. Для какой формы туберкулеза характерно образование «штампованных» каверн?
854. Назовите рентгенологические симптомы хронического-гематогенно-диссеминированного туберкулеза легких
855. Назовите рентгенологические симптомы острого миллиарного туберкулеза легких

856. К осложнениям туберкулеза внутригрудных лимфатических узлов не относится:
857. Назовите рентгенологические симптомы первичного туберкулезного комплекса в стадии кальцинации
858. Назовите рентгенологические симптомы первичного туберкулезного комплекса в стадии организации и уплотнения
859. Назовите рентгенологические симптомы инфильтративно-пневмонической фазы первичного туберкулезного комплекса
860. При течении первичного туберкулезного комплекса отсутствует фаза:
861. Назовите рентгенологические симптомы, не характерные для развития пневмокониозов
862. К рентгеноморфологическим симптомам эмфиземы легких не относится:
863. Назовите рентгенологические симптомы тотального эксудативного плеврита
864. Назовите рентгенологический симптом хронического абсцесса
865. Назовите рентгенологический симптом острого абсцесса
866. Назовите рентгенологический симптом долевой пневмонии в стадии опеченения:
867. К патологически измененному легочному рисунку не относится:
868. Синдром затемнения в легочном поле не дает:
869. К синдрому затемнения в легочном поле не относится:

870. К рентгенологическим синдромам при заболеваниях легких не относится:

871. На каком уровне проходят границы между верхними и нижними долями обеих легких сзади?

872. На каком уровне проходит граница между средней и нижней долями правого легкого спереди

873. На каком уровне проходит граница между верхней и нижней долями левого легкого спереди

874. На каком уровне проходит граница между верхней и средней долями правого легкого спереди?

875. Что является патолого-анатомическим субстратом легочного рисунка?

876. Укажите уровень расположения корней легкого на рентгенограмме органов грудной полости в передней прямой проекции в норме

877. Укажите границы нижних отделов легких

878. Укажите границы верхних отделов легких

879. На каком уровне проводят две горизонтальные линии, которые разделяют легочные поля на отделы?

880. Как называется суммационная тень, расположенная между легочными полями?

881. Как называются симметричные участки рентгенограммы органов грудной полости, расположенные с обеих сторон от срединной тени?