

ЗАВАНТАЖЕНО З САЙТУ ТЕСТУВАННЯ.УКР

Загальний медичний профіль - база тестів 2012 року

Категорія: **Бази тестів українською мовою 2012 року**

Кількість запитань: **59**

1. Хвора Н., 38 років, скаржиться на збільшення та відчуття напруження нижньої губи та повік після прийому аспіріну з приводу головного болю. набряк зникає через деякий час після прийому антигістамінних препаратів. Який найбільш вірогідний діагноз?

*** А) набряк Квінке**

- В) Синдром Мелькерсона-Розенталя
- С) Рожисте запалення губ
- Д) Лімфа демотозний макрохейліт
- Е) Трофедема Мейжа

2. Хворий К., 30 років, звернувся у стомат. поліклініку з приводу видалення 36. З анамнезу виявлено, що пацієнт страждає гемофілією. Попереднє видалення супроводжувалося довготривалою кровотечею. Яка тактика лікаря.

*** А) Провести втручання в стаціонарі з до і післяопераційною підготовкою.**

- В) Необхідна передопераційна підготовка в умовах поліклініки
- С) Післяопераційне лікування не є необхідністю.
- Д) Провести видалення амбулаторно з подальшими рекомендаціями.
- Е) Провести видалення під наглядом гематолога в поліклініці

3. Хвора 42-х років скаржиться на набряк нижньої губи. набряк появився попереднього дня після прийому таблетки аспіріну. Об'єктивно: нижня губа значно набрякла, колір шкіри та слизової оболонки не змінився, пальпація губи безболісна, при натисканні на губу ямки не залишається. Визначте найбільш вірогідний діагноз.

*** А) Ангіоневротичний набряк Квінке.**

- В) Гландулярний макрохейліт.
- С) Синдром Мелькерсона-Розенталя.
- Д) Синдром Ашера
- Е) Синдром Мішера

4. Через 1 хвилину після проведення торусальної анестезії 2% розчином новокаїну 4 мл. з приводу видалення 17 зуба, хворий почав скаржитися на відчуття утруднення дихання. Під час огляду встановлено, що верхня та нижня губа набрякнули, слизова оболонка гортані і порожнини рота також набрякла, різко гіперемійована. Яке ускладнення виникло у цього хворого?

*** А) Набряк Квінке.**

- В) Інтоксикація анестетиком.
- С) Анафілактичний шок.
- Д) Колапс
- Е) Гостра легенева недостатність.

5. У рядового вогнепальне поранення в ділянці підборіддя, доставлений на МПП з дислокаційною асфіксією. Які заходи необхідно виконати для усунення асфіксії.

*** А) Прошити і вивести язик**

- В) Провести інтубацію трахеї
- С) Накласти трахеостому
- Д) Ввести повітрівід
- Е) Штучна вентиляція легень

6. Під час операції видалення зуба дівчинка 11 років поскаржилася на раптову слабкість, запаморочення. Об'єктивно: шкіра бліда, вкрита холодним потом. Дихання часте, пульс слабкий, артеріальний тиск знижений, руки холодні. Визначте імовірний діагноз.

*** А) Непритомність**

- В) Колапс
- С) Анафілактичний шок
- Д) Травматичний шок
- Е) Токсичний шок

7. У больного 30-ти лет при лечении пульпита 25 в качестве обезболивающего средства использовали 2% лидокаин. Через несколько минут после инъекции появилось “одеревенелость языка”, удушье, тяжесть за грудиной, сухой кашель, цианоз, общее беспокойство, судороги. АД 90/60 мм рт.ст. Поставьте наиболее вероятный диагноз.

*** А) Анафилактический шок**

В) Острая сердечная недостаточность

С) Обморок

Д) Отек Квинке

Е) Эпилепсия

8. Жінка 25-ти років поступила до відділення щелепно-лицевої хірургії через 2 години після дорожньо-транспортної пригоди. Шкіряні покрови бліді. На обличчі каплі поту. Дихання приривисте, затруднене. Пульс 120 уд/хвил., м'який. АТ 70/60 На обличчі в області щоки зліва - рана, проникаюча до порожнини рота. Під час транспортування жінка знаходилася в положенні на спині з запрокинутою головою. Який тип асфіксії розвивається у даної хворої?

*** А) Аспіраційна.**

В) Клапана.

С) Стенотична.

Д) Обтураційна.

Е) Дислокаційна.

9. Для анестезии при препарировании зуба был использован препарат из немаркированной ампулы. Во время препарирования пациент потерял сознание, были судороги, побледнения кожных покровов. АД 80/60 мм рт ст. Какую ошибку допустил врач?

*** А) Использовал неизвестное вещество**

- В) Не обработал место вкола
- С) Не сделал аллергическую пробу
- Д) Не выяснил анамнез жизни
- Е) Не имел права производить анестезию

10. После проведения инфильтрационной анестезии 2 % раствором лидокаина по поводу лечения пульпита 24 зуба мужчина 33 лет внезапно почувствовал себя плохо, появилось затрудненное дыхание, загрудинные боли. Объективно: резкая бледность кожных покровов, отечность губ и век, на лбу холодный пот, сознание затуманено. Дыхание поверхностное, частое, с хрипами. Пульс слабый, частый, тона сердца глухие. АД - 40/20 мм рт.ст. Каков наиболее вероятный диагноз?

*** А) Анафилактический шок.**

- В) Вазомоторный обморок.
- С) Инфаркт миокарда.
- Д) Приступ бронхиальной астмы.
- Е) Стенокардия напряжения.

11. Під час протезування зубів хвора г., 52 років, яка хворіє гіпертонічною хворобою, поскаржилась на головний біль. Лікар вирішив , що через 10-15 хв. закінчить примірку протезів. Попросив хвору потерпіти і продовжував маніпуляцію. Через деякий час у пацієнтки з'явилося запаморочення, нудота, ниючий біль за грудиною, погіршився зір. Інтенсивність головного болю зростала, з'явилося блювання. Пульс 64 уд./хв., ритмічний, напружений, артеріальний тиск 220/150 мм.рт.ст. Тони серця звучні, систолічний шум над верхівкою серця, акцент 2-го тону над аортою. Дихання везикулярне. Визначте діагноз у даному випадку:

*** А) Гіпертонічна криза**

- В) Стенокардія
- С) Інфаркт міокарда
- Д) Гіпертонічна хвороба 2 А ст.
- Е) Вада серця

12. У хворого 66-ти років, що хворіє на ІХС та атеросклероз, під час стоматологічного прийому, з'явився сильний за груднинний біль, з іррадіацією в ліву лопатку, який супроводжувався онімінням лівої руки. Хворий зблід, на лоб виступив піт. АТ- 140/90 мм рт.ст., пульс 75/хв, ритмічний. Біль не знімається валідолом, але став зменшуватись після прийому "нітрогліцерину". Приступ якої хвороби розвинувся у хворого?

*** А) Стенокардії.**

- В) Інфаркт міокарду.
- С) Гіпертонічний криз.
- Д) Тахікардія.
- Е) Пароксизмальна тахікардія

13. Хворому проводиться ортопедичне лікування включених дефектів зубних рядів верхньої та нижньої щелеп суцільнолитими комбінованими мостоподібними протезами. Супутнє захворювання: гіпертонічна хвороба. Який гемостатичний середник не варто використовувати при ретракції ясен?

*** А) норадреналін.**

- В) перекис водню.
- С) хлорид алюмінію.
- Д) сульфат заліза.
- Е) тетрагідрозолін.

14. У хворого 30 років різана рана бокової поверхні спинки язика внаслідок травми сепараційним диском. Через попадання крові у дихальні шляхи виникла асфіксія. Яка форма асфіксії виникла у хворого?

*** А) Аспіраційна**

- В) Стенотична
- С) Клапанна
- Д) Обтураційна
- Е) Дислокаційна

15. Під час проведення анестезії розчином новокаїну хворий відчув утруднення дихання, почервоніння шкіри змінилося блідістю, почав падати артеріальний тиск. Який стан найвірогідніше виник у пацієнта?

*** А) Анафілактичний шок**

- В) Клінічна смерть
- С) Колапс
- Д) Непритомність
- Е) Напад епілепсії

16. Загальний стан пораненого середньої важкості, свідомість збережена, шкіра бліда із синюшним відтінком, губи ціанотичні. Дихання часте, утруднене (28 за хв.). Є підозра на дислокаційну асфіксію. На якому етапі медичної евакуації пораненого язик прошивається шовковою лігатурою?

*** А) На МПБ [медичний пункт батальйону]**

В) На полі бою

С) На МПП [медичний пункт полку]

Д) В ОМедБ [окремий медичний батальйон]

Е) У спеціалізованому госпіталі

17. Під час препарування 47 зуба лікар сепараційним диском пошкодив бокову поверхню язика пацієнта. За кілька хвилин хворий з кровотечею потрапив до хірурга-стоматолога. Об'єктивно: На правій боковій поверхні язика - глибока різана рана близько 2-3 см, з глибини якої - кровотеча яскраво-червоною кров'ю. Якою має бути тактика лікаря у данному клінічному випадку?

*** А) Глибоке глухе прошивання рани**

В) Антисептична обробка рани та тампонада

С) Зупинка кровотечі шляхом накладання зажиму в рані

Д) Перев'язка зовнішньої сонної артерії

Е) Перев'язка язикової артерії у трикутнику М.І. Пирогова

18. У больной 32 лет во время операции удаления зуба возникла резкая общая слабость, бледность кожных покровов, холодный пот, слабый пульс, значительное снижение АД (диастолическое до 40 мм.рт.ст.). Какое осложнение возникло у больного.

*** А) Коллапс.**

В) Обморок.

С) Травматический шок.

Д) Анафилактический шок.

Е) Приступ стенокардии

19. У больного 40 лет после производства анестезии по поводу удаления 27 внезапно возник отек мягких тканей лица, языка, мягкого неба. Затем отек распространился на гортань, появилось удушье, дыхание стало шумным, голос хриплым. Больной стал беспокойным. Какое осложнение развилось у больного?

*** А) Отек Квинке**

- В) Коллапс.
- С) Анафилактический шок.
- Д) Крапивница.
- Е) Интоксикация анестетиком.

20. У больного К., 20 лет, во время введения новокаина появилась общая слабость, чувство стеснения за грудиной, бледность кожных покровов, холодный пот, затрудненное дыхание, тошнота, пульс частый, нитевидный. АД упало до 90/60 мм рт ст., через несколько минут появились судороги. Тоны сердца - прослушиваемые. Какое осложнение развилось у больного?

*** А) Анафилактический шок**

- В) Обморок.
- С) Отек Квинке.
- Д) Коллапс.
- Е) Интоксикация новокаином.

21. Хворий, 20 р., звернувся до хірурга-стоматолога з метою видалення коренів 47 зуба. Супутнє захворювання - гемофілія. В яких умовах необхідно провести видалення 47 зуба ?

*** А) Провести операцію в умовах стаціонару до- і післяопераційною підготовкою**

- В) Провести операцію в умовах стаціонару
- С) Умови не мають значення
- Д) Провести операцію амбулаторно
- Е) Провести операцію в умовах стаціонару з доопераційною підготовкою

22. Під час операції кістотомії хлопчик 9 років поскаржився на запаморочення, нудоту. Об'єктивно: шкіра бліда, вкрита холодним потом. Дихання часте, пульс слабкий, артеріальний тиск 80/45 мм рт.ст., руки холодні. Визначте імовірний діагноз.

*** А) Непритомність**

- В) Колапс
- С) Анафілактичний шок
- Д) Травматичний шок
- Е) Токсичний шок

23. У хворого М. 39 років під час видалення 48 зуба, виникли головокружіння, різка слабкість, загальна в'ялість. Свідомість збережена. Шкіра бліда, холодна на дотик, волога. Дихання поверхневе, тахікардія, пульс слабого наповнювання. Температура і артеріальний тиск зменшилися. Яке ускладнення можна запідозрити у хворого?

*** А) Колапс**

- В) Анафілактичний шок
- С) Непритомність
- Д) Травматичний шок
- Е) Набряк Квінке

24. Хворому 35 років, для лікування 26 була проведена провідникова анестезія. Через декілька хвилин після введення анестетика, хворий почав хвилюватися, часто дихати, вкрився рясним потом, почервоніння шкіри змінилося блідістю. Спостерігається різке падіння артеріального тиску. Який з перелічених препаратів застосовується при цьому стані в першу чергу?

*** А) Адреналін-гідрохлорид**

- В) Преднізолон
- С) Кальцій-хлорид
- Д) Фенкарол
- Е) Димедрол

25. При лечении пульпита 31 зуба у больной З., 27 лет, через несколько минут после аппликационного обезболивания аэрозолем 10% раствора лидокаина, появился значительный отек нижней губы и слизистой оболочки полости рта, затрудненное дыхание, головная боль. Какое осложнение возникло у пациентки?

*** А) Отек Квинке**

- В) Крапивница
- С) Химический ожог лидокаином
- Д) Спазм мышц гортани патогенной природы
- Е) Контактный аллергический хейлит

26. Під час лікування 16 зуба з приводу гострого дифузного пульпіту через декілька хвилин після проведеної провідникової анестезії хворий відчув неспокій, відчуття жару, болі в грудях. Об'єктивно: затруднене дихання, рясний піт, гіперемія шкірного покриву, блювота, втрата свідомості, судоми. Поставте діагноз:

*** А) Анафілактичний шок**

- В) Бронхіальна астма
- С) Колапс
- Д) Обморок
- Е) Гіпоглікемічна кома

27. Під час анестезії для операції видалення зуба дівчинка 12ти років поскаржилася на раптову слабкість, запаморочення, нудоту. Об'єктивно: шкіра бліда, вкрита холодним потом. Дихання часте, пульс слабкий, артеріальний тиск знижений (80/60 мм рт.ст.), руки холодні. Визначте імовірний діагноз

*** А) Непритомність**

- В) Колапс
- С) Анафілактичний шок
- Д) Токсичний шок
- Е) Травматичний шок

28. У дитини 7-ми років діагностовано хронічний періодонтит 64 та 85 зубів.

Дитина страждає на гемофілію А. Визначте лікувальну тактику

*** А) Видалення зубів в гематологічному відділенні, після відповідної підготовки**

В) Видалення зубів можливо як в стаціонарі, так і в амбулаторії

С) Видалення зубів в амбулаторних умовах, з подальшою тампонадою альвеол гемостатичною губкою

Д) Видалення зубів в щелепно-лицевому відділенні

Е) Видалення зубів протипоказане, через високу вірогідність кровотечі

29. После анестезии, через 2 мин. больной потерял сознание. Красная кайма губ и кожные покровы бледные, на поверхности капельки пота, ладони увлажнены. Какое состояние возникло у юноши?

*** А) Обморок.**

В) Коллапс.

С) Острый инфаркт миокарда.

Д) Интоксикация анестетиком.

Е) Анафилактический шок.

30. Пацієнту К., 47 р. під час ортопедичного лікування було проведено знеболення (Ultracain DS forte) . Через 20 хвилин після введення препарата в пацієнта з`явилась гіперемія шкіряних покрівів, головний біль відчуття запаморочення, збільшення частоти серцевих скорочень. Раніше неодноразово проводилося лікування зубів з використанням даного анестетика. Яке з ускладнень виникло у хворого ?

*** А) Підвищення АТ.**

В) Анафілактичний шок.

С) Обморок.

Д) Колапс.

Е) Приступ стенокардії.

31. Хвора В. 50 р., звернулась в ортопедичне відділення зі скаргами на дефект тв. тканин 21, 22 зубів. Показано виготовлення металокерамічних коронок на 21 і 22 зуби . Хвора відмічає алергічну реакцію при проведенні анестезії при попередньому відвідуванні стоматолога. Яка тактика лікаря в даній ситуації ?

*** А) Проведення алергологічних лабораторних проб.**

- В) Провести інфільтраційну анестезію анестетиком артикаїнового ряду.
- С) Провести скарифікаційну пробу на анестетик, яким буде проводитись знеболення.
- Д) Провести знеболення анестетиком ефірного ряду.
- Е) Провести підшкірну пробу на анестетик.

32. Хвора 42-х років звернулась до клініки ортопедичної стоматології з метою протезування. Об'єктивно: зубна формула 18 13 12 11 21 22 23 28 48 47 46 45 44 43 42 41 31 32 33 34 35 36 37 Прикус глибокий, клінічні коронки низькі, екватор не виражений. Хвора страждає епілептиформними приступами. Який вид протезування показано даній хворій?

*** А) Частковий знімний пластинковий протез з металевим базисом.**

- В) Мостоподібні протези.
- С) Частковий знімний пластинчастий пластмасовий протез з утримуючими кламерами.
- Д) Частковий знімний пластинчастий протез з опорно - утримуючими кламерами.
- Е) Бюгельний протез.

33. У дитини 12 р. під час прийому у стоматолога ватна турунда потрапила в дихальні шляхи : з'явилося шумне дихання зі свистом, різка задишка, виникла блідість в поєднанні з вираженим ціанозом, пітливість. Який невідкладний стан виник у даного пацієнта?

*** А) Обтураційна асфіксія**

- В) Дислокаційна асфіксія
- С) Клапанна асфіксія
- Д) Анафілактичний шок
- Е) Коллапс

34. У больного гемофилией 24 лет диагностировано обострение хронического пульпита 11 зуба. Выберите оптимальный метод лечения зуба в этом клиническом случае.

*** А) Девитальная экстирпация**

- В) Биологический метод лечения
- С) Витальная ампутация
- Д) Девитальная ампутация
- Е) Витальная экстирпация

35. Пацієнт М., 53 роки. Звернувся до стоматолога з метою ортопедичного лікування 27 зуба. Ще до підготовки місцевої анестезії хворому стало погано (заг. слабкість, блідість, посилене потіння) і він зомлів. Який діагноз на основі вказаних симптомів можна поставити цьому пацієнтові?

*** А) Непритомність**

- В) Колапс
- С) Анафілактичний шок
- Д) Травматичний шок
- Е) Кардіогенний шок

36. Пацієнт К., 25 років. Звернувся до стоматолога з метою ортопедичного лікування 17 зуба. Після проведення місцевої анестезії йому раптом стало погано (неспокій, загальна слабкість, сильний біль голови, нудота, непритомність, зіниці майже не реагують на світло, АТ різко знижується). Який діагноз у цьому випадку?

*** А) Анафілактичний шок**

- В) Кардіогенний шок
- С) Септичний шок
- Д) Травматичний шок
- Е) Інфекційно-токсичний шок

37. На приеме у стоматолога-ортопеда при получении оттиска у пациента С., возникли следующие симптомы: приступообразный кашель, цианоз, рвота, при вдохе слышны хлопки. Поставьте диагноз.

*** А) Аспирация инородного тела**

- В) Приступ бронхиальной астмы
- С) Острый бронхит
- Д) Трахеит
- Е) Повышенный рвотный рефлекс

38. При лечении у стоматолога пациент Д., стал жаловаться на слабость, тошноту, потемнение в глазах, затем потерял сознание. Поставьте диагноз.

*** А) Обморок**

- В) Шок
- С) Коллапс
- Д) Кома
- Е) Инсульт

39. При проведении стоматологом проводниковой анестезии, через 2 сек. У пациента возникает следующие симптомы: потеря сознания, судороги, зрачки расширены, реакции зрачков на свет нет, снижение артериального давления, дыхание затруднено, тоны сердца пропадают. Поставьте диагноз.

*** А) Анафилактический шок**

- В) Обморок
- С) Коллапс
- Д) Инфаркт миокарда
- Е) Инсульт

40. На приєме у врача-ортопеда во время препарирования зуба у пациента начался приступ эпилепсии. Приступ был купирован. Какую ошибку допустил врач?

*** А) Не полностью собрал анамнез**

- В) Не применил один из видов местного обезболивания
- С) Нарушил правила препарирования
- Д) Не провел психологическую подготовку больного
- Е) Не использовал общего обезболивания

41. Хворий Д., 25 років, отримав політравму у результаті ДТП. Під час огляду діагностовано дислокація асфіксія. Перша допомога при дислокаційній асфіксії:

*** А) фіксація язика.**

- В) Трахеотомія.
- С) Проведення штучної вентиляції легень.
- Д) Медикаментозне усунення стенозу гортані.
- Е) Видалення слизу і сторонніх тіл з верхніх дихальних шляхів.

42. Хлопчик 13ти років потребує видалення 46 зуба з приводу хронічного гранульоматозного періодонтиту. Супутнє захворювання у дитини - цукровий діабет. Оберіть доцільні метод знеболення та анестетик:

*** А) Мандибулярна анестезія 3% розчином Scandonest;**

- В) Внутрішньовенний наркоз.
- С) Інгаляційний наркоз;
- Д) Інфільтраційна анестезія 2% розчином лідокаїну;
- Е) Мандибулярна анестезія Ultracain DS forte (вміст адреналіну 1: 100 000);

43. У хлопчика 7ми років діагностовано хронічний періодонтит 64 та 85 зубів. Дитина страждає на гемофілію А. Визначте лікувальну тактику:

*** А) Видалення можливе в гематологічному відділенні, після проведення відповідної підготовки.**

В) Видалення можливе як в щелепно-лицевому стаціонарі, так і в амбулаторії після відповідної підготовки;

С) Видалення зубів можливе в амбулаторних умовах, після видалення слід тампонувати альвеоли гемостатичною губкою;

Д) Видалення зубів можливе в щелепно-лицевому відділенні;

Е) Видалення зубів протипоказане через високу вірогідність кровотечі;

44. Під час операції видалення ретенційної кісти нижньої губи хлопчик 14ти років поскаржився на раптову слабкість, запаморочення, нудоту. Об'єктивно: шкіра бліда, вкрита холодним потом. Дихання часте, пульс слабкий, артеріальний тиск знижений (90/60 мм рт.ст.), руки холодні. Визначте імовірний діагноз.

*** А) Непритомність**

В) Токсичний шок.

С) Травматичний шок;

Д) Анафілактичний шок ;

Е) Колапс;

45. Під час виконання мандибулярної анестезії 4% розчином Ultracain-forte дівчинка 13ти років поскаржилася на раптову слабкість, утруднене дихання, нудоту, страх. Об'єктивно: шкіра бліда, вкрита холодним потом, на шкірі обличчя та шиї виявляються плями гіперемії. Дихання часте, пульс слабкий, артеріальний тиск знижений (60/40 мм рт.ст.), руки холодні. Визначте імовірний діагноз.

*** А) Анафілактичний шок ;**

В) Токсичний шок.

С) Непритомність;

Д) Травматичний шок;

Е) Колапс;

46. Хлопчику 9ти років встановлено діагноз - повний вивих 21 зуба. Дитина страждає на цукровий діабет; після травми минуло 20 годин. Оберіть лікувальну тактику:

*** А) Зуб не підлягає реплантації і збереженню;**

В) Реплантація, фіксація зуба з наступним спостереженням.

С) Резекція верхівки кореня, реплантація, фіксація зуба;

Д) Пломбування кореневого каналу амальгамою, реплантація, фіксація зуба;

Е) Пломбування кореневого каналу пастою, яка містить кальцій, реплантація, фіксація зуба;

47. Хворого С., 32 років, направили з терапевтичного відділення з метою видалення кореня 35 зубу з приводу загострення хронічного періодонтиту. Через 2 - 3 хвилини після проведення мандибулярної анестезії хворий почав скаржитися на відчуття здавлення в горлі, голос став сиплим, утруднилося дихання, з'явився набряк язика, нижньої губи, тканин дна порожнини рота. Про яке ускладнення може іти мова?

*** А) Ангіоневротичний набряк Квінке**

- В) Істерія
- С) Постін'єкційна гематома
- Д) Напад бронхіальної астми
- Е) Інтоксикація анестетиком

48. Хворий К., 35 років, звернувся зі скаргами на значне збільшення об'єму верхньої губи та повік очей, яке з'явилося на протязі кількох хвилин (в період прибирання будинку з застосуванням дезінфікуючих засобів). Об'єктивно: набряк тканин верхньої частини обличчя, верхньої губи і повік очей. Пальпація безболісна. Для якого захворювання характерна вище означена симптоматика і клініка?

*** А) Ангіоневротичний набряк Квінке**

- В) Макрохейліт
- С) Лімфедема
- Д) Синдром Мелькерсона-Розенталя
- Е) Гландулярний хейлит

49. Хворого В., 56 років, з шизофренією в стадії загострення направлено в щелепно-лицьовий стаціонар з діагнозом: перелом нижньої щелепи, в ділянці 34—35 зубів зі зміщенням відламків. Який метод лікування йому показаний?

*** А) Остеосинтез**

- В) Однощелепна гладенька шина-скоба
- С) Двощелепна назубна шина
- Д) Шина Вебера
- Е) Шина Ванкевич

50. Больной В., 25 лет, ВИЧ-инфицирован, обратился в клинику ортопедической стоматологии с целью протезирования. Ваша тактика в отношении асептики и антисептики?

*** А) По схеме**

- В) Кварцевать оттиски
- С) Не принимать
- Д) Обычный прием
- Е) Работать в перчатках и маске

51. Больная 35 лет обратилась к врачу-ортопеду с целью протезирования. Во время препарирования твердых тканей зубов под несъемные конструкции протезов ей была проведена проводниковая анестезия. После окончания введения обезболивающего препарата у больной появилось чувство страха, беспокойство с покалыванием и зудом кожи лица, рук, шумом в ушах, головной болью, потливостью, покраснением лица, с последующей резкой бледностью, судорогами, потерей сознания, тяжестью и болью за грудиной, тахикардией, снижением артериального давления, рвотой. Предполагаемый диагноз:

*** А) Анафилактический шок**

- В) Отек Квинке
- С) Интоксикация
- Д) Обморок
- Е) Гипертонический криз

52. Больной 37 лет обратился к врачу-ортопеду с целью протезирования. Во время препарирования твердых тканей зубов под несъемные конструкции протезов ему была проведена проводниковая анестезия. Во время введения препарата у больного появился холодный пот, внезапно наступающая бледность и цианоз, пульс стал нитевидным. Больной сохранял сознание, но стал расслабленным и апатичным. Предполагаемый диагноз:

*** А) Коллапс**

- В) Анафилактический шок
- С) Интоксикация
- Д) Обморок
- Е) Гипертонический криз

53. Хвора С., 20 років на 8 - му місяці вагітності скаржиться на естетичний недолік, порушення мови в зв'язку з відсутністю зуба у фронтальній ділянці верхньої щелепи. Об'єктивно: відсутній 12. Зуби 11, 13 інтактні, стійкі, анатомічна форма збережена. Прикус ортогнатичний. Якій конструкції протеза слід надати перевагу ?

*** А) Імедіат- протез**

- В) Пластмасовому мостоподібному протезу
- С) Металокерамічному мостоподібному протезу
- Д) Металопластмасовому мостоподібному протезу
- Е) Імплантату з керамічною короною

54. Під час видалення 26 зуба у пацієнта Р., 34 років, з'явилися шум у вухах, побіління шкіри, слабкість. Діагностовано запаморочення. Яка тактика найбільш доцільна під час надання невідкладної допомоги?

*** А) Надати хворому положення Тренделенбурга**

- В) Ввести внутрішньом'язово 50% анальгін.
- С) Ввести внутрішньовенно 0,1% адреналін.
- Д) Ввести підшкірно кордіамін.
- Е) Ввести внутрішньовенно преднізолон.

55. Больной М. 23 лет во время препарирования зубов внезапно потерял сознание. Наблюдалось резкое, побледнение кожных покровов, холодный пот, похолодание конечностей, значительное урежение пульса и дыхания, снижение артериального давления. Такое состояние продолжалось около 2 мин. Какое неоложное состояние развилось в данном случае?

*** А) Обморок**

В) Шок

С) Коллапс

Д) Стенокардия

Е) Инфаркт миокарда

56. Больной 40 лет после проведенной анестезии отметил появление резкой слабости, тошноты: болей за грудиной, иррадиирующих в лопаточную область и в левую руку, учащение сердцебиения. Троекратное применение нитроглицерина не дало положительного эффекта. Объективно: больной, в сознании, вял, лоб покрыт холодным потом, отмечается бледность кожных покровов, АД 100/60 мм.рт.ст., тоны сердца глухие, пульс слабого наполнения, нитевидный аритмичен. Какое состояние развивается у больного?

*** А) Инфаркт миокарда**

В) Кардиогенная форма анафилактического шока

С) Приступ стенокардии

Д) Обострение язвенной болезни желудка

Е) Острый панкреатит

57. Больной, 40 лет после проведенной анестезии отметил появление резкой слабости, учащение сердцебиения. Объективно: Больной, в сознании, вял, кожные покровы резко гиперемированы, отмечается резкая головная боль, АД 180/100 мм.рт.ст., тоны сердца глухие. Какое состояние развивается у больного?

*** А) Гипертонический криз**

- В) Кардиогенная форма анафилактического шока
- С) Приступ стенокардии
- Д) Кардиальные боли
- Е) Инфаркт миокарда

58. После проведения торусальной анестезии для препарирования зубов под металлокерамические коронки раствором лидокаина у пациента наступила слабость, усиливающаяся со временем, чувство сдавления за грудиной, АД 60/20 , кожные покровы бледные, начались боли в животе, тошнота, рвота, пульс частый, нитевидный. Поставьте диагноз.

*** А) Анафилактический шок**

- В) Коллапс
- С) Отек Квинке
- Д) Обморок
- Е) Гипертонический криз

59. Больная А., 56 лет, явилась с целью санации полости рта. Поставлен диагноз: хронический фиброзный пульпит 36 зуба. Проведена торусальная анестезия Sol. Ubistesini 4% - 1,8 ml. Через 10 минут больная пожаловалась на онемение руки и ноги слева, подергивание левого глаза, боль в голове. АД 200/120 мм рт. ст. Какие препараты нужно ввести незамедлительно?

*** А) Гипотензивные**

В) Антигистаминные

С) Гормональные

Д) Сосудосуживающие

Е) Ингибиторы протеолиза