

ЗАВАНТАЖЕНО З САЙТУ ТЕСТУВАННЯ.УКР

Фармакологія - база тестів 2014 року

Категорія: **Бази тестів українською мовою 2014 року**

Кількість запитань: **176**

1. Проконсультуйте лікаря-інтерна, чому одночасно з препаратами заліза не доцільно застосовувати антацидні засоби?

*** А) Погіршується всмоктування препаратів заліза**

- В) Збільшується зв'язування з білками крові
- С) Порушується депонування заліза в організмі
- Д) Підсилюється інтоксикація препаратами заліза
- Е) Прискорюється елімінація препаратів заліза

2. Лікар - провізору:" Нагадайте мені, колего, як називають явище, коли один препарат підсилює дію іншого".

*** А) Потенціювання**

- В) Антагонізм
- С) Сенсибілізація
- Д) Абстиненція
- Е) Тахіфілаксія

3. З якою метою хворому із стенокардією призначили ацетилсаліцилову кислоту ?

*** А) дезагрегантної дії**

- В) пригнічення фібрінолітичної активності крові
- С) агрегантної дії
- Д) протизапальної дії
- Е) підвищення фібрінолітичної активності крові

4. Хворий 32-х років приймає протитуберкульозні препарати. Через деякий час він помітив, що сеча набула червоно-оранжевого кольору. Який препарат сприяв появі цього явища?

*** А) рифампіцин**

- В) ізоніазид
- С) піразінамід
- Д) етамбутол
- Е) стрептоміцину сульфат

5. При інфаркті міокарду була проведена нейролептанальгезія. Який препарат з групи нейролептиків найчастіше застосовується спільно з фентанілом?

*** А) Дроперидол**

- В) Етаперазин
- С) Левомепромазин
- Д) Клозапін
- Е) сульпірид

6. У хворого 55 років на 4-й день лікування індометацином виникла шлункова кровотеча в результаті виразки слизової оболонки шлунка. З чим пов'язана ульцерогенна дія препарату?

*** А) Зменшення активності циклооксигенази-1 (ЦОГ-1)**

- В) Зменшення активності циклооксигенази-2 (ЦОГ-2)
- С) Зменшення активності ліпооксигенази (ЛОГ)
- Д) Зменшення активності тромбосансинтетази
- Е) Зменшення активності простаглінінсинтетази

7. У хворої 45 років, котра протягом двох тижнів приймає неодикумарін з приводу тромбофлебіту, при черговому обстеженні в крові виявлено зниження протромбіну, в сечі спостерігається мікрогематурія. Який лікарській засіб необхідно застосувати в якості антагоністу неодикумаріну?

*** А) Вікасол**

- В) Протаміну сульфат
- С) Натрію цитрат
- Д) Гепарин
- Е) Кислота амінокапронова

8. До приймального відділення був доставлений хворий зі скаргами на утруднене дихання, слинотечу, спастичні болі у животі, діарею, запаморочення, зниження гостроти зору. Був встановлений діагноз: отруєння фосфорорганічними сполуками. Які препарати доцільно включити до складу патогенетичної терапії?

*** А) Атропіну сульфат та дипіроксим**

- В) Тіосульфат натрію та бемеград
- С) Тетацин-кальцій та унітіол
- Д) Налорфіну гідрохлорид та бемеград
- Е) Глюкозу та бемеград

9. До приймального відділення доставлений хворий зі скаргами на сухість в роті, фотофобію та порушення зору. Шкіра гіперемійована, суха, зіниці розширені, тахікардія. Був встановлений діагноз: отруєння алкалоїдами красавки. Який з лікарських засобів доцільно застосувати?

*** А) Прозерин**

- В) Ацеклідін
- С) Пілокарпін
- Д) Армін
- Е) Дипіроксим

10. Хворому з гіпертонічною хворобою призначено каптоприл. Який механізм дії даного препарату?

*** А) Пригнічення активності ангіотензинперетворюючого ферменту**

- В) Блокада бета-адренорецепторів
- С) Блокада альфа-адренорецепторів
- Д) Блокада рецепторів ангіотензину II
- Е) Блокада повільних кальцієвих каналів

11. Хворому з гіпертензивною кризою ввели внутрішньовенно клофелін. Який механізм лежить в основі антигіпертензивної дії клофеліну?

*** А) Стимуляція центральних пресинаптичних альфа-2-адренорецепторів**

- В) Блокада периферичних альфа-1-адренорецепторів
- С) Блокада бета-адренорецепторів
- Д) Блокада Н-холінорецепторів вегетативних гангліїв
- Е) Пряма міотропна дія на судини

12. Хворому з виразковою хворобою призначено ранітидин. Кислотність шлункового соку значно знизилась. Який механізм лежить в основі дії даного препарату?

*** А) Блокада H2-гістамінових рецепторів**

- В) Блокада H1-гістамінових рецепторів
- С) Блокада М-холінорецепторів
- Д) Пригнічення активності H⁺K⁺АТФ-ази
- Е) Блокада Н-холінорецепторів вегетативних гангліїв

13. Хворому з ознаками інтоксикації серцевими глікозидами призначено унітіол. Який механізм лікувальної дії препарату?

*** А) Реактивація мембранної K^+, Na^+ -АТФ-ази**

- В) Зв'язування іонізованого Ca^{2+}
- С) Збільшення проникнення K^+ в міокардіоцити
- Д) Збільшення вмісту Na^+ в міокарді
- Е) Індукція метаболізму серцевих глікозидів

14. Для зняття марення і галюцинацій у хворої на шизофренію лікар використав аміназин. Який механізм антипсихотичної дії препарату?

*** А) Інгібування дофамінергічних процесів в ЦНС**

- В) Стимуляція адренергічних і дофамінергічних процесів в ЦНС
- С) Стимуляція холінергічних процесів в ЦНС
- Д) Інгібування холінергічних процесів в ЦНС
- Е) Інгібування адренергічних процесів в ЦНС

15. У чоловіка 52-х років діагностовано системний амебіаз з ураженням кишечника, печінки, легень. Який препарат слід призначити?

*** А) Метронідазол**

- В) Хініофон
- С) Тетрациклін
- Д) Хінгамін
- Е) Фталазол

16. Внаслідок інфаркту міокарда у хворого виникла шлуночкова аритмія. Серцевий ритм нормалізувався після введення протиаритмічного засобу з місцевоанестезуючою активністю. Який препарат введено?

*** А) Лідокаїн**

- В) Новокаїнамід
- С) Верапаміл
- Д) Панангін
- Е) Пропранолол

17. У приймальне відділення поступив у важкому стані чоловік 38 років, який отруївся сулемою. Який антидот треба негайно ввести хворому?

*** А) Унітіол**

- В) Дипіроксим
- С) Атропін
- Д) Налорфін
- Е) Ізонітрозин

18. Жінка 33-х років, яка тривалий час лікується з приводу хронічного поліартриту, скаржиться на підвищення артеріального тиску, зміни розподілу жирової тканини, порушення менструального циклу. Який препарат приймає хвора?

*** А) Преднізолон**

- В) Індометацин
- С) Бутадіон
- Д) Синафлан
- Е) Діклофенак натрію

19. Вагітна жінка (20 тижнів вагітності) захворіла на пневмонію. Який хіміотерапевтичний препарат можна порадити її лікарю для призначення хворій, без загрози для розвитку плода?

*** А) Бензілпеніцилін**

В) Гентаміцин

С) Сульфален

Д) Левоміцетин

Е) Офлоксацин

20. При проведенні оперативного втручання в якості міорелаксantu було застосовано тубокурарину хлорид. Який засіб-антагоніст слід ввести хворому для відновлення у нього самостійного дихання?

*** А) Прозерин**

В) Дитилін

С) Цитітон

Д) Етимізол

Е) Бензогексоній

21. Хворому з алергічним дерматитом був призначений супрастин. До якої групи антиалергічних засобів належить цей препарат ?

*** А) Блокатори Н 1 гістамінових рецепторів**

В) Глюкокортикостероїди

С) Інгібітори дегрануляції тучних клітин

Д) Антагоністи лейкотрієнових рецепторів

Е) Блокатори Н 2 гістамінових рецепторів

22. Дитина випадково випила із флакона розчин, який її бабуся використовувала для лікування глаукоми. Виявилось, що це був пілокарпіну гідрохлорид. Який лікарський засіб можна застосувати в якості атидоту?

*** А) Атропін**

- В) Карбахолін
- С) Ацеклідін
- Д) Бензогексоній
- Е) Пентамін

23. Жінка, яка страждає на невроз, погано спить. Якому з перерахованих засобів слід віддати перевагу для лікування безсоння?

*** А) Нітразепам**

- В) Фенобарбітал
- С) Етамінал-натрій
- Д) Бромізовал
- Е) Настоянка валеріани

24. У наркоманів після закінчення дії наркотику виникають тяжкі психічні, неврологічні і соматичні порушення. Як називається цей симптомокомплекс?

*** А) Абстинентний синдром**

- В) Тахіфілаксія
- С) Сенсibiliзація
- Д) Кумуляція
- Е) Толерантність

25. С какой группой диуретиков нельзя одновременно назначать гипотензивные средства, относящиеся к группе ингибиторов ангиотензин превращающего фермента?

*** А) Калий сберегающие**

- В) Тиазидные
- С) Петлевые
- Д) Ксантины
- Е) Осмотические

26. В аптеку звернувся хворий, який протягом місяця приймав феназепам. Хворий наполягав на придбанні ще двох упаковок цього препарату, пояснюючи тим, що він без діазепаму погано себе почуває. Що лежить в основі побічної дії препарату, що розвинулася у хворого?

*** А) лікова залежність**

- В) ідіосинкразія
- С) синдром післядії
- Д) кумуляція
- Е) толерантність

27. Хворому на алергічний риніт призначили ефедрин в краплях для носа. Закапування препарату в ніс значно покращило стан хворого, що спонукало його до застосування цього засобу кожні 2 години, але ефект був відсутнім. Що лежить в основі неефективності ефедрину?

*** А) Тахіфілаксія**

- В) Лікарська залежність
- С) Ідіосинкразія
- Д) Алергія
- Е) Кумуляція

28. Хворому з гіпертензивним кризом в комплексному лікуванні необхідно призначити сечогінний засіб. Порадьте лікарю-інтерну, який препарат необхідно ввести хворому?

*** А) Фуросемід**

- В) Діакарб
- С) Спіронолактон
- Д) Тріамтерен
- Е) Амілорид

29. Який протипротозойний засіб можна порекомендувати жінці, яка хворіє на трихомоніаз?

*** А) Метронідазол**

- В) Примахін
- С) Хлоридин
- Д) Солюсурьмін
- Е) Хініофон

30. Порекомендуйте хворому на хронічний бронхіт, який відхаркувальний засіб можна придбати в аптеці для полегшення відходження густого та в'язкого харкотиння.

*** А) Амброксол**

- В) Фалімінт
- С) Глаувент
- Д) Лібексин
- Е) Сальбутамол

31. Виберіть антисептик із групи галогеномісних сполук, який можна покласти в аптечку для дитини, що збирається у літній табір:

*** А) Розчин йоду спиртовий**

- В) Брильянтовий зелений
- С) Міді сульфат
- Д) Метиленовий синій
- Е) Розчин формальдегіду

32. Який місцевий анестетик краще придбати в аптеці для знеболення при екстракції зуба?

*** А) Лідокаїн**

- В) Дикаїн
- С) Анестезин
- Д) Совкаїн
- Е) Кокаїн

33. До аптеки надійшов препарат нового покоління нестероїдних протизапальних засобів "мелоксикам". Вкажіть, якими перевагами володіє даний препарат, як переважний блокатор циклооксигенази-2, порівняно з іншими нестероїдними протизапальними засобами:

*** А) Мінімальна побічна дія на травний канал**

- В) Виразний міоспазмолітичний ефект
- С) Наявність інтерфероногенних властивостей
- Д) Мінімальна побічна дія на кровотворення
- Е) Значне пригнічення активності протеаз

34. При відсутності в аптеці фенотеролу в інгаляціях яким препаратом із групи бронхоселективних бета-2-адреноміметиків можна його замінити?

*** А) Сальбутамолом**

- В) Ізадрин
- С) Метацином
- Д) Ефедрин
- Е) Еуфіліном

35. Проконсультуйте лікаря, яким найбільш близьким за дією препаратом можна замінити відсутній в аптеці ацетилцистеїн.

*** А) Амброксол**

- В) Натрію хлорид
- С) Кодеїну фосфат
- Д) Лібексин
- Е) Натрію гідрокарбонат

36. Дайте відповідь на запитання терапевта - який сучасний антигістамінний препарат краще застосувати людям, робота, який потребує швидкої реакції на оточуюче?

*** А) Лоратадин**

- В) Димедрол
- С) Дипразин
- Д) Супрастин
- Е) Піпольфен

37. При відсутності в аптеці строфантину яким препаратом із групи серцевих глікозидів можна його замінити?

*** А) Корглікон**

- В) Ізоланід
- С) Дигітоксин
- Д) Адонізид
- Е) Целанід

38. Назвіть найбільш типовий симптом отруєння атропіном.

*** А) Розширення зіниць, що не реагують на світло.**

- В) Звуження зіниць, які не реагують на світло.
- С) Підвищене потововиділення.
- Д) Брадикардія.
- Е) Зниження внутрішньоочного тиску.

39. Хворий звернувся до лікаря офтальмолога із скаргами на зниження нічного зору, сухість рогівки. Який препарат призначив лікар?

*** А) Ретинол**

- В) Піридоксин
- С) Токоферол
- Д) Аскорбінова кислота
- Е) Кокарбоксилаза

40. У хворого на гіпертонічну хворобу підвищений рівень реніну в плазмі крові. Якій з перерахованих фармакологічних груп треба віддати перевагу для лікування даного хворого?

*** А) Інгібітори АПФ**

- В) Альфа-адреноблокатори
- С) Діуретики
- Д) Антагоністи іонів кальцію
- Е) Симпатолітики

41. Хворому на виразкову хворобу шлунку призначили альмагель. Яка з фармакологічних властивостей препарату використовується для лікування цієї патології?

*** А) Нейтралізація НСІ**

- В) Місцевоанестезуюча дія
- С) Блокада H₂-гістамінорецепторів
- Д) Блокада М-холінорецепторів
- Е) Протизапальна дія

42. При тривалому застосуванні фенобарбіталу у хворого з епілепсією розвинулася толерантність до препарату. Що лежить в основі розвитку даного явища?

*** А) Прискорення біотрансформації**

- В) Послаблення процесу всмоктування
- С) Підвищення чутливості рецепторів
- Д) Пригнічення біотрансформації
- Е) Накопичення речовини в організмі

43. Хворому на депресію лікар призначив препарат із групи трициклічних антидепресантів. Назвіть препарат.

*** А) амітриптилін**

В) феназепам

С) дроперидол

Д) аміналон

Е) кофеїн

44. Хвора на гіпертонічну хворобу звернулася до лікаря зі скаргою на сухий кашель, що виник на фоні лікування. Який гіпотензивний препарат вона використовувала?

*** А) лізиноприл**

В) атенолол

С) ніфедипін

Д) фуросемід

Е) дихлотіазид

45. В аптеку звернувся хворий, якому з приводу виразкової хвороби лікар призначив фамотидин. Поясніть, який механізм лежить в основі дії даного препарату?

*** А) Блокада H₂-гістамінових рецепторів**

В) Блокада H₁-гістамінових рецепторів

С) Блокада М-холінорецепторів

Д) Пригнічення активності H⁺K⁺АТФ-ази

Е) Блокада холінорецепторів симпатичних гангліїв

46. Що відображає такий фармакокінетичний параметр лікарських засобів як період напіввиведення ($T_{1/2}$)?

*** А) Проміжок часу, за який концентрація препарату в плазмі крові зменшується на 50 %**

- В) Об'єм плазми крові, який звільняється від препарату за одиницю часу
- С) Час повного виведення препарату з організму
- Д) Швидкість виведення препарату через нирки
- Е) Співвідношення між швидкістю виведення препарату та його концентрацією у плазмі крові

47. Зменшення всмоктування препаратів групи тетрацикліну при їх одночасному застосуванні з антацидними засобами є прикладом:

*** А) Фармакокінетичної несумісності**

- В) Фармацевтичної несумісності
- С) Фармакодинамічної несумісності
- Д) Синергізму препаратів
- Е) Функціонального антагонізму препаратів

48. Больному эпилепсией назначен диуретический препарат. Определите этот препарат.

*** А) Диакарб**

- В) Верошпирон
- С) Фуросемид
- Д) Гипотиазид
- Е) Маннит

49. Помогите студенту медицинского вуза выбрать адренергический препарат для лечения анафилактического шока.

*** А) Адреналина гидрохлорид**

- В) Клофелин
- С) Галазолин
- Д) Фенотерол
- Е) Изадрин

50. Дайте ответ посетителю Вашей аптеки, какой побочный эффект характерен для каптоприла?

*** А) сухой кашель**

- В) повышение артериального давления
- С) гипергликемия
- Д) нарушения ритма сердца
- Е) гіпокаліємія

51. Проконсультуйте, який препарат з групи антигістамінних засобів не проявляє снодійної та седативної дії.

*** А) лоратидин**

- В) дімедрол
- С) дипразин
- Д) супрастин
- Е) тавегіл

52. Дайте відповідь провізору-інтерну: який з препаратів відноситься до препаратів задньої долі гіпофізу ?

*** А) Окситоцин**

- В) Інсулін
- С) Преднізолон
- Д) Тіреоїдин
- Е) Естрон

53. Допоможіть лікарю вибрати препарат для замісної терапії після видалення щитовидної залози.

*** А) L-тироксин**

- В) Інсулін
- С) Преднізолон
- Д) Паратиреоїдин
- Е) Мерказоліл

54. У лікуванні гіпертонічної хвороби лікар призначив засіб, що блокує ангіотензинові рецептори. Вкажіть препарат :

*** А) Лозартан**

- В) Ніфедипін
- С) Празозин
- Д) Каптоприл
- Е) Апресин

55. Який механізм дії диклофенаку натрію?

*** А) Блокує циклооксигеназу**

- В) Активує синтез фосфодіестерази
- С) Пригнічує холінестеразу
- Д) Активує аденілатциклазу
- Е) Пригнічує фосфодіестеразу

56. Хворому з виразкою шлунка призначили омепразол. Який механізм дії цього препарату ?

*** А) Пригнічення H^+K^+ -АТФази**

- В) Блокада гістамінових H_2 -рецепторів
- С) Блокада М-холінорецепторів
- Д) Нейтралізація HCl
- Е) Стимуляція утворення слизу

57. Який з антисептичних препаратів свою бактерицидну дію проявляє за рахунок утворення атомарного кисню?

*** А) Калію перманганат**

- В) Хлорамін
- С) Фурацилін
- Д) Етоній
- Е) Срібла нітрат

58. Больному с дискинезией пищеварительного тракта назначен метоклопрамид. С чем связан противорвотный эффект этого препарата?

*** А) Блокада D_2 -рецепторов**

- В) Блокада M_1 -холинорецепторов
- С) Блокада H_1 -рецепторов
- Д) Стимуляция бета-адренорецепторов
- Е) Стимуляция M_1 -холинорецепторов

59. При лечении хронической сердечной недостаточности дигитоксином у больного появились признаки интоксикации этим препаратом. Врач назначил унитиол. Объясните, в чём заключается механизм действия унитиола при интоксикации сердечными гликозидами?

*** А) Востановление активности K^+-Na^+ АТФ-азы**

- В) Связывание ионов кальция
- С) Повышение уровня натрия в кардиомиоцитах
- Д) Повышение проницаемости для калия в кардиомиоцитах
- Е) Связывание гликозида в комплексное соединение

60. Відносна кількість лікарського засобу, що надходить з місця введення до системного кровообігу називається:

*** А) біодоступність**

- В) період напівадсорбції
- С) період напіввиведення
- Д) об'єм розподілу
- Е) період напівелімінації

61. Хворий 67 років з хронічною серцевою недостатністю отримує дигоксин. Для зменшення побічної дії дигоксину лікар порадив його комбінувати з:

*** А) Панангіном**

- В) Глюконатом кальцію
- С) Еуфіліном
- Д) Дихлотіазидом
- Е) Хлоридом кальцію

62. На тлі тривалого введення гепарину у хворого розвинулась шлункова кровотеча. Назвіть специфічний антидот гепарину, який треба негайно застосувати:

*** А) Протаміну сульфат**

- В) Дипіроксим
- С) Вікасол
- Д) Бемегрид
- Е) Натрію цитрат

63. Який основний механізм дії лежить в основі бактерицидного впливу бензилпеніциліну на кокову флору?

*** А) порушення синтезу стінки мікробної клітини**

- В) пригнічення синтезу білка
- С) пошкодження проникності цитоплазматичної мембрани
- Д) активація імунної системи макроорганізму
- Е) підвищення фагоцитарної активності лейкоцитів

64. Больному, страждаючому неврозом с явлениями тревоги и страха, врач назначил диазепам. Какой фармакологический эффект препарата позволяет применять его для лечения данного заболевания?

*** А) Анксиолитический**

- В) Противоаритмический
- С) Противовоспалительный
- Д) Гипотензивный
- Е) Антиангинальный

65. Больному с нарушением сердечного ритма ввели лидокаин. Каким фармакологическим эффектом, помимо местноанестезирующего, обладает этот препарат?

*** А) Антиаритмический**

В) Снотворный

С) Жаропонижающий

Д) Антидепрессивный

Е) Ноотропный

66. Больному с острым отравлением необходимо провести форсированный диурез. Какой препарат можно применить с этой целью?

*** А) Фуросемид**

В) Кофеин бензоат натрия

С) Галантамина гидробромид

Д) Эналаприл

Е) Пирацетам

67. Больному после перенесенной черепно-мозговой травмы, врач назначил пирацетам. К какой фармакологической группе относится этот препарат?

*** А) Ноотропные препараты**

В) Ненаркотические анальгетики

С) Транквилизаторы

Д) Средства для наркоза

Е) Нейролептики

68. Больному, страдающему гипертонической болезнью, врач назначил лизиноприл. Каким механизмом действия обладает этот препарат?

*** А) Блокирует АПФ**

- В) Блокирует альфа-адренорецепторы
- С) Блокирует бета-адренорецепторы
- Д) Стимулирует бета-адренорецепторы
- Е) Блокирует М-холинорецепторы

69. Для лечения атеросклероза больной в аптеке приобрел гиполипидемический препарат из группы фибратов. Назовите этот препарат?

*** А) Фенофибрат**

- В) Дротаверина гидрохлорид
- С) Бисакодил
- Д) Спинолактон
- Е) Силибор

70. Для купирования приступа стенокардии больной использует нитроглицерин в капсулах. Какой рациональный путь введения этого препарата ?

*** А) Сублингвальный**

- В) Пероральный
- С) Ректальный
- Д) Ингаляционный
- Е) Подкожный

71. В больницу доставлен ребенок с признаками отравления алкалоидами белладонны. Какой препарат необходимо применить в качестве антидота?

*** А) Прозерин**

- В) Магния сульфат
- С) Кофеин бензоат натрия
- Д) Парацетамол
- Е) Натрия вольпроат

72. Врач назначил больному по поводу хронического запора, препарат бисакодил. Через 3 недели лечения больной обратил внимание на уменьшение слабительного эффекта. С развитием какого побочного эффекта это связано?

*** А) Привыкание**

- В) Пристрастие
- С) Сенсибилизация
- Д) Кумуляция
- Е) Дисбактериоз

73. Посоветуйте больному с острым бронхитом, муколитический препарат, который облегчает отхаркивание.

*** А) Ацетилцистеин**

- В) Глауцин
- С) Лоратидин
- Д) Диклофенак натрия
- Е) Дротаверина гидрохлорид

74. Вы сотрудник аптечного склада. При внесении поступивших препаратов в компьютерную базу данных укажите к какой фармакологической группе относится парацетамол.

*** А) Ненаркотический анальгетик**

- В) Снотворное средство
- С) Диуретическое средство
- Д) Гипотензивное средство
- Е) Антиангинальное средство

75. Провизор посоветовал больному противоязвенный препарат, который блокирует гистаминовые рецепторы слизистой желудка.

*** А) Фамотидин**

- В) Омепразол
- С) Альмагель
- Д) Атропина сульфат
- Е) Пирензепин

76. Больному стенокардией назначили метопролол. Какой фармакологический эффект позволяет применять этот препарат для лечения стенокардии?

*** А) Антиангинальный**

- В) Гипотензивный
- С) Антиаритмический
- Д) Антиагрегантный
- Е) Бронхолитический

77. В связи со слабостью родовой деятельности врач назначил роженице гормональный препарат для стимуляции родов. Назовите препарат.

*** А) Окситоцин**

В) Глибенкламид

С) Преднизолон

Д) Инсулин

Е) L-тироксин

78. Ответьте на вопрос своего коллеги провизора. Какой нестероидный противовоспалительный препарат относится к средствам, селективно блокирующим ЦОГ2?

*** А) Целекоксиб**

В) Анальгин

С) Парацетамол

Д) Диклофенак-натрия

Е) Кислота ацетилсалициловая

79. Дайте ответ на вопрос медсестры: гипогликемическое действие какого препарата обусловлено стимуляцией бета-клеток поджелудочной железы?

*** А) Глибенкламид**

В) Преднизолон

С) Адреналина гидрохлорид

Д) Ретаболил

Е) Гепарин

80. У пожилого больного развилась послеоперационная атония кишечника. Какой антихолинэстеразный препарат показан ему?

*** А) Прозерин**

- В) Дитилин
- С) Пилокарпина гидрохлорид
- Д) Атропина сульфат
- Е) Метопролол

81. Больному с болезнью Паркинсона назначили препарат с преобладающим влиянием на дофаминергическую систему. Назовите это лекарственное средство?

*** А) Леводоба**

- В) Зопиклон
- С) Дроперидол
- Д) Аминазин
- Е) Лоразепам

82. У больного в связи с обострением мочекаменной болезни возникла почечная колика. Какой препарат необходимо ввести для устранения колики?

*** А) Дротаверина гидрохлорид**

- В) Силибор
- С) Альмагель
- Д) Этимизол
- Е) Прозерин

83. Хворому Н. 56 р. який хворіє на ІХС було призначено метопролол. Який механізм дії бета-адреноблокаторів при ІХС?

*** А) Зменшують потребу міокарда в кисні**

- В) Збільшують потребу міокарда в кисні
- С) Розширюють коронарні судини
- Д) Зменшують тонус периферичних судин
- Е) Звужують коронарні судини

84. Хворий, що страждає на алергічний дерматит звернувся в лікарню. Який препарат з метою протизапальної та протиалергічної дії необхідно призначити?

*** А) Преднізолон**

- В) Етамід
- С) Окситоцин
- Д) Інсулін
- Е) Ретаболіл

85. Хворому на атеросклероз було призначено антиатеросклеротичний засіб. Вкажіть який це препарат?

*** А) Фенофібрат**

- В) Аскорбінова кислота
- С) Пірацетам
- Д) Дексаметазон
- Е) Бутадіон

86. У хворого після бджолиних укусів розвинувся набряк Квінке. Який препарат треба негайно ввести хворому з метою усунення цього стану?

*** А) Адреналіну гідрохлорид**

- В) Натрію хлорид
- С) Платифіліну гідротартрат
- Д) Атропіну сульфат
- Е) Анаприлін

87. Чоловік 55 років скаржиться на безсоння, дратівливість, загальну слабкість. Який з вказаних нижче препаратів доцільно призначити в даному випадку?

*** А) Нітразепам**

- В) Аміназин
- С) Трифтазин
- Д) Дроперидол
- Е) Амітриптилін

88. Хворому на гіпертонічну хворобу з метою зниження артеріального тиску було призначено метопролол. Який механізм дії цього препарату:

*** А) Блокування бета-адренорецепторів**

- В) Блокування альфа-адренорецепторів
- С) Непряма адреноміметична дія
- Д) Спазмолітична дія
- Е) Блокування ангіотензинових рецепторів

89. Хворому на бронхіальну астму для усунення нападу було призначено препарат, в основі механізму дії якого лежить стимулювання переважно бета-2-адренорецепторів. Назвіть препарат:

*** А) Сальбутамол**

- В) Адреналіну гідрохлорид
- С) Дроперидол
- Д) Клофелін
- Е) Ізадрін

90. Хворій на паркінсонізм для усунення м'язевої ригідності було призначено препарат, який є попередником дофаміну. Назвіть цей препарат:

*** А) Леводопа**

- В) Аміназин
- С) Парацетамол
- Д) Скопаламіну гідробромід
- Е) Атропіну сульфат

91. Хворому на невроз було призначено анксиолітичний засіб, похідне бензодіазепіну. Назвіть препарат:

*** А) Діазепам**

- В) Атропіну сульфат
- С) Піроксикам
- Д) Ретаболіл
- Е) Циклодол

92. Хворій 34-х років, яка хворіє на бронхіт, лікар призначив протикашльовий засіб центральної дії. Який це препарат?

*** А) Глауцин**

- В) Корглікон
- С) Еналаприл
- Д) Фуросемід
- Е) Ферковен

93. Хворому на інсуліннезалежний цукровий діабет було призначено синтетичний протидіабетичний препарат з групи похідних сульфонілсечовини. Назвіть препарат:

*** А) Глібенкламід**

- В) Інсулін
- С) Анаприлін
- Д) Преднізолон
- Е) Фуросемід

94. Допоможіть лікарю підібрати препарат із групи нестероїдних протизапальних засобів, який є інгібітором ЦОГ-2 і не пошкоджує шлунок.

*** А) Целекоксиб**

- В) Кислота ацетилсаліцилова
- С) Індометацин
- Д) Парацетамол
- Е) Диклофенак-натрій

95. Поясніть лікарю, як коректно називати явище, коли при тривалому застосуванні препарату його ефективність знижується:

*** А) Звикання**

В) Сенсибілізація

С) Кумуляція

Д) Залежність

Е) Тахіфілаксія

96. Хворого попередили, що при застосуванні препарату, який йому призначили, може виникнути кашель. Назвіть цей препарат:

*** А) Лізіноприл**

В) Клофелін

С) Фенігідин

Д) Діхлотіазид

Е) Метопролол

97. Хворому при гострому отруєнні для форсованого діурезу призначили петлевий діуретик. Який це препарат ?

*** А) Фуросемід**

В) Манніт

С) Гідрохлортіазид

Д) Тріамтерен

Е) Спіронолактон

98. Хворому на гіпертонічну хворобу призначено лізиноприл. Який типовий побічний ефект йому властивий ?

*** А) Сухий кашель**

- В) Закреп
- С) Підвищення апетиту
- Д) Безсоння
- Е) Блювання

99. Порекомендуйте хворому на глаукому засіб із групи М-холіноміметиків.

*** А) Пілокарпіну гідрохлорид**

- В) Ефедрину гідрохлорид
- С) Сульфацил натрій
- Д) Атропіну сульфат
- Е) Левоміцетин

100. Хворій для лікування пневмонії призначено доксицикліцину гідрохлорид. До якої групи антибіотиків відноситься даний препарат ?

*** А) Тетрацикліни**

- В) Аміноглікозиди
- С) Макроліди
- Д) Цефалоспорини
- Е) Пеніциліни

101. Ви - провізор аптеки. Яку групу бронхолітиків слід замовити пульмонологічному відділенню для лікування хворих на бронхіальну астму?

*** А) Бета-2-адреноміметики**

- В) Бета-адреноблокатори
- С) М-холіноміметики
- Д) Н-холіноміметики
- Е) Антихолінестеразні засоби

102. Больному с острой сердечной недостаточностью и непереносимостью сердечных гликозидов был введен добутамин. Какой механизм действия этого препарата?

*** А) Стимуляция бета -1-адренорецепторов**

- В) Стимуляция альфа-адренорецепторов
- С) Блокада K^+ -, Na^+ -АТФ-азы
- Д) Угнетения активности фосфодиэстеразы
- Е) Стимуляция М-холинорецепторов

103. Для лечения тромбоза врач назначил больному препарат из группы антикоагулянтов прямого действия. Назовите этот препарат.

*** А) Гепарин**

- В) Фенилин
- С) Синкумар
- Д) Неодикумарин
- Е) Викасол

104. Больному хронической сердечной недостаточностью назначили сердечный гликозид из группы наперстянки. Назовите этот препарат:

*** А) Дигоксин**

- В) Строфантин
- С) Корвалол
- Д) Коргликон
- Е) Кордиамин

105. У хворого після вакцинації розвинувся анафілактичний шок. Назвіть препарат вибору.

*** А) Адреналіну гідрохлорид**

- В) Анаприлін
- С) Нафтізин
- Д) Сальбутамол
- Е) Дитилін

106. Хворий похилого віку страждає запором, в основі якого лежить гіпотонія товстого кишечника. Який препарат слід призначити хворому?

*** А) Бісакодил**

- В) Натрію сульфат
- С) Касторову олію
- Д) Атропіну сульфат
- Е) Новокаїнамід

107. Хворому на гострий бронхіт призначили муколітичний засіб. Назвіть препарат.

*** А) Ацетилцистеїн**

- В) Глауцин
- С) Кодеїну фосфат
- Д) Етимізол
- Е) Бемегрид

108. Жінка після перенесеного стресу погано спить. Якому з перерахованих снодійних засобів слід віддати перевагу для лікування безсоння ?

*** А) Нітразепам**

- В) Фенобарбітал
- С) Хлоралгідрат
- Д) Аміназин
- Е) Барбітал

109. У наркоманів після закінчення дії наркотику виникають тяжкі психічні, неврологічні і соматичні порушення. Як називається цей симптомокомплекс?

*** А) Абстинентний синдром**

- В) Ідіосинкразія
- С) Сенсibiliзація
- Д) Кумуляція
- Е) Толерантність

110. Жінці 65 років з переломом нижньої щелепи призначили препарат із групи наркотичних анальгетиків. Назвіть препарат.

*** А) Промедол**

- В) Пірацетам
- С) Гепарин
- Д) Циннаризин
- Е) Фуросемід

111. Хворому на гіпертонічну хворобу призначили препарат з групи неселективних бета-адреноблокаторів. Вкажіть цей препарат:

*** А) Анаприлін**

- В) Празозин
- С) Прозерин
- Д) Адреналіну гідрохлорид
- Е) Лабеталол.

112. У хворого гостре отруєння морфіном. Який препарат слід ввести в якості антидоту?

*** А) Налоксон**

- В) Лобеліну гідрохлорид.
- С) Бемегрид.
- Д) Атропіну сульфат
- Е) Унітіол

113. Для лікування глаукоми лікар вирішив призначити хворому холіноміметичний засіб прямої дії. Який це препарат?

*** А) Пілокарпіну гідрохлорид**

- В) Цинку сульфат
- С) Сульфацил натрію
- Д) Платифіліну гідротартрат
- Е) Атропіну сульфат

114. У процесі фармакотерапії бронхіту у хворого виникли диспептичні розлади, фотодерматит, порушення функції печінки. Який препарат із призначених хворому міг спричинити ці явища?

*** А) Доксидиклін**

В) Парацетамол

С) Кислота аскорбінова.

Д) Ацетилцистеїн.

Е) Кодеїну фосфат

115. Хворий страждає на жовче-кам'яну хворобу. Який засіб слід йому призначити з метою усунення печінкової коліки?

*** А) Магнію сульфат**

В) Амальгель

С) Контрикал

Д) Бісакодил

Е) Панкреатин.

116. Допоможіть лікарю вибрати наркотичний анальгетик, який можна використати для знеболення пологів?

*** А) Промедол**

В) Парацетамол

С) Кодеїну фосфат

Д) Фентаніл

Е) Анальгін

117. У стаціонар надійшов хворий з діагнозом “Виразкова хвороба шлунку у фазі загострення”. Проконсультуйте лікаря-інтерна який препарат знизить функцію залоз шлунку за рахунок блокади H₂ -рецепторів

*** А) Фамотидин**

- В) Екстракт беладони сухий
- С) Метацин
- Д) Атропіну сульфат
- Е) Платифіліну гідротартрат

118. Виберіть на аптечному складі для хірургічного відділення антихолінестеразний засіб зворотної дії для призначення хворим в післяопераційному періоді з атонією кишечника та сечового міхура

*** А) Прозерин**

- В) Фосфакол
- С) Бензогексоній
- Д) Атропіну сульфат
- Е) Дитилін

119. До міжлікарняної аптеки надійшло замовлення від хірургічного відділення на отримання препарату з групи міорелаксантів деполяризуючого типу дії для проведення хірургічних втручань. Який препарат було замовлено?

*** А) Дитилін**

- В) Нікотин
- С) Атропіну сульфат
- Д) Метацин
- Е) Гігроній

120. До провізора звернулася хвора з проханням відпустити засіб від болю голови, який одночасно має антиагрегатну дію. Назвіть цей препарат?

*** А) Кислота ацетилсаліцилова**

- В) Кодеїну фосфат
- С) Промедол
- Д) Трамадол
- Е) Фентаніл

121. Хворому після гострого інфаркту міокарду лікар порекомендував протягом 3-4 місяців приймати ацетилсаліцилову кислоту. На яку дію ацетилсаліцилової кислоти розраховував лікар?

*** А) Антиагрегантну**

- В) Жарознижуючу
- С) Анальгезуючу
- Д) Протизапальну
- Е) Спазмолітичну

122. Лікар-інтерн звернувся до фармацевта за порадою, який засіб краще призначити хворому з діагнозом: амебна дизентерія.

*** А) Метронідазол**

- В) Пірантел
- С) Левомізол
- Д) Біцілін-5
- Е) Бензилпеніциліну натрієва сіль

123. Во время оперативного вмешательства с применением миорелаксанта тубокурарина у пациента развилось нарушение дыхания, которое было ликвидировано после введения прозерина. Какому термину соответствует указанное взаимодействие между лекарствами?

*** А) Антагонизм**

- В) Кумуляция
- С) Несовместимость
- Д) Тахифилаксия
- Е) Синергизм

124. У больного, который длительное время страдал заболеванием желудка выявлена гиперхромная анемия. Какое из перечисленных средств применяется для лечения этой патологии?

*** А) Цианокобаламин**

- В) Аскорбиновая кислота
- С) Унитиол
- Д) Феррум Лек
- Е) Оксиферрискорбон

125. Женщине 25 лет с явлениями острой интоксикации морфином был введен налоксон, вызвавший быстрое улучшение ее состояния. Каков механизм действия этого препарата?

*** А) Блокада опиоидных рецепторов**

- В) Блокада ГАМК-рецепторов
- С) Блокада серотониновых рецепторов
- Д) Блокада дофаминовых рецепторов
- Е) Блокада бензодиазепиновых рецепторов

126. У наркологічне відділення надійшов хворий з діагнозом - морфінізм. Лікар відзначив зниження фармакологічної активності морфіну. Як називається явище, коли зменшується ефективність препарату при повторному введенні?

*** А) Звикання**

- В) Матеріальна кумуляція
- С) Функціональна кумуляція
- Д) Антагонізм
- Е) Сумація

127. Препаратом вибору для лікування трихомонозної інфекції є:

*** А) Метронідазол**

- В) Олететрин
- С) Норфлуксацин
- Д) Ністатин
- Е) Клафоран

128. Виберіть препарат для лікування бронхіальної астми з групи ?2-адреностимуляторів.

*** А) Сальбутамол**

- В) Еуфілін
- С) Атровент
- Д) Кетотіфен
- Е) Беклометазон

129. Хворому з шизофренією призначено нейролептик. Який з перерахованих препаратів належить до цієї групи?

*** А) Аміназин**

- В) Целекоксиб
- С) Анаприлін
- Д) Морфін
- Е) Пірацетам

130. В аптеку звернувся студент з проханням поради лікарський засіб для усунення проявів алергічного риніту, який виникає у нього під час цвітіння липи. Який засіб можна застосувати?

*** А) Лоратидин**

- В) Адреналін
- С) Анаприлін
- Д) Амброксол
- Е) Лозартан

131. У хворого встановлено діагноз - виразкова хвороба шлунка. Препарат з якої з перелічених груп лікарських засобів необхідно використати в комплексній терапії пацієнта ?

*** А) Блокатори H-2 гістамінорецепторів**

- В) Блокатори H-1 гістамінорецепторів
- С) ?-Адреноблокатори
- Д) ? -Адреноблокатори
- Е) ?? Адреноміметики

132. Пацієнтці з ревматоїдним артритом та супутньою виразковою хворобою дванадцятипалої кишки необхідно призначити нестероїдний протизапальний препарат. Який препарат є препаратом вибору в даному випадку?

*** А) Целекоксиб**

- В) Ацетилсаліцилова кислота
- С) Парацетамол
- Д) Анальгін
- Е) Диклофенак-натрій

133. Пацієнту з ішемічною хворобою серця для швидкого зняття приступу стенокардії лікар призначив лікарський препарат, який необхідно вживати під язик. Вкажіть цей препарат.

*** А) Нітрогліцерин**

- В) Корглікон
- С) Ізосорбиду мононітрат
- Д) Лізиноприл
- Е) Аміодарон

134. При проведенні проби на чутливість до бензилпеніциліну у пацієнта розвинувся анафілактичний шок. Яким препаратом слід обколоти місце введення антибіотика?

*** А) Адреналіну гідрохлорид**

- В) Норадреналіну гідротартрат
- С) Атропіну сульфат
- Д) Пропранолол
- Е) Цефтріаксон

135. Назовите препарат из группы тетрациклинов, который назначили больному для лечения бронхита

*** А) Доксициклина гидрохлорид**

- В) Бензилпенициллина натриевая соль
- С) Ацикловир
- Д) Изониазид
- Е) Хингамин

136. Для лечения атеросклероза больной приобрел в аптеке гиполипидемический препарат фенофибрат. К какой фармакологической группе относится этот препарат?

*** А) Фибраты**

- В) Нитрофураны
- С) Блокаторы кальциевых каналов
- Д) (-адреноблокаторы
- Е) М-холиноблокаторы

137. Напомните своему коллеге провизору как называется явление, когда один препарат ослабляет действие другого?

*** А) Антагонизм**

- В) Привыкание
- С) Сенситализация
- Д) Потенцирование
- Е) Тахифилаксия

138. Объясните своему коллеге провизору, какие показания к применению налоксона?

*** А) Острое отравление наркотическими анальгетиками**

- В) Отравление тяжелыми металлами
- С) Отравление сердечными гликозидами
- Д) Отравление алкалоидами спорыньи
- Е) Отравление атропина сульфатом

139. Больному для лечения бронхиальной астмы, врач назначил препарат из группы (-адреномиметиков. Укажите этот препарат?

*** А) Сальбутамол**

- В) Диазепам
- С) Доксициклина гидрохлорид
- Д) Нитроглицерин
- Е) Дигоксин

140. Какой из перечисленных ниже препаратов при сублингвальном применении быстро купирует приступ стенокардии?

*** А) Нитроглицерин**

- В) Дигоксин
- С) Амiodарон
- Д) Лизиноприл
- Е) Коргликон

141. Благодаря какому фармакологическому эффекту диазепам применяется для лечения неврозов?

*** А) Анксиолитическому**

В) Анальгетическому

С) Диуретическому

Д) Жаропонижающему

Е) Антидепрессивному

142. Вы - провизор, проходящий интернатуру. При сдаче тестового экзамена выберите из предложенных фармакологических эффектов тот, который позволяет применять аминазин для лечения психозов?

*** А) Антипсихотический**

В) Гипотермический

С) Противоспалительный

Д) Противорвотный

Е) Спазмолитический

143. Ответьте на вопрос своего коллеги провизора, какой механизм действия НПВС целекоксиба?

*** А) Селективное ингибирование ЦОГ-2**

В) Блокада АПФ

С) Стимуляция М-холинорецепторов

Д) Блокада H₂-гистаминовых рецепторов

Е) Стимуляция (2-адренорецепторов

144. Ответьте на вопрос молодого врача: как называется способность лекарств накапливаться в организме больного?

*** А) Кумуляция**

- В) Антагонизм
- С) Синергизм
- Д) Привыкание
- Е) Аллергия

145. Вы провизор ЦРА. Выберите из поступивших в вашу аптеку препаратов тот, который относится к жирорастворимым витаминным препаратам

*** А) Ретинола ацетат**

- В) Окситоцин
- С) Ацикловир
- Д) Гепарин
- Е) Димедрол

146. Помогите молодому врачу выбрать из имеющихся у вас в аптеке химиотерапевтических средств препарат для лечения больного, страдающего герпесом

*** А) Ацикловир**

- В) Рифампицин
- С) Доксициклина гидрохлорид
- Д) Хингамин
- Е) Метронидазол

147. Какой фармакологический эффект ацетилсалициловой кислоты позволяет применять ее у больных с ИБС для профилактики тромбозов?

- * А) Антиагрегантный**
- В) Анальгезирующий
- С) Жаропонижающий
- Д) Ульцерогенный
- Е) Противовоспалительный

148. Больному с глаукомой врач назначил прозерин в виде глазных капель. К какой фармакологической группе относится этот препарат?

- * А) Антихолинестеразный обратимого действия**
- В) М-холиноблокатор
- С) Н-холиномиметик
- Д) (-)-адреноблокатор
- Е) (-)-адреномиметик

149. Какой препарат из группы местноанестезирующих средств применяется у больных с нарушением сердечного ритма?

- * А) Лидокаин**
- В) Парацетамол
- С) Морфина гидрохлорид
- Д) Кофеина-бензоат натрия
- Е) Нитразепам

150. Хворому з нирковою колькою в комплексну терапію долучено спазмолітик з групи М-холіноблокаторів.

- * А) Атропін**
- В) Прозерін
- С) Галантамін
- Д) Дитилін
- Е) Бензогексоній

151. В лікуванні екстрасistolії використан неселективний ?-адреноблокатор.

- * А) Анаприлін**
- В) Атенолол
- С) Фентоламін
- Д) Празозін
- Е) Резерпін

152. Хворому у стані психозу призначено антипсихотік.

- * А) Аміназин**
- В) Діазепам
- С) Циклодол
- Д) Кофеїн
- Е) Фенобарбітал

153. Страх, емоційна напруга у хворого неврозом дозволили лікарю підібрати препарат, знижуючий ці симптоми.

- * А) Діазепам**
- В) Карбонат літія
- С) Сіднокарб
- Д) Ноотропіл
- Е) Кофеїн

154. Хворому на бронхіальну астму було призначено сальбутамол після якого зникли симптоми бронхоспазму. Це пов'язано зі стимуляцією:

*** А) β -2-адренорецепторів**

В) α -1-адренорецепторів

С) М-холіноорецепторів

Д) Синтезу ацетилхоліну

Е) β -1-адренорецепторів

155. Після довготривалого прийому ізосорбїду для профілактики приступів стенокардії хворий відмітив значне зниження ефекту останнього. Яке явище мало місце?

*** А) Толерантність**

В) Кумуляція

С) Фізична залежність

Д) Алергія

Е) Потенціювання

156. Під час слабкості пологової діяльності призначають:

*** А) Окситоцин**

В) Но-шпу

С) Прогестерон

Д) Вікасол

Е) Фенотерол

157. Хворому для профілактики тромбоутворення з ІХС був призначений препарат з групи нестероїдних протизапальних засобів.

*** А) Кислота ацетилсаліцилова**

- В) Ібупрофен
- С) Піроксикам
- Д) Кислота мефенамова
- Е) Індометацин

158. Хворому на інфаркт міокарду вводили внутрішньовенно антикоагулянт прямої дії.

*** А) Гепарин**

- В) Неодикумарин
- С) Вікасол
- Д) Тромбін
- Е) Кальцію глюконат

159. Вкажіть антибіотик для лікування сифілісу.

*** А) Бензилпеніцилін**

- В) Стрептоміцин
- С) Канаміцин
- Д) Амфотерицин
- Е) Ністатин

160. Діагностовано трихомоніаз. Який антимікробний препарат необхідно призначити?

*** А) Метронідазол**

- В) Ампіцилін
- С) Хлорохін
- Д) Ністатин
- Е) Гентаміцин

161. У пацієнта з'явилися герпетичні висипання. Який засіб необхідно призначити?

*** А) Ацикловір**

- В) Гентаміцин
- С) Клотримазол
- Д) Бензилпеніцилін
- Е) Бісептол

162. Для індивідуальної профілактики малярії було призначено препарат.

*** А) Хінгамін**

- В) Рифампіцин
- С) Ампіцилін
- Д) Гентаміцин
- Е) Бісептол (Ко-тримаксазол)

163. Відпускаючи з аптеки глауцину гідрохлорид хворому на хронічний бронхіт про який типовий побічний ефект слід його застережити ?

*** А) Зниження артеріального тиску**

- В) Збудження центральної нервової системи
- С) Порушення серцевого ритму
- Д) Підвищення внутрішньоочного тиску
- Е) Алергічні висипи на шкірі

164. Хворій для лікування алергічного дерматиту після укусів бджіл призначено лоратадин. Який механізм протиалергічної дії препарату?

*** А) Пригнічення H1-гістамінових рецепторів**

- В) Пригнічення H2-гістамінових рецепторів
- С) Блокада D4-лейкотрієнових рецепторів
- Д) Зменшення вивільнення лейкотрієну
- Е) Антисеротонінова активність

165. Лікар при підозрі на холеру призначив пацієнту доксицикліну гідрохлорид. До якої групи антибіотиків відноситься даний препарат?

*** А) Тетрацикліни**

- В) Пеніциліни
- С) Цефалоспорини
- Д) Циклічні поліпептиди
- Е) Макроліди та азаліди

166. Який із холінотропних лікарських засобів застосовують при глаукомі для зниження внутрішньоочного тиску?

*** А) Пілокарпін**

- В) Атропін
- С) Платифілін
- Д) Скополамін
- Е) Метацин

167. Хворому 30 років із розладом сну і неурівноваженістю психоемоційної сфери лікар призначив діазепам. Чим обумовлений психоседативний ефект препарату?

*** А) Активацією ГАМК-ергічної системи**

- В) Гальмуванням лімбічної системи
- С) Гальмуванням ретикулярної формації
- Д) Зменшенням кількості норадреналіну в ЦНС
- Е) Гальмуванням опіоїдних рецепторів

168. Чому бензилпеніциліну натрієву сіль не застосовують всередину?

*** А) Руйнується HCl шлунку**

- В) Погано всмоктується в кишечнику
- С) Подразнює слизову оболонку шлунка
- Д) Зменшує утворення HCl шлунку
- Е) Руйнується пеніциліназою

169. Порадьте лікарю при кровотечі, обумовленій тривалим застосуванням неодикумарину, препарат антагоніст.

*** А) Вікасол;**

- В) Кислота амінокапронова;
- С) Етамзилат;
- Д) Фібриноген;
- Е) Кислота аскорбінова.

170. Який препарат при передозуванні наркотичним анальгетиком слід застосовувати в якості антидоту для зняття пригнічення дихального центру?

*** А) Налоксон;**

- В) Кордіамін;
- С) Етимізол;
- Д) Камфора;
- Е) Нашатирний спирт.

171. У жінки затяжний період пологової діяльності. Із переліку препаратів виберіть той, який завдяки фізіологічній дії стимулюватиме пологову діяльність.

*** А) Окситоцин;**

- В) Прозерин;
- С) Пахикарпін;
- Д) Прогестерон;
- Е) Естрон.

172. Хворій 48-ми років для зняття важкого нападу бронхіальної астми внутрішньовенно ввели розчин преднізолону. До якої групи гормонопрепаратів належить преднізолон?

- * А) Глюкокортикоїди;**
- В) Гестагенні препарати;
- С) Естрогенні препарати;
- Д) Мінералокортикоїди;
- Е) Анаболічні стероїди.

173. Ви працюєте в аптеці, яка розташована на території шкірно-венерологічного диспансеру. Проконсультуйте лікаря-інтерна: який антибіотик є препаратом вибору для лікування сифілісу?

- * А) Бензилпеніциліну натрієва сіль;**
- В) Лінкоміцину гідрохлорид;
- С) Леворину натрієва сіль;
- Д) Стрептоміцину сульфат;
- Е) Поліміксину М сульфат.

174. Ви працюєте на фармацевтичній фірмі у відділі реалізації ліків. Поясніть провізору-інтерну: до якої фармакологічної групи належить фенофібрат.

- * А) Гіполіпідемічні засоби;**
- В) Інгібітори фібринолізу;
- С) Снодійні засоби;
- Д) Антигіпертензивні засоби;
- Е) Антикоагулянти непрямої дії.

175. Ви провізор-інформатор працюєте в аптеці. Порадьте хворому з загостренням ревматоїдного артриту знеболювальний протизапальний препарат, що найменше шкодить шлунку.

*** А) Целекоксиб;**

В) Диклофенак-натрій;

С) Кислота ацетилсаліцилова;

Д) Ібупрофен;

Е) Індометацин.

176. Ви - провізор аптеки. Для оформлення вітрини сечогінних препаратів виберіть “петльовий” діуретик екстренної, сильної і короткотривалої дії:

*** А) Фуросемід;**

В) Клопамід;

С) Діакарб;

Д) Спіронолактон;

Е) Тріамтерен.