

ЗАВАНТАЖЕНО З САЙТУ ТЕСТУВАННЯ.УКР

Надання допомоги стоматологічним хворим, що потребують особливої тактики ведення - база тестів 2012 року

Категорія: **Бази тестів українською мовою 2012 року**

Кількість запитань: **27**

1. У пацієнта Ч., 53 роки в товщі слизової оболонки спинки язика виявлено щільну гумозну виразку, яка виступає над поверхнею. При пальпації слабоболісна. Якому періоду розвитку сифілісу притаманні дані елементи ураження?

*** А) Третинному сифілісу**

- В) Первинному сифілісу
- С) Інкубаційному сифілісу
- Д) Латентному сифілісу
- Е) Вторинному сифілісу

2. У пацієнта Р., 76 років із діагнозом третинний сифіліс в товщі слизової оболонки м'якого та твердого піднебіння виявлено болючі вузли діаметром до 3-х см. в центрі яких є глибокі кратероподібні виразки із некротичним стрижнем. З яким захворюванням слід диференціювати дану патологію?

*** А) Туберкульоз порожнини рота**

- В) Гострий герпетичний стоматит
- С) Рецидивуючий герпетичний стоматит
- Д) Виразково-некротичний стоматит
- Е) Багатоформна ексудативна ерітема

3. У хворого М. 32 років, лікарем-стоматологом. констатовано факт наявності твердого шанкру в порожнині рота. Якими додатковими методами обстеження можна підтвердити діагноз?

*** А) Серологічними методами**

- В) Прицільною рентгенограмою
- С) Гістологічними методами
- Д) Реополіграфічним методом
- Е) Денситометричним методом

4. Больной 46-ти лет обратился в стоматологическую амбулаторию с жалобами на кровоточивость десен и расшатанность зубов. При сборе анамнеза выяснено, что больной в настоящее время проходит лечение по поводу туберкулеза легких. Какова тактика в отношении данного больного.

*** А) Стоматологическая санация в туберкулезном диспансере.**

- В) Лечение по месту жительства.
- С) Отказ от какой-либо помощи кроме ургентной.
- Д) Лечение после выздоровления от туберкулеза.
- Е) Удаление всех зубов.

5. Пацієнтка П., 38 років, скаржиться на наявність болісної виразки в роті, яка збільшується й не загоюється протягом півтора місяця. Об'єктивно: на слизовій щоки ліворуч - неглибока виразка діаметром 2 мм з нерівними краями, м'якої консистенції. Дно виразки горбисте, жовтого кольору. Навколо виразки багато дрібних горбків жовтого кольору. Регіонарні лімфатичні вузли еластичні, болісні, спаяні в пакети. Який найбільш вірогідний діагноз?

*** А) Туберкульоз**

- В) Сифіліс
- С) Лейкоплакія
- Д) Рак
- Е) Червоний плескатий лишай

6. Пацієнт К., 48 років, скаржиться на наявність виразок на яснах в області молярів, що поступово поширюються, рухливість зубів у зоні ураження. Об'єктивно: на слизовій оболонці ясен в області нижніх молярів ліворуч - дві поверхневі, різко болісні виразки з підритими краями. Дно виразок жовтуваті, зернисті, вкриті жовтуватими грануляціями. Шийки зубів оголені, патологічна рухливість зубів. Регіонарні лімфатичні вузли збільшені, утворюють щільні пакети. Який найбільш вірогідний діагноз?

*** А) Туберкульоз**

- В) Сифіліс
- С) Хронічний лейкоз
- Д) Інфекційний мононуклеоз
- Е) Рухливість зубів – подвижность зубов, щільні-плотные

7. У хворого 47 років, який страждає бронхіальною астмою під час проведення скелінгу для видалення зубних відкладень з'явилися симптоми легкого нападу бронхіальної астми: почервоніння обличчя, задуха. Який першочерговий засіб невідкладної допомоги потрібно використати лікарю-пародонтологу?

*** А) Беротек-спрей**

- В) Дипрозин
- С) Гідрокортизон
- Д) Діазепам
- Е) Аміназин

8. Вагітна жінка 22 років звернулася зі скаргами на розростання ясен, болючість, кровоточивість ясен при чищенні зубів. Об'єктивно: ясенні сосочки фронтальної ділянки нижньої щелепи набрякли, ціанотичні, збільшені в розмірах, перекривають зуби на 1/3 висоти коронки, кровоточать при зондуванні, болючі при пальпації. Встановіть діагноз.

*** А) Гіпертрофічний гінгівіт**

- В) Атрофічний гінгівіт
- С) Виразковий гінгівіт
- Д) Фіброматоз ясен
- Е) Катаральний гінгівіт

9. Хвора С., 30 р., скаржиться на спонтанну кровотечу із ясен та носа. Об'єктивно: слизова оболонка порожнини рота бліда, набрякла, спостерігаються ділянки крововиливів в слизову оболонку, яка нагадує колір веселки. У периферичній крові: зменшення кількості тромбоцитів та наявність гігантських тромбоцитів. Ваш попередній діагноз?

*** А) Хвороба Верльгофа**

- В) Хвороба Вакеза
- С) Гіпопластична анемія
- Д) Гіповітаміноз С
- Е) Хронічний мієломікоз

10. Під час препарування каріозної порожнини 44 зуба у хворого В., інфікованого ВІЛ-інфекцією терапевту-стоматологу випадково в око потрапила слина хворого. Які першочергові дії лікаря в цій ситуації?

*** А) Промити око 1% розчином борної кислоти**

- В) Промити око дистильованою водою
- С) Промити око 1% розчином атропіну
- Д) Промити око 1% розчином хлоргексидину
- Е) Промити око відваром зеленого чаю

11. Пацієнт А., 26 років, що знаходився в шкірно-венерологічному диспансері з приводу лікування сифілісу був оглянутий лікарем-стоматологом. Констатовано факт наявності в порожнині рота палул округлої форми розмірами 3х4 мм. Якому періоду розвитку сифілісу притаманні дані елементи ураження?

*** А) Вторинному сифілісу**

- В) Первинному сифілісу
- С) Інкубаційному сифілісу
- Д) Латентному сифілісу
- Е) Третинному сифілісу

12. У пацієнта Б., 56 років виявлено в товщі слизової оболонки м'якого та твердого піднебіння болючі вузли діаметром до 3-х см. в центрі яких є глибокі кратероподібні виразки із некротичним стрижнем. Якому періоду розвитку сифілісу притаманні дані елементи ураження?

*** А) Третинному сифілісу**

- В) Первинному сифілісу
- С) Інкубаційному сифілісу
- Д) Латентному сифілісу
- Е) Вторинному сифілісу

13. Хворий К., 38 років, страждає на хронічний лейкоз, проходить диспансерний огляд з приводу хронічного генералізованого пародонтиту II ступеня. Глибина зубо-ясневих кишень 4-5 мм, рясні зубні відкладення, гноєтечі немає. Яку технологію лікування обрати?

*** А) Вектор-терапія.**

- В) Відкритий кюретаж.
- С) Клаптева операція.
- Д) Вакуум-кюретаж.
- Е) Накладання лікувальних пов'язок.

14. Метод знеболювання при лікуванні гострого серозного дифузного пульпіту 12 та 22 зубів у дитини 12 років з ДЦП

*** А) загальне**

- В) внутрішньопульпарне
- С) провідникове
- Д) провідникове та внутрішньорпульпарне
- Е) -

15. У пацієнта К., 28 років внаслідок травми дефект твердого піднебіння у передньому відділі. При об'єктивному обстеженні встановили відсутність 11, 12, 21, 22 разом із альвеолярним відростком, дефект піднебіння розміром 2,0x0,5 см, доходить до перехідної складки. Зуби в бокових ділянках верхньої щелепи збережені, інтактні. Яку конструкцію протеза доцільно застосувати в даному випадку?

*** А) Знімний пластинковий протез із еластичною підкладкою**

- В) Знімний пластинковий протез із пелотами
- С) Знімний пластинковий протез із ізолюваним торусом
- Д) Знімний пластинковий протез із зубами на приточці
- Е) -

16. Гострий початок, підвищення температури, порушення загального стану; катаральний стоматит, чисельні петехії на слизовій оболонці порожнини рота, збільшення підщелепних та шийних лімфатичних вузлів. В крові: моноцитоз, виявлення мононуклеарів, лейкоцитоз, лімфоцитоз. Поставте попередній діагноз:

*** А) інфекційний мононуклеоз**

- В) вітряна віспа
- С) дифтерія
- Д) грип
- Е) кір

17. На яснах яскраво-червоні дрібні горбики м'якої консистенції, частково укриті виразками, фібриновим нальотом. Виразки неглибокі, різко болісні, з неправильними чітко окресленими краями, їхнє дно покрите подібними до малини грануляціями. Який найбільш вірогідний діагноз?

*** А) туберкульозний вовчак**

- В) виразковий гінгівіт
- С) третинний сифіліс
- Д) червоний вовчак
- Е) ракова виразка

18. Больной 46-ти лет обратился в стоматологическую амбулаторию с жалобами на кровоточивость десен и расшатанность зубов. При сборе анамнеза выяснено, что больной в настоящее время проходит лечение по поводу туберкулеза легких. Какова тактика в отношении данного больного.

*** А) Стоматологическая санация в туберкулезном диспансере.**

- В) Лечение по месту жительства.
- С) Отказ от какой-либо помощи кроме ургентной.
- Д) Лечение после выздоровления от туберкулеза.
- Е) Удаление всех зубов.

19. У хворого під час прийому у стоматолога з'явилося запаморочення, судоми, зіниці розширились та з'явилися виділення піни з рота. Встановіть діагноз.

*** А) Епілептичний напад**

- В) Зомління
- С) Больовий шок
- Д) Колапс
- Е) Анафілактичний шок.

20. Пацієнт, 30 років, скаржиться на кровоточивість ясен при прийомі твердої їжі та чистці зубів. З анамнезу: захворів 3 тижня тому, коли з'явилася загальна слабкість, біль в кістках, періодичне підвищення температури тіла. Об'єктивно: слизова оболонка порожнини рота ясен не змінена в кольорі. Ясна кровоточать при торканні, зуби інтактні. Аналіз крові: ер. - $3,0 \times 10^{12}/\text{л}$; Hb - 40 г/л; ЧП - 0,9; лейк.- $25 \times 10^9/\text{л}$; бласти - 60%; п/я - 5%; с/я - 20%; лімф. - 20%; тр. - $20 \times 10^9/\text{л}$; ШОЕ - 60 мм/год. Який остаточний діагноз?

*** А) Гострий лейкоз**

- В) Агранулоцитоз
- С) Тромбоцитопенічна пурпура
- Д) Хронічний лімфолейкоз
- Е) Хронічний мієлолейкоз

21. Чоловік, 21 року, скаржиться на появу „ранок” у роті, висип на шкірі. Об'єктивно: на слизовій оболонці твердого й м'якого піднебіння, внутрішньої поверхні щік - пухирці, папули, ерозії округлої форми, із чіткими краями, вкриті жовтувато-сірим нальотом. Аналогічний висип на шкірі. Який найбільш вірогідний діагноз?

*** А) Вітряна віспа**

- В) Герпетична ангіна
- С) Інфекційний моноклеоз
- Д) Багатоформна ексудативна ерітема
- Е) Оперізувальний лишай

22. У дитини 7 років на прийомі у хірурга-стоматолога під час огляду, безпідставно почалася носова кровотеча. Об'єктивно: дитина астенична, бліда, апатична. У ділянці колінних та ліктьових суглобів визначаються деформуючі остеоартрози. Яке захворювання характерно для дитини?

*** А) Гемофілія.**

- В) Тромбоцитопенічна пурпура.
- С) Геморагічний васкуліт.
- Д) Геморагічний діатез.
- Е) Тромбогеморагічний синдром.

23. У хворого 47 років, який страждає бронхіальною астмою під час проведення скелінгу для видалення зубних відкладень з'явилися симптоми легкого нападу бронхіальної астми: почервоніння обличчя, задуха. Який першочерговий засіб невідкладної допомоги потрібно використати лікарю-пародонтологу ?

*** А) Беротек-спрей**

- В) Дипрозин
- С) Гідрокортизон
- Д) Діазепам
- Е) Аміназин

24. Хворий М. 32 років, що знаходився в шкіро-венеричному диспансері з приводу лікування сифілісу був оглянутий лікарем-стоматологом. Констатовано факт наявності твердого шанкру в порожнині рота. Який період розвитку венеричного захворювання характеризує виявлений лікарем елемент ураження?

*** А) Первинний сифіліс**

- В) Інкубаційний період сифілісу
- С) Вторинний свіжий сифіліс
- Д) Вторинний рецидивуючий сифіліс
- Е) Третинний сифіліс

25. Пацієнт Л., 48 років, що знаходився в шкіро-венеричному диспансері з приводу лікування сифілісу був оглянутий лікарем-стоматологом. Констатовано факт наявності твердого шанкру в порожнині рота. В якій термін від моменту виникнення шанкру слід очікувати позитивної серологічної реакції крові?

*** А) З кінця 3-го - початку 4-го тижня**

В) З кінця 1-го - початку 2-го тижня

С) З кінця 2-го - початку 3-го тижня

Д) З кінця 4-го - початку 5-го тижня

Е) З кінця 5-го - початку 6-го тижня

26. Пацієнт К., 38 років, що знаходився в шкірно-венерологічному диспансері з приводу лікування сифілісу був оглянутий лікарем-стоматологом. Констатовано факт наявності твердого шанкру в порожнині рота. В якій термін від моменту виникнення шанкру сифіліс має назву серонегативного?

*** А) До кінця 3-го початку 4-го тижня**

В) До кінця 1-го початку 2-го тижня

С) До кінця 2-го початку 3-го тижня

Д) До кінця 4-го початку 5-го тижня

Е) До кінця 5-го початку 6-го тижня

27. Пацієнт Д., 36 років, що знаходився в шкірно-венерологічному диспансері з приводу лікування сифілісу був оглянутий лікарем-стоматологом. Констатовано факт наявності в порожнині рота яскраво червоних плям, що злилися в ерітему (плямистий сифілід). Якому періоду розвитку сифілісу притаманні дані елементи ураження?

*** А) Вторинному свіжому сифілісу**

В) Первинному періоду сифілісу

С) Інкубаційному періоду сифілісу

Д) Вторинному рецидивуючому сифілісу

Е) Третинному періоду сифілісу