

ЗАВАНТАЖЕНО З САЙТУ ТЕСТУВАННЯ.УКР

Організація надання допомоги, в тому числі профілактики - база тестів 2013 року

Категорія: **Бази тестів українською мовою 2013 року**

Кількість запитань: **21**

1. У дитини Д., 4 років під час диспансерного огляду визначено індекс рівня інтенсивності карієсу, який дорівнює 0,3. Як можна оцінити цей показник?

*** А) Низький.**

В) Середній.

С) Високий.

Д) Дуже високий.

Е) Дуже низький.

2. Пацієнт 29 л. звернувся в клініку на наявність порожнини в 25 зубі. Поставлено діагноз - хронічний фіброзний пульпіт 25 зуба. Де повинна знаходитися границя кореневої пломби.

*** А) Не доходячи 1.0 - 1.5 мм до рентгенологічної верхівки кореня.**

В) Не доходячи 2.0 - 2.5 мм до рентгенологічної верхівки кореня.

С) Не доходячи 3.0 - 3.5 мм до рентгенологічної верхівки. Верхівки.

Д) За межами кореня.

Е) На рівні анатомічної верхівки.

3. Хлопчик 11-ти років. Під час профілактичного огляду виявлено аномалію положення зубів - 23 зуб прорізався на місці латерального різця, а 22 зуб - на місці ікла. Встановіть діагноз.

*** А) Транспозиція латерального різця і ікла.**

В) Тортоаномалія латерального різця і ікла.

С) Дистальне положення латерального різця.

Д) Мезіальне положення ікла.

Е) Дистальне положення латерального різця і мезіальне положення ікла.

4. Пацієнт, 32 року, скаржиться на слабкість, головний біль та біль у горлі при ковтанні, підвищення температури тіла до 38,7°C. Об'єктивно: на слизовій оболонці передніх піднебінних дужок, мигдаликів, задньої стінки глотки на тлі гіперемії - безліч дрібних ерозій. Вставлено діагноз герпангіна. Які препарати для обробки порожнини рота слід призначити в перші три дні захворювання?

*** А) Протівірусні препарати, антисептичні розчини**

- В) Протизапальні, гіпосенсибілізуючі засоби
- С) Протизапальні, антисептичні розчини
- Д) Кератопластичні, протівірусні препарати
- Е) Кератопластичні засоби, антисептичні розчини

5. Дитина 14 років діагностовано остеобластокластому (кістозна форма). На рентгенограмі правої половини нижньої щелепи: вогнище резорбції кісткової тканини із зоною склерозу навколо. У вогнищі ураження виявляються множинні дрібні порожнини, горизонтальна резорбція коренів зубів, що знаходяться в зоні пухлини. Яке лікування показане хворому?

*** А) Хірургічне**

- В) Хіміотерапія
- С) Променева терапія
- Д) Комбіноване
- Е) Симптоматичне

6. Після профілактичного огляду у дитини 6 років лікарем-ортодонтом зішліфовані нестерті рвучі горбики тимчасових іклів. Для профілактики розвитку якого прикусу було це здійснено?

*** А) Прогенічного**

- В) Прогнатичного
- С) Опістогнатичного
- Д) Відкритого
- Е) Глибокого

7. Больному Д., 67 лет, с беззубыми челюстями, при изготовлении съемных протезов применяли аппарат Ларина. При помощи этого аппарата:

- * А) Формировали протетическую плоскость**
- В) Определяли камперовскую горизонталь
- С) Определяли франкфуртскую горизонталь
- Д) Формировали окклюзионную плоскость
- Е) Формировали сферическую окклюзионную поверхность

8. Пациент 55 лет обратился с жалобами на отсутствие 26 зуба. Объективно: слизистая в области удаленного зуба бледно-розового цвета, зубы, ограничивающие дефект интактны, устойчивы. 36 зуб на 1/3 коронки выдвинут в сторону дефекта. Какой план лечения необходимо рекомендовать больному:

- * А) Депульпирование 36 зуба и одновременное изготовление мостовидного протеза на верхнюю челюсть и искусственной коронки на 36 зуб**
- В) Направить на ортодонтическое лечение с последующим ортопедическим лечением.
- С) Изготовление временного мостовидного протеза на период от 3 до 6 месяцев с последующим изготовлением постоянного мостовидного протеза
- Д) Провести аппаратно-хирургическое лечение с последующим изготовлением ортопедического протеза.
- Е) Изготовить мостовидный протез с вогнутой промежуточной частью

9. Чоловік 48 р. звернувся зі скаргами на постійні болі в ділянці 36 зуба. Раніше зуб неодноразово болів. При огляді порожнини рота коронка 36 зуба відсутня, перкусія коренів болісна. На рентгенограмі в ділянці верхівок коренів 36 зона розрідження з нечіткими контурами. Встановіть діагноз:

- * А) Хронічний гранулюючий періодонтит.**
- В) Хронічний гранульоматозний періодонтит.
- С) Гострий періодонтит.
- Д) Хронічний фіброзний періодонтит.
- Е) Хронічний пульпіт.

10. До місцевих карієсogених факторів відносять:

*** А) Порушення властивостей і складу ротової рідини**

- В) Екстремальні впливи
- С) Погана якість питної води
- Д) Спадковість
- Е) Неповноцінна структура твердих тканин

11. Хвора 22 років страждає ревмокардитом. спрямована до стоматолога для санації порожнини рота. Яка форма періодонтиту з перерахованих є найбільш грізним вогнищем одонтогенної інфекції?

*** А) Хронічний гранулюючий періодонтит.**

- В) Хронічний гранульоматозний періодонтит.
- С) Хронічний фіброзний періодонтит.
- Д) Гострий серозний періодонтит.
- Е) Гострий гнійний періодонтит.

12. У клініку звернулася жінка з дитиною 12 років із приводу травми 11 зуба. Об'єктивно: відкол коронки на 1/3, перкусія безболісна, зондування слабоболюча. Коротка болюча реакція на температурні подразники. На знімку змін немає. Дії лікаря?

*** А) Відновити зуб і періодично спостерігати.**

- В) Провести вітальну ампутацію з наступним відновленням зуба.
- С) Провести вітальну екстерпацію з наступним відновленням коронки..
- Д) Провести девітальну екстерпацію з наступним відновленням коронки.
- Е) Спостерігати за зубом.

13. Яке ускладнення під час ортодонтичного лікування незнімним апаратом виникає при використанні великої сили?

*** А) Рухливість та біль в зубах.**

В) Гіперемія ясен.

С) Декубітальні виразки

Д) Біль в області суглобів.

Е) Некроз емалі.

14. Жінка, 41 рік, звернулась до лікаря-стоматолога зі скаргами на кровоточивість ясен. Після проведеного обстеження встановлений діагноз: генералізований пародонтит II ступеню, загострений перебіг. З анамнезу відмічає цукровий діабет. З яким лікарем інтерністом необхідно вести цю пацієнтку?

*** А) Ендокринологом**

В) Гематологом

С) Пульмонологом

Д) Нефрологом

Е) Алергологом

15. Больной С., 33 лет, находится на лечении у стоматолога по поводу хронического глубокого кариеса 22,III класс по Блэку. Восстановление коронки врач решил выполнить с применением фотоотверждаемого композиционного материала. Какая оптимальная температура рекомендована в стоматологическом кабинете для работы с фотоотверждаемыми композиционными материалами?

*** А) 21-24°C**

В) 18-21°C

С) 24-26°C

Д) Не имеет значения

16. Після ендодонтичного лікування пацієнтка 35 р. звернулася з приводу зміни кольору коронки 22 зуба. Зуб придбав рожеве фарбування. Вкажіть причину.

*** А) Неправильний вибір кореневого наповнювача.**

- В) Неправильний вибір реставраційного матеріалу.
- С) Порушення технології обробки кореневого каналу.
- Д) Порушення технології реставрації зуба.
- Е) Внутрішні захворювання пацієнтки.

17. Жінка скаржиться на гострий біль у 48 зубі. Біль постійний, самовільний, інтенсивність наростає з кожною годиною, відмічається відчуття “вирослого зуба”. При огляді в 48 зубі глибока каріозна порожнина, перкусія різко болісна. Встановіть діагноз.

*** А) гострий періодонтит.**

- В) гострий пульпіт.
- С) глибокий карієс.
- Д) хронічний пульпіт.
- Е) невралгія трійчастого нерва.

18. Підліток звернувся зі скаргами на біль у 26 зубі. Встановлений діагноз: гострий дифузний пульпіт. Які симптоми характерні?

*** А) самовільні, нічні, ірадіюючі.**

- В) постійні сильні болі.
- С) короткочасні приступоподібні з довгими періодами ремісії.
- Д) Поряд з гострими приступоподібними болями може бути довгочасний, ниючий біль.
- Е) Постійні слабкі болі.

19. На прийом прийшов пацієнт з пляшкою холодної води, яка заспокоює зубний біль. Який найбільш вірогідний діагноз?

*** А) Гострий гнійний пульпіт.**

- В) Середній карієс.
- С) Гострий періодонтит.
- Д) Хронічний періодонтит.
- Е) Глибокий карієс.

20. У клініку звернувся пацієнт 33 р зі скаргами на рухливість 22 зуба. В анамнезі травма зуба 2 роки тому. Об'єктивно: зуб раніше не лікований, рухливість 3 ст., перкусія слабо болюча. На знімку - резорбція кореня на 1/3. Найбільше доцільно:

*** А) Видалити зуб.**

- В) Провести фізіотерапевтичне лікування.
- С) Провести ендодонтичне лікування і шинувати зуб.
- Д) Провести резекцію кореня зуба з підсадженням кісткової тканини.
- Е) Спостереження.

21. Для відкриття міської дитячої стоматологічної поліклініки потрібна певна кількість населення. Яка кількість населення необхідна для відкриття міської дитячої стоматологічної поліклініки

*** А) 25 тис. населення**

- В) 20 тис. населення
- С) 18 тис. населення
- Д) 16 тис. населення
- Е) 15 тис. населення