

ЗАВАНТАЖЕНО З САЙТУ ТЕСТУВАННЯ.УКР

Надання допомоги стоматологічним хворим, що потребують особливої тактики ведення - база тестів 2013 року

Категорія: **Бази тестів українською мовою 2013 року**

Кількість запитань: **8**

1. Метод знеболювання при лікуванні гострого серозного дифузного пульпіту 12 та 22 зубів у дитини 12 років з ДЦП

*** А) загальне**

- В) внутрішньопульпарне
- С) провідникове
- Д) провідникове та внутрішньорпульпарне
- Е) -

2. До лікаря-стоматолога звернулась пацієнтка віком 32 років зі скаргами на появу “виразок” на слизовій оболонці порожнини рота. Під час огляду виявлено, що на червоній каймі губ пухирці і кірки, у кутиках рота глибокі тріщини, вкриті білим нальотом. Пацієнтка хворіє впродовж двох місяців. Впродовж вказаного періоду у пацієнтки у пацієнтки зменшилась вага на 11 кг, пацієнтка перенесла пневмонію. Визначте первинний діагноз.

*** А) СНІД**

- В) Багатоформна ексудативна еритема
- С) Хронічний кандидозний стоматит
- Д) Герпетичний стоматит
- Е) Рецидивуючий герпес порожнини рота, ангулярний мікотичний хейліт

3. У мальчика ,страдающего ревматоидным артритом, на ортопантомограмме была выявлена резорбция вершин межзубных перегородок на фоне остеопороза челюстных костей. Назовите ведущую причину поражения пародонта в данном случае.

*** А) Системная дезорганизация соединительной ткани**

- В) Снижение скорости слюноотделения
- С) Нарушение гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой системы
- Д) Микроангиопатия
- Е) -

4. Девочке 10 лет был поставлен диагноз гипертрофический гингивит средней тяжести (отечная форма). Прием каких лекарственных препаратов может вызвать гиперплазию десны?

*** А) Дифенин**

В) Анальгин

С) Аскорбиновая кислота

Д) Димедрол

Е) Пенициллин

5. У пацієнта К., 28 років внаслідок травми дефект твердого піднебіння у передньому відділі. При об'єктивному обстеженні встановили відсутність 11, 12, 21, 22 разом із альвеолярним відростком, дефект піднебіння розміром 2,0х0,5 см, доходить до перехідної складки. Зуби в бокових ділянках верхньої щелепи збережені, інтактні. Яку конструкцію протеза доцільно застосувати в даному випадку?

*** А) Знімний пластинковий протез із еластичною підкладкою**

В) Знімний пластинковий протез із пелотами

С) Знімний пластинковий протез із ізолюваним торусом

Д) Знімний пластинковий протез із зубами на приточці

Е) -

6. Зміни, які найчастіше з'являються на слизовій оболонці порожнини рота у хворих на СНІД до появи основних клінічних симптомів:

*** А) лейкоплакія**

В) червоний плаский лишай

С) хронічний рецидивуючий афтозний стоматит

Д) папіломатоз

Е) гінгівіт

7. Гострий початок, підвищення температури, порушення загального стану; катаральний стоматит, чисельні петехії на слизовій оболонці порожнини рота, збільшення підщелепних та шийних лімфатичних вузлів. В крові: моноцитоз, виявлення мононуклеарів, лейкоцитоз, лімфоцитоз. Поставте попередній діагноз:

*** А) інфекційний мононуклеоз**

В) вітряна віспа

С) дифтерія

Д) грип

Е) кір

8. На яснах яскраво-червоні дрібні горбики м'якої консистенції, частково укриті виразками, фібриновим нальотом. Виразки неглибокі, різко болісні, з неправильними чітко окресленими краями, їхнє дно покрите подібними до малини грануляціями. Який найбільш вірогідний діагноз?

*** А) туберкульозний вовчак**

В) виразковий гінгівіт

С) третинний сифіліс

Д) червоний вовчак

Е) ракова виразка