

ЗАВАНТАЖЕНО З САЙТУ ТЕСТУВАННЯ.УКР

Організація надання допомоги, в тому числі профілактики - база тестів 2014 року

Категорія: **Бази тестів українською мовою 2014 року**

Кількість запитань: **40**

1. Батьки дівчинки 3 років скаржаться на наявність порожнин в зубах на верхній щелепі. Об'єктивно: на жувальних поверхнях 54, 64 каріозні порожнини в межах плащевого дентину, краї емалі стоншені, легко відламуються, дентин каріозних порожнин світлий, вологий, знімається пластами. Зондування дна каріозної порожнини безболісне. Який пломбувальний матеріал бажано використати?

*** А) Склоіономерний цемент.**

- В) Срібну амальгаму.
- С) Композитний матеріал.
- Д) Сілікатний цемент.
- Е) Цинкфосфатний цемент.

2. Хлопчик 6 років скаржиться на біль в зубі від хімічних та термічних подразників, затримку їжі між зубами. Об'єктивно: в 55 каріозна порожнина на жувальній поверхні в межах біляпульпарного дентину, дентин світло-коричневого кольору, м'який, знімається пластами. Зондування дна слабо болісне, реакція на термічні подразники позитивна, швидко минає після усунення подразника. Виберіть пломбувальний матеріал.

*** А) Склоіономерний цемент.**

- В) Срібну амальгаму.
- С) Композитний матеріал.
- Д) Сілікатний цемент.
- Е) Цинкфосфатний цемент.

3. Ребенку 6,5 лет. Жалоб не предъявляет. При профилактическом осмотре полости рта выявлено: в 16, 26, 36, 46 зубах широкие, слабо минерализованные, не до конца сформированные фиссуры. Укажите оптимальный способ лечения и группу материалов для его проведения.

*** А) Герметизация фиссур, композиционные материалы**

В) Препарирование и пломбирование, металлические материалы

С) Герметизация фиссур, фторсодержащие лаки

Д) Реминерализирующая терапия, препараты кальция

Е) Герметизация фиссур, металлические материалы

4. Ребенку 9 лет. Родился и проживает в эндемической зоне по флюорозу. Обратился с целью санации полости рта. При осмотре выявлено: на вестибулярной поверхности 12, 11, 21, 22, 31, 32, 41, 42 зубов темные пятна, которые обнаружили при прорезывании. Укажите главный этиологический фактор заболевания.

*** А) Токсическое воздействие фтора**

В) Наследственное нарушение формирования

С) Токсикозы беременности

Д) Нарушение белкового обмена

Е) Токсическое воздействие тяжелых металлов

5. Чоловік 48 р. звернувся зі скаргами на постійні болі в ділянці 36 зуба. Раніше зуб неодноразово болів. При огляді порожнини рота коронка 36 зуба відсутня, перкусія коренів болісна. На рентгенограмі в ділянці верхівок коренів 36 зона розрідження з нечіткими контурами. Встановіть діагноз:

*** А) Хронічний гранулюючий періодонтит.**

В) Хронічний гранульоматозний періодонтит.

С) Гострий періодонтит.

Д) Хронічний фіброзний періодонтит.

Е) Хронічний пульпіт.

6. Дитина 8 років скаржиться на болі в 26 зубі, які посилюються від термічних та хімічних подразників. Болі не проходять після зняття подразника протягом 4-5 хв. Безбольові проміжки короткотривалі, перкусія болюча, зондування болюче по всьому дну, зуб болить три дні. Який метод лікування Ви оберете, зважаючи на ступінь формування коренів?

*** А) Вітальна ампутація**

В) Девітальна екстерпація.

С) Біологічний метод.

Д) Девітальна ампутація.

Е) Вітальна екстерпація.

7. Больной С., 33 лет, находится на лечении у стоматолога по поводу хронического глубокого кариеса 22, III класс по Блеку. Восстановление коронки врач решил выполнить с применением фотоотверждаемого композиционного материала. Какая оптимальная температура рекомендована в стоматологическом кабинете для работы с фотоотверждаемыми композиционными материалами?

*** А) 21-24°C**

В) 18-21°C

С) 24-26°C

Д) Не имеет значения

8. Больной И. 27 лет обратился к хирургу стоматологу для удаления зуба на верхней челюсти, с целью подготовки к протезированию. В анамнезе у больного полиаллергия на различные лекарственные препараты. После введения лидокаина у больного развился анафилактический шок. Выберете препарат, который первым вводится при оказании первой помощи:

*** А) Адреналин 0,1% - 0,5 мл**

В) Димедрол 1% - 2,0 мл

С) Кордиамин 25% - 1,0 мл

Д) Эуфиллин 2,4% - 10,0 мл

Е) -

9. Какой процент перекиси водорода применяется для обработки стоматологических зеркал, по приказу №408 для медицинских учреждений стоматологического профиля

*** А) 4%**

В) 6%

С) 3%

Д) 2%

Е) 10%

10. Какой из перечисленных препаратов обладает выраженной противовирусной активностью?

*** А) Стериллиум**

В) 70% раствор спирта

С) 0,5% раствор хлорамина

Д) 3% раствор перекиси водорода

Е) Раствор хлоргексидина

11. С целью диспансеризации была осмотрена группа детей 12 лет. в группе обследованных детей показатель интенсивности кариеса [КПУ] составил 3,7. Какому уровню распространенности кариеса отвечают эти данные?

*** А) средний**

- В) Очень низкий
- С) низкий
- Д) Очень высокий
- Е) высокий

12. Детям, проживающим в городской зоне необходимо провести плановую санацию. Какой метод является наиболее предпочтительным?

*** А) Організований**

- В) змішаний
- С) бригадний
- Д) централізований
- Е) децентралізований

13. Родители девочки 12-ти лет обратились к стоматологу с жалобой на наличие пятен на передних зубах. При осмотре на вестибулярной поверхности резцов выявлена меловидная пигментация эмали. Из анамнеза установлено, что девочка жила в местности, где концентрация фтора в воде 1,7 мг/л. Поставлен диагноз: меловидно-крапчатая форма флюороза. Определите причину заболевания.

*** А) Избыточное содержание фтора в воде.**

- В) Нарушение закладки зубов.
- С) Наследственные заболевания.
- Д) Прием антибиотиков в первый год жизни.
- Е) Симптом общесоматической патологии.

14. Для осуществления первичной профилактики стоматологических заболеваний рекомендовано провести фторирование воды. Какая средняя концентрация фтора должна быть в искусственно фторированной воде в условиях умеренного климата?

*** А) 0,8-1,2мг/л**

В) 1,1-1,5 мг/л

С) 2,0-6,0 мг/л

Д) 1,5-2,0мг/л

Е) 0,1-0,3 мг/л

15. На приеме у стоматолога ребенок 6 лет. Определили индекс КПУ+кп = 0, индекс гигиены по Федорову Володкиной =2,1.Обнаружены закрытые глубокие фиссуры в 16,26,36 и 46.Какое оптимальное профилактическое мероприятие выберет врач, для предупреждения кариеса в этих зубах?

*** А) Герметизация фиссур**

В) покрытие фтор-лак

С) аппликацияРаствор фторида натрия

Д) аппликацияРаствор ремодента

Е) Метод серебрения

16. Хворому І., 34 років внаслідок отриманої травми на виробництві у процесі виконання ним трудових обов'язків було пошкоджено 4 фронтальних зуба на верхній щелепі, які було за показаннями видалено.Чи забезпечується потерпілий правом безоплатного зубного протезування?

*** А) Забезпечується зубним протезуванням з відшкодуванням витрат із фонду соціального страхування (за винятком протезування з дорогоцінних металів).**

В) Не забезпечується

С) Забезпечується зубним протезуванням (за винятком протезування з дорогоцінних металів та металокерамічних і металопластмасових протезів)

Д) Забезпечується зубним протезуванням (за винятком протезування з дорогоцінних металів та прирівняних до них по ціні тільки по досягненню пенсійного віку)

17. Хвора 32-х років скаржиться на постійний ниючий біль у 26, що підсилюється при накусуванні. Об'єктивно: на жувальній поверхні 26 каріозна порожнина, що сполучається з порожниною зуба. Перехідна складка болюча при пальпації, перкусія 26 різко болюча. Після зондування з каналу з'явився гній. Який метод дослідження необхідно провести для встановлення діагнозу?

*** А) Рентгенологічне дослідження**

- В) електроодонтодіагностика
- С) термопроба
- Д) бактеріологічне дослідження
- Е) глибоке зондування

18. Хворий 45-ти років звернувся зі скаргами на постійний ниючий біль у зубі, що підсилюється при накушуванні. З дні тому зуб було запломбовано з приводу глибокого карієсу. Вертикальна перкусія болісна. Термопроба болісна ЄОД 120 мкА. На рентгенограмі - тканини періодонту не змінені. Що повинен зробити лікар у першу чергу:

*** А) Відкрити порожнину зуба і створити відток ексудату.**

- В) видалити пломбу.
- С) призначити антисептичні полоскання.
- Д) призначити фізпроцедуру.
- Е) провести корекцію пломби.

19. До місцевих карієсogених факторів відносять:

*** А) Порушення властивостей і складу ротової рідини**

- В) Екстремальні впливи
- С) Погана якість питної води
- Д) Спадковість
- Е) Неповноцінна структура твердих тканин

20. Хвора 22 років страждає ревмокардитом. спрямована до стоматолога для санації порожнини рота. Яка форма періодонтиту з перерахованих є найбільш грізним вогнищем одонтогенної інфекції?

*** А) Хронічний гранулюючий періодонтит.**

В) Хронічний гранульоматозний періодонтит.

С) Хронічний фіброзний періодонтит.

Д) Гострий серозний періодонтит.

Е) Гострий гнійний періодонтит.

21. У клініку звернулася жінка з дитиною 12 років із приводу травми 11 зуба. Об'єктивно: відкол коронки на 1/3, перкусія безболісна, зондування слабоболюча. Коротка болюча реакція на температурні подразники. На знімку змін немає. Дії лікаря?

*** А) Відновити зуб і періодично спостерігати.**

В) Провести вітальну ампутацію з наступним відновленням зуба.

С) Провести вітальну екстерпацію з наступним відновленням коронки..

Д) Провести девітальну екстерпацію з наступним відновленням коронки.

Е) Спостерігати за зубом.

22. Дівчинці 4 роки. В анамнезі часті респіраторні захворювання. Об'єктивно: Обличчя симетричне. Тимчасовий прикус. Зубна формула: на верхній щелепі - 55 54 53 52 51 61 62 63 64 65, на нижній щелепі - 85 84 83 82 81 71 72 73 74 75. Дихає ротом. Консультація якого лікаря-спеціаліста більш необхідна у даному випадку?

*** А) ЛОР-лікаря**

В) Лікаря-терапевта

С) Лікаря-гастроентеролога

Д) Лікаря-невропатолога

Е) Лікаря-хірурга

23. Яке ускладнення під час ортодонтичного лікування незнімним апаратом виникає при використанні великої сили?

*** А) Рухливість та біль в зубах.**

- В) Гіперемія ясен.
- С) Декубітальні виразки
- Д) Біль в області суглобів.
- Е) Некроз емалі.

24. Дитина 6-ти років звернулася з метою профілактичного обстеження ротової порожнини. Об'єктивно: 16, 26, 36, 46 зуби інтактні, з глибокими вузькими фісурами, прорізались 4 місяці тому. Який метод профілактики карієсу доцільно використати:

*** А) Герметизація фісур зубів**

- В) Електрофорез 10% розчину глюконату кальцію
- С) Таблетки фториду натрію
- Д) Покриття фтористим лаком
- Е) Аплікація 10% розчину глюконату кальцію

25. Який термін зберігання стерильності інструментарію в камері з бактерицидним опроміненням після стерилізації?

*** А) Сім діб**

- В) Чотири доби
- С) П'ять діб
- Д) Шість діб
- Е) Три доби

26. У дитини 8-ми років внаслідок травми відбувся перелом коронки 11 зуба. Порожнина зуба розкрита, зондування різко болісне. На рентгенограмі - несформована верхівка кореня. Дії лікаря?

*** А) Ендодонтичне лікування, спрямоване на апексифікацію**

В) Хірургічне лікування

С) Ортопедичне лікування

Д) Лікування травматичного пульпіту в одне відвідування

Е) Фізіотерапевтичне лікування

27. Після ендодонтичного лікування пацієнтка 35 р. звернулася з приводу зміни кольору коронки 22 зуба. Зуб придбав рожеве фарбування. Вкажіть причину.

*** А) Неправильний вибір кореневого наповнювача.**

В) Неправильний вибір реставраційного матеріалу.

С) Порушення технології обробки кореневого каналу.

Д) Порушення технології реставрації зуба.

Е) Внутрішні захворювання пацієнтки.

28. Жінка скаржиться на гострий біль у 48 зубі. Біль постійний, самовільний, інтенсивність наростає з кожною годиною, відмічається відчуття “вирослого зуба”. При огляді в 48 зубі глибока каріозна порожнина, перкусія різко болісна. Встановіть діагноз.

*** А) гострий періодонтит.**

В) гострий пульпіт.

С) глибокий карієс.

Д) хронічний пульпіт.

Е) невралгія трійчастого нерва.

29. Підліток звернувся зі скаргами на біль у 26 зубі. Встановлений діагноз: гострий дифузний пульпіт. Які симптоми характерні ?

*** А) самовільні, нічні, ірадіюючі.**

В) постійні сильні болі.

С) короткочасні приступоподібні з довгими періодами ремісії.

Д) Поряд з гострими приступоподібними болями може бути довгочасний, ниючий біль.

Е) Постійні слабкі болі.

30. Хворий скаржиться на наявність каріозної порожнини у 26 зубі, колір зуба змінений, глибока каріозна порожнина, поєднана з порожниною зуба. Зондування, перкусія безболісні. ЕОД 100 мкА. На рентгенограмі - розширення періодонтальної щілини. Який найбільш вірогідний діагноз?

*** А) Хронічний фіброзний періодонтит.**

В) Хронічний глибокий карієс.

С) Хронічний гранульоматозний періодонтит.

Д) Хронічний гангренозний пульпіт.

Е) Хронічний гранулюючий періодонтит.

31. На прийом прийшов пацієнт з пляшкою холодної води, яка заспокоює зубний біль. Який найбільш вірогідний діагноз?

*** А) Гострий гнійний пульпіт.**

В) Середній карієс.

С) Гострий періодонтит.

Д) Хронічний періодонтит.

Е) Глибокий карієс.

32. Скільки посад лікарів-стоматологів і лікарів стоматологів-хірургів устанавлюються сумарно на 10 000 дорослого населення міста, де мешкає понад 25тис. осіб, згідно штатних нормативів медичного персоналу за Наказом МОЗ України № 33 від 23.02.2000.

*** А) 4 посади лікарів-стоматологів і лікарів стоматологів- хірургів**

В) 6 посад лікарів-стоматологів і лікарів стоматологів- хірургів

С) 7 посад лікарів-стоматологів і лікарів стоматологів- хірургів

Д) 9 посад лікарів-стоматологів і лікарів стоматологів- хірургів

Е) 8 посад лікарів-стоматологів і лікарів стоматологів- хірургів

33. Жінка, 41 рік, звернулась до лікаря-стоматолога зі скаргами на кровоточивість ясен. Після проведеного обстеження встановлений діагноз: генералізований пародонтит II ступеню, загострений перебіг. З анамнезу відмічає цукровий діабет. З яким лікарем інтерністом необхідно вести цю пацієнтку?

*** А) Ендокринологом**

В) Гематологом

С) Пульмонологом

Д) Нефрологом

Е) Алергологом

34. У больной 65 лет, с полным отсутствием моляров и премоляров на в/чел и н/чел развилась боль и тугоподвижность в ВНЧС, незначительное снижение слуха. Больная страдает полиартритом. Какое исследование необходимо провести в первую очередь для постановки диагноза?

*** А) Рентгенографию ВНЧС**

В) Рентгенографию нижней челюсти в прямой проекции

С) Рентгенографию черепа в прямой аксиальной проекции

Д) Рентгенографию придаточных пазух носа

Е) Сиалография

35. Больной С., 33 лет, находится на лечении у стоматолога по поводу хронического глубокого кариеса 22,III класс по Блеку. Восстановление коронки врач решил выполнить с применением фотоотверждаемого композиционного материала. Какая оптимальная температура рекомендована в стоматологическом кабинете для работы с фотоотверждаемыми композиционными материалами?

- * А) 21-24°C**
- В) 18-21°C
- С) 24-26°C
- Д) Не имеет значения

36. У клініку звернувся пацієнт 33 р зі скаргами на рухливість 22 зуба. В анамнезі травма зуба 2 роки тому. Об'єктивно: зуб раніше не лікований, рухливість 3 ст., перкусія слабо болюча. На знімку - резорбція кореня на 1/3. Найбільше доцільно:

- * А) Видалити зуб.**
- В) Провести фізіотерапевтичне лікування.
- С) Провести ендодонтичне лікування і шинувати зуб.
- Д) Провести резекцію кореня зуба з підсадженням кісткової тканини.
- Е) Спостереження.

37. Хворий 45 л. звернувся зі скаргами на постійний ниючий біль у зубі, що підсилюється при накушуванні. 3 дні тому зуб було запломбовано з приводу глибокого карієсу. Вертикальна перкусія болісна. Термопроба болісна ЄОД 120 мкА. На рентгенограмі - тканини періодонту не змінені. Що повинен зробити лікар у першу чергу:

- * А) Відкрити порожнину зуба і створити відток ексудату.**
- В) Призначити протизапальні препарати
- С) призначити антисептичні полоскання.
- Д) призначити фізпроцедуру.
- Е) провести корекцію пломби.

38. Хлопчик 11-ти років. Під час профілактичного огляду виявлено аномалію положення зубів - 23 зуб прорізався на місці латерального різця, а 22 зуб - на місці ікла. Встановіть діагноз.

*** А) Транспозиція латерального різця і ікла.**

В) Тортоаномалія латерального різця і ікла.

С) Дистальне положення латерального різця.

Д) Мезіальне положення ікла.

Е) Дистальне положення латерального різця і мезіальне положення ікла.

39. Пацієнт, 32 року, скаржиться на слабкість, головний біль та біль у горлі при ковтанні, підвищення температури тіла до 38,7°C. Об'єктивно: на слизовій оболонці передніх піднебінних дужок, мигдаликів, задньої стінки глотки на тлі гіперемії - безліч дрібних ерозій. Вставлено діагноз герпангіна. Які препарати для обробки порожнини рота слід призначити в перші три дні захворювання?

*** А) Протівірусні препарати, антисептичні розчини**

В) Протизапальні, гіпосенсибілізуючі засоби

С) Протизапальні, антисептичні розчини

Д) Кератопластичні, протівірусні препарати

Е) Кератопластичні засоби, антисептичні розчини

40. Дитина 14 років діагностовано остеобластокластому (кістозна форма). На рентгенограмі правої половини нижньої щелепи: вогнище резорбції кісткової тканини із зоною склерозу навколо. У вогнищі ураження виявляються множинні дрібні порожнини, горизонтальна резорбція коренів зубів, що знаходяться в зоні пухлини. Яке лікування показане хворому?

*** А) Хірургічне**

В) Хіміотерапія

С) Променева терапія

Д) Комбіноване

Е) Симптоматичне