

ЗАВАНТАЖЕНО З САЙТУ ТЕСТУВАННЯ.УКР

Диспансеризація - база тестів 2014 року

Категорія: **Бази тестів українською мовою 2014 року**

Кількість запитань: **40**

1. У хворої А., 12 років, КПУ=6 . 17,27зуби щойно прорізалися .Якому матеріалу для запечаткування фісур 17,27 надати перевагу?

*** А) склоіономерний цемент**

- В) Композит хімічного твердіння
- С) Композит світлового твердіння
- Д) Ком помер
- Е) Ормокер

2. Під час профілактичного огляду в дівчинки 10 років виявлено: в 55, 65, 75 та 85 - пломби, що відповідають усім вимогам, перші премоляри у стадії прорізування. ТЕР-тест за Окушко - 4 бали. Гігієнічний індекс за Green-Vermillion - 1 бал. Проба Шиллера-Писарева - негативна, індекс РМА = 0%. Які зубні пасти потрібні дитині для гігієни порожнини рота?

*** А) З вмістом кальцію та фтору**

- В) З вмістом фтору та ферментів
- С) З вмістом кальцію та ферментів
- Д) З вмістом біодобавок та фосфатів
- Е) З вмістом цитратів та солей

3. Мужчина 28 років, що хворіє на цукровий діабет пришов на прийом до стоматолога з ознаками флегмони лівої підщелепної ділянки. В зв'язку з погіршенням загального стану і тризмом прийом їжі після ін'єкції інсуліну був затруднений і неповноцінний. Під час обстеження у хворого з'явилося відчуття голоду, неспокою, тремтіння м'язів. Через декілька хвилин він втратив свідомість. Об'єктивно: шкірні покриви бліді, вологи, очні яблука в гіпертонусі. Пульс частий, напружений. АТ 130/90 мм рт. ст, дихання рівне. Назвіть ймовірний діагноз.

*** А) Гіпоглікемічна кома**

В) Гіперглікемічна кома

С) Непритомність

Д) Ендотоксичний шок

Е) Колапс

4. При якій кількості лікарів-ортопедів вводиться 1,0 ставка завідуючого ортопедичним відділенням згідно з Наказом №33 МОЗ України ?

*** А) При кількості вказаних посад більше 6,0**

В) При кількості лікарів - 3,5-6,0

С) При кількості лікарів - більше 4,0

Д) При кількості лікарів - більше 3,0

5. Хвора в черзі на прийом до лікаря-стоматолога поскаржилась на погане самопочуття, нудоту, біль в животі, головний біль. Вона зробила спробу піднятись, але похитнулась і впала, втративши свідомість, хвору перенесли на кушетку в кабінеті. Об'єктивно: блідість, сухість, зниження тургору шкіри, м'якість очних яблук, слабкість реакції зіниць на світло, дихання глибоке гучне, запах ацетону під час видиху, пульс слабкий, 70 уд на хв, АТ 70/40 мм тр ст. Назвіть стан, який розвинувся у хворой?

*** А) Гіперглікемічна діабетична кома**

В) Гіпоглікемічна кома

С) Непритомність

Д) Колапс

Е) Наднирникова кома

6. Дитина В., 6 р., отримала опіки шкіри лиця І-ІІ ступеня соляною кислотою. Яка допомога необхідна постраждалій дитині?

*** А) Промивання проточною водою (20-30 хв.), примочки 2-5% розчином натрію гідрокарбонату, комплексна терапія**

В) Промивання проточною водою (20-30 хв.), комплексна терапія

С) Примочки 2-5% розчином натрію гідрокарбонату, мазеві пов'язки

Д) Промивання водою, мазеві пов'язки, комплексна терапія

Е) Примочки 2-5% розчином натрію гідрокарбонату, комплексна терапія

7. Дитина К., 5 р., гострою металевою трубкою травмувала слизову оболонку м'якого піднебіння. При огляді на м'якому піднебінні у центрі визначається рана розміром до 1 см, глибина - 0,5 см, прикрита згустком крові. Яка допомога необхідна постраждалої дитині?

*** А) Первиння хірургічна обробка рани під загальним знеболюванням в умовах стаціонару**

- В) Обробка рани антисептиками, накладання швів тільки на слизову оболонку
- С) Обробка рани відваром трав, рана не зашивається
- Д) Обробка рани розчином перекиси водню, рана не зашивається
- Е) Спостереження за постраждалим, рана не зашивається

8. На хірургічному стоматологічному прийомі хворий 18-ти років при огляді лікарем порожнини рота і зруйнованого зуба раптом зблід, втратив свідомість. Дихання поверхневе, пульс слабкий. Який діагноз слід поставити?

*** А) Непритомність**

- В) Шок
- С) Колапс
- Д) Кома
- Е) Епілептичний припадок

9. Чоловік 56 років звернувся до стоматолога для профілактичного огляду. Хворіє на виразку шлунку, палить з 15 років. Об'єктивно: на слизовій оболонці виявлені вогнища змутнілого епітелію сіро-білого кольору з чіткими контурами, розміром 2.0 x 2.0 см, їх поверхня суха, при зскрібанні не знімається. Пальпація безболісна, ущільнення в основі не має. Встановлений діагноз - лейкоплакія. Яка форма захворювання у пацієнта?

*** А) Проста лейкоплакія**

- В) Лейкоплакія Таппейнера
- С) М'яка лейкоплакія
- Д) Верукозна лейкоплакія
- Е) Ерозивна лейкоплакія

10. Під час профілактичного огляду у жінки 23 років на вестибулярній поверхні 13, 23 був виявлений дефект твердих тканин з щільним дном та стінками, які сходяться під гострим кутом, глибина дефекту 1 мм. Термодіагностика чутлива, перкусія безболісна. Виберіть засоби індивідуальної гігієни порожнини рота ?

*** А) Зубні щітки з м'якою щетиною, зубні пасти з ремінералізуючою дією**

В) Зубні щітки з твердою щетиною, зубні пасти з протизапальною дією

С) Зубні щітки з середньо-твердою щетиною, гігієнічні зубні пасти

Д) Зубні щітки з твердою щетиною, абразивні зубні пасти

Е) Зубні щітки з м'якою щетиною, зубні пасти з протизапальною дією

11. Хвора 18 років, після проведення мандібулярної анестезії ультракаїном ДС раптово зблідла, втратила свідомість, дихання стало повехневим, пульс прискорений, слабого наповнення та напруження. Встановіть діагноз?

*** А) Непритомність.**

В) Інфаркт міокарду.

С) Стенокардія.

Д) набряк Квінке.

Е) Гіпертонічний криз.

12. У хворого, 45 років, після проведення мандибулярної анестезії розчином новокаїну, раптово з'явилося почуття страху, поколювання, свербіння, блідість шкіри обличчя, різка слабкість, стиснення в грудях, на чолі холодний піт, біль за грудиною, пульс нитковидний, артеріальний тиск 80/50 мм рт.ст. Слизові оболонки синюшні, зіниці розширені. Встановіть діагноз?

*** А) Анафілактичний шок.**

В) Гіпертонічний криз

С) Втрата свідомості

Д) набряк Квінке

Е) Ниркова коліка

13. При плановому огляді у школі дітей 9 - ти років лікар - стоматолог виявила групу дітей з високим ризиком розвитку карієсу і застосувала з метою профілактики фтористі лаки з кальційвиісними препаратами. Через який проміжок часу доцільно використовувати ці препарати повторно?

*** А) Кожні 3- 6 міс.**

- В) 1 раз на рік.
- С) 1 раз в 2 роки.
- Д) Кожних 1,5 року.
- Е) 1 раз в 2,5 роки.

14. Жінка 25 років, вагітна, звернулась з метою санації. При огляді у пришийковій ділянці 12,11,21,22 виявлені порожнини з шорстким дном, дентин дна м'який пігментований . Термодіагностика, зондування , перкусія безболісні. Які методи місцевого лікування доцільно застосувати?

*** А) Ремінералізуючу терапію, пломбування**

- В) Професійне чищення, іригація
- С) Професійне чищення, ремінералізуючу терапію
- Д) Пломбування, іригація
- Е) Пломбування, професійне чищення

15. Хвора із патологією щитовидної залози звернулась до стоматолога з метою санації. Під час огляду на вестибулярній поверхні 11 і 12 по екватору зубів виявлені долотоподібні дефекти емалі та дентину з гладкою блискучою поверхнею жовтого кольору. Реакція на подразники відсутня. Визначте діагноз.

*** А) Ерозія**

- В) Поверхневий карієс
- С) Гіпоплазія
- Д) Флюороз
- Е) Стертість

16. Під час очікування своєї черги біля стоматологічного кабінету у пацієнтки 38-ми років розпочалися судоми, з'явилася піна з рота, пацієнтка втратила свідомість. Що трапилось з хворою?

*** А) Епілептичний напад**

- В) Непритомність
- С) Тромбоемболія легеневої артерії
- Д) Інсульт
- Е) Серцева асма.

17. Показник інтенсивності карієсу (кпв) у 12-ти річних дітей становить 3,0. Який рівень оцінки інтенсивності карієсу зубів за ВООЗ?

*** А) середній**

- В) низький
- С) дуже низький
- Д) високий
- Е) дуже високий

18. Хлопчику 4,5 років. Батьків дитини хвилює кволе жування, пташиний профіль обличчя. В анамнезі штучне вигодовування. Об'єктивно: сагітальна щілина 4,5 мм. Форма верхньої і нижньої щелепи - півколо. Який метод лікування в цьому віці найбільш доцільний ?

*** А) Міотерапевтичний**

- В) Апаратурний
- С) Видалення зубів
- Д) Ортопедичний
- Е) Фізіотерапевтичний

19. Дитині 14 років. Четвертий верхній зуб прорізався повністю, але розташований вище оклюзійної поверхні. Яке це аномалійне положення?

*** А) Супраоклюзія**

- В) Інфраоклюзія
- С) Тортооклюзія
- Д) Оральне
- Е) Вестибулярне

20. До лікаря звернулися батьки дівчини 5 років зі скаргами на затруднене носове дихання. Дитина дихає ротом, рот постійно відкритий. До чого може привести дана патологія?

*** А) Звуження верхнього зубного ряду**

- В) Розширення верхнього зубного ряду
- С) Часткової адентії
- Д) Сплющення верхнього зубного ряду у фронтальній ділянці
- Е) Неповне прорізування фронтальних зубів

21. При огляді дитини 8-ми років на вестибулярній поверхні 11, 12, 21, 22 зубів на тлі щільної емалі виявлені плями перлинно-білого кольору, блискучі, безболісні при зондуванні, які поступово переходять в незмінену емаль. При УФ опроміненні плями флюоресцують блакитним кольором. Дитина до 3 років мешкала у зоні де вміст фтору у питній воді становив 2мг/л. Про яке не каріозне ураження іде мова?

*** А) Плямиста форма флюорозу**

- В) Штрихова форма флюорозу
- С) Ерозивна форма флюорозу
- Д) Місцева гіпоплазія
- Е) Системна гіпоплазія

22. Мед. сестрі 30 л., що страждає контактним дерматитом, поставлений діагноз хронічний фіброзний пульпіт 22 зуба. Зуб планується реставрувати. Чим доцільніше obturувати канал?

- * А) Термопластифікованою гутаперчою.**
- В) Пастою на основі резорцину-формаліну.
- С) Пастою, яка має кальцій.
- Д) Пастою, яка має еugenol.
- Е) Провести депофорез з подальшої obturaцією відповідним цементом.

23. Хворому 30 років, в анамнезі цукровий діабет. Під час прийому у стоматолога раптово з'явилося відчуття голоду, слабкість, тримтіння кінцівок, рясний піт. Через 10 хвилин виникли клонічні та тонічні судоми. АТ- 120/80 мм рт.ст, Рс- 82/хв. Дихання в нормі. Який найбільш вірогідний діагноз?

- * А) Гіпоглікемічна кома**
- В) Гіперглікемічна кома
- С) Тиреотоксичний криз
- Д) Гіпертонічний криз
- Е) Коллапс

24. При судорожному синдромі у дітей, для досягнення найбільш швидкого ефекту, хворим необхідно вводити:

- * А) Діазепам**
- В) Аміназин
- С) Платифілін
- Д) Дибазол
- Е) Атропін

25. Вибір препаратів для піднімання тиску при колапсі залежить від сполучення їх судинної та кардіотропної дії. Тільки судинну дію має:

*** А) Мезатон**

В) Норадреналін

С) Адреналін

Д) Ізадрін

Е) Мефетамін

26. У хворого, 27 років, з двохстороннім ментальним переломом нижньої щелепи змістився середній фрагмент нижньої щелепи. В наслідок цього у нього появились симптоми асфіксії [задуха, утруднене дихання, цианоз шкіри]. Який вид асфіксії можна діагностувати при цьому?

*** А) Дислокаційна асфіксія**

В) Стенотична асфіксія

С) Обтураційна асфіксія

Д) Аспіраційна асфіксія

Е) Клапанна асфіксія

27. Хвора страждає ревмокардитом. спрямована до стоматолога для санації порожнини рота. Яка форма періодонтиту з перерахованих є найбільш грізним вогнищем одонтогенної інфекції?

*** А) Хронічний гранулюючий періодонтит.**

В) Хронічний гранульоматозний періодонтит.

С) Хронічний фіброзний періодонтит.

Д) Гострий серозний періодонтит.

Е) Гострий гнійний періодонтит.

28. Після проведеного обстеження хворому 6-ти місяців був вставлений діагноз: повне незрощення верхньої губи. Яку пластичну операцію усунення дефекту потрібно провести?

- * А) Хейлопластика**
- В) Уранопластика
- С) Стафілопластика
- Д) Стафілорафія
- Е) Ураностафілопластика

29. Який із критеріїв оцінки ефективності диспансеризації являється негативним:

- * А) погіршення**
- В) стабілізація процесу
- С) стан без змін
- Д) ремісія
- Е) поліпшення

30. При диспансерному клінічному обстеженні в школі у пацієнта 12 років виявлено відсутність 4 зубів. На рентгенограмі відсутні їх зародки. Який діагноз можна поставити?

- * А) Адентія**
- В) Дистопія
- С) Транспозиція
- Д) Тортоаномалія
- Е) Супраокклюзія

31. Мужчина 35 лет обратился по поводу протезирования зубов. Объективно коронка 25 разрушена на 2/3, культия выступает над уровнем десны на 3 мм. На рентгенограмме: корневой канал запломбирован до верхушки. Как из перечисленных ниже конструкций показана пациенту?

*** А) Корнево-коронковая вкладка**

- В) Вкладка коронковая
- С) Полу коронка
- Д) Экваторная коронка
- Е) Искусственная коронка

32. Пациентке 27 лет планируется изготовление пластмассовой коронки на 21 зуб. Объективно: 21 зуб изменен в цвете и разрушен на 1/3 по режущему краю. На рентгенограмме корневой канал запломбирован до верхушки. Где находится край коронки по отношению к десневому краю?

*** А) на уровне десны**

- В) Не доходит до десны на 0,5 мм
- С) Не доходит до десны на 1,0 мм
- Д) Под десной на 0,5 м
- Е) Под десной на 1,0 мм

33. Стан відсутності свідомості, дихання, серцебиття кваліфікується як:

*** А) Клінічна смерть**

- В) Кома
- С) Супор
- Д) Шок
- Е) Ступор

34. Динаміка астматичного стану:

*** А) Бронхіальна обструкція, дихальна недостатність, недостатність серця**

- В) Задишка ларингоспазм
- С) Тахікардія, наростання набряків
- Д) Колапс, дихальна недостатність
- Е) Кропив'янка, асфіксія

35. Дівчині, 18 років, необхідно провести розкриття абсцесу на верхній щелепі від 15 зуба під місцевою анестезією 2% розчином лідокаїну. Під час операції стан дівчини погіршився: дихання стало нерівномірним, розвинувся "блідий цианоз" обличчя, акроцианоз; шкіра чола вкрилася холодним потом, з'явилися судоми кінцівок. Після одноразової блювоти хвора втратила свідомість; пульс та артеріальний тиск не визначаються, тони серця глухі. Зіниці розширені. Який найбільш вірогідний діагноз?

*** А) Анафілактичний шок**

- В) Колапс
- С) Набряк Квінке
- Д) Тромбоз кавернозного синуса
- Е) Гостра серцева недостатність

36. Хвора 45-ти років страждає на патологічне стирання зубів, з'явилася для диспансерного огляду. Який коефіцієнт стирання [RDA] має мати зубна паста, рекомендована для щоденного застосування?

*** А) 25**

- В) 50-70
- С) 70-100
- Д) 100-120
- Е) -

37. Хвора 49-ти років страждає на клиноподібні дефекти зубів, з'явилася для диспансерного огляду. У 13, 23 клиноподібні дефекти глибиною менш 1 мм, не збільшуються протягом 6 місяців. Тактика лікаря?

*** А) вітамінотерапія, електрофорез препаратів кальцію**

- В) Пломбування дефектів композитами
- С) Електрофорез вітамінів, покриття фтор лаком
- Д) Дарсонвалізація, пломбування компомерами

38. Під час диспансерного огляду хворий В, 42 років скаржиться на підвищену чутливість зубів. Оберіть засоби гігієни .

*** А) Зубна паста з амінофторидом, м'яка щітка, флоси**

- В) Зубна паста з хлоргексидином, м'яка щітка, флоси
- С) Зубна паста з екстрактом шавлії, м'яка щітка, флоси
- Д) Зубна паста з метронідазолом, м'яка щітка, флоси

39. Під час диспансерного огляду хворий 38-ми років, який страждає на клиноподібні дефекти зубів, курить, скаржиться на темний колір зубів. Яку зубну пасту рекомендувати для щоденного застосування?

*** А) для чутливих зубів**

- В) Відбілюючи
- С) Для курців
- Д) Протизапальну
- Е) Протикаріозну

40. Під час диспансерного огляду у хворого 10-ти років виявлено початковий карієс 11, 21 зубів. Зубна паста з якою сполукою буде найефективнішою при щоденному застосуванні?

*** А) з амінофторидом**

В) з хлоргексидином

С) з триклозаном

Д) з лактатом алюмінію

Е) з прополісом