

ЗАВАНТАЖЕНО З САЙТУ ТЕСТУВАННЯ.УКР

Буклет українською мовою 2019 року

Категорія: **Буклети**

Кількість запитань: **150**

1. Медична сестра повинна провести забір матеріалу з носоглотки на чашку Петрі для виявлення палички Борде-Жангу. При якому захворюванні проводиться таке дослідження?

*** А) При кашлюку**

- В) При туберкульозі
- С) При дифтерії
- Д) При менінгококовій інфекції
- Е) При скарлатині

2. Дитина 2-х років хворіє на гострий стенозуючий ларинготрахеїт. Визначена IV ступінь захворювання. Який метод невідкладної допомоги доцільний в цьому випадку?

*** А) Трахеотомія**

- В) Подавання зволоженого кисню
- С) Відволікаюча терапія
- Д) Антигістамінні засоби
- Е) Парові інгаляції

3. Пацієнтка 58-ти років поступила у ендокринологічне відділення у тяжкому стані. При медсестринському обстеженні виявлено: свідомість відсутня, шкіра суха, очі запалі, ціаноз, запах ацетону з рота. Який медикамент найбільш доцільно підготувати медсестрі для надання невідкладної допомоги?

*** А) Інсулін короткої дії**

- В) Інсулін пролонгованої дії
- С) 40% розчин глюкози
- Д) Фізіологічний розчин
- Е) 5% розчин глюкози

4. Хворий 30-ти років отримав ножове поранення стегна. З рани витікає кров темночервоного кольору, рівномірною цівкою. Це характерно для:

*** А) Венозної кровотечі**

В) Артеріальної кровотечі

С) Капілярної кровотечі

Д) Пульсуючої кровотечі

Е) Паренхіматозної кровотечі

5. У пацієнта після фізичного перевантаження виник напад болю у правому підребер'ї з іррадіацією в праве плече, нудота, блювання, яке не принесло полегшення, здуття живота. Язик сухий, обкладений. Шкіра і склери жовтушні. Для якого стану характерні вказані проблеми пацієнта?

*** А) Жовчної коліки**

В) Шлункової кровотечі

С) Ниркової коліки

Д) Кишкової кровотечі

Е) Кишкової коліки

6. Яке ускладнення може розвинути в гострий період інфаркту міокарда?

*** А) Кардіогенний шок**

В) Непритомність

С) Анафілактичний шок

Д) Пневмонія

Е) Носова кровотеча

7. У пологовий будинок доставлена вагітна в терміні 35 тижнів. Після падіння в неї з'явився біль у животі та незначні кров'яністі виділення зі статевих шляхів. Об'єктивно: матка напружена, болюча. За даними УЗД - плацента в ділянці дна матки. Серцебиття плода ритмічне, приглушене, 90/хв. Якій патології відповідає зазначена клінічна картина?

*** А) Передчасне відшарування нормально розташованої плаценти**

В) Загроза переривання вагітності

С) Передлежання плаценти

Д) Передчасні пологи

Е) Загроза розриву матки

8. У постраждалого площа опіків II-III ступенів складає 20%, розвивається опіковий шок. Вкажіть заходи протишокової терапії:

*** А) Знеболювання, введення плазмозамінників**

В) Первинна обробка опіку, асептична пов'язка

С) Знеболювання, гемотрансфузія

Д) ШВЛ, непрямий масаж серця

Е) ПХО рани, іммобілізація опікової ділянки

9. Дитина 10-ти років постраждала в автокатастрофі. Непритомна, пульс на сонній артерії не визначається, дихання відсутнє. Якими повинні бути дії медичної сестри в цьому випадку?

*** А) негайно розпочати серцево-легеневу реанімацію**

В) Чекати прибуття швидкої допомоги

С) Повернути потерпілого набік

Д) Надати підвищеного положення ногам потерпілої

Е) Виміряти артеріальний тиск

10. Медсестра оглянула постраждалого, який упав з висоти 3-х метрів на ноги. Об'єктивно: пальпація болісна в ділянці III-го поперекового хребця, відсутня чутливість на нижніх кінцівках. Зазначте засоби, що необхідно застосувати при транспортуванні даного пацієнта:

*** А) Твердий щит**

- В) Шину Дітеріхса
- С) Шину Крамера
- Д) Шину Єланського
- Е) Лямки

11. До приймального відділення швидка допомога привезла непритомного постраждалого. Об'єктивно: кровотеча з вух та носа, на потиличній ділянці голови - забійна рана 4х3 см. До якого відділення слід направити пацієнта?

*** А) Нейрохірургічне**

- В) Неврологічне
- С) Хірургічне
- Д) Терапевтичне
- Е) Діагностичне

12. У пацієнта, який працює в друкарському виробництві, виник переймоподібний біль у животі, закрепи, солодкий присмак у роті, біль у голові, запаморочення. Навколо ясен і зубів - лілово-сіра смужка. Для якого отруєння характерні ці симптоми?

*** А) Свинцем**

- В) Ртуттю
- С) Хлорорганічними сполуками
- Д) Пестицидами
- Е) Фосфорорганічними сполуками

13. Чоловік 40-ка років отримав під час бійки ножове поранення серця. Медична сестра, яку викликали до потерпілого побачила, що зліва від груднини, в 4 міжребер'ї, стримить ніж. Вкажіть тактику медичної сестри:

*** А) Ніж не видаляти**

- В) Ввести спазмолітики
- С) Ніж видалити
- Д) Ввести кордіамін
- Е) Видалити ніж та накласти оклюзійну пов'язку

14. Через 2 години після святкування дня народження у дитини 6-ти років з'явилися нудота, переймоподібний біль у животі, багаторазове блювання. Які першочергові дії медичної сестри при наданні допомоги на догоспітальному етапі?

*** А) Промивання шлунку і кишок**

- В) Дезінтоксикаційна терапія
- С) Послаблюючі засоби
- Д) Очисна клізма
- Е) Посилене пиття

15. 5-місячна дитина хворіє на кашлюк. Під час нападу кашлю виник ціаноз шкіри обличчя, слизових оболонок, наступила зупинка дихання. Скільки вдихів за хвилину Вам необхідно провести при виконанні штучного дихання?

*** А) 25-30**

- В) 10-15
- С) 15-20
- Д) 80-100
- Е) 100-120

16. Дівчинка 8-ми років поскаржилась на загальну слабкість, запаморочення, миготіння перед очима, шум у вухах, втратила свідомість. При огляді: шкіра бліда, вкрита потом, дихання рідке, поверхнєве, тони серця приглушені, пульс - 105/хв., АТ- 70/35 мм рт.ст. Вкажіть, яке положення необхідно надати дитині:

*** А) Горизонтальне з припіднятими ногами**

В) Напівсидяче положення

С) Вертикальне положення

Д) Лежачи на лівому боці

Е) Лежачи на правому боці

17. В акушерське відділення поступила вагітна в терміні 33 тижні зі скаргами на кровотечу зі статевих шляхів. При акушерському дослідженні виявлено: високе стояння голівки плода по відношенню до входу в малий таз. При УЗД виявлено: плацента повністю перекриває внутрішнє вічко. Який стан характеризує дана клінічна картина?

*** А) Повне передлежання плаценти**

В) Бокове передлежання плаценти

С) Крайове передлежання плаценти

Д) Неповне передлежання плаценти

Е) Прирощення плаценти

18. У гінекологічний стаціонар бригадою швидкої допомоги доставлено жінку 35-ти років зі скаргами на раптовий біль внизу живота з іррадіацією у пряму кишку, короточасну втрату свідомості, запаморочення. При огляді: АТ- 100/60 мм рт.ст., пульс 88/хв., шкірні покриви та слизові оболонки бліді. Піхвове дослідження - відмічається різка болючість в ділянці заднього склепіння. Остання менструація була 2 місяці тому. Оцініть клінічну ситуацію:

*** А) Порушена позаматкова вагітність**

В) Апоплексія яєчника

С) Прогресуюча позаматкова вагітність

Д) Гострий аднексит

Е) Гострий ендометрит

19. До акушерського стаціонару доставлена вагітна зі скаргами на сильний головний біль, пелену перед очима, "миготіння мушок". Термін вагітності 36 тижнів. АТ170/110 мм рт.ст., протеїнурія - 5 г/л, генералізовані набряки. На пропускнику у вагітної почалися тоніко-клонічні судоми. Оцініть клінічну ситуацію:

*** А) Еклампсія**

В) Геморагічний інсульт

С) Менінгоенцефаліт

Д) Пухлина головного мозку

Е) Епілепсія

20. До гінекологічного відділення поступила пацієнтка зі скаргами на рясні кров'янисті виділення зі статевих шляхів, сильний переймоподібний біль внизу живота. Об'єктивно: АТ- 100/60 мм рт.ст., Рс- 90/хв. При піхвовому дослідженні: зовнішнє вічко шийки матки пропускає палець. Матка збільшена до 8-9 тижнів вагітності. Оцініть клінічну ситуацію:

*** А) Аборт у ході**

- В) Аборт, що не відбувся
- С) Неповний аборт
- Д) Загроза аборті
- Е) Повний аборт

21. До шкільної медсестри звернувся школяр, який поранив склом праву гомілку. При огляді медична сестра виявила рану 3х1 см, з якої рівномірним струменем витікає темна кров. Назвіть метод тимчасової зупинки кровотечі у даному випадку:

*** А) Стискаюча пов'язка**

- В) Оклюзійна пов'язка
- С) Пальцеве притиснення артерії
- Д) Згинання кінцівки в суглобі
- Е) Накладання джгута

22. У пацієнтки, після укусу бджоли, виник набряк обличчя, особливо набрякли губи і шия. Потім з'явилась ядуха, гавкаючий кашель. Дихання утруднене, осиплість голосу. Який стан розвинувся у пацієнтки?

*** А) Набряк Квінке**

- В) Анафілактичний шок
- С) Серцева астма
- Д) Бронхіальна астма
- Е) Кропив'янка

23. До дільничної медичної сестри звернулась хвора 53-х років зі скаргами на головний біль переважно у потиличній ділянці, нудоту, блювання. При огляді: пульс - 89/хв., ритмічний, АТ- 210/120 мм рт.ст. Який препарат введе медсестра хворій за призначенням лікаря?

*** А) Магнію сульфат**

В) Корглікон

С) Кордіамін

Д) Анальгін

Е) Адреналін

24. У пацієнтки 28-ми років, запідозрено порушену позаматкову вагітність. Яке обстеження підтвердить Ваші припущення?

*** А) Пункція черевної порожнини через заднє склепіння**

В) Діагностичне вишкрібання порожнини матки

С) Зондування матки

Д) Пельвіометрія

Е) Кольпоскопія

25. Дитина 2-х років хворіє на гострий стенозуючий ларинготрахеїт. Визначена ІV ступінь захворювання. Який метод невідкладної допомоги доцільний в цьому випадку?

*** А) Трахеотомія**

В) Подавання зволоженого кисню

С) Відволікаюча терапія

Д) Антигістамінні засоби

Е) Парові інгаляції

26. Пацієнтка 58-ти років поступила у ендокринологічне відділення у тяжкому стані. При медсестринському обстеженні виявлено: свідомість відсутня, шкіра суха, очі запалі, ціаноз, запах ацетону з рота. Який медикамент найбільш доцільно підготувати медсестрі для надання невідкладної допомоги?

*** А) Інсулін короткої дії**

В) Інсулін пролонгованої дії

С) 40% розчин глюкози

Д) Фізіологічний розчин

Е) 5% розчин глюкози

27. Хворий 30-ти років отримав ножове поранення стегна. З рани витікає кров темночервоного кольору, рівномірною цівкою. Це характерно для:

*** А) Венозної кровотечі**

В) Артеріальної кровотечі

С) Капілярної кровотечі

Д) Пульсуючої кровотечі

Е) Паренхіматозної кровотечі

28. У пацієнта після фізичного перевантаження виник напад болю у правому підребер'ї з іррадіацією в праве плече, нудота, блювання, яке не принесло полегшення, здуття живота. Язик сухий, обкладений. Шкіра і склери жовтушні. Для якого стану характерні вказані проблеми пацієнта?

*** А) Жовчної коліки**

В) Шлункової кровотечі

С) Ниркової коліки

Д) Кишкової кровотечі

Е) Кишкової коліки

29. Яке ускладнення може розвинутись в гострий період інфаркту міокарда?

*** А) Кардіогенний шок**

- В) Непритомність
- С) Анафілактичний шок
- Д) Пневмонія
- Е) Носова кровотеча

30. У пологовий будинок доставлена вагітна в терміні 35 тижнів. Після падіння в неї з'явився біль у животі та незначні кров'яністі виділення зі статевих шляхів. Об'єктивно: матка напружена, болюча. За даними УЗД - плацента в ділянці дна матки. Серцебиття плода ритмічне, приглушене, 90/хв. Якій патології відповідає зазначена клінічна картина?

*** А) Передчасне відшарування нормально розташованої плаценти**

- В) Загроза переривання вагітності
- С) Передлежання плаценти
- Д) Передчасні пологи
- Е) Загроза розриву матки

31. У постраждалого площа опіків II-III ступенів складає 20%, розвивається опіковий шок. Вкажіть заходи протишокової терапії:

*** А) Знеболювання, введення плазмозамінників**

- В) Первинна обробка опіку, асептична пов'язка
- С) Знеболювання, гемотрансфузія
- Д) ШВЛ, непрямий масаж серця
- Е) ПХО рани, іммобілізація опікової ділянки

32. Дитина 10-ти років постраждала в автокатастрофі. Непритомна, пульс на сонній артерії не визначається, дихання відсутнє. Якими повинні бути дії медичної сестри в цьому випадку?

*** А) негайно розпочати серцево-легеневу реанімацію**

- В) Чекати прибуття швидкої допомоги
- С) Повернути потерпілого набік
- Д) Надати підвищеного положення ногам потерпілої
- Е) Виміряти артеріальний тиск

33. Медсестра оглянула постраждалого, який упав з висоти 3-х метрів на ноги. Об'єктивно: пальпація болісна в ділянці III-го поперекового хребця, відсутня чутливість на нижніх кінцівках. Зазначте засоби, що необхідно застосувати при транспортуванні даного пацієнта:

*** А) Твердий щит**

- В) Шину Дітерікса
- С) Шину Крамера
- Д) Шину Єланського
- Е) Лямки

34. До приймального відділення швидка допомога привезла непритомного постраждалого. Об'єктивно: кровотеча з вух та носа, на потиличній ділянці голови - забійна рана 4х3 см. До якого відділення слід направити пацієнта?

*** А) Нейрохірургічне**

- В) Неврологічне
- С) Хірургічне
- Д) Терапевтичне
- Е) Діагностичне

35. У пацієнта, який працює в друкарському виробництві, виник переймоподібний біль у животі, закрепи, солодкий присмак у роті, біль у голові, запаморочення. Навколо ясен і зубів - лілово-сіра смужка. Для якого отруєння характерні ці симптоми?

*** А) Свинцем**

- В) Ртуттю
- С) Хлорорганічними сполуками
- Д) Пестицидами
- Е) Фосфорорганічними сполуками

36. Чоловік 40-ка років отримав під час бійки ножове поранення серця. Медична сестра, яку викликали до потерпілого побачила, що зліва від груднини, в 4 міжребер'ї, стримить ніж. Вкажіть тактику медичної сестри:

*** А) Ніж не видаляти**

- В) Ввести спазмолітики
- С) Ніж видалити
- Д) Ввести кордіамін
- Е) Видалити ніж та накласти оклюзійну пов'язку

37. Через 2 години після святкування дня народження у дитини 6-ти років з'явилися нудота, переймоподібний біль у животі, багаторазове блювання. Які першочергові дії медичної сестри при наданні допомоги на догоспітальному етапі?

*** А) Промивання шлунку і кишок**

- В) Дезінтоксикаційна терапія
- С) Послаблюючі засоби
- Д) Очисна клізма
- Е) Посилене пиття

38. 5-місячна дитина хворіє на кашлюк. Під час нападу кашлю виник ціаноз шкіри обличчя, слизових оболонок, наступила зупинка дихання. Скільки вдихів за хвилину Вам необхідно провести при виконанні штучного дихання?

*** А) 25-30**

В) 10-15

С) 15-20

Д) 80-100

Е) 100-120

39. Дівчинка 8-ми років поскаржилась на загальну слабкість, запаморочення, миготіння перед очима, шум у вухах, втратила свідомість. При огляді: шкіра бліда, вкрита потом, дихання рідке, поверхнєве, тони серця приглушені, пульс - 105/хв., АТ- 70/35 мм рт.ст. Вкажіть, яке положення необхідно надати дитині:

*** А) Горизонтальне з припіднятими ногами**

В) Напівсидяче положення

С) Вертикальне положення

Д) Лежачи на лівому боці

Е) Лежачи на правому боці

40. В акушерське відділення поступила вагітна в терміні 33 тижні зі скаргами на кровотечу зі статевих шляхів. При акушерському дослідженні виявлено: високе стояння голівки плода по відношенню до входу в малий таз. При УЗД виявлено: плацента повністю перекриває внутрішнє вічко. Який стан характеризує дана клінічна картина?

*** А) Повне передлежання плаценти**

В) Бокове передлежання плаценти

С) Крайове передлежання плаценти

Д) Неповне передлежання плаценти

Е) Прирощення плаценти

41. У гінекологічний стаціонар бригадою швидкої допомоги доставлено жінку 35-ти років зі скаргами на раптовий біль внизу живота з іррадіацією у пряму кишку, короточасну втрату свідомості, запаморочення. При огляді: АТ- 100/60 мм рт.ст., пульс 88/хв., шкірні покриви та слизові оболонки бліді. Піхвове дослідження - відмічається різка болючість в ділянці заднього склепіння. Остання менструація була 2 місяці тому. Оцініть клінічну ситуацію:

*** А) Порушена позаматкова вагітність**

В) Апоплексія яєчника

С) Прогресуюча позаматкова вагітність

Д) Гострий аднексит

Е) Гострий ендометрит

42. До акушерського стаціонару доставлена вагітна зі скаргами на сильний головний біль, пелену перед очима, "миготіння мушок". Термін вагітності 36 тижнів. АТ170/110 мм рт.ст., протеїнурія - 5 г/л, генералізовані набряки. На пропускнику у вагітної почалися тоніко-клонічні судоми. Оцініть клінічну ситуацію:

*** А) Еклампсія**

В) Геморагічний інсульт

С) Менінгоенцефаліт

Д) Пухлина головного мозку

Е) Епілепсія

43. До гінекологічного відділення поступила пацієнтка зі скаргами на рясні кров'янисті виділення зі статевих шляхів, сильний переймоподібний біль внизу живота. Об'єктивно: АТ- 100/60 мм рт.ст., Рс- 90/хв. При піхвовому дослідженні: зовнішнє вічко шийки матки пропускає палець. Матка збільшена до 8-9 тижнів вагітності. Оцініть клінічну ситуацію:

*** А) Аборт у ході**

- В) Аборт, що не відбувся
- С) Неповний аборт
- Д) Загроза аборту
- Е) Повний аборт

44. До шкільної медсестри звернувся школяр, який поранив склом праву гомілку. При огляді медична сестра виявила рану 3х1 см, з якої рівномірним струменем витікає темна кров. Назвіть метод тимчасової зупинки кровотечі у даному випадку:

*** А) Стискаюча пов'язка**

- В) Оклюзійна пов'язка
- С) Пальцеве притиснення артерії
- Д) Згинання кінцівки в суглобі
- Е) Накладання джгута

45. У пацієнтки, після укусу бджоли, виник набряк обличчя, особливо набрякли губи і шия. Потім з'явилась ядуха, гавкаючий кашель. Дихання утруднене, осиплість голосу. Який стан розвинувся у пацієнтки?

*** А) Набряк Квінке**

- В) Анафілактичний шок
- С) Серцева астма
- Д) Бронхіальна астма
- Е) Кропив'янка

46. До дільничної медичної сестри звернулась хвора 53-х років зі скаргами на головний біль переважно у потиличній ділянці, нудоту, блювання. При огляді: пульс - 89/хв., ритмічний, АТ- 210/120 мм рт.ст. Який препарат введе медсестра хворій за призначенням лікаря?

*** А) Магнію сульфат**

В) Корглікон

С) Кордіамін

Д) Анальгін

Е) Адреналін

47. У пацієнтки 28-ми років, запідозрено порушену позаматкову вагітність. Яке обстеження підтвердить Ваші припущення?

*** А) Пункція черевної порожнини через заднє склепіння**

В) Діагностичне вишкрібання порожнини матки

С) Зондування матки

Д) Пельвіометрія

Е) Кольпоскопія

48. До сімейної медичної сестри звернулась мати з дитиною віком 1 місяць зі скаргами на постійні закисання правого ока з народження. При натисканні на область слізного мішка із нижньої слізної точки виділяється гній. Яке захворювання запідозрить медична сестра?

*** А) Дакріоцистит новонароджених**

В) Гострий дакриоденіт

С) Гострий кон'юнктивіт

Д) Гострий іридоцикліт

Е) Гострий кератит

49. Ви медична сестра комбустіологічного відділення, де знаходиться пацієнт з опіками, передньої поверхні обох стегон та тулуба, а також промежини.

Визначте % площі опіку:

*** А) 28**

В) 18

С) 9

Д) 36

Е) 25

50. Прибувши на місце аварії, у потерпілого діагностували множинний перелом ребер. Потерпілому надана перша медична допомога та вирішено транспортувати його в лікувальний заклад. В якому положенні слід здійснювати транспортування пацієнта?

*** А) В напівсидячому**

В) Лежачи на спині

С) Лежачи на животі

Д) На спині на щиті

Е) Лежачи на здоровому боці

51. Ви обстежуєте пацієнта після травми живота. Запідозрили пошкодження порожнистого органу черевної порожнини. Який основний симптом характерний при цьому?

*** А) Щоткіна-Блюмберга**

В) Бабінського

С) Пастернацького

Д) Грекова-Ортнера

Е) Василенка

52. У міському парку перехожі знайшли чоловіка без ознак життя. При огляді: свідомість відсутня, дихання та пульсу на сонних артеріях немає, зіниці розширені, рогівка блискуча. Ваші дії:

*** А) Розпочати серцево-легеневу реанімацію**

- В) Викликати швидку допомогу
- С) Викликати поліцію
- Д) Констатувати біологічну смерть
- Е) Не чіпати постраждалого

53. При рентгенологічному дослідженні органів черевної порожнини на знімку виявляються чаші Клойбера. Яке захворювання можна запідозрити?

*** А) Кишкова непрохідність**

- В) Гострий холецистит
- С) Гострий панкреатит
- Д) Піддіафрагмальний абсцес
- Е) Міжпетельний абсцес

54. Медична сестра повинна провести забір матеріалу з носоглотки на чашку Петрі для виявлення палички Борде-Жангу. При якому захворюванні проводиться таке дослідження?

*** А) При кашлюку**

- В) При туберкульозі
- С) При дифтерії
- Д) При менінгококовій інфекції
- Е) При скарлатині

55. У хворої 27-ми років під час профогляду виявлено пухлину в черевній порожнині. Менструальний цикл не порушений. Під час піхвового дослідження: матка й ліві придатки не змінені. Справа в ділянці придатків - тугоеластичне утворення до 8 см у діаметрі, рухоме, неболюче, з гладенькою поверхнею. Який діагноз можна припустити?

*** А) Кіста правого яєчника**

- В) Субсерозна міома матки
- С) Ектопічна вагітність
- Д) Правобічний піосальпінкс
- Е) Рак тіла матки

56. Пацієнт 48-ми років скаржиться на постійну задишку, періодично біль в грудній клітці, кашель. Хворіє 15 років. Тривалий час працював шахтарем. Грудна клітка діжкоподібної форми. Над легеньми коробковий звук, місцями притуплений. Яке захворювання слід запідозрити?

*** А) Пневмоконіоз**

- В) Хронічний бронхіт
- С) Бронхоектатична хвороба
- Д) Туберкульоз легень
- Е) Рак легень

57. У тракториста після обприскування сільськогосподарських угідь фосфорорганічними пестицидами з'явилися слинотеча, блювання. Об'єктивно: міоз, блідість шкіри, АТ- 80/50 мм рт.ст. Який препарат слід застосувати при наданні медичної допомоги?

*** А) Атропін**

- В) Адреналін
- С) Кофеїн
- Д) Унітіол
- Е) Хлористий кальцій

58. Пацієнтка доставлена в приймальне відділення зі скаргами на слинотечу, нудоту, блювання, біль у животі, слюзоточивість, порушення зору. Ці явища виникли після знищування мух і комарів. Яке отруєння запідозрить медична сестра у пацієнта?

*** А) Фосфорорганічними сполуками**

- В) Метиловим спиртом
- С) Чадним газом
- Д) Хлорорганічними сполуками
- Е) Ртутьорганічними сполуками

59. У пацієнта 60-ти років, що хворіє на гіпертонічну хворобу, виник напад ядухи, кашель з виділенням пінистого харкотиння рожевого кольору. Яке ускладнення розвинулось у пацієнта?

*** А) Набряк легень**

- В) Інфаркт міокарда
- С) Легенева кровотеча
- Д) Тромбоемболія легеневої артерії
- Е) Напад бронхіальної астми

60. До приймального відділення звернулась жінка із скаргами на запаморочення, нудоту, сильний головний біль в ділянці потилиці, миготіння мушок перед очима. Об'єктивно: обличчя гіперемійоване, пульс 92/хв., АТ-180/100 мм рт.ст. Який стан розвинувся у пацієнта?

*** А) Гіпертонічний криз**

- В) Інфаркт міокарда
- С) Гіпотонічний криз
- Д) Ішемічний інсульт
- Е) Напад мігрені

61. Медична сестра повинна провести забір матеріалу з носоглотки на чашку Петрі для виявлення палички Борде-Жангу. При якому захворюванні проводиться таке дослідження?

*** А) При кашлюку**

- В) При туберкульозі
- С) При дифтерії
- Д) При менінгококовій інфекції
- Е) При скарлатині

62. Дитина 2-х років хворіє на гострий стенозуючий ларинготрахеїт. Визначена IV ступінь захворювання. Який метод невідкладної допомоги доцільний в цьому випадку?

*** А) Трахеотомія**

- В) Подавання зволоженого кисню
- С) Відволікаюча терапія
- Д) Антигістамінні засоби
- Е) Парові інгаляції

63. Пацієнтка 58-ти років поступила у ендокринологічне відділення у тяжкому стані. При медсестринському обстеженні виявлено: свідомість відсутня, шкіра суха, очі запалі, ціаноз, запах ацетону з рота. Який медикамент найбільш доцільно підготувати медсестрі для надання невідкладної допомоги?

*** А) Інсулін короткої дії**

- В) Інсулін пролонгованої дії
- С) 40% розчин глюкози
- Д) Фізіологічний розчин
- Е) 5% розчин глюкози

64. Хворий 30-ти років отримав ножове поранення стегна. З рани витікає кров темночервоного кольору, рівномірною цівкою. Це характерно для:

*** А) Венозної кровотечі**

В) Артеріальної кровотечі

С) Капілярної кровотечі

Д) Пульсуючої кровотечі

Е) Паренхіматозної кровотечі

65. У пацієнта після фізичного перевантаження виник напад болю у правому підребер'ї з іррадіацією в праве плече, нудота, блювання, яке не принесло полегшення, здуття живота. Язик сухий, обкладений. Шкіра і склери жовтушні. Для якого стану характерні вказані проблеми пацієнта?

*** А) Жовчної коліки**

В) Шлункової кровотечі

С) Ниркової коліки

Д) Кишкової кровотечі

Е) Кишкової коліки

66. Яке ускладнення може розвинути в гострий період інфаркту міокарда?

*** А) Кардіогенний шок**

В) Непритомність

С) Анафілактичний шок

Д) Пневмонія

Е) Носова кровотеча

67. У пологовий будинок доставлена вагітна в терміні 35 тижнів. Після падіння в неї з'явився біль у животі та незначні кров'яністі виділення зі статевих шляхів. Об'єктивно: матка напружена, болюча. За даними УЗД - плацента в ділянці дна матки. Серцебиття плода ритмічне, приглушене, 90/хв. Якій патології відповідає зазначена клінічна картина?

*** А) Передчасне відшарування нормально розташованої плаценти**

- В) Загроза переривання вагітності
- С) Передлежання плаценти
- Д) Передчасні пологи
- Е) Загроза розриву матки

68. У постраждалого площа опіків II-III ступенів складає 20%, розвивається опіковий шок. Вкажіть заходи протишокової терапії:

*** А) Знеболювання, введення плазмозамінників**

- В) Первинна обробка опіку, асептична пов'язка
- С) Знеболювання, гемотрансфузія
- Д) ШВЛ, непрямий масаж серця
- Е) ПХО рани, іммобілізація опікової ділянки

69. Дитина 10-ти років постраждала в автокатастрофі. Непритомна, пульс на сонній артерії не визначається, дихання відсутнє. Якими повинні бути дії медичної сестри в цьому випадку?

*** А) негайно розпочати серцево-легеневу реанімацію**

- В) Чекати прибуття швидкої допомоги
- С) Повернути потерпілого набік
- Д) Надати підвищеного положення ногам потерпілої
- Е) Виміряти артеріальний тиск

70. Медсестра оглянула постраждалого, який упав з висоти 3-х метрів на ноги. Об'єктивно: пальпація болісна в ділянці III-го поперекового хребця, відсутня чутливість на нижніх кінцівках. Зазначте засоби, що необхідно застосувати при транспортуванні даного пацієнта:

*** А) Твердий щит**

- В) Шину Дітеріхса
- С) Шину Крамера
- Д) Шину Єланського
- Е) Лямки

71. До приймального відділення швидка допомога привезла непритомного постраждалого. Об'єктивно: кровотеча з вух та носа, на потиличній ділянці голови - забійна рана 4х3 см. До якого відділення слід направити пацієнта?

*** А) Нейрохірургічне**

- В) Неврологічне
- С) Хірургічне
- Д) Терапевтичне
- Е) Діагностичне

72. У пацієнта, який працює в друкарському виробництві, виник переймоподібний біль у животі, закрепи, солодкий присмак у роті, біль у голові, запаморочення. Навколо ясен і зубів - лілово-сіра смужка. Для якого отруєння характерні ці симптоми?

*** А) Свинцем**

- В) Ртуттю
- С) Хлорорганічними сполуками
- Д) Пестицидами
- Е) Фосфорорганічними сполуками

73. Чоловік 40-ка років отримав під час бійки ножове поранення серця. Медична сестра, яку викликали до потерпілого побачила, що зліва від груднини, в 4 міжребер'ї, стримить ніж. Вкажіть тактику медичної сестри:

- * А) Ніж не видаляти**
- В) Ввести спазмолітики
- С) Ніж видалити
- Д) Ввести кордіамін
- Е) Видалити ніж та накласти оклюзійну пов'язку

74. Через 2 години після святкування дня народження у дитини 6-ти років з'явилися нудота, переймоподібний біль у животі, багаторазове блювання. Які першочергові дії медичної сестри при наданні допомоги на догоспітальному етапі?

- * А) Промивання шлунку і кишок**
- В) Дезінтоксикаційна терапія
- С) Послаблюючі засоби
- Д) Очисна клізма
- Е) Посилене пиття

75. 5-місячна дитина хворіє на кашлюк. Під час нападу кашлю виник ціаноз шкіри обличчя, слизових оболонок, наступила зупинка дихання. Скільки вдихів за хвилину Вам необхідно провести при виконанні штучного дихання?

- * А) 25-30**
- В) 10-15
- С) 15-20
- Д) 80-100
- Е) 100-120

76. Дівчинка 8-ми років поскаржилась на загальну слабкість, запаморочення, миготіння перед очима, шум у вухах, втратила свідомість. При огляді: шкіра бліда, вкрита потом, дихання рідке, поверхнєве, тони серця приглушені, пульс - 105/хв., АТ- 70/35 мм рт.ст. Вкажіть, яке положення необхідно надати дитині:

*** А) Горизонтальне з припіднятими ногами**

В) Напівсидяче положення

С) Вертикальне положення

Д) Лежачи на лівому боці

Е) Лежачи на правому боці

77. В акушерське відділення поступила вагітна в терміні 33 тижні зі скаргами на кровотечу зі статевих шляхів. При акушерському дослідженні виявлено: високе стояння голівки плода по відношенню до входу в малий таз. При УЗД виявлено: плацента повністю перекриває внутрішнє вічко. Який стан характеризує дана клінічна картина?

*** А) Повне передлежання плаценти**

В) Бокове передлежання плаценти

С) Крайове передлежання плаценти

Д) Неповне передлежання плаценти

Е) Прирощення плаценти

78. У гінекологічний стаціонар бригадою швидкої допомоги доставлено жінку 35-ти років зі скаргами на раптовий біль внизу живота з іррадіацією у пряму кишку, короточасну втрату свідомості, запаморочення. При огляді: АТ- 100/60 мм рт.ст., пульс 88/хв., шкірні покриви та слизові оболонки бліді. Піхвове дослідження - відмічається різка болючість в ділянці заднього склепіння. Остання менструація була 2 місяці тому. Оцініть клінічну ситуацію:

*** А) Порушена позаматкова вагітність**

- В) Апоплексія яєчника
- С) Прогресуюча позаматкова вагітність
- Д) Гострий аднексит
- Е) Гострий ендометрит

79. До акушерського стаціонару доставлена вагітна зі скаргами на сильний головний біль, пелену перед очима, "миготіння мушок". Термін вагітності 36 тижнів. АТ170/110 мм рт.ст., протеїнурія - 5 г/л, генералізовані набряки. На пропускнику у вагітної почалися тоніко-клонічні судоми. Оцініть клінічну ситуацію:

*** А) Еклампсія**

- В) Геморагічний інсульт
- С) Менінгоенцефаліт
- Д) Пухлина головного мозку
- Е) Епілепсія

80. До гінекологічного відділення поступила пацієнтка зі скаргами на рясні кров'янисті виділення зі статевих шляхів, сильний переймоподібний біль внизу живота. Об'єктивно: АТ- 100/60 мм рт.ст., Рс- 90/хв. При піхвовому дослідженні: зовнішнє вічко шийки матки пропускає палець. Матка збільшена до 8-9 тижнів вагітності. Оцініть клінічну ситуацію:

*** А) Аборт у ході**

- В) Аборт, що не відбувся
- С) Неповний аборт
- Д) Загроза аборті
- Е) Повний аборт

81. До шкільної медсестри звернувся школяр, який поранив склом праву гомілку. При огляді медична сестра виявила рану 3х1 см, з якої рівномірним струменем витікає темна кров. Назвіть метод тимчасової зупинки кровотечі у даному випадку:

*** А) Стискаюча пов'язка**

- В) Оклюзійна пов'язка
- С) Пальцеве притиснення артерії
- Д) Згинання кінцівки в суглобі
- Е) Накладання джгута

82. У пацієнтки, після укусу бджоли, виник набряк обличчя, особливо набрякли губи і шия. Потім з'явилась ядуха, гавкаючий кашель. Дихання утруднене, осиплість голосу. Який стан розвинувся у пацієнтки?

*** А) Набряк Квінке**

- В) Анафілактичний шок
- С) Серцева астма
- Д) Бронхіальна астма
- Е) Кропив'янка

83. До дільничної медичної сестри звернулась хвора 53-х років зі скаргами на головний біль переважно у потиличній ділянці, нудоту, блювання. При огляді: пульс - 89/хв., ритмічний, АТ- 210/120 мм рт.ст. Який препарат введе медсестра хворій за призначенням лікаря?

*** А) Магнію сульфат**

В) Корглікон

С) Кордіамін

Д) Анальгін

Е) Адреналін

84. У пацієнтки 28-ми років, запідозрено порушену позаматкову вагітність. Яке обстеження підтвердить Ваші припущення?

*** А) Пункція черевної порожнини через заднє склепіння**

В) Діагностичне вишкрібання порожнини матки

С) Зондування матки

Д) Пельвіометрія

Е) Кольпоскопія

85. До сімейної медичної сестри звернулась мати з дитиною віком 1 місяць зі скаргами на постійні закисання правого ока з народження. При натисканні на область слізного мішка із нижньої слізної точки виділяється гній. Яке захворювання запідозрить медична сестра?

*** А) Дакріоцистит новонароджених**

В) Гострий дакриоденіт

С) Гострий кон'юнктивіт

Д) Гострий іридоцикліт

Е) Гострий кератит

86. Ви медична сестра комбустіологічного відділення, де знаходиться пацієнт з опіками, передньої поверхні обох стегон та тулуба, а також промежини.

Визначте % площі опіку:

*** А) 28**

В) 18

С) 9

Д) 36

Е) 25

87. Прибувши на місце аварії, у потерпілого діагностували множинний перелом ребер. Потерпілому надана перша медична допомога та вирішено транспортувати його в лікувальний заклад. В якому положенні слід здійснювати транспортування пацієнта?

*** А) В напівсидячому**

В) Лежачи на спині

С) Лежачи на животі

Д) На спині на щиті

Е) Лежачи на здоровому боці

88. Ви обстежуєте пацієнта після травми живота. Запідозрили пошкодження порожнистого органу черевної порожнини. Який основний симптом характерний при цьому?

*** А) Щоткіна-Блюмберга**

В) Бабінського

С) Пастернацького

Д) Грекова-Ортнера

Е) Василенка

89. У міському парку перехожі знайшли чоловіка без ознак життя. При огляді: свідомість відсутня, дихання та пульсу на сонних артеріях немає, зіниці розширені, рогівка блискуча. Ваші дії:

*** А) Розпочати серцево-легеневу реанімацію**

- В) Викликати швидку допомогу
- С) Викликати поліцію
- Д) Констатувати біологічну смерть
- Е) Не чіпати постраждалого

90. При рентгенологічному дослідженні органів черевної порожнини на знімку виявляються чаші Клойбера. Яке захворювання можна запідозрити?

*** А) Кишкова непрохідність**

- В) Гострий холецистит
- С) Гострий панкреатит
- Д) Піддіафрагмальний абсцес
- Е) Міжпетельний абсцес

91. Медична сестра повинна провести забір матеріалу з носоглотки на чашку Петрі для виявлення палички Борде-Жангу. При якому захворюванні проводиться таке дослідження?

*** А) При кашлюку**

- В) При туберкульозі
- С) При дифтерії
- Д) При менінгококовій інфекції
- Е) При скарлатині

92. Дитина 2-х років хворіє на гострий стенозуючий ларинготрахеїт. Визначена IV ступінь захворювання. Який метод невідкладної допомоги доцільний в цьому випадку?

*** А) Трахеотомія**

- В) Подання зволоженого кисню
- С) Відволікаюча терапія
- Д) Антигістамінні засоби
- Е) Парові інгаляції

93. Пацієнтка 58-ти років поступила у ендокринологічне відділення у тяжкому стані. При медсестринському обстеженні виявлено: свідомість відсутня, шкіра суха, очі запалі, ціаноз, запах ацетону з рота. Який медикамент найбільш доцільно підготувати медсестрі для надання невідкладної допомоги?

*** А) Інсулін короткої дії**

- В) Інсулін пролонгованої дії
- С) 40% розчин глюкози
- Д) Фізіологічний розчин
- Е) 5% розчин глюкози

94. Хворий 30-ти років отримав ножове поранення стегна. З рани витікає кров темночервоного кольору, рівномірною цівкою. Це характерно для:

*** А) Венозної кровотечі**

- В) Артеріальної кровотечі
- С) Капілярної кровотечі
- Д) Пульсуючої кровотечі
- Е) Паренхіматозної кровотечі

95. У пацієнта після фізичного перевантаження виник напад болю у правому підребер'ї з іррадіацією в праве плече, нудота, блювання, яке не принесло полегшення, здуття живота. Язик сухий, обкладений. Шкіра і склери жовтушні. Для якого стану характерні вказані проблеми пацієнта?

*** А) Жовчної коліки**

В) Шлункової кровотечі

С) Ниркової коліки

Д) Кишкової кровотечі

Е) Кишкової коліки

96. Яке ускладнення може розвинути в гострий період інфаркту міокарда?

*** А) Кардіогенний шок**

В) Непритомність

С) Анафілактичний шок

Д) Пневмонія

Е) Носова кровотеча

97. У пологовий будинок доставлена вагітна в терміні 35 тижнів. Після падіння в неї з'явився біль у животі та незначні кров'яністі виділення зі статевих шляхів. Об'єктивно: матка напружена, болюча. За даними УЗД - плацента в ділянці дна матки. Серцебиття плода ритмічне, приглушене, 90/хв. Якій патології відповідає зазначена клінічна картина?

*** А) Передчасне відшарування нормально розташованої плаценти**

В) Загроза переривання вагітності

С) Передлежання плаценти

Д) Передчасні пологи

Е) Загроза розриву матки

98. У постраждалого площа опіків II-III ступенів складає 20%, розвивається опіковий шок. Вкажіть заходи протишокової терапії:

*** А) Знеболювання, введення плазмозамінників**

- В) Первинна обробка опіку, асептична пов'язка
- С) Знеболювання, гемотрансфузія
- Д) ШВЛ, непрямий масаж серця
- Е) ПХО рани, іммобілізація опікової ділянки

99. Дитина 10-ти років постраждала в автокатастрофі. Непритомна, пульс на сонній артерії не визначається, дихання відсутнє. Якими повинні бути дії медичної сестри в цьому випадку?

*** А) негайно розпочати серцево-легеневу реанімацію**

- В) Чекати прибуття швидкої допомоги
- С) Повернути потерпілого набік
- Д) Надати підвищеного положення ногам потерпілої
- Е) Виміряти артеріальний тиск

100. Медсестра оглянула постраждалого, який упав з висоти 3-х метрів на ноги. Об'єктивно: пальпація болісна в ділянці III-го поперекового хребця, відсутня чутливість на нижніх кінцівках. Зазначте засоби, що необхідно застосувати при транспортуванні даного пацієнта:

*** А) Твердий щит**

- В) Шину Дітерікса
- С) Шину Крамера
- Д) Шину Єланського
- Е) Лямки

101. До приймального відділення швидка допомога привезла непритомного постраждалого. Об'єктивно: кровотеча з вух та носа, на потиличній ділянці голови - забійна рана 4х3 см. До якого відділення слід направити пацієнта?

*** А) Нейрохірургічне**

- В) Неврологічне
- С) Хірургічне
- Д) Терапевтичне
- Е) Діагностичне

102. У пацієнта, який працює в друкарському виробництві, виник переймоподібний біль у животі, закрепи, солодкий присмак у роті, біль у голові, запаморочення. Навколо ясен і зубів - лілово-сіра смужка. Для якого отруєння характерні ці симптоми?

*** А) Свинцем**

- В) Ртуттю
- С) Хлорорганічними сполуками
- Д) Пестицидами
- Е) Фосфорорганічними сполуками

103. Чоловік 40-ка років отримав під час бійки ножове поранення серця. Медична сестра, яку викликали до потерпілого побачила, що зліва від груднини, в 4 міжребер'ї, стримить ніж. Вкажіть тактику медичної сестри:

*** А) Ніж не видаляти**

- В) Ввести спазмолітики
- С) Ніж видалити
- Д) Ввести кордіамін
- Е) Видалити ніж та накласти оклюзійну пов'язку

104. Через 2 години після святкування дня народження у дитини 6-ти років з'явилися нудота, переймоподібний біль у животі, багаторазове блювання. Які першочергові дії медичної сестри при наданні допомоги на догоспітальному етапі?

*** А) Промивання шлунку і кишок**

В) Дезінтоксикаційна терапія

С) Послаблюючі засоби

Д) Очисна клізма

Е) Посилене пиття

105. 5-місячна дитина хворіє на кашлюк. Під час нападу кашлю виник ціаноз шкіри обличчя, слизових оболонок, наступила зупинка дихання. Скільки вдихів за хвилину Вам необхідно провести при виконанні штучного дихання?

*** А) 25-30**

В) 10-15

С) 15-20

Д) 80-100

Е) 100-120

106. Дівчинка 8-ми років поскаржилась на загальну слабкість, запаморочення, миготіння перед очима, шум у вухах, втратила свідомість. При огляді: шкіра бліда, вкрита потом, дихання рідке, поверхнєве, тони серця приглушені, пульс - 105/хв., АТ- 70/35 мм рт.ст. Вкажіть, яке положення необхідно надати дитині:

*** А) Горизонтальне з припіднятими ногами**

В) Напівсидяче положення

С) Вертикальне положення

Д) Лежачи на лівому боці

Е) Лежачи на правому боці

107. В акушерське відділення поступила вагітна в терміні 33 тижні зі скаргами на кровотечу зі статевих шляхів. При акушерському дослідженні виявлено: високе стояння голівки плода по відношенню до входу в малий таз. При УЗД виявлено: плацента повністю перекриває внутрішнє вічко. Який стан характеризує дана клінічна картина?

*** А) Повне передлежання плаценти**

- В) Бокове передлежання плаценти
- С) Крайове передлежання плаценти
- Д) Неповне передлежання плаценти
- Е) Прирощення плаценти

108. У гінекологічний стаціонар бригадою швидкої допомоги доставлено жінку 35-ти років зі скаргами на раптовий біль внизу живота з іррадіацією у пряму кишку, короточасну втрату свідомості, запаморочення. При огляді: АТ- 100/60 мм рт.ст., пульс 88/хв., шкірні покриви та слизові оболонки бліді. Піхвове дослідження - відмічається різка болючість в ділянці заднього склепіння. Остання менструація була 2 місяці тому. Оцініть клінічну ситуацію:

*** А) Порушена позаматкова вагітність**

- В) Апоплексія яєчника
- С) Прогресуюча позаматкова вагітність
- Д) Гострий аднексит
- Е) Гострий ендометрит

109. До акушерського стаціонару доставлена вагітна зі скаргами на сильний головний біль, пелену перед очима, "миготіння мушок". Термін вагітності 36 тижнів. АТ170/110 мм рт.ст., протеїнурія - 5 г/л, генералізовані набряки. На пропускнику у вагітної почалися тоніко-клонічні судоми. Оцініть клінічну ситуацію:

*** А) Еклампсія**

- В) Геморагічний інсульт
- С) Менінгоенцефаліт
- Д) Пухлина головного мозку
- Е) Епілепсія

110. До гінекологічного відділення поступила пацієнтка зі скаргами на рясні кров'яністі виділення зі статевих шляхів, сильний переймоподібний біль внизу живота. Об'єктивно: АТ- 100/60 мм рт.ст., Рс- 90/хв. При піхвовому дослідженні: зовнішнє вічко шийки матки пропускає палець. Матка збільшена до 8-9 тижнів вагітності. Оцініть клінічну ситуацію:

*** А) Аборт у ході**

- В) Аборт, що не відбувся
- С) Неповний аборт
- Д) Загроза аборті
- Е) Повний аборт

111. До шкільної медсестри звернувся школяр, який поранив склом праву гомілку. При огляді медична сестра виявила рану 3х1 см, з якої рівномірним струменем витікає темна кров. Назвіть метод тимчасової зупинки кровотечі у даному випадку:

*** А) Стискаюча пов'язка**

- В) Оклюзійна пов'язка
- С) Пальцеве притиснення артерії
- Д) Згинання кінцівки в суглобі
- Е) Накладання джгута

112. У пацієнтки, після укусу бджоли, виник набряк обличчя, особливо набрякли губи і шия. Потім з'явилась ядуха, гавкаючий кашель. Дихання утруднене, осиплість голосу. Який стан розвинувся у пацієнтки?

*** А) Набряк Квінке**

- В) Анафілактичний шок
- С) Серцева астма
- Д) Бронхіальна астма
- Е) Кропив'янка

113. До дільничної медичної сестри звернулась хвора 53-х років зі скаргами на головний біль переважно у потиличній ділянці, нудоту, блювання. При огляді: пульс - 89/хв., ритмічний, АТ- 210/120 мм рт.ст. Який препарат введе медсестра хворій за призначенням лікаря?

*** А) Магнію сульфат**

- В) Корглікон
- С) Кордіамін
- Д) Анальгін
- Е) Адреналін

114. У пацієнтки 28-ми років, запідозрено порушену позаматкову вагітність. Яке обстеження підтвердить Ваші припущення?

*** А) Пункція черевної порожнини через заднє склепіння**

- В) Діагностичне вишкрібання порожнини матки
- С) Зондування матки
- Д) Пельвіометрія
- Е) Кольпоскопія

115. Дитина 2-х років хворіє на гострий стенозуючий ларинготрахеїт. Визначена IV ступінь захворювання. Який метод невідкладної допомоги доцільний в цьому випадку?

*** А) Трахеотомія**

- В) Подання зволоженого кисню
- С) Відволікаюча терапія
- Д) Антигістамінні засоби
- Е) Парові інгаляції

116. Пацієнтка 58-ти років поступила у ендокринологічне відділення у тяжкому стані. При медсестринському обстеженні виявлено: свідомість відсутня, шкіра суха, очі запалі, ціаноз, запах ацетону з рота. Який медикамент найбільш доцільно підготувати медсестрі для надання невідкладної допомоги?

*** А) Інсулін короткої дії**

- В) Інсулін пролонгованої дії
- С) 40% розчин глюкози
- Д) Фізіологічний розчин
- Е) 5% розчин глюкози

117. Хворий 30-ти років отримав ножове поранення стегна. З рани витікає кров темночервоного кольору, рівномірною цівкою. Це характерно для:

*** А) Венозної кровотечі**

- В) Артеріальної кровотечі
- С) Капілярної кровотечі
- Д) Пульсуючої кровотечі
- Е) Паренхіматозної кровотечі

118. У пацієнта після фізичного перевантаження виник напад болю у правому підребер'ї з іррадіацією в праве плече, нудота, блювання, яке не принесло полегшення, здуття живота. Язик сухий, обкладений. Шкіра і склери жовтушні. Для якого стану характерні вказані проблеми пацієнта?

*** А) Жовчної коліки**

В) Шлункової кровотечі

С) Ниркової коліки

Д) Кишкової кровотечі

Е) Кишкової коліки

119. Яке ускладнення може розвинути в гострий період інфаркту міокарда?

*** А) Кардіогенний шок**

В) Непритомність

С) Анафілактичний шок

Д) Пневмонія

Е) Носова кровотеча

120. У пологовий будинок доставлена вагітна в терміні 35 тижнів. Після падіння в неї з'явився біль у животі та незначні кров'яністі виділення зі статевих шляхів. Об'єктивно: матка напружена, болюча. За даними УЗД - плацента в ділянці дна матки. Серцебиття плода ритмічне, приглушене, 90/хв. Якій патології відповідає зазначена клінічна картина?

*** А) Передчасне відшарування нормально розташованої плаценти**

В) Загроза переривання вагітності

С) Передлежання плаценти

Д) Передчасні пологи

Е) Загроза розриву матки

121. У постраждалого площа опіків II-III ступенів складає 20%, розвивається опіковий шок. Вкажіть заходи протишокової терапії:

*** А) Знеболювання, введення плазмозамінників**

- В) Первинна обробка опіку, асептична пов'язка
- С) Знеболювання, гемотрансфузія
- Д) ШВЛ, непрямий масаж серця
- Е) ПХО рани, іммобілізація опікової ділянки

122. Дитина 10-ти років постраждала в автокатастрофі. Непритомна, пульс на сонній артерії не визначається, дихання відсутнє. Якими повинні бути дії медичної сестри в цьому випадку?

*** А) негайно розпочати серцево-легеневу реанімацію**

- В) Чекати прибуття швидкої допомоги
- С) Повернути потерпілого набік
- Д) Надати підвищеного положення ногам потерпілої
- Е) Виміряти артеріальний тиск

123. Медсестра оглянула постраждалого, який упав з висоти 3-х метрів на ноги. Об'єктивно: пальпація болісна в ділянці III-го поперекового хребця, відсутня чутливість на нижніх кінцівках. Зазначте засоби, що необхідно застосувати при транспортуванні даного пацієнта:

*** А) Твердий щит**

- В) Шину Дітерікса
- С) Шину Крамера
- Д) Шину Єланського
- Е) Лямки

124. До приймального відділення швидка допомога привезла непритомного постраждалого. Об'єктивно: кровотеча з вух та носа, на потиличній ділянці голови - забійна рана 4х3 см. До якого відділення слід направити пацієнта?

*** А) Нейрохірургічне**

- В) Неврологічне
- С) Хірургічне
- Д) Терапевтичне
- Е) Діагностичне

125. У пацієнта, який працює в друкарському виробництві, виник переймоподібний біль у животі, закрепи, солодкий присмак у роті, біль у голові, запаморочення. Навколо ясен і зубів - лілово-сіра смужка. Для якого отруєння характерні ці симптоми?

*** А) Свинцем**

- В) Ртуттю
- С) Хлорорганічними сполуками
- Д) Пестицидами
- Е) Фосфорорганічними сполуками

126. Дитина 2-х років хворіє на гострий стенозуючий ларинготрахеїт. Визначена IV ступінь захворювання. Який метод невідкладної допомоги доцільний в цьому випадку?

*** А) Трахеотомія**

- В) Подавання зволоженого кисню
- С) Відволікаюча терапія
- Д) Антигістамінні засоби
- Е) Парові інгаляції

127. Пацієнтка 58-ти років поступила у ендокринологічне відділення у тяжкому стані. При медсестринському обстеженні виявлено: свідомість відсутня, шкіра суха, очі запалі, ціаноз, запах ацетону з рота. Який медикамент найбільш доцільно підготувати медсестрі для надання невідкладної допомоги?

*** А) Інсулін короткої дії**

- В) Інсулін пролонгованої дії
- С) 40% розчин глюкози
- Д) Фізіологічний розчин
- Е) 5% розчин глюкози

128. Хворий 30-ти років отримав ножове поранення стегна. З рани витікає кров темночервоного кольору, рівномірною цівкою. Це характерно для:

*** А) Венозної кровотечі**

- В) Артеріальної кровотечі
- С) Капілярної кровотечі
- Д) Пульсуючої кровотечі
- Е) Паренхіматозної кровотечі

129. У пацієнта після фізичного перевантаження виник напад болю у правому підребер'ї з іррадіацією в праве плече, нудота, блювання, яке не принесло полегшення, здуття живота. Язик сухий, обкладений. Шкіра і склери жовтушні. Для якого стану характерні вказані проблеми пацієнта?

*** А) Жовчної коліки**

- В) Шлункової кровотечі
- С) Ниркової коліки
- Д) Кишкової кровотечі
- Е) Кишкової коліки

130. Яке ускладнення може розвинутись в гострий період інфаркту міокарда?

*** А) Кардіогенний шок**

- В) Непритомність
- С) Анафілактичний шок
- Д) Пневмонія
- Е) Носова кровотеча

131. У пологовий будинок доставлена вагітна в терміні 35 тижнів. Після падіння в неї з'явився біль у животі та незначні кров'янисті виділення зі статевих шляхів. Об'єктивно: матка напружена, болюча. За даними УЗД - плацента в ділянці дна матки. Серцебиття плода ритмічне, приглушене, 90/хв. Якій патології відповідає зазначена клінічна картина?

*** А) Передчасне відшарування нормально розташованої плаценти**

- В) Загроза переривання вагітності
- С) Передлежання плаценти
- Д) Передчасні пологи
- Е) Загроза розриву матки

132. У постраждалого площа опіків II-III ступенів складає 20%, розвивається опіковий шок. Вкажіть заходи протишокової терапії:

*** А) Знеболювання, введення плазмозамінників**

- В) Первинна обробка опіку, асептична пов'язка
- С) Знеболювання, гемотрансфузія
- Д) ШВЛ, непрямий масаж серця
- Е) ПХО рани, іммобілізація опікової ділянки

133. Дитина 10-ти років постраждала в автокатастрофі. Непритомна, пульс на сонній артерії не визначається, дихання відсутнє. Якими повинні бути дії медичної сестри в цьому випадку?

*** А) негайно розпочати серцево-легеневу реанімацію**

- В) Чекати прибуття швидкої допомоги
- С) Повернути потерпілого набік
- Д) Надати підвищеного положення ногам потерпілої
- Е) Виміряти артеріальний тиск

134. Медсестра оглянула постраждалого, який упав з висоти 3-х метрів на ноги. Об'єктивно: пальпація болісна в ділянці III-го поперекового хребця, відсутня чутливість на нижніх кінцівках. Зазначте засоби, що необхідно застосувати при транспортуванні даного пацієнта:

*** А) Твердий щит**

- В) Шину Дітерікса
- С) Шину Крамера
- Д) Шину Єланського
- Е) Лямки

135. До приймального відділення швидка допомога привезла непритомного постраждалого. Об'єктивно: кровотеча з вух та носа, на потиличній ділянці голови - забійна рана 4х3 см. До якого відділення слід направити пацієнта?

*** А) Нейрохірургічне**

- В) Неврологічне
- С) Хірургічне
- Д) Терапевтичне
- Е) Діагностичне

136. У пацієнта, який працює в друкарському виробництві, виник переймоподібний біль у животі, закрепи, солодкий присмак у роті, біль у голові, запаморочення. Навколо ясен і зубів - лілово-сіра смужка. Для якого отруєння характерні ці симптоми?

*** А) Свинцем**

- В) Ртуттю
- С) Хлорорганічними сполуками
- Д) Пестицидами
- Е) Фосфорорганічними сполуками

137. Чоловік 40-ка років отримав під час бійки ножове поранення серця. Медична сестра, яку викликали до потерпілого побачила, що зліва від груднини, в 4 міжребер'ї, стримить ніж. Вкажіть тактику медичної сестри:

*** А) Ніж не видаляти**

- В) Ввести спазмолітики
- С) Ніж видалити
- Д) Ввести кордіамін
- Е) Видалити ніж та накласти оклюзійну пов'язку

138. Через 2 години після святкування дня народження у дитини 6-ти років з'явилися нудота, переймоподібний біль у животі, багаторазове блювання. Які першочергові дії медичної сестри при наданні допомоги на догоспітальному етапі?

*** А) Промивання шлунку і кишок**

- В) Дезінтоксикаційна терапія
- С) Послаблюючі засоби
- Д) Очисна клізма
- Е) Посилене пиття

139. 5-місячна дитина хворіє на кашлюк. Під час нападу кашлю виник ціаноз шкіри обличчя, слизових оболонок, наступила зупинка дихання. Скільки вдихів за хвилину Вам необхідно провести при виконанні штучного дихання?

*** А) 25-30**

В) 10-15

С) 15-20

Д) 80-100

Е) 100-120

140. Дівчинка 8-ми років поскаржилась на загальну слабкість, запаморочення, миготіння перед очима, шум у вухах, втратила свідомість. При огляді: шкіра бліда, вкрита потом, дихання рідке, поверхнєве, тони серця приглушені, пульс - 105/хв., АТ- 70/35 мм рт.ст. Вкажіть, яке положення необхідно надати дитині:

*** А) Горизонтальне з припіднятими ногами**

В) Напівсидяче положення

С) Вертикальне положення

Д) Лежачи на лівому боці

Е) Лежачи на правому боці

141. В акушерське відділення поступила вагітна в терміні 33 тижні зі скаргами на кровотечу зі статевих шляхів. При акушерському дослідженні виявлено: високе стояння голівки плода по відношенню до входу в малий таз. При УЗД виявлено: плацента повністю перекриває внутрішнє вічко. Який стан характеризує дана клінічна картина?

*** А) Повне передлежання плаценти**

В) Бокове передлежання плаценти

С) Крайове передлежання плаценти

Д) Неповне передлежання плаценти

Е) Прирощення плаценти

142. У гінекологічний стаціонар бригадою швидкої допомоги доставлено жінку 35-ти років зі скаргами на раптовий біль внизу живота з іррадіацією у пряму кишку, короточасну втрату свідомості, запаморочення. При огляді: АТ- 100/60 мм рт.ст., пульс 88/хв., шкірні покриви та слизові оболонки бліді. Піхвове дослідження - відмічається різка болючість в ділянці заднього склепіння. Остання менструація була 2 місяці тому. Оцініть клінічну ситуацію:

*** А) Порушена позаматкова вагітність**

В) Апоплексія яєчника

С) Прогресуюча позаматкова вагітність

Д) Гострий аднексит

Е) Гострий ендометрит

143. До акушерського стаціонару доставлена вагітна зі скаргами на сильний головний біль, пелену перед очима, "миготіння мушок". Термін вагітності 36 тижнів. АТ170/110 мм рт.ст., протеїнурія - 5 г/л, генералізовані набряки. На пропускнику у вагітної почалися тоніко-клонічні судоми. Оцініть клінічну ситуацію:

*** А) Еклампсія**

В) Геморагічний інсульт

С) Менінгоенцефаліт

Д) Пухлина головного мозку

Е) Епілепсія

144. До гінекологічного відділення поступила пацієнтка зі скаргами на рясні кров'янисті виділення зі статевих шляхів, сильний переймоподібний біль внизу живота. Об'єктивно: АТ- 100/60 мм рт.ст., Рс- 90/хв. При піхвовому дослідженні: зовнішнє вічко шийки матки пропускає палець. Матка збільшена до 8-9 тижнів вагітності. Оцініть клінічну ситуацію:

*** А) Аборт у ході**

- В) Аборт, що не відбувся
- С) Неповний аборт
- Д) Загроза аборті
- Е) Повний аборт

145. До шкільної медсестри звернувся школяр, який поранив склом праву гомілку. При огляді медична сестра виявила рану 3х1 см, з якої рівномірним струменем витікає темна кров. Назвіть метод тимчасової зупинки кровотечі у даному випадку:

*** А) Стискаюча пов'язка**

- В) Оклюзійна пов'язка
- С) Пальцеве притиснення артерії
- Д) Згинання кінцівки в суглобі
- Е) Накладання джгута

146. У пацієнтки, після укусу бджоли, виник набряк обличчя, особливо набрякли губи і шия. Потім з'явилась ядуха, гавкаючий кашель. Дихання утруднене, осиплість голосу. Який стан розвинувся у пацієнтки?

*** А) Набряк Квінке**

- В) Анафілактичний шок
- С) Серцева астма
- Д) Бронхіальна астма
- Е) Кропив'янка

147. До дільничної медичної сестри звернулась хвора 53-х років зі скаргами на головний біль переважно у потиличній ділянці, нудоту, блювання. При огляді: пульс - 89/хв., ритмічний, АТ- 210/120 мм рт.ст. Який препарат введе медсестра хворій за призначенням лікаря?

A) Анальгін

*** B) Магнію сульфат**

C) Корглікон

D) Кордіамін

E) Адреналін

148. У пацієнтки 28-ми років, запідозрено порушену позаматкову вагітність. Яке обстеження підтвердить Ваші припущення?

*** A) Пункція черевної порожнини через заднє склепіння**

B) Діагностичне вишкрібання порожнини матки

C) Зондування матки

D) Пельвіометрія

E) Кольпоскопія

149. Хворий 49-ти років внаслідок ДТП отримав травми обличчя зі значними дефектами м'яких тканин носа і щілиною верхньої щелепи. Від пластичної операції хворий відмовився. Що необхідно зробити для відновлення анатомічних особливостей і покращення естетики обличчя хворого?

*** A) Комбінований протез-обтуратор і протез носа на окулярній оправі**

B) Виконати пластику місцевими тканинами

C) Ортодонтично закрити щілину верхньої щелепи

D) Виготовити ектопротез носа з фіксацією пружинами в носових отворах

E) Виготовити ектопротез носа на окулярній оправі

150. Хворий 30-ти років звернувся до стоматолога зі скаргами на сухість в порожнині рота, наявність нашарувань, дискомфорт під час прийому їжі. При огляді слизова оболонка рота гіперемована, сироподібні нашарування. При знятті шпателем стає видно яскраво-рожеву поверхню на тлі атрофії сосочків. Пальпуються підщелепні лімфатичні вузли. При мікроскопічному дослідженні зіскобу нашарувань виявлено псевдоміцелій. З анамнезу: споживач ін'єкційних наркотиків протягом останніх 5-ти років. Які препарати слід призначити для лікування даної патології?

*** А) Анतिретровірусна терапія, протигрибкові препарати**

В) Макроліди, дезінтоксикаційні засоби

С) Анतिретровірусна терапія

Д) Антипротозойні препарати

Е) Протівірусні препарати