

ЗАВАНТАЖЕНО З САЙТУ ТЕСТУВАННЯ.УКР

Медсестринство: Невідкладні стани в хірургії - база тестів 2017 року

Категорія: **Бази тестів українською мовою 2017 року**

Кількість запитань: **28**

1. У хворого на пахвинну грижу 1 годину тому після підняття вантажу з'явився біль у ділянці грижового утворення і воно перестало вправлятися у черевну порожнину. Які заходи невідкладної допомоги повинна виконати медсестра?

*** А) Викликати “швидку допомогу”**

- В) Ввести розчин анальгіну внутрішньом'язово
- С) Ввести розчин но-шпи внутрішньом'язово
- Д) Спробувати самотійно вправити грижу
- Е) Покласти грілку на ділянку грижі

2. Потерпілого чоловіка, 24 років, після ДТП до приймально-діагностичного відділення доставили з множинними ушкодженнями. Чергова медична сестра виявила, що пацієнт без свідомості, дихання поверхневе, пульс ниткоподібний, зіниці звужені. Першочергове незалежне медсестринське втручання.

*** А) Викликати лікаря**

- В) Виміряти АТ
- С) Зібрати сечу на аналіз
- Д) Транспортувати до рентгенкабінету
- Е) Зняти ЕКГ

3. Медична сестра відділення реанімації та інтенсивної терапії за призначенням лікаря проводить інтенсивну медикаментозну терапію. Визначити найбільш ефективний шлях введення інфузійних засобів:

*** А) Внутрішньовенний**

- В) Внутрішньом'язовий
- С) Підшкірний
- Д) Внутрішньосерцевий
- Е) Внутрішньоартеріальний

4. У жінки опік окропом передньої поверхні грудей, живота та ніг. Скарги на сильний біль. Шкіра гіперемована, набрякла. Яке сестринське втручання є доцільним на догоспітальному етапі?

*** А) Охолодити, накласти асептичну пов'язку**

- В) Підсікти пухирі та накласти пов'язку
- С) Порадити застосувати грілку
- Д) Накласти мазеву пов'язку
- Е) Накласти оцтовий компрес

5. Чоловік в стані алкогольного сп'яніння випадково взяв в рот декілька мл оцтової кислоти. Турбує біль. Ротова порожнина гіперемована. Що в першу чергу повинна зробити медсестра?

*** А) Ретельно промити рот водою**

- В) Дати випити гарячого молока
- С) Дати випити холодного молока
- Д) Дати ковтати шматочки льоду
- Е) Ввести в шлунок тонкий зонд.

6. Пацієнт отримав травму грудної клітки. Положення вимушене, у 4 міжребер'ї зліва різана рана 3х1 см, з якої витікає піниста кров, а під час видиху чути всмоктування повітря. Ви наклали окклюзійну пов'язку. Яке її функціональне призначення?

*** А) Герметизація рани**

- В) Захист від інфікування
- С) Усунення деформації
- Д) Зупинка кровотечі
- Е) Транспортна іммобілізація

7. До Вас звернувся сусід, який скаржиться на переймоподібний біль в животі, нудоту, блювання, затримку газів і стільця. При огляді Ви запідозрили “гострий живіт”. Як надати долікарську допомогу?

*** А) Покласти холод на живіт, викликати “швидку допомогу”**

- В) Знеболити, покласти грілку на живіт
- С) Промити шлунок, поставити очисну клізму
- Д) Знеболити, спостерігати за пацієнтом протягом 3-х годин
- Е) Обмежити прийом їжі та води, ввести спазмолітики

8. У потерпілого внаслідок дорожньо-транспортної пригоди ви виявили відсутність дихання, пульса на сонній артерії, широкі зіниці. Що в першу чергу треба зробити?

*** А) Розпочати серцево-легеневу реанімацію**

- В) Дати вдихнути нашатирного спирту
- С) Викликати “швидку допомогу”
- Д) Викликати міліцію
- Е) Ввести хлористий кальцій

9. До медичної сестри звернувся пацієнт із забоем м'яких тканин. Який препарат із групи місцевих анестетиків необхідно використати для знеболення ділянки цієї травми шляхом охолодження?

*** А) Хлоретил**

- В) Дикаін
- С) Ефір
- Д) Лідокаїн
- Е) Новокаїн

10. У хворого з напруженим пневмотораксом з'явилися симптоми порушення гемодинаміки. Яка причина цього порушення?

*** А) Зміщення органів середостіння**

- В) Гіповолемія
- С) Метаболічний ацидоз
- Д) Метаболічний алкалоз
- Е) Повітряна емболія

11. Назвіть показання до екстреної профілактики правця:

*** А) Позагоспітальні аборти**

- В) Фурункул
- С) Бешиха
- Д) Термічні опіки 1 ст
- Е) Відмороження 1 ст

12. При падінні з висоти хворий отримав закритий перелом обох нижніх кінцівок в ділянці гомілок. Надайте невідкладну допомогу:

*** А) Накладання транспортних шин**

- В) Накладання джгута
- С) Накладання скелетного витягу
- Д) Накладання гіпсової пов'язки
- Е) Накладання тиснучої пов'язки

13. При переливанні одногрупної, резус-сумісної крові у хворого з'явилися скарги на біль у поперековій ділянці, важкість при диханні, серцебиття, біль за грудиною. Ваші дії:

- * А) Припинити переливання крові, викликати лікаря**
- В) Припинити переливання крові, ввести 50% 2 мл анальгіну
- С) Припинити переливання крові, дати таблетку валідолу під язик
- Д) Припинити переливання крові, спостерігати за хворим
- Е) Заспокоїти хворого і продовжити переливання крові

14. До лікаря звернувся хворий з різаною раною передньої поверхні передпліччя, з якої витікає темно-червона кров. Що повинна виконати медична сестра за призначенням лікаря для тимчасової зупинки кровотечі?

- * А) Накладання давячої пов'язки**
- В) Згинання кінцівки в суглобі
- С) Накладання артеріального джгута
- Д) Накладання затискача
- Е) Електрокоагуляція

15. Дві хвилини тому електрик отримав удар електричним струмом. Хворий непритомний, пульс над сонною артерією не визначається, зіниці розширені, не реагують на світло. Ваші дії:

- * А) негайно розпочати серцево-легеневу реанімацію**
- В) Дати понюхати ватку, змочену нашатирним спиртом
- С) Розпочати непрямий масаж серця
- Д) Ввести в/в 1% розчин адреналіну
- Е) Чекати на прибуття реанімаційної бригади

16. Ознакою перфорації виразки шлунка вважається:

*** А) Раптовий кинджальний біль в животі**

В) Симптом Ортнера

С) Метеоризм

Д) Підвищення температури тіла

Е) Позитивний симптом Ровзінга

17. Вы медсестра здравпункта. Вас вызвали к пострадавшему с проникающим ранением грудной клетки. Состояние больного тяжелое. При осмотре из раны выделяется пенистая кровь. Какой тип повязки планирует медсестра для оказания первой медицинской помощи?

*** А) Оклюзионную**

В) Спиральную

С) Давящую

Д) Черепашью

Е) Косыночную

18. Яке найбільш небезпечне ускладнення може виникнути при кровотечі з яремних вен шиї?

*** А) Повітряна емболія**

В) Травматичний шок

С) Велика крововтрата

Д) Падіння артеріального тиску

Е) Виникнення тромбів

19. Робітник підприємства одержав електротравму, тримає дріт в руці. Що в першу чергу повинна зробити медична сестра:

*** А) Звільнити потерпілого від джерела електроструму**

- В) Ввести знеболюючі препарати
- С) Провести штучну вентиляцію легенів
- Д) Провести закритий масаж серця
- Е) Викликати бригаду швидкої медичної допомоги

20. Ви оглядаєте потерпілого з вогнепальною раною правого стегна. Локально: в рані видно осколки стегнової кістки, рана кровоточить пульсуючим струменем. Ваші першочергові дії:

*** А) Накласти джгут**

- В) Накласти асептичну пов'язку
- С) Ввести знеболюючі
- Д) Транспортувати потерпілого в найближчу лікарню
- Е) Провести транспортну іммобілізацію підручними засобами

21. У чоловіка 70 років Ви діагностували гостру затримку сечі. Виберіть першочергові дії медичної сестри при наданні невідкладної допомоги хворому:

*** А) Катетеризація гумовим катетером.**

- В) Катетеризація металевим катетером.
- С) Надлобкова пункція сечового міхура.
- Д) Епіцистостомія.
- Е) Аденомектомія.

22. На травмпункт доставлений чоловік 28 років. Сам сказати нічого не може, рот широко відкритий, нижня щелепа висунута вперед. Відмічається слинотеча. Травму отримав під час бійки. Який найбільш вірогідний діагноз?

*** А) Вивих нижньої щелепи.**

В) Перелом нижньої щелепи.

С) Перелом верхньої щелепи.

Д) Остеомієліт нижньої щелепи.

Е) Остеома нижньої щелепи.

23. Чоловік 45 років звернувся за медичною допомогою. Скаржиться на біль правій паховій ділянці, який з'явився раптово після фізичного навантаження. Рік тому у хворого діагностовано правобічну пахову килу. При огляді у правій паховій ділянці є різкоболюче випинання, яке невправляється в черевну порожнину. Яке ускладнення виникло у хворого?

*** А) Защемлення пахової кили**

В) Запалення килкових оболонок

С) Гострий апендицит

Д) Евентрація

Е) Копростаз

24. До якого основного обстеження треба підготувати пацієнта при підозрі на гостру кишкову непрохідність?

*** А) Рентгенологічне обстеження черевної порожнини**

В) Аналіз крові, сечі

С) УЗД черевної порожнини

Д) Радіоізотопне черевної порожнини

Е) Колоноскопія, ректороманоскопія

25. Яку першу медичну допомогу надасть медсестра при закритій травмі живота з ушкодженням внутрішніх органів?

*** А) Холод на живіт, екстрена госпіталізація**

- В) Фізіотерапевтичне лікування
- С) Грілку на живіт
- Д) Знеболювання
- Е) Підготовка до обстеження

26. В здоровпункті чоловіку 50 років встановлено діагноз: правостороння защемлена пахова грижа. Які дії медсестри є першочерговими на догоспітальному етапі?

*** А) Негайно викликати швидку допомогу, холод на живіт**

- В) Дати но-шпу
- С) Дати анальгін
- Д) Покласти холод на живіт
- Е) Покласти грілку на живіт

27. У хірургічному відділенні пацієнту 50 років з виразковою хворобою шлунку, ускладненою кровотечею, проведено гемотрансфузію. Яке лабораторне обстеження необхідно планувати на наступний день?

*** А) Клінічний аналіз крові і сечі**

- В) Аналіз крові на цукор
- С) Пробу за Зимницьким
- Д) Коагулограму
- Е) Аналіз крові на RW

28. До приймального відділення швидка допомога привезла постраждалого без свідомості. Об'єктивно: кровотеча з вух та носу, на потиличній ділянці голови - забійна рана 4х3 см. До якого відділення слід направити пацієнта?

*** А) Нейрохірургічного**

В) Неврологічного

С) Хірургічного

Д) Терапевтичного

Е) Діагностичного