

ЗАВАНТАЖЕНО З САЙТУ ТЕСТУВАННЯ.УКР

Медсестринство: Невідкладні стани в терапії - база тестів 2017 року

Категорія: **Бази тестів українською мовою 2017 року**

Кількість запитань: **38**

1. У хворого астматичний статус. Який препарат Ви використаєте на долікарському етапі?

*** А) Преднізолон**

- В) Дібазол
- С) Інсулін
- Д) Пеніцилін
- Е) Анальгін

2. У хворого після ін'єкції антибіотика виник анафілактичний шок. Що Ви використаєте при наданні невідкладної допомоги?

*** А) Адреналін**

- В) Анальгін
- С) Дібазол
- Д) Но-шпу
- Е) Дицинон

3. Медсестра під час проведення шлункового зондування тонким зондом помітила у шлунковому вмісті значну кількість крові. Які її першочергові дії?

*** А) Припинити зондування**

- В) Продовжити зондування
- С) Зробити перерву
- Д) Поставити грілку на живіт
- Е) -

4. У хворого критичне зниження температури тіла, з'явилися ознаки гострої судинної недостатності. Яке залежне сестринське втручання виконаєте при наданні допомоги?

*** А) Ввести судинні засоби**

- В) Покласти грілки до ніг
- С) Дати випити каву
- Д) Підняти ніжний кінець ліжка
- Е) Забрати подушку з-під голови

5. У кардіологічне відділення терміново госпіталізований пацієнт з діагнозом: гострий інфаркт міокарда. Йому проводиться комплекс інтенсивної терапії та догляду. При плануванні заходів медсестринської допомоги пацієнту Вашим першочерговим завданням буде:

*** А) Забезпечити повний фізичний та психічний спокій**

- В) Забезпечити комплекс гігієнічних заходів догляду за шкірою
- С) Спостереження за пульсом, артеріальним тиском
- Д) Годування пацієнта та догляду за порожниною рота
- Е) Слідкувати за фізіологічними відправленнями

6. На стаціонарному лікуванні перебуває пацієнт 33 років з приводу бронхіальної астми. Яке медсестринське втручання необхідно здійснити у разі нападу бронхіальної астми?

*** А) Заспокоїти пацієнта, застосувати інгаляційно сальбутамол**

- В) Заспокоїти пацієнта, дати зволожений кисень
- С) Заспокоїти пацієнта, поставити міхур з льодом на грудну клітку
- Д) Заспокоїти пацієнта, дати відхаркувальну мікстуру
- Е) Заспокоїти пацієнта, провести лужну інгаляцію

7. Пацієнту на цукровий діабет медсестра за призначенням лікаря ввела 24 одиниці інсуліну. Через 20 хв. він звернувся до неї зі скаргами на відчуття сильного голоду, тремтіння кінцівок і всього тіла. Шкіра бліда, вкрита холодним потом. Яку термінову допомогу потрібно надати пацієнту?

*** А) Випити солодкого чаю**

- В) Укласти в ліжко, зігріти
- С) Прийняти заспокійливі
- Д) Прийняти цукрознижуючі
- Е) -

8. Пацієнт звернувся до сімейної медсестри зі скаргами на сильний біль голови у потилиці, шум у вухах. Такі напади спостерігаються після психічних навантажень. АТ коливається від 150/100 до 190/110 мм рт.ст. Розвиток якого синдрому спостерігається у хворого?

*** А) Гіпертензивного**

- В) Гострої серцевої недостатності
- С) Вінцевої недостатності
- Д) Гіпотензивного
- Е) Гострої судинної недостатності

9. Сімейну медсестру викликали до хворого 48 років, який скаржиться на біль тиснучого характеру за грудиною, що віддає у ліву руку. Біль з'явився після підняття по сходах. Який засіб слід використати в першу чергу?

*** А) Нітрогліцерин**

- В) Ніфедипін
- С) Аспірин
- Д) Атенотол
- Е) Папаверин

10. Пацієнта доставлено в приймальне відділення без свідомості. Впродовж 8 років хворіє на цукровий діабет, отримує інсулін. На роботі втратив свідомість. Об'єктивно: шкіра чиста, волога, гіпертонус м'язів. АТ- 115/70 мм рт.ст. Яке ускладнення основного захворювання виникло у пацієнта?

*** А) Гіпоглікемічна кома**

В) Гіперосмолярна кома

С) Молочнокисла кома

Д) Гіперглікемічна кома

Е) Церебральна кома

11. В маніпуляційному кабінеті після введення антибіотику внутрішньом'язово у пацієнта з'явилися шум в вухах, почуття задухи, втрата свідомості. Яке ускладнення запідозрить медична сестра?

*** А) Анафілактичний шок**

В) Непритомність

С) Колапс

Д) Кардіогенний шок

Е) Токсико-інфекційний шок

12. У хворого 65-ти років на рак легенів виникла легенева кровотеча. Який з перерахованих препаратів слід ввести?

*** А) Амінокапронову кислоту**

В) Анальгін

С) Адреналін

Д) Гемостимулін

Е) Вітамін В12

13. Пацієнтка доставлена бригадою швидкої допомоги у терапевтичне відділення зі скаргами на блювання темно-коричневого кольору, дьогтеподібні випорожнення, біль у животі, серцебиття, загальну слабкість. Страждає на виразкову хворобу шлунка. Яке ускладнення виникло у пацієнтки?

*** А) Шлункова кровотеча**

- В) Легенева кровотеча
- С) Гемороїдальна кровотеча
- Д) Стравохідна кровотеча
- Е) Маткова кровотеча

14. Жінку укусила бджола в праве плече. Вона звернулася до медичної сестри зі скаргами на набряк, свербіння у місці укусу. Яку невідкладну допомогу треба надати хворій?

*** А) Накласти міхур з льодом**

- В) Накласти пов'язку з фурациліном
- С) Ввести р-н анальгін
- Д) Обробити розчином йоду
- Е) Прикласти грілку до місця укусу

15. У хворої, яка страждає на гіпертиреоз, після психоемоційної травми з'явилися різке збудження, профузна пітливість, висока температура тіла (41°C), тахікардія, АТ- 160/70 мм рт.ст. Яке ускладнення розвинулось у пацієнтки?

*** А) Тиреотоксична криза**

- В) Гіпертонічна криза
- С) Порушення мозкового кровообігу
- Д) Напад серцевої астми
- Е) Напад стенокардії

16. У пацієнта на гіпертонічну хворобу ввечері раптово підвищився артеріальний тиск. З'явився біль в ділянці серця і потилиці, миготіння “мушок” перед очима, нудота. Об'єктивно: АТ- 260/100 мм рт.ст. Пульс - 120/хв., ритмічний. Обличчя гіперемійоване, шкіра волога. Яке ускладнення виникло?

*** А) Гіпертонічна криза**

- В) Стенокардія
- С) Гостре порушення мозкового кровообігу
- Д) Інфаркт міокарду
- Е) Гостра лівошлуночкова недостатність

17. У пацієнтки на цукровий діабет з'явилась слабкість, зниження працездатності, погіршення апетиту, спрага, сонливість, шумне дихання Куссмауля, запах ацетону з рота. Через 2 доби втратила свідомість. АТ- 100/60 мм рт.ст. Пульс - 110/хв., ритмічний. Шкіра суха. Очні яблука м'які, зіниці звужені. Яке ускладнення виникло у хворой?

*** А) Гіперглікемічна кома**

- В) Гіперсмолярна кома
- С) Гіпоглікемічна кома
- Д) Уремична кома
- Е) Печінкова кома

18. У пацієнта на гіпертонічну хворобу після стресу ввечері з'явилась різка слабкість, біль в ділянці серця з ірадіацією в ліве плече і руку впродовж 30 хвилин, не знімається нітрогліцерином. Об'єктивно: блідий, АТ- 90/60 мм рт.ст., пульс - 90/хв., аритмічний. Що запідозрить медична сестра?

*** А) Інфаркт міокарду**

- В) Шок
- С) Колапс
- Д) Серцеву астму
- Е) Стенокардію

19. В гастроентерологічному відділенні у пацієнта на виразкову хворобу шлунка раптово вночі з'явився “кинджальний” біль у надчеревній ділянці. Об'єктивно: холодний липкий піт, блідість шкіри. Захисне напруження м'язів передньої черевної стінки, позитивний симптом Щоткіна-Блюмберга. Яке ускладнення розвинулось у пацієнта?

*** А) Перфорація**

- В) Пенетрація
- С) Пілоростеноз
- Д) Малігнізація
- Е) Шлункова кровотеча

20. Під час прогулянки в полі чоловіка вкусила оса. Невдовзі він поскаржився на біль в гортані, охриплість голосу, утруднене дихання, нудоту. Об'єктивно: набряк губ, язика, мигдаликів, повік. Дихання шумне. Яке ускладнення виникло у пацієнта?

*** А) Набряк Квінке**

- В) Гострий риніт
- С) Анафілактичний шок
- Д) Кропив'янка
- Е) Астматичний статус

21. Пацієнт 42 років звернувся до чергової медичної сестри онкологічного диспансеру з такими проблемами: кашель з виділенням яскраво-червоної крові, запаморочення. Який препарат підготує медсестра для надання допомоги?

*** А) Дицинон**

- В) Диклофенак
- С) Дипіридамомл
- Д) Димедрол
- Е) Дилтіазем

22. Пацієнт 53 років звернувся до дільничної медсестри зі скаргами на стискаючий біль за грудиною, який триває 4-5 хвилин та іррадіює в ліве плече, ліву руку. Який препарат застосовують з метою розширення коронарних артерій?

*** А) Нітрогліцерин**

В) Нітроксолін

С) Димедрол

Д) Омнопон

Е) Папаверин

23. Пациент, 34 года, находится на лечении в гастроэнтерологическом отделении с диагнозом - язвенная болезнь желудка. Жалуется на слабость, головокружение, рвоту “кофейной гущей”, дегтеобразный кал. Какое осложнение возникло у пациента?

А) Пенетрация

В) Малигнизация

*** С) Желудочно-кишечное кровотечение**

Д) Перфорация язвы

Е) Стеноз привратника

24. Медсестру пригласили к соседу, 54 года, страдает сахарным диабетом. Со слов родственников жаловался на слабость, чувство голода, дрожание тела, головокружение. Затем потерял сознание. Объективно: кожа бледная, влажная, тонус мышц повышен, дыхание поверхностное, глазные яблоки обычные, запаха ацетона нет. Какое состояние возникло у пациента?

*** А) Гипогликемическая кома**

В) Гипергликемическая кома

С) Уремическая кома

Д) Печеночная кома

Е) Анафилактический шок

25. Больная К., 47 лет, находится на лечении с диагнозом - язвенная болезнь желудка. Внезапно возникла резкая “кинжальная” боль в эпигастриальной области, слабость, головокружение. Тактика медсестры в данной ситуации:

*** А) Вызвать врача**

- В) Ввести анальгин
- С) Ввести спазмолитики
- Д) Промыть желудок
- Е) Дать теплое питье

26. У пацієнта онкодиспансера спостерігається виділення під час кашлю червоної пінистої крові. Протягом останніх двох місяців погіршився апетит, з'явилася слабкість, знизилася маса тіла. Об'єктивно: шкіра бліда, пульс - 100 уд/хв., АТ- 80/50 мм рт.ст. В аналізі мокротиння виявлені атипів клітини. Яку до лікарську допомогу необхідно надати пацієнту в першу чергу?

*** А) Покласти міхур з льодом на грудну клітку**

- В) Покласти теплу грілку на грудну клітку
- С) Поставити гірчичники на стегно
- Д) Провести оксигенотерапію
- Е) -

27. У пацієнта після вживання меду з'явилися скарги на різке нездужання, утруднене дихання, осиплість голосу. Під час огляду: стан середньої тяжкості, свідомість збережена. шкірні покриви бліді, набряклі губи, повіки та язик. Пульс - 92 уд/хв., АТ- 110/70 мм рт.ст. Який стан розвинувся у пацієнта?

*** А) Набряк Квінке**

- В) Кропив'янка
- С) Сироваткова хвороба
- Д) Напад бронхіальної астми
- Е) Анафілактичний шок

28. У пацієнтки 54, яка хворіє на цукровий діабет, раптово появились загальна слабкість, відчуття голоду, тремтіння тіла, запаморочення, втрата свідомості. Який із препаратів медсестра повинна підготувати?

*** А) 40% розчин глюкози**

- В) 0,9% розчин хлориду натрію
- С) Інсулін
- Д) Кордіамін
- Е) Строфантин

29. Хвора скаржиться на інтенсивний тиснучий біль за грудиною, що триває 45 хв., слабкість, серцебиття, страх смерті. Об'єктивно: шкіра бліда, синюшність губ. Тони серця ослаблені, ритмічні. Пульс - 108/хв., АТ- 100/60 мм рт.ст. Яке захворювання запідозрить медсестра?

*** А) Гострий інфаркт міокарда**

- В) набряк легень
- С) Стенокардія
- Д) Міокардит
- Е) Сухий плеврит

30. У пацієнтки після введення протиправцевої сироватки через декілька хвилин з'явилась різка кволість, запаморочення, серцебиття, задишка. Пізніше втратила свідомість. Об'єктивно: виражена блідість шкіри та слизових, пітливість. Рс- 110/хв., АТ- 60/40 мм рт.ст. Вкажіть причину погіршення стану пацієнтки:

*** А) Анафілактичний шок**

- В) Астматичний статус
- С) Травматичний шок
- Д) Геморагічний шок
- Е) -

31. Пацієнт доставлений в лікарню у тяжкому стані, свідомість сплутана. Шкіра суха, запах ацетону в повітрі. Пульс - 115/хв., ритмічний, АТ- 95/65 мм рт.ст. Дихання шумне, типу Кусмауля. До якого найбільш інформативного методу дослідження підготує медична сестра пацієнта?

*** А) Визначення рівня глюкози в крові**

- В) Визначення вазопресину в крові
- С) Визначення креатиніну крові
- Д) Визначення рівня білірубіну
- Е) Визначення рівня рН крові

32. У пацієнта на гострий інфаркт міокарда розвивається набряк легенів. Яка першочергова дія медсестри?

*** А) Надати напівсидячого положення з опущеними ногами**

- В) Надати положення з опущеною головою
- С) Надати горизонтального положення з піднятими ногами
- Д) Надати сидячого положення
- Е) Надати положення на боці

33. Пацієнтка лікується з приводу цукрового діабету. Поскаржилася медсестрі на відчуття голоду, слабості, тремтіння рук. Якою буде першочергова дія медсестри?

*** А) Дати солодкий чай або цукор**

- В) Ввести розчин глюкози 5%
- С) Ввести розчин глюкози 20%
- Д) Ввести інсулін короткої дії
- Е) Ввести інсулін пролонгованої дії

34. Дівчина 19 років після тривалого знаходження в душному приміщенні раптово знепритомніла. Об'єктивно: блідість шкіри, Рс- 90/хв., АТ- 95/60 мм рт.ст. Вкажіть незалежне медсестринське втручання:

*** А) Надати положення з припіднятими ногами**

- В) Ввести еуфілін
- С) Ввести адреналін
- Д) Ввести кальцію хлорид
- Е) Надати хворій положення сидячи

35. Хворий 54 років скаржиться на головний біль, запаморочення, слино- та сльозотечу, нудоту, блювання, біль в животі. В день, коли захворів, розфасовував мішки з хлорофосом. Об'єктивно: шкіра волога. Зіниці звужені. Рс- 50/хв. Посіпування м'язів язика та обличчя. Який патологічний стан виник у пацієнта?

*** А) Гостре отруєння хлорофосом**

- В) Гостре отруєння свинцем
- С) Гостре отруєння ртуттю
- Д) Гостре отруєння гранозаном
- Е) Гостре отруєння миш'яком

36. У пацієнта 53 років, який знаходиться на лікуванні в пульмонологічному відділенні з

А) діагнозом: "Абсцес правої легені", після виділення гнійного смердючого харкотиння "повним ротом" виник кашель з виділенням яскраво-червоної пінистої крові. Які першочергові дії медсестри?

*** В) Викликати лікаря**

- С) Ввести анальгін
- Д) Ввести еуфілін
- Е) Ввести дицинон
- Ф) Ввести кальцію глюконату

37. У пацієнта Д., 48 років, який знаходиться на лікуванні в кардіологічному відділенні з діагнозом: “Гострий інфаркт міокарда”, раптово вночі виник напад інспіраторної задишки з виділенням рожевого пінистого харкотиння. Яке медсестринське втручання виконає медсестра при наданні невідкладної допомоги?

*** А) Інгаляцію кисню, насиченого 96% етиловим спиртом**

- В) Дати хворому нітрогліцерин під язик
- С) Налагодити інгаляцію кисню, зволоженого водою
- Д) Надати пацієнту напівсидячого положення
- Е) -

38. Медична сестра, оцінюючи стан пацієнта, який лікується в терапевтичному відділенні з діагнозом: “цироз печінки”, звернула увагу, що він став млявим, сонливим. Хворий поскаржився на зниження апетиту, нудоту, біль у животі, підвищення температури тіла. Що необхідно виконати медичній сестрі в першу чергу?

*** А) негайно повідомити лікаря**

- В) Взяти кров з вени на біохімічне дослідження
- С) Визначити добовий діурез
- Д) Провести штучне годування хворого
- Е) Ввести розчин глюкози внутрішньовенно крапельно