

ЗАВАНТАЖЕНО З САЙТУ ТЕСТУВАННЯ.УКР

Медсестринство в акушерстві - база тестів 2017 року

Категорія: **Бази тестів українською мовою 2017 року**

Кількість запитань: **47**

1. При зовнішньому акушерському обстеженні вагітної в терміні 36 тижнів встановлено: над входом в малий таз визначається округла, помірної щільності балотуюча частина плода. Спинка плода зліва. Якому визначенню за акушерською термінологією відповідають отримані дані акушерського дослідження?

*** А) I позиція, головне передлежання**

В) II позиція, головне передлежання

С) I позиція, сідничне передлежання

Д) II позиція, сідничне передлежання

Е) Поперечне положення

2. Після завершення фізіологічних пологів породілля знаходиться в пологовій залі під наглядом медичної сестри. Яка тривалість раннього післяпологового періоду?

*** А) 2 години**

В) 3 години

С) 6 годин

Д) 24 години

Е) 48 годин

3. Роділля знаходиться в пологовій залі. Завершився I період пологів. Які ознаки вказують на його завершення?

*** А) Повне відкриття шийки матки**

В) Народження посліду

С) Відкриття шийки матки на 3 см

Д) Постійний ниючий біль

Е) Народження плода

4. Породілля виписана з пологового будинку. Протягом якого терміну медсестра повинна зробити патронаж?

*** А) Протягом 3 днів після виписки породіллі із пологового будинку**

В) Протягом 3-х тижнів після виписки породіллі із пологового будинку

С) Протягом місяця після виписки породіллі із пологового будинку

Д) Протягом 3 місяців після виписки породіллі із пологового будинку

Е) Протягом 14 днів після виписки породіллі із пологового будинку

5. Медична сестра визначає достовірні ознаки вагітності. Який метод обстеження вона повинна застосувати?

*** А) Прийоми Леопольда-Левицького**

В) Призначення сечі на наявність ХГ

С) Вимірювання обводу живота

Д) Бімануальне обстеження

Е) Огляд шийки матки у дзеркалах

6. Вагітна М., 31 року, під час зовнішнього обстеження проведено вимірювання ОЖ, що дорівнює 90 см і ВСДМ - 30 см. Яка передбачувана маса плода?

*** А) 2700 г**

В) 3100 г

С) 3000 г

Д) 2900 г

Е) 2500 г

7. Роділля Н., 26 років, поступила у акушерський стаціонар із нормальною пологовою діяльністю і через три години народила живу доношену дівчинку масою - 3200 г. Затискач, накладений на материнський відрізок пуповини біля статевої щілини, опустився на 10-12 см. Яка ознака відшарування плаценти є позитивною в цьому випадку?

*** А) Альфельда**

В) Кюстнера-Чукалова

С) Шредера

Д) Довженка

Е) Клейна

8. У вагітної А., 25 років, серцебиття плода - 130 уд/хв., вислуховується ліворуч нижче пупка і ближче до середньої лінії живота. Визначити позицію, вид позиції та передлежання плода:

*** А) I позиція, передній вид, головне передлежання**

В) II позиція, передній вид, головне передлежання

С) I позиція, задній вид, тазове передлежання

Д) II позиція, задній вид, головне передлежання

Е) I позиція, передній вид, тазове передлежання

9. Вагітна Л., 29 років, у терміні вагітності 32 тижні, звернулась до лікаря ж/к зі скаргами на швидку втомлюваність, спрагу. Вага жінки за тиждень збільшилась на 650 грамів. Вкажіть допустиму прибавку ваги за тиждень:

*** А) 350 грамів**

В) 250 грамів

С) 450 грамів

Д) 550 грамів

Е) 650 грамів

10. У післяпологовому відділенні медична сестра здійснює I етап сестринського процесу. Що із нижчепереліченого належить до суб'єктивного обстеження пацієнтки?

*** А) Бесіда з породіллею**

- В) Вимірювання температури
- С) Визначення частоти пульсу
- Д) Оцінка характеру лохій
- Е) Визначення рівня гемоглобіну в крові

11. Вагітна 25 років звернулася в жіночу консультацію для взяття на облік. При вимірюванні зовнішніх розмірів тазу отримали дані: 26-28-31-20. Який таз у жінки?

*** А) Нормальний**

- В) Чоловічий
- С) Плоскоракітичний
- Д) Простий плоский
- Е) Загальнорівномірнозвужений

12. Вагітна 20 років. При зовнішньому акушерському обстеженні визначено, що спинка плода розташована праворуч. Вкажіть позицію плоду:

*** А) Друга**

- В) Перша
- С) П'ята
- Д) Четверта
- Е) Третя

13. У вагітної до початку пологової діяльності відійшли навколоплідні води. Про яке відходження вод йде мова?

*** А) Передчасне**

- В) Ранне
- С) Своєчасне
- Д) Запізніле
- Е) -

14. Вагітна, у терміні 7 тижнів, скарги на блювання 4-6 разів на добу, нудоту, відразу до їжі. Вкажіть пріоритетну проблему у даної пацієнтки:

*** А) Блювання вагітної**

- В) Відраза до продуктів харчування
- С) Порушення засвоєння їжі
- Д) Порушення режиму сна
- Е) Отруєння

15. Пацієнтка 20 років звернулася в жіночу консультацію зі скаргами на затримку менструації протягом 2-х місяців, зміни апетиту, нудоту. Лікарем установлена вагітність 7-8 тижнів. Назвати документ, який оформляється при взятті на облік по вагітності:

*** А) Індивідуальна карта вагітної і породіллі**

- В) Обмінна карта
- С) Амбулаторна карта
- Д) Історія пологів
- Е) Контрольна карта диспансерного спостереження

16. На 3-й день после родов у родильницы поднялась температура - 38°C, боль в молочной железе. Медсестра осмотрела родильницу: в левой молочной железе пальпируется уплотнение 7х6, болезненное, над ним гиперемия, отек. Каковы действия медсестры по реализации плана медсестринского вмешательства?

*** А) Пузырь со льдом на область молочной железы, вызвать врача**

- В) Ввести анальгетики
- С) Грелка на область молочной железы
- Д) Ввести жаропонижающие средства
- Е) Компресс на молочную железу

17. Роженица Н., в III периоде родов, признаки Альфельда, Шредера положительные. Что должна сделать медсестра для реализации плана медсестринских вмешательств?

*** А) Предложить роженице потужиться**

- В) Потянуть за пуповину
- С) Провести наружный массаж матки
- Д) Измерить АД
- Е) Применить метод Абуладзе

18. У беременной 27 лет, при тазометрии выявилось, что размеры таза составили 26-29-31-20. Индекс Соловьева - 14,5 см. Определите истинную конъюгату:

*** А) 11 см**

- В) 12 см
- С) 9 см
- Д) 10 см
- Е) 13 см

19. У пологовий будинок госпіталізовано роділлю, яка народжує вперше у терміні вагітності 38-39 тижнів із кровотечею зі статевих шляхів. При піхвовому дослідженні: шийка матки згладжена, відкрита на один поперечний палець, внутрішнє вічко повністю закрито губчастою тканиною. Яка патологія спостерігається у роділлі?

*** А) Центральне передлежання плаценти**

- В) Бокове передлежання плаценти
- С) Крайове передлежання плаценти
- Д) Низьке прикріплення плаценти
- Е) Шийна вагітність

20. Першороділля 20 років на третій день після термінових пологів скаржиться на підвищення температури до 39°C, озноб, біль унизу живота, гнійно-кров'янисті виділення зі статевих шляхів. Яке ускладнення виникло у породіллі?

*** А) Післяпологовий ендометрит**

- В) Лохіометра
- С) Аднексит
- Д) Перитоніт
- Е) Післяпологова виразка

21. Під час огляду вагітної медична сестра виміряла зовнішні розміри тазу, вони дорівнюють 25-29-30-20. Який висновок відносно тазу зробила медична сестра?

*** А) Нормальний таз**

- В) Простий плоский таз
- С) Плоскорохітичний таз
- Д) Загальнозвужений таз
- Е) Поперечнозвужений таз

22. До пологового будинку госпіталізовано жінку у терміні вагітності 37-38 тижнів. ВСДМ - 40 см. Над входом в малий таз визначається велика частина, що балотує, та багато дрібних частин. Вислуховується чітке серцебиття плода зліва нижче пупка - 136/хв., та праворуч вище пупка - 140/хв. Про що йде мова?

*** А) Багатоплідна вагітність**

- В) Гідроцефалія плода
- С) Гігантський плід
- Д) Розгинальне передлежання
- Е) Тазове передлежання

23. У роділлі відійшли навколоплідні води при розкритті шийки матки на 4 см. Як називають таке відходження навколоплідних вод?

*** А) Раннє**

- В) Вчасне
- С) Передчасне
- Д) Запізніле
- Е) Високий надрив плодового міхура

24. Роділля К., 26 р. Пологи II. III період. Ознак відокремлення посліду немає. Яка тривалість послідового періоду?

- А) 30 хвилин
- В) 15 хвилин
- С) 60 хвилин
- Д) 45 хвилин
- Е) 40 хвилин

25. Медична сестра проводить вимірювання зовнішніх розмірів тазу. Що характерно для загальнорівномірнозвуженого тазу?

- A) Усі розміри зменшені на однакову величину
- B) Вкорочені прямі розміри тазу
- C) Вкорочені поперечні розміри тазу
- D) Вкорочені усі косі розміри тазу
- E) Зменшення прямого розміру входу в малий таз

26. Патронажна медична сестра при обстеженні вагітної встановила, що спинка плода розташована з лівого боку матки, над входом в малий таз пальпується щільна, “балотуюча”, крупна частина плода. Визначте положення, позицію та передлежання плода:

- * A) Повздовжнє положення, перша позиція, головне передлежання**
- B) Повздовжнє положення, друга позиція, головне передлежання
- C) Повздовжнє положення, перша позиція, тазове передлежання
- D) Поперечне положення, друга позиція
- E) Повздовжнє положення, друга позиція, тазове передлежання

27. Під час вимірювання тазу при взятті вагітної на облік медсестрою встановлені наступні розміри: 24-26-28-18 см. Назвіть форму тазу вагітної:

- * A) Загальнорівномірнозвужений таз**
- B) Поперечнозвужений таз
- C) Косозміщений таз
- D) Плоский таз
- E) Звужений таз

28. У породіллі в післяпологовому періоді медична сестра виявила кровотечу зі статевих шляхів. Крововтрата під час пологів склала 450 мл. Розривів м'яких тканин родового каналу немає, послід цілий. Матка періодично скорочується і розслабляється. Кров, що витікає з матки, утворює згортки. Яка найбільш вірогідна патологія, що зумовлює таку картину?

*** А) Гіпотонічна маткова кровотеча**

- В) ДВЗ-синдром
- С) Атонічна кровотеча
- Д) Розрив матки
- Е) Емболія навколоплідними водами

29. Першовагітна прийшла на черговий прийом у жіночу консультацію. Із анамнезу - перші рухи плода відчула 4 тижні тому. Дно матки на рівні пупка. Визначте термін вагітності:

*** А) 24 тижні**

- В) 20 тижнів
- С) 16 тижнів
- Д) 28 тижнів
- Е) 32 тижні

30. Роділля М., 26 років, І період пологів. Як часто медична сестра визначає параметри пульсу і артеріального тиску у роділлі?

*** А) Кожні 2 години**

- В) Кожні 4 години
- С) Кожні 6 години
- Д) Кожну годину
- Е) Кожні 30 хвилин

31. У пацієнтки діагностували набряки вагітної. Складаючи план сестринського догляду Ви оберете:

*** А) Щотижневе зважування вагітної**

- В) Підрахунок частоти дихання
- С) Підрахунок частоти серцевих скорочень
- Д) Вимірювання температури тіла
- Е) Визначення внутрішньоутробної маси плода

32. На стаціонарному лікуванні знаходиться пацієнтка Г. 35 років, з приводу загрози переривання вагітності у терміні 10 тижнів. В ході планування медсестринського догляду, медична сестра повинна звернути увагу на:

*** А) Наявність кров'янистих виділень із піхви**

- В) Показники температури тіла
- С) Показники артеріального тиску
- Д) Частоту серцевих скорочень
- Е) Наявність апетиту

33. Породіллі проведений курс лікування з приводу післяпологового маститу. При оцінці результатів медсестринських втручань Ви у першу чергу звернули увагу на:

*** А) Зникнення ущільнення та гіперемії молочних залоз**

- В) Нормалізацію лактації
- С) Нормалізацію сну
- Д) Покращення апетиту
- Е) Покращення самопочуття

34. При взятті мазка на визначення ступеню чистоти піхвового вмісту виявлено: паличок Додерлейна мало, багато лейкоцитів, переважно кокова флора, реакція вмісту піхви слаболужна. Це характерно для:

*** А) III ступеню чистоти піхвового вмісту**

- В) I ступеню чистоти піхвового вмісту
- С) II ступеню чистоти піхвового вмісту
- Д) IV ступеню чистоти піхвового вмісту
- Е) V ступеню чистоти піхвового вмісту

35. При обстеженні вагітної прийомами зовнішнього акушерського дослідження визначено, що дно матки розташоване на рівні пупка. При одноплідній вагітності це відповідає:

*** А) 24 тижням вагітності**

- В) 36 тижням вагітності
- С) 28 тижням вагітності
- Д) 32 тижням вагітності
- Е) 40 тижням вагітності

36. Медсестра обстежує вагітну жінку в терміні вагітності 36 тижнів. При огляді медсестра звернула увагу, що живіт овоїдної форми, витягнутий в поперечному напрямку. Серцебиття плода - 140 уд/хв., тони ясні, діяльність ритмічна і вислуховується на рівні пупка праворуч. За допомогою яких прийомів Леопольда-Левицького медсестра може визначити положення та позицію плода?

*** А) I-го і II-го прийомів Леопольда-Левицького**

- В) III-го прийому Леопольда-Левицького
- С) I-го прийому Леопольда-Левицького
- Д) III-го і IV-го прийомів Леопольда-Левицького
- Е) IV-го прийому Леопольда-Левицького

37. В регістратуру жіночої консультації звернулася вагітна жінка з приводу взяття її на облік з приводу вагітності. Який медичний документ, що забезпечує зв'язок жіночої консультації, пологового будинку і вагітної повинна заповнити медсестра?

*** А) Індивідуальну карту вагітної і роділлі**

- В) Контрольну карту диспансерного обліку
- С) Журнал обліку вагітності
- Д) Медичну картку амбулаторного хворого
- Е) Історію пологів

38. Ви медсестра жіночої консультації, у обов'язки якої входить патронаж породіль. Скільки часу триває післяпологовий період?

- А) 6-8 тижнів
- В) 4-5 тижнів
- С) 2-3 тижні
- Д) 1 місяць
- Е) 1 рік

39. Роділля 26 років доставлена у пологове відділення з переймами, які почалися 12 годин тому. Перейми слабкі, короткотривалі, повторюються через 12-15 хв. Серцебиття плода - 140 уд/хв., ритмічне. При піхвовому обстеженні: шийка згладжена, розкриття 4 см, плодовий міхур цілий, голівка плода притиснута до входу в малий таз. Про яке ускладнення пологів йде мова?

*** А) Первинна слабкість пологової діяльності**

- В) Дискоординована пологова діяльність
- С) Надмірно сильна пологова діяльність
- Д) Вторинна слабкість пологової діяльності
- Е) Загроза розриву матки

40. Ви працюєте у приймальному відділенні пологового будинку. Поступає жінка з доношеною вагітністю. Що свідчить про початок пологів?

*** А) Наявність регулярних перейм**

- В) Наявність нерегулярних перейм
- С) Відходження навколопідіних вод
- Д) Відходження слизової пробки
- Е) Опущення дна матки

41. Ви працюєте медичною сестрою в жіночій консультації. Які ознаки відносяться до ймовірних ознак вагітності?

- А) Зміна величини, форми і консистенції матки
- В) Зміна апетиту, смаку, нудота, блювання зранку
- С) Пігментація шкіри на обличчі, навколо сосків, по білій лінії живота
- Д) Промацування частин плода
- Е) Вислуховування серцебиття плода

42. У роділлі III період пологів. Через 10 хвилин дно матки відхилилося у бік правого підребір'я. Вкажіть ознаку відділення плаценти:

*** А) Шредера**

- В) Альфельда
- С) Довженка
- Д) Чукалова-Кюстнера
- Е) Абуладзе

43. У першовагітної жінки 24 років терміном 38-39 тижнів, з'явився переймоподібний біль внизу живота і попереку по 15-20 секунд через 1-2 години. Як оцінити такі симптоми?

*** А) Прелімінарний період**

- В) Перший період пологів
- С) Третій період пологів
- Д) Післяпологовий період
- Е) Другий період пологів

44. Медична сестра при огляді вагітної жінки визначає розташування плода у порожнині матки. Для цього вона застосовує:

*** А) Прийоми Леопольда**

- В) Вимірювання розмірів тазу
- С) Аускультацию плода
- Д) Перкусію живота
- Е) Вагінальне дослідження

45. Породілля, 23 роки, знаходиться у післяпологовому відділенні. Дно матки перебуває на рівні пупка, лохії кров'яністі. Якій добі післяпологового періоду відповідають ці симптоми?

- А) 1-2-й добі
- В) 3-4-й добі
- С) 5-6-й добі
- Д) 7-8-й добі
- Е) 10-й добі

46. У жіночу консультацію звернулась жінка зі скаргами на нагрубання молочних залоз, блювоту вранці, затримку місячних на 2 місяці. Який метод обстеження необхідно застосувати для підтвердження вагітності?

- A) Дворучне піхве дослідження
- B) Чотири прийоми Леопольда
- C) Визначення ВСДМ
- D) Аналіз крові
- E) Зважування жінки

47. Медична сестра амбулаторії сімейної медицини проводить патронаж вагітної у терміні 32 тижні. Вагітна поскаржилась на головний біль, миготіння перед очима. Медична сестра визначила: АТ- 180/110 мм рт.ст., набряки на нижніх кінцівках, передній черевній стінці, обличчі. Для якої патології характерна дана симптоматика?

*** А) Прееклампсія III ступеню**

- B) Прееклампсія II ступеню
- C) Прееклампсія I ступеню
- D) Гіпертензія вагітних
- E) Водянка вагітних