

ЗАВАНТАЖЕНО З САЙТУ ТЕСТУВАННЯ.УКР

Буклет українською мовою 2019 року

Категорія: **Буклети**

Кількість запитань: **159**

1. Експертизу інвалідності встановлює МСЕК. Яку групу інвалідності встановлюють особам з постійною чи тривалою втратою працездатності, що потребують постійного догляду, нагляду чи допомоги?

*** А) Першу**

В) Другу

С) Третю

Д) Четверту

2. При оцінці структури ендокринної патології в Україні було встановлено, що 30% припадає на цукровий діабет, 35% на дифузний зоб, 5% - на вузловий зоб, 4% - на дифузний токсичний зоб, 2% - на гіпотиреоз, 1% - на тиреоїдит, 13% - на ожиріння, 10% - на інші. Визначте статистичний характер наведених показників:

*** А) Екстенсивний**

В) Інтенсивний

С) Співвідношення

Д) Наочності

Е) Середнього арифметичного

3. Пацієнт помер від гострої серцевосудинної недостатності. На секції: на передній стінці лівого шлуночка серця в міокарді виявлено фокус 1,5-2 см жовтувато-сірого кольору з червоним вінчиком. Коронарні артерії нерівномірно звужені на 50% з атеросклеротичними бляшками. Про яке захворювання можна думати?

*** А) Гострий інфаркт міокарда**

В) Гострий міокардит

С) Постінфарктний кардіосклероз

Д) Хронічна аневризма серця

4. До медико-генетичної консультації звернулася мама з дівчинкою-підлітком зі скаргами на порушення статевого та фізичного розвитку. Мікроскопічне дослідження клітин слизової оболонки ротової порожнини показало відсутність статевого хроматину. Яке захворювання у дівчинки?

*** А) Синдром Шерешевського-Тернера**

- В) Синдром Клайнфельтера
- С) Хвороба Дауна
- Д) Трисомія за Х-хромосомою
- Е) Синдром Патау

5. Експертизу інвалідності встановлює МСЕК. Яку групу інвалідності встановлюють особам з постійною чи тривалою втратою працездатності, що потребують постійного догляду, нагляду чи допомоги?

*** А) Першу**

- В) Другу
- С) Третю
- Д) Четверту

6. У 20-річного наркомана з'явилися скарги на слабкість, артралгії, нудоту. Через 5 днів шкіра та склери стали жовтушними, сеча - темна, кал - світлий, спостерігається збільшення печінки: +2,0 см, селезінки: +1,0 см. В крові: лейкоцити - 3,5·10⁹/л, лімфоцити - 45%, загальний білірубін 180 мкмоль/л, АлАТ- 72 Од/л, протромбіновий індекс - 76%. Методом ІФА в крові виявлені: HbsAg, anti-HBc_{or} IgM. Вкажіть діагноз:

*** А) Гострий гепатит В**

- В) Гострий гепатит С
- С) Хронічний гепатит В
- Д) Хронічний гепатит С
- Е) Гепатит А

7. Хворого 54-х років оперують з приводу ендофітної пухлини антрального відділу шлунка. При ревізії виявили щільні збільшені лімфатичні вузли. Якими повинні бути дії хірурга?

*** А) Біопсія лімфатичних вузлів із терміновим гістологічним дослідженням**

- В) Виконання обхідного анастомоза
- С) Екстирпація шлунка з спленектомією
- Д) Відмова від операції і призначення хіміотерапії
- Е) Відмова від операції і направлення на променеву терапію

8. 42-річна жінка звернулась в приймальне відділення із скаргами на інтенсивний біль в попереку і правій здухвинній ділянці, що іррадіює в статеві губи, часте сечовипускання, нудоту. Захворіла три години тому, після фізичного навантаження. Об'єктивно: живіт м'який, дещо здутий, болючий в правій здухвинній ділянці і чутливий в правому підребер'ї. Симптом Пастернацького - позитивний справа. Температура тіла - 37,3оС. Загальний аналіз сечі: питома вага - 1016, білок - сліди, лейкоцити - 6-8 в полі зору, еритроцити - 12-16 в полі зору, свіжі. При хромоцистоскопії: індигокармін з лівого сечовода виділився на 4-й хвилині сильним струменем, справа - на 10 хвилині слабким струменем. Яка найбільш імовірна патологія, що зумовлює таку картину?

*** А) Правобічна ниркова коліка**

- В) Гострий правобічний пієлонефрит
- С) Гострий правобічний аднексит
- Д) Гострий холецистит
- Е) Гострий апендицит

9. Хворий 64-х років госпіталізований з діагнозом: рак товстої кишки, гостра кишкова непрохідність. Після дообстеження та підготовки виконана операція. Інтраопераційно виявлено, що вся товста кишка до пухлини розширена з ознаками гострої кишкової непрохідності, крім того пухлина проростає в магістральні судини (аорту та нижню порожнисту вену), тому виконано виведення двостовбурової колостоми без резекції пухлини. Яка операція виконана хворому?

*** А) Симптоматична**

- В) Комбінована
- С) Поєднана
- Д) Радикальна
- Е) Розширена

10. Хлопчик 14-ти років звернувся до лікаря з приводу фурункула на правій щоці. Скаржиться на біль при жуванні, головний біль. Температура тіла - 37,8оУ центрі щоки пальпується щільний інфільтрат, розміром з лісовий горіх. Яка тактика лікаря?

*** А) Термінова госпіталізація в хірургічний стаціонар**

- В) Амбулаторне лікування
- С) Призначення антибактеріальних засобів
- Д) Призначення фізіотерапевтичних засобів

11. При контролі якості роботи біохімічного аналізатора виявлено відхилення показників білкових фракцій у бік зниження при всіх видах вимірювань. Який тип виявлених помилок?

*** А) Систематичні**

- В) Похибки вимірювання
- С) Технічний збій
- Д) Випадкові
- Е) Грубі

12. При оцінці структури ендокринної патології в Україні було встановлено, що 30% припадає на цукровий діабет, 35% на дифузний зоб, 5% - на вузловий зоб, 4% - на дифузний токсичний зоб, 2% - на гіпотиреоз, 1% - на тиреоїдит, 13% - на ожиріння, 10% - на інші. Визначте статистичний характер наведених показників:

*** А) Екстенсивний**

В) Інтенсивний

С) Співвідношення

Д) Наочності

Е) Середнього арифметичного

13. Пацієнт помер від гострої серцевосудинної недостатності. На секції: на передній стінці лівого шлуночка серця в міокарді виявлено фокус 1,5-2 см жовтувато-сірого кольору з червоним вінчиком. Коронарні артерії нерівномірно звужені на 50% з атеросклеротичними бляшками. Про яке захворювання можна думати?

*** А) Гострий інфаркт міокарда**

В) Гострий міокардит

С) Постінфарктний кардіосклероз

Д) Хронічна аневризма серця

14. До медико-генетичної консультації звернулася мама з дівчинкою-підлітком зі скаргами на порушення статевого та фізичного розвитку. Мікроскопічне дослідження клітин слизової оболонки ротової порожнини показало відсутність статевого хроматину. Яке захворювання у дівчинки?

*** А) Синдром Шерешевського-Тернера**

В) Синдром Клайнфельтера

С) Хвороба Дауна

Д) Трисомія за Х-хромосомою

Е) Синдром Патау

15. Експертизу інвалідності встановлює МСЕК. Яку групу інвалідності встановлюють особам з постійною чи тривалою втратою працездатності, що потребують постійного догляду, нагляду чи допомоги?

- * А) Першу**
- В) Другу
- С) Третю
- Д) Четверту

16. У 20-річного наркомана з'явилися скарги на слабкість, артралгії, нудоту. Через 5 днів шкіра та склери стали жовтушними, сеча - темна, кал - світлий, спостерігається збільшення печінки: +2,0 см, селезінки: +1,0 см. В крові: лейкоцити - 3,5·10⁹/л, лімфоцити - 45%, загальний білірубін 180 мкмоль/л, АлАТ- 72 Од/л, протромбіновий індекс - 76%. Методом ІФА в крові виявлені: HbsAg, anti-HBcIgM. Вкажіть діагноз:

- * А) Гострий гепатит В**
- В) Гострий гепатит С
- С) Хронічний гепатит В
- Д) Хронічний гепатит С
- Е) Гепатит А

17. Хворого 54-х років оперують з приводу ендофітної пухлини антрального відділу шлунка. При ревізії виявили щільні збільшені лімфатичні вузли. Якими повинні бути дії хірурга?

- * А) Біопсія лімфатичних вузлів із терміновим гістологічним дослідженням**
- В) Виконання обхідного анастомоза
- С) Екстирпація шлунка з спленектомією
- Д) Відмова від операції і призначення хіміотерапії
- Е) Відмова від операції і направлення на променеви терапію

18. При оцінці структури ендокринної патології в Україні було встановлено, що 30% припадає на цукровий діабет, 35% на дифузний зоб, 5% - на вузловий зоб, 4% - на дифузний токсичний зоб, 2% - на гіпотиреоз, 1% - на тиреоїдит, 13% - на ожиріння, 10% - на інші. Визначте статистичний характер наведених показників:

*** А) Екстенсивний**

В) Інтенсивний

С) Співвідношення

Д) Наочності

Е) Середнього арифметичного

19. 42-річна жінка звернулась в приймальне відділення із скаргами на інтенсивний біль в попереку і правій здухвинній ділянці, що іррадіює в статеві губи, часте сечовипускання, нудоту. Захворіла три години тому, після фізичного навантаження. Об'єктивно: живіт м'який, дещо здутий, болючий в правій здухвинній ділянці і чутливий в правому підребер'ї. Симптом Пастернацького - позитивний справа. Температура тіла - 37,3оС. Загальний аналіз сечі: питома вага - 1016, білок - сліди, лейкоцити - 6-8 в полі зору, еритроцити - 12-16 в полі зору, свіжі. При хромоцистоскопії: індигокармін з лівого сечовода виділився на 4-й хвилині сильним струменем, справа - на 10 хвилині слабким струменем. Яка найбільш імовірна патологія, що зумовлює таку картину?

*** А) Правобічна ниркова коліка**

В) Гострий правобічний пієлонефрит

С) Гострий правобічний аднексит

Д) Гострий холецистит

Е) Гострий апендицит

20. Хворий 64-х років госпіталізований з діагнозом: рак товстої кишки, гостра кишкова непрохідність. Після дообстеження та підготовки виконана операція. Інтраопераційно виявлено, що вся товста кишка до пухлини розширена з ознаками гострої кишкової непрохідності, крім того пухлина проростає в магістральні судини (аорту та нижню порожнисту вену), тому виконано виведення двостовбурової колостоми без резекції пухлини. Яка операція виконана хворому?

*** А) Симптоматична**

- В) Комбінована
- С) Поєднана
- Д) Радикальна
- Е) Розширена

21. Хлопчик 14-ти років звернувся до лікаря з приводу фурункула на правій щоці. Скаржиться на біль при жуванні, головний біль. Температура тіла - 37,8оУ центрі щоки пальпується щільний інфільтрат, розміром з лісовий горіх. Яка тактика лікаря?

*** А) Термінова госпіталізація в хірургічний стаціонар**

- В) Амбулаторне лікування
- С) Призначення антибактеріальних засобів
- Д) Призначення фізіотерапевтичних засобів

22. Чоловік, який палить більше 10-ти років, скаржиться на постійне покашлювання, біль у грудях, схуднення. Лікар запідозрив у пацієнта рак легенів. Який метод дослідження є найбільш інформативним для верифікації діагнозу та уточнення локалізації первинної пухлини при даній патології?

*** А) Бронхоскопія з біопсією**

- В) Бронхографія
- С) Комп'ютерна томографія
- Д) Оглядова рентгенографія
- Е) Ультразвукове дослідження

23. До лікаря звернулася жінка зі скаргами на кров'яністі виділення із соска при натисканні на грудну залозу. Яке дослідження необхідно провести в даному випадку?

*** А) Цитологічне**

В) Біохімічне

С) Бактеріологічне

Д) Серологічне

Е) Імунологічне

24. 60-річний чоловік скаржиться на часте, болісне сечовипускання, появу згустків крові в сечі. Лікар підозрює у нього камінь сечового міхура. Який метод дослідження є найбільш інформативним для встановлення діагнозу?

*** А) Оглядова цистоскопія**

В) Екскреторна урографія

С) Мазок з уретри

Д) Ретроградна пієлографія

Е) Загальний аналіз сечі

25. При оцінці мікроклімату у квартирі було одержано такі дані: температура повітря - 17°C, відносна вологість - 65%, швидкість руху повітря - 0,3 м/с. Дайте характеристику мікроклімату житлового приміщення:

*** А) Охолоджуючий**

В) Оптимальний

С) Інтермітуючий

Д) Нагріваючий

Е) Подразнюючий

26. При лабораторному дослідженні молока встановлено: густина - 1,020, кислотність - 20oT, жирність - 2,5%, проба з розчином Люголя - позитивна. Які методи фальсифікації молока було використано?

*** А) Розведення водою, додавання крохмалю**

- В) Зняття вершків, додавання крохмалю
- С) Розведення водою, додавання соди
- Д) Зняття вершків, додавання соди
- Е) Додавання соди та крохмалю

27. При видобуванні залізної руди концентрація пилу в повітрі робочої зони упродовж багатьох років перевищує гранично-допустиму концентрацію (ГДК) в 3-7 разів. Яке професійне захворювання може виникнути у працівників?

*** А) Сидероз**

- В) Антракоз
- С) Силікоз
- Д) Пневмоконіоз
- Е) Азбестоз

28. В автомеханіків у виробничому приміщенні наприкінці робочого дня з'явилися симптоми: головний біль, нудота, блювання, шум у вухах. Який токсичний чинник викликав виробниче отруєння?

*** А) Оксид вуглецю**

- В) Діоксид вуглецю
- С) Діоксид сірки
- Д) Оксид азоту
- Е) Сірководень

29. Часто у розповсюдженні різноманітних бактерій та вірусів певне значення мають побутові предмети, особисті речі, руки персоналу тощо. З метою виявлення бактеріоносіїв серед медичного персоналу було проведено санітарнобактеріологічне дослідження на предмет наявності санітарно-показових мікроорганізмів. Який метод дає змогу виявити такі мікроорганізми на руках медичних працівників?

*** А) Мікробіологічне дослідження змивів**

- В) Мікробіологічне дослідження мазківвідбитків
- С) Мікробіологічне дослідження секційного матеріалу
- Д) Мікробіологічне дослідження одягу
- Е) Мікробіологічне дослідження робочих поверхонь

30. Для лабораторної діагностики вірусних захворювань використовують різноманітні серологічні реакції. Однією з таких реакцій є реакція нейтралізації, яка базується на взаємодії типоспецифічної сироватки і віруса. У результаті позитивної реакції спостерігається зміна забарвлення або її відсутність. Як називається така модифікація реакції нейтралізації?

*** А) Кольорова проба**

- В) Бляшкоутворення
- С) Аглютинація
- Д) Преципітація
- Е) Нейтралізація токсинів

31. Працівників клініко-діагностичної лабораторії необхідно вакцинувати проти гепатиту В. Вкажіть, який препарат для цього використовується?

*** А) Рекомбінантна вакцина**

- В) Жива вакцина
- С) Вакцина з убитих вібріонів
- Д) Специфічний імуноглобулін
- Е) Специфічний анатоксин

32. З метою мікробіологічної діагностики кашлюку використовують посів на спеціальне середовище. Вкажіть його назву:

*** А) Казеїново-вугільний агар**

- В) Середовище Ендо
- С) Селенітовий бульйон
- Д) Вісмут-сульфіт агар
- Е) Середовище Плоскірева

33. Спеціалізована лабораторія шкірновенерологічного диспансеру веде дослідження сироваток хворих з метою діагностики сифілісу. Вкажіть, яка реакція використовується з цією метою?

*** А) Вассермана**

- В) Райта
- С) Відаля
- Д) Борде-Жангу
- Е) Манту

34. Бактеріологічна лабораторія перевіряє воду відкритих водойм на присутність вібріонів. Яке середовище вибрав лаборант для посіву проби води?

*** А) 1% пептонну воду**

- В) Середовище Ендо
- С) Селенітовий бульйон
- Д) Глюкозо-кров'яний агар
- Е) Цукровий бульйон?

35. Пацієнт помер від гострої серцевосудинної недостатності. На секції: на передній стінці лівого шлуночка серця в міокарді виявлено фокус 1,5-2 см жовтувато-сірого кольору з червоним вінчиком. Коронарні артерії нерівномірно звужені на 50% з атеросклеротичними бляшками. Про яке захворювання можна думати?

*** А) Гострий інфаркт міокарда**

- В) Гострий міокардит
- С) Постінфарктний кардіосклероз
- Д) Хронічна аневризма серця

36. До медико-генетичної консультації звернулася мама з дівчинкою-підлітком зі скаргами на порушення статевого та фізичного розвитку. Мікроскопічне дослідження клітин слизової оболонки ротової порожнини показало відсутність статевого хроматину. Яке захворювання у дівчинки?

*** А) Синдром Шерешевського-Тернера**

- В) Синдром Клайнфельтера
- С) Хвороба Дауна
- Д) Трисомія за Х-хромосомою
- Е) Синдром Патау

37. Експертизу інвалідності встановлює МСЕК. Яку групу інвалідності встановлюють особам з постійною чи тривалою втратою працездатності, що потребують постійного догляду, нагляду чи допомоги?

*** А) Першу**

- В) Другу
- С) Третю
- Д) Четверту

38. У 20-річного наркомана з'явилися скарги на слабкість, артралгії, нудоту. Через 5 днів шкіра та склери стали жовтушними, сеча - темна, кал - світлий, спостерігається збільшення печінки: +2,0 см, селезінки: +1,0 см. В крові: лейкоцити - $3,5 \cdot 10^9$ /л, лімфоцити - 45%, загальний білірубін 180 мкмоль/л, АлАТ- 72 Од/л, протромбіновий індекс - 76%. Методом ІФА в крові виявлені: HbsAg, anti-HBcIgM. Вкажіть діагноз:

*** А) Гострий гепатит В**

В) Гострий гепатит С

С) Хронічний гепатит В

Д) Хронічний гепатит С

Е) Гепатит А

39. Хворого 54-х років оперують з приводу ендофітної пухлини антрального відділу шлунка. При ревізії виявили щільні збільшені лімфатичні вузли. Якими повинні бути дії хірурга?

*** А) Біопсія лімфатичних вузлів із терміновим гістологічним дослідженням**

В) Виконання обхідного анастомоза

С) Екстирпація шлунка з спленектомією

Д) Відмова від операції і призначення хіміотерапії

Е) Відмова від операції і направлення на променеву терапію

40. Спеціалізована лабораторія шкірновенерологічного диспансеру веде дослідження сироваток хворих з метою діагностики сифілісу. Вкажіть, яка реакція використовується з цією метою?

*** А) Вассермана**

В) Райта

С) Відаля

Д) Борде-Жангу

Е) Манту

41. Бактеріологічна лабораторія перевіряє воду відкритих водойм на присутність вібріонів. Яке середовище вибрав лаборант для посіву проби води?

*** А) 1% пептонну воду**

В) Середовище Ендо

С) Селенітовий бульйон

Д) Глюкозо-кров'яний агар

Е) Цукровий бульйон

42. Провітрювання кімнати житлового приміщення здійснюється шляхом багаторазового відкривання кватирок впродовж дня. За яким з показників оцінюється ефективність провітрювання житлових кімнат?

*** А) Концентрація вуглекислого газу**

В) Вміст азоту

С) Концентрація чадного газу

Д) Концентрація пилу

Е) Концентрація оксидів азоту

43. 42-річна жінка звернулась в приймальне відділення із скаргами на інтенсивний біль в попереку і правій здухвинній ділянці, що іррадіює в статеві губи, часте сечовипускання, нудоту. Захворіла три години тому, після фізичного навантаження. Об'єктивно: живіт м'який, дещо здутий, болючий в правій здухвинній ділянці і чутливий в правому підребер'ї. Симптом Пастернацького - позитивний справа. Температура тіла - 37,3оС. Загальний аналіз сечі: питома вага - 1016, білок - сліди, лейкоцити - 6-8 в полі зору, еритроцити - 12-16 в полі зору, свіжі. При хромоцистоскопії: індигокармін з лівого сечовода виділився на 4-й хвилині сильним струменем, справа - на 10 хвилині слабким струменем. Яка найбільш імовірна патологія, що зумовлює таку картину?

*** А) Правобічна ниркова коліка**

- В) Гострий правобічний пієлонефрит
- С) Гострий правобічний аднексит
- Д) Гострий холецистит
- Е) Гострий апендицит

44. Хворий 64-х років госпіталізований з діагнозом: рак товстої кишки, гостра кишкова непрохідність. Після дообстеження та підготовки виконана операція. Інтраопераційно виявлено, що вся товста кишка до пухлини розширена з ознаками гострої кишкової непрохідності, крім того пухлина проростає в магістральні судини (аорту та нижню порожнисту вену), тому виконано виведення двостовбурової колостоми без резекції пухлини. Яка операція виконана хворому?

- А) Радикальна
- В) Розширена

*** С) Симптоматична**

- Д) Комбінована
- Е) Поєднана

45. Хлопчик 14-ти років звернувся до лікаря з приводу фурункула на правій щоці. Скаржиться на біль при жуванні, головний біль. Температура тіла - 37,8оУ центрі щоки пальпується щільний інфільтрат, розміром з лісовий горіх. Яка тактика лікаря?

*** А) Термінова госпіталізація в хірургічний стаціонар**

- В) Амбулаторне лікування
- С) Призначення антибактеріальних засобів
- Д) Призначення фізіотерапевтичних засобів

46. Чоловік, який палить більше 10-ти років, скаржиться на постійне покашлювання, біль у грудях, схуднення. Лікар запідозрив у пацієнта рак легенів. Який метод дослідження є найбільш інформативним для верифікації діагнозу та уточнення локалізації первинної пухлини при даній патології?

*** А) Бронхоскопія з біопсією**

- В) Бронхографія
- С) Комп'ютерна томографія
- Д) Оглядова рентгенографія
- Е) Ультразвукове дослідження

47. До лікаря звернулася жінка зі скаргами на кров'яністі виділення із соска при натисканні на грудну залозу. Яке дослідження необхідно провести в даному випадку?

*** А) Цитологічне**

- В) Біохімічне
- С) Бактеріологічне
- Д) Серологічне
- Е) Імунологічне

48. 60-річний чоловік скаржиться на часте, болісне сечовипускання, появу згустків крові в сечі. Лікар підозрює у нього камінь сечового міхура. Який метод дослідження є найбільш інформативним для встановлення діагнозу?

*** А) Оглядова цистоскопія**

- В) Екскреторна урографія
- С) Мазок з уретри
- Д) Ретроградна пієлографія
- Е) Загальний аналіз сечі

49. При контролі якості роботи біохімічного аналізатора виявлено відхилення показників білкових фракцій у бік зниження при всіх видах вимірювань. Який тип виявлених помилок?

*** А) Систематичні**

- В) Похибки вимірювання
- С) Технічний збій
- Д) Випадкові
- Е) Грубі

50. При оцінці структури ендокринної патології в Україні було встановлено, що 30% припадає на цукровий діабет, 35% на дифузний зоб, 5% - на вузловий зоб, 4% - на дифузний токсичний зоб, 2% - на гіпотиреоз, 1% - на тиреоїдит, 13% - на ожиріння, 10% - на інші. Визначте статистичний характер наведених показників:

*** А) Екстенсивний**

- В) Інтенсивний
- С) Співвідношення
- Д) Наочності
- Е) Середнього арифметичного

51. Пацієнт помер від гострої серцевосудинної недостатності. На секції: на передній стінці лівого шлуночка серця в міокарді виявлено фокус 1,5-2 см жовтувато-сірого кольору з червоним вінчиком. Коронарні артерії нерівномірно звужені на 50% з атеросклеротичними бляшками. Про яке захворювання можна думати?

- * А) Гострий інфаркт міокарда**
- В) Гострий міокардит
- С) Постінфарктний кардіосклероз
- Д) Хронічна аневризма серця

52. До медико-генетичної консультації звернулася мама з дівчинкою-підлітком зі скаргами на порушення статевого та фізичного розвитку. Мікроскопічне дослідження клітин слизової оболонки ротової порожнини показало відсутність статевого хроматину. Яке захворювання у дівчинки?

- * А) Синдром Шерешевського-Тернера**
- В) Синдром Клайнфельтера
- С) Хвороба Дауна
- Д) Трисомія за Х-хромосомою
- Е) Синдром Патау

53. Експертизу інвалідності встановлює МСЕК. Яку групу інвалідності встановлюють особам з постійною чи тривалою втратою працездатності, що потребують постійного догляду, нагляду чи допомоги?

- * А) Першу**
- В) Другу
- С) Третю
- Д) Четверту

54. У 20-річного наркомана з'явилися скарги на слабкість, артралгії, нудоту. Через 5 днів шкіра та склери стали жовтушними, сеча - темна, кал - світлий, спостерігається збільшення печінки: +2,0 см, селезінки: +1,0 см. В крові: лейкоцити - $3,5 \cdot 10^9$ /л, лімфоцити - 45%, загальний білірубін 180 мкмоль/л, АлАТ- 72 Од/л, протромбіновий індекс - 76%. Методом ІФА в крові виявлені: HbsAg, anti-HBcIgM. Вкажіть діагноз:

*** А) Гострий гепатит В**

В) Гострий гепатит С

С) Хронічний гепатит В

Д) Хронічний гепатит С

Е) Гепатит А

55. Хворого 54-х років оперують з приводу ендофітної пухлини антрального відділу шлунка. При ревізії виявили щільні збільшені лімфатичні вузли. Якими повинні бути дії хірурга?

*** А) Біопсія лімфатичних вузлів із терміновим гістологічним дослідженням**

В) Виконання обхідного анастомоза

С) Екстирпація шлунка з спленектомією

Д) Відмова від операції і призначення хіміотерапії

Е) Відмова від операції і направлення на променеву терапію

56. При оцінці структури ендокринної патології в Україні було встановлено, що 30% припадає на цукровий діабет, 35% на дифузний зоб, 5% - на вузловий зоб, 4% - на дифузний токсичний зоб, 2% - на гіпотиреоз, 1% - на тиреоїдит, 13% - на ожиріння, 10% - на інші. Визначте статистичний характер наведених показників:

*** А) Екстенсивний**

В) Інтенсивний

С) Співвідношення

Д) Наочності

Е) Середнього арифметичного

57. 42-річна жінка звернулась в приймальне відділення із скаргами на інтенсивний біль в попереку і правій здухвинній ділянці, що іррадіює в статеві губи, часте сечовипускання, нудоту. Захворіла три години тому, після фізичного навантаження. Об'єктивно: живіт м'який, дещо здутий, болючий в правій здухвинній ділянці і чутливий в правому підребер'ї. Симптом Пастернацького - позитивний справа. Температура тіла - 37,3оС. Загальний аналіз сечі: питома вага - 1016, білок - сліди, лейкоцити - 6-8 в полі зору, еритроцити - 12-16 в полі зору, свіжі. При хромоцистоскопії: індигокармін з лівого сечовода виділився на 4-й хвилині сильним струменем, справа - на 10 хвилині слабким струменем. Яка найбільш імовірна патологія, що зумовлює таку картину?

*** А) Правобічна ниркова коліка**

- В) Гострий правобічний пієлонефрит
- С) Гострий правобічний аднексит
- Д) Гострий холецистит
- Е) Гострий апендицит

58. Хворий 64-х років госпіталізований з діагнозом: рак товстої кишки, гостра кишкова непрохідність. Після дообстеження та підготовки виконана операція. Інтраопераційно виявлено, що вся товста кишка до пухлини розширена з ознаками гострої кишкової непрохідності, крім того пухлина проростає в магістральні судини (аорту та нижню порожнисту вену), тому виконано виведення двостовбурової колостоми без резекції пухлини. Яка операція виконана хворому?

*** А) Симптоматична**

- В) Комбінована
- С) Поєднана
- Д) Радикальна
- Е) Розширена

59. Хлопчик 14-ти років звернувся до лікаря з приводу фурункула на правій щоці. Скаржиться на біль при жуванні, головний біль. Температура тіла - 37,8оУ центрі щоки пальпується щільний інфільтрат, розміром з лісовий горіх. Яка тактика лікаря?

*** А) Термінова госпіталізація в хірургічний стаціонар**

- В) Амбулаторне лікування
- С) Призначення антибактеріальних засобів
- Д) Призначення фізіотерапевтичних засобів

60. Чоловік, який палить більше 10-ти років, скаржиться на постійне покашлювання, біль у грудях, схуднення. Лікар запідозрив у пацієнта рак легенів. Який метод дослідження є найбільш інформативним для верифікації діагнозу та уточнення локалізації первинної пухлини при даній патології?

*** А) Бронхоскопія з біопсією**

- В) Бронхографія
- С) Комп'ютерна томографія
- Д) Оглядова рентгенографія
- Е) Ультразвукове дослідження

61. До лікаря звернулася жінка зі скаргами на кров'яністі виділення із соска при натисканні на грудну залозу. Яке дослідження необхідно провести в даному випадку?

*** А) Цитологічне**

- В) Біохімічне
- С) Бактеріологічне
- Д) Серологічне
- Е) Імунологічне

62. 60-річний чоловік скаржиться на часте, болісне сечовипускання, появу згустків крові в сечі. Лікар підозрює у нього камінь сечового міхура. Який метод дослідження є найбільш інформативним для встановлення діагнозу?

*** А) Оглядова цистоскопія**

- В) Екскреторна урографія
- С) Мазок з уретри
- Д) Ретроградна пієлографія
- Е) Загальний аналіз сечі

63. При оцінці мікроклімату у квартирі було одержано такі дані: температура повітря - 17оС, відносна вологість - 65%, швидкість руху повітря - 0,3 м/с. Дайте характеристику мікроклімату житлового приміщення:

*** А) Охолоджуючий**

- В) Оптимальний
- С) Інтермітуючий
- Д) Нагріваючий
- Е) Подразнюючий

64. При лабораторному дослідженні молока встановлено: густина - 1,020, кислотність - 20оТ, жирність - 2,5%, проба з розчином Люголя - позитивна. Які методи фальсифікації молока було використано?

*** А) Розведення водою, додавання крохмалю**

- В) Зняття вершків, додавання крохмалю
- С) Розведення водою, додавання соди
- Д) Зняття вершків, додавання соди
- Е) Додавання соди та крохмалю

65. При видобуванні залізної руди концентрація пилу в повітрі робочої зони упродовж багатьох років перевищує гранично-допустиму концентрацію (ГДК) в 3-7 разів. Яке професійне захворювання може виникнути у працівників?

*** А) Сидероз**

- В) Антракоз
- С) Силікоз
- Д) Пневмоконіоз
- Е) Азбестоз

66. В автомеханіків у виробничому приміщенні наприкінці робочого дня з'явилися симптоми: головний біль, нудота, блювання, шум у вухах. Який токсичний чинник викликав виробниче отруєння?

*** А) Оксид вуглецю**

- В) Діоксид вуглецю
- С) Діоксид сірки
- Д) Оксид азоту
- Е) Сірководень

67. Експертизу інвалідності встановлює МСЕК. Яку групу інвалідності встановлюють особам з постійною чи тривалою втратою працездатності, що потребують постійного догляду, нагляду чи допомоги?

*** А) Першу**

- В) Другу
- С) Третю
- Д) Четверту

68. Часто у розповсюдженні різноманітних бактерій та вірусів певне значення мають побутові предмети, особисті речі, руки персоналу тощо. З метою виявлення бактеріоносіїв серед медичного персоналу було проведено санітарнобактеріологічне дослідження на предмет наявності санітарно-показових мікроорганізмів. Який метод дає змогу виявити такі мікроорганізми на руках медичних працівників?

*** А) Мікробіологічне дослідження змивів**

- В) Мікробіологічне дослідження мазківвідбитків
- С) Мікробіологічне дослідження секційного матеріалу
- Д) Мікробіологічне дослідження одягу
- Е) Мікробіологічне дослідження робочих поверхонь

69. Для лабораторної діагностики вірусних захворювань використовують різноманітні серологічні реакції. Однією з таких реакцій є реакція нейтралізації, яка базується на взаємодії типоспецифічної сироватки і віруса. У результаті позитивної реакції спостерігається зміна забарвлення або її відсутність. Як називається така модифікація реакції нейтралізації?

*** А) Кольорова проба**

- В) Бляшкоутворення
- С) Аглютинація
- Д) Преципітація
- Е) Нейтралізація токсинів

70. Працівників клініко-діагностичної лабораторії необхідно вакцинувати проти гепатиту В. Вкажіть, який препарат для цього використовується?

*** А) Рекомбінантна вакцина**

- В) Жива вакцина
- С) Вакцина з убитих вібріонів
- Д) Специфічний імуноглобулін
- Е) Специфічний анатоксин

71. З метою мікробіологічної діагностики кашлюку використовують посів на спеціальне середовище. Вкажіть його назву:

*** А) Казеїново-вугільний агар**

- В) Середовище Ендо
- С) Селенітовий бульйон
- Д) Вісмут-сульфіт агар
- Е) Середовище Плоскірева

72. Пацієнт помер від гострої серцевосудинної недостатності. На секції: на передній стінці лівого шлуночка серця в міокарді виявлено фокус 1,5-2 см жовтувато-сірого кольору з червоним вінчиком. Коронарні артерії нерівномірно звужені на 50% з атеросклеротичними бляшками. Про яке захворювання можна думати?

*** А) Гострий інфаркт міокарда**

- В) Гострий міокардит
- С) Постінфарктний кардіосклероз
- Д) Хронічна аневризма серця

73. До медико-генетичної консультації звернулася мама з дівчинкою-підлітком зі скаргами на порушення статевого та фізичного розвитку. Мікроскопічне дослідження клітин слизової оболонки ротової порожнини показало відсутність статевого хроматину. Яке захворювання у дівчинки?

*** А) Синдром Шерешевського-Тернера**

- В) Синдром Клайнфельтера
- С) Хвороба Дауна
- Д) Трисомія за X-хромосомою
- Е) Синдром Патау

74. Експертизу інвалідності встановлює МСЕК. Яку групу інвалідності встановлюють особам з постійною чи тривалою втратою працездатності, що потребують постійного догляду, нагляду чи допомоги?

- * А) Першу**
- В) Другу
- С) Третю
- Д) Четверту

75. У 20-річного наркомана з'явилися скарги на слабкість, артралгії, нудоту. Через 5 днів шкіра та склери стали жовтушними, сеча - темна, кал - світлий, спостерігається збільшення печінки: +2,0 см, селезінки: +1,0 см. В крові: лейкоцити - 3,5·10⁹/л, лімфоцити - 45%, загальний білірубін 180 мкмоль/л, АлАТ- 72 Од/л, протромбіновий індекс - 76%. Методом ІФА в крові виявлені: HbsAg, anti-HBcIgM. Вкажіть діагноз:

- * А) Гострий гепатит В**
- В) Гострий гепатит С
- С) Хронічний гепатит В
- Д) Хронічний гепатит С
- Е) Гепатит А

76. Хворого 54-х років оперують з приводу ендофітної пухлини антрального відділу шлунка. При ревізії виявили щільні збільшені лімфатичні вузли. Якими повинні бути дії хірурга?

- * А) Біопсія лімфатичних вузлів із терміновим гістологічним дослідженням**
- В) Виконання обхідного анастомоза
- С) Екстирпація шлунка з спленектомією
- Д) Відмова від операції і призначення хіміотерапії
- Е) Відмова від операції і направлення на променеву терапію

77. 42-річна жінка звернулась в приймальне відділення із скаргами на інтенсивний біль в попереку і правій здухвинній ділянці, що іррадіює в статеві губи, часте сечовипускання, нудоту. Захворіла три години тому, після фізичного навантаження. Об'єктивно: живіт м'який, дещо здутий, болючий в правій здухвинній ділянці і чутливий в правому підребер'ї. Симптом Пастернацького - позитивний справа. Температура тіла - 37,3оС. Загальний аналіз сечі: питома вага - 1016, білок - сліди, лейкоцити - 6-8 в полі зору, еритроцити - 12-16 в полі зору, свіжі. При хромоцистоскопії: індигокармін з лівого сечовода виділився на 4-й хвилині сильним струменем, справа - на 10 хвилині слабким струменем. Яка найбільш імовірна патологія, що зумовлює таку картину?

*** А) Правобічна ниркова коліка**

- В) Гострий правобічний пієлонефрит
- С) Гострий правобічний аднексит
- Д) Гострий холецистит
- Е) Гострий апендицит

78. Експертизу інвалідності встановлює МСЕК. Яку групу інвалідності встановлюють особам з постійною чи тривалою втратою працездатності, що потребують постійного догляду, нагляду чи допомоги?

*** А) Першу**

- В) Другу
- С) Третю
- Д) Четверту

79. Хворий 64-х років госпіталізований з діагнозом: рак товстої кишки, гостра кишкова непрохідність. Після дообстеження та підготовки виконана операція. Інтраопераційно виявлено, що вся товста кишка до пухлини розширена з ознаками гострої кишкової непрохідності, крім того пухлина проростає в магістральні судини (аорту та нижню порожнисту вену), тому виконано виведення двостовбурової колостоми без резекції пухлини. Яка операція виконана хворому?

*** А) Симптоматична**

- В) Комбінована
- С) Поєднана
- Д) Радикальна
- Е) Розширена

80. Хлопчик 14-ти років звернувся до лікаря з приводу фурункула на правій щоці. Скаржиться на біль при жуванні, головний біль. Температура тіла - 37,8оУ центрі щоки пальпується щільний інфільтрат, розміром з лісовий горіх. Яка тактика лікаря?

*** А) Термінова госпіталізація в хірургічний стаціонар**

- В) Амбулаторне лікування
- С) Призначення антибактеріальних засобів
- Д) Призначення фізіотерапевтичних засобів

81. Чоловік, який палить більше 10-ти років, скаржиться на постійне покашлювання, біль у грудях, схуднення. Лікар запідозрив у пацієнта рак легенів. Який метод дослідження є найбільш інформативним для верифікації діагнозу та уточнення локалізації первинної пухлини при даній патології?

*** А) Бронхоскопія з біопсією**

- В) Бронхографія
- С) Комп'ютерна томографія
- Д) Оглядова рентгенографія
- Е) Ультразвукове дослідження

82. До лікаря звернулася жінка зі скаргами на кров'яністі виділення із соска при натисканні на грудну залозу. Яке дослідження необхідно провести в даному випадку?

*** А) Цитологічне**

В) Біохімічне

С) Бактеріологічне

Д) Серологічне

Е) Імунологічне

83. 60-річний чоловік скаржиться на часте, болісне сечовипускання, появу згустків крові в сечі. Лікар підозрює у нього камінь сечового міхура. Який метод дослідження є найбільш інформативним для встановлення діагнозу?

*** А) Оглядова цистоскопія**

В) Екскреторна урографія

С) Мазок з уретри

Д) Ретроградна пієлографія

Е) Загальний аналіз сечі

84. При оцінці мікроклімату у квартирі було одержано такі дані: температура повітря - 17°C, відносна вологість - 65%, швидкість руху повітря - 0,3 м/с. Дайте характеристику мікроклімату житлового приміщення:

*** А) Охолоджуючий**

В) Оптимальний

С) Інтермітуючий

Д) Нагріваючий

Е) Подразнюючий

85. При лабораторному дослідженні молока встановлено: густина - 1,020, кислотність - 20oT, жирність - 2,5%, проба з розчином Люголя - позитивна. Які методи фальсифікації молока було використано?

*** А) Розведення водою, додавання крохмалю**

- В) Зняття вершків, додавання крохмалю
- С) Розведення водою, додавання соди
- Д) Зняття вершків, додавання соди
- Е) Додавання соди та крохмалю

86. При видобуванні залізної руди концентрація пилу в повітрі робочої зони упродовж багатьох років перевищує гранично-допустиму концентрацію (ГДК) в 3-7 разів. Яке професійне захворювання може виникнути у працівників?

*** А) Сидероз**

- В) Антракоз
- С) Силікоз
- Д) Пневмоконіоз
- Е) Азбестоз

87. В автомеханіків у виробничому приміщенні наприкінці робочого дня з'явилися симптоми: головний біль, нудота, блювання, шум у вухах. Який токсичний чинник викликав виробниче отруєння?

*** А) Оксид вуглецю**

- В) Діоксид вуглецю
- С) Діоксид сірки
- Д) Оксид азоту
- Е) Сірководень

88. У хворого 47-ми років збільшена печінка, болюча при пальпації. При дослідженні крові спостерігається лейкоцитоз, еозинофілія, помірне підвищення ШОЕ. Як з'ясувалося, хворий захоплюється риболовлю. Які яйця має виявити лаборант для підтвердження діагнозу опісторхоз?

*** А) Жовті, овальні, звужені до полюсів, на одному з них кришечка**

В) Золотисто-жовті, у вигляді діжки або лимона (50х30 мкм), з безбарвними "корками" на полюсах

С) Безбарвні, у формі несиметричних овалів, розміром 23-50 мкм

Д) Жовто-коричневі, з горбкуватою оболонкою, заповнені жовтковою масою

Е) Округлі або овальні, з темною оболонкою із онкосферою всередині

89. При оцінці структури ендокринної патології в Україні було встановлено, що 30% припадає на цукровий діабет, 35% на дифузний зоб, 5% - на вузловий зоб, 4% - на дифузний токсичний зоб, 2% - на гіпотиреоз, 1% - на тиреоїдит, 13% - на ожиріння, 10% - на інші. Визначте статистичний характер наведених показників:

*** А) Екстенсивний**

В) Інтенсивний

С) Співвідношення

Д) Наочності

Е) Середнього арифметичного

90. Пацієнт помер від гострої серцевосудинної недостатності. На секції: на передній стінці лівого шлуночка серця в міокарді виявлено фокус 1,5-2 см жовтувато-сірого кольору з червоним вінчиком. Коронарні артерії нерівномірно звужені на 50% з атеросклеротичними бляшками. Про яке захворювання можна думати?

*** А) Гострий інфаркт міокарда**

В) Гострий міокардит

С) Постінфарктний кардіосклероз

Д) Хронічна аневризма серця

91. Пацієнтка 36-ти років скаржиться на надлишкову вагу, сонливість, слабкість, оволосіння обличчя. Після об'єктивного обстеження запідозрено хворобу ІценкоКушинга. Який лабораторний показник є найбільш інформативним в даному випадку?

*** А) 17-кетостероїди**

В) Т3, Т4, ТТГ

С) Глюкоза

Д) Кетонові тіла

Е) Соматотропний гормон

92. При оцінці структури ендокринної патології в Україні було встановлено, що 30% припадає на цукровий діабет, 35% на дифузний зоб, 5% - на вузловий зоб, 4% - на дифузний токсичний зоб, 2% - на гіпотиреоз, 1% - на тиреоїдит, 13% - на ожиріння, 10% - на інші. Визначте статистичний характер наведених показників:

*** А) Екстенсивний**

В) Інтенсивний

С) Співвідношення

Д) Наочності

Е) Середнього арифметичного

93. Пацієнт помер від гострої серцевосудинної недостатності. На секції: на передній стінці лівого шлуночка серця в міокарді виявлено фокус 1,5-2 см жовтувато-сірого кольору з червоним вінчиком. Коронарні артерії нерівномірно звужені на 50% з атеросклеротичними бляшками. Про яке захворювання можна думати?

*** А) Гострий інфаркт міокарда**

В) Гострий міокардит

С) Постінфарктний кардіосклероз

Д) Хронічна аневризма серця

94. До медико-генетичної консультації звернулася мама з дівчинкою-підлітком зі скаргами на порушення статевого та фізичного розвитку. Мікроскопічне дослідження клітин слизової оболонки ротової порожнини показало відсутність статевого хроматину. Яке захворювання у дівчинки?

*** А) Синдром Шерешевського-Тернера**

- В) Синдром Клайнфельтера
- С) Хвороба Дауна
- Д) Трисомія за Х-хромосомою
- Е) Синдром Патау

95. У 20-річного наркомана з'явилися скарги на слабкість, артралгії, нудоту. Через 5 днів шкіра та склери стали жовтушними, сеча - темна, кал - світлий, спостерігається збільшення печінки: +2,0 см, селезінки: +1,0 см. В крові: лейкоцити - $3,5 \cdot 10^9/\text{л}$, лімфоцити - 45%, загальний білірубін 180 мкмоль/л, АлАТ- 72 Од/л, протромбіновий індекс - 76%. Методом ІФА в крові виявлені: HbsAg, anti-HBcIgM. Вкажіть діагноз:

*** А) Гострий гепатит В**

- В) Гострий гепатит С
- С) Хронічний гепатит В
- Д) Хронічний гепатит С
- Е) Гепатит А

96. Хворого 54-х років оперують з приводу ендофітної пухлини антрального відділу шлунка. При ревізії виявили щільні збільшені лімфатичні вузли. Якими повинні бути дії хірурга?

*** А) Біопсія лімфатичних вузлів із терміновим гістологічним дослідженням**

- В) Виконання обхідного анастомоза
- С) Екстирпація шлунка з спленектомією
- Д) Відмова від операції і призначення хіміотерапії
- Е) Відмова від операції і направлення на променеви терапію

97. 42-річна жінка звернулась в приймальне відділення із скаргами на інтенсивний біль в попереку і правій здухвинній ділянці, що іррадіює в статеві губи, часте сечовипускання, нудоту. Захворіла три години тому, після фізичного навантаження. Об'єктивно: живіт м'який, дещо здутий, болючий в правій здухвинній ділянці і чутливий в правому підребер'ї. Симптом Пастернацького - позитивний справа. Температура тіла - 37,3оС. Загальний аналіз сечі: питома вага - 1016, білок - сліди, лейкоцити - 6-8 в полі зору, еритроцити - 12-16 в полі зору, свіжі. При хромоцистоскопії: індигокармін з лівого сечовода виділився на 4-й хвилині сильним струменем, справа - на 10 хвилині слабким струменем. Яка найбільш імовірна патологія, що зумовлює таку картину?

*** А) Правобічна ниркова коліка**

- В) Гострий правобічний пієлонефрит
- С) Гострий правобічний аднексит
- Д) Гострий холецистит
- Е) Гострий апендицит

98. У 6-місячної дитини діагностовано дизентерію. Які особливості характеру випорожнень при даному захворюванні?

*** А) Не втрачають каловий характер, з прожилками крові**

- В) Пінисті, помаранчевого кольору
- С) Нагадують болотну тину
- Д) Нагадують рисовий відвар

99. При оцінці структури ендокринної патології в Україні було встановлено, що 30% припадає на цукровий діабет, 35% на дифузний зоб, 5% - на вузловий зоб, 4% - на дифузний токсичний зоб, 2% - на гіпотиреоз, 1% - на тиреоїдит, 13% - на ожиріння, 10% - на інші. Визначте статистичний характер наведених показників:

*** А) Екстенсивний**

В) Інтенсивний

С) Співвідношення

Д) Наочності

Е) Середнього арифметичного

100. Пацієнт помер від гострої серцевосудинної недостатності. На секції: на передній стінці лівого шлуночка серця в міокарді виявлено фокус 1,5-2 см жовтувато-сірого кольору з червоним вінчиком. Коронарні артерії нерівномірно звужені на 50% з атеросклеротичними бляшками. Про яке захворювання можна думати?

*** А) Гострий інфаркт міокарда**

В) Гострий міокардит

С) Постінфарктний кардіосклероз

Д) Хронічна аневризма серця

101. До медико-генетичної консультації звернулася мама з дівчинкою-підлітком зі скаргами на порушення статевого та фізичного розвитку. Мікроскопічне дослідження клітин слизової оболонки ротової порожнини показало відсутність статевого хроматину. Яке захворювання у дівчинки?

*** А) Синдром Шерешевського-Тернера**

В) Синдром Клайнфельтера

С) Хвороба Дауна

Д) Трисомія за Х-хромосомою

Е) Синдром Патау

102. Експертизу інвалідності встановлює МСЕК. Яку групу інвалідності встановлюють особам з постійною чи тривалою втратою працездатності, що потребують постійного догляду, нагляду чи допомоги?

- * А) Першу**
- В) Другу
- С) Третю
- Д) Четверту

103. У 20-річного наркомана з'явилися скарги на слабкість, артралгії, нудоту. Через 5 днів шкіра та склери стали жовтушними, сеча - темна, кал - світлий, спостерігається збільшення печінки: +2,0 см, селезінки: +1,0 см. В крові: лейкоцити - 3,5·10⁹/л, лімфоцити - 45%, загальний білірубін 180 мкмоль/л, АлАТ- 72 Од/л, протромбіновий індекс - 76%. Методом ІФА в крові виявлені: HbsAg, anti-HBcIgM. Вкажіть діагноз:

- * А) Гострий гепатит В**
- В) Гострий гепатит С
- С) Хронічний гепатит В
- Д) Хронічний гепатит С
- Е) Гепатит А

104. Хворого 54-х років оперують з приводу ендоефітної пухлини антрального відділу шлунка. При ревізії виявили щільні збільшені лімфатичні вузли. Якими повинні бути дії хірурга?

- * А) Біопсія лімфатичних вузлів із терміновим гістологічним дослідженням**
- В) Виконання обхідного анастомоза
- С) Екстирпація шлунка з спленектомією
- Д) Відмова від операції і призначення хіміотерапії
- Е) Відмова від операції і направлення на променеви терапію

105. У пацієнта 45-ти років скарги на сильний біль в поперековій ділянці зліва, який іррадіює в стегно, часте сечовипускання, одноразове блювання. Симптом Пастернацького позитивний зліва. Який препарат найдоцільніше використати для надання першої медичної допомоги?

*** А) Баралгін**

- В) Лазикс
- С) Нітроксолін
- Д) Цистенал
- Е) Авісан

106. При оцінці структури ендокринної патології в Україні було встановлено, що 30% припадає на цукровий діабет, 35% на дифузний зоб, 5% - на вузловий зоб, 4% - на дифузний токсичний зоб, 2% - на гіпотиреоз, 1% - на тиреоїдит, 13% - на ожиріння, 10% - на інші. Визначте статистичний характер наведених показників:

*** А) Екстенсивний**

- В) Іntenсивний
- С) Співвідношення
- Д) Наочності
- Е) Середнього арифметичного

107. Пацієнт помер від гострої серцевосудинної недостатності. На секції: на передній стінці лівого шлуночка серця в міокарді виявлено фокус 1,5-2 см жовтувато-сірого кольору з червоним вінчиком. Коронарні артерії нерівномірно звужені на 50% з атеросклеротичними бляшками. Про яке захворювання можна думати?

*** А) Гострий інфаркт міокарда**

- В) Гострий міокардит
- С) Постінфарктний кардіосклероз
- Д) Хронічна аневризма серця

108. До медико-генетичної консультації звернулася мама з дівчинкою-підлітком зі скаргами на порушення статевого та фізичного розвитку. Мікроскопічне дослідження клітин слизової оболонки ротової порожнини показало відсутність статевого хроматину. Яке захворювання у дівчинки?

*** А) Синдром Шерешевського-Тернера**

- В) Синдром Клайнфельтера
- С) Хвороба Дауна
- Д) Трисомія за Х-хромосомою
- Е) Синдром Патау

109. У 20-річного наркомана з'явилися скарги на слабкість, артралгії, нудоту. Через 5 днів шкіра та склери стали жовтушними, сеча - темна, кал - світлий, спостерігається збільшення печінки: +2,0 см, селезінки: +1,0 см. В крові: лейкоцити - 3,5·10⁹/л, лімфоцити - 45%, загальний білірубін 180 мкмоль/л, АлАТ- 72 Од/л, протромбіновий індекс - 76%. Методом ІФА в крові виявлені: HbsAg, anti-HBcIgM. Вкажіть діагноз:

*** А) Гострий гепатит В**

- В) Гострий гепатит С
- С) Хронічний гепатит В
- Д) Хронічний гепатит С
- Е) Гепатит А

110. Хворого 54-х років оперують з приводу ендофітної пухлини антрального відділу шлунка. При ревізії виявили щільні збільшені лімфатичні вузли. Якими повинні бути дії хірурга?

*** А) Біопсія лімфатичних вузлів із терміновим гістологічним дослідженням**

- В) Виконання обхідного анастомоза
- С) Екстирпація шлунка з спленектомією
- Д) Відмова від операції і призначення хіміотерапії
- Е) Відмова від операції і направлення на променеву терапію

111. 42-річна жінка звернулась в приймальне відділення із скаргами на інтенсивний біль в попереку і правій здухвинній ділянці, що іррадіює в статеві губи, часте сечовипускання, нудоту. Захворіла три години тому, після фізичного навантаження. Об'єктивно: живіт м'який, дещо здутий, болючий в правій здухвинній ділянці і чутливий в правому підребер'ї. Симптом Пастернацького - позитивний справа. Температура тіла - 37,3оС. Загальний аналіз сечі: питома вага - 1016, білок - сліди, лейкоцити - 6-8 в полі зору, еритроцити - 12-16 в полі зору, свіжі. При хромоцистоскопії: індигокармін з лівого сечовода виділився на 4-й хвилині сильним струменем, справа - на 10 хвилині слабким струменем. Яка найбільш імовірна патологія, що зумовлює таку картину?

*** А) Правобічна ниркова коліка**

- В) Гострий правобічний пієлонефрит
- С) Гострий правобічний аднексит
- Д) Гострий холецистит
- Е) Гострий апендицит

112. Хворий 64-х років госпіталізований з діагнозом: рак товстої кишки, гостра кишкова непрохідність. Після дообстеження та підготовки виконана операція. Інтраопераційно виявлено, що вся товста кишка до пухлини розширена з ознаками гострої кишкової непрохідності, крім того пухлина проростає в магістральні судини (аорту та нижню порожнисту вену), тому виконано виведення двостовбурової колостоми без резекції пухлини. Яка операція виконана хворому?

*** А) Симптоматична**

- В) Комбінована
- С) Поєднана
- Д) Радикальна
- Е) Розширена

113. Хлопчик 14-ти років звернувся до лікаря з приводу фурункула на правій щоці. Скаржиться на біль при жуванні, головний біль. Температура тіла - 37,8оУ центрі щоки пальпується щільний інфільтрат, розміром з лісовий горіх. Яка тактика лікаря?

*** А) Термінова госпіталізація в хірургічний стаціонар**

- В) Амбулаторне лікування
- С) Призначення антибактеріальних засобів
- Д) Призначення фізіотерапевтичних засобів

114. Чоловік, який палить більше 10-ти років, скаржиться на постійне покашлювання, біль у грудях, схуднення. Лікар запідозрив у пацієнта рак легенів. Який метод дослідження є найбільш інформативним для верифікації діагнозу та уточнення локалізації первинної пухлини при даній патології?

*** А) Бронхоскопія з біопсією**

- В) Бронхографія
- С) Комп'ютерна томографія
- Д) Оглядова рентгенографія
- Е) Ультразвукове дослідження

115. До лікаря звернулася жінка зі скаргами на кров'яністі виділення із соска при натисканні на грудну залозу. Яке дослідження необхідно провести в даному випадку?

*** А) Цитологічне**

- В) Біохімічне
- С) Бактеріологічне
- Д) Серологічне
- Е) Імунологічне

116. 60-річний чоловік скаржиться на часте, болісне сечовипускання, появу згустків крові в сечі. Лікар підозрює у нього камінь сечового міхура. Який метод дослідження є найбільш інформативним для встановлення діагнозу?

*** А) Оглядова цистоскопія**

- В) Екскреторна урографія
- С) Мазок з уретри
- Д) Ретроградна пієлографія
- Е) Загальний аналіз сечі

117. При контролі якості роботи біохімічного аналізатора виявлено відхилення показників білкових фракцій у бік зниження при всіх видах вимірювань. Який тип виявлених помилок?

*** А) Систематичні**

- В) Похибки вимірювання
- С) Технічний збій
- Д) Випадкові
- Е) Грубі

118. При оцінці структури ендокринної патології в Україні було встановлено, що 30% припадає на цукровий діабет, 35% на дифузний зоб, 5% - на вузловий зоб, 4% - на дифузний токсичний зоб, 2% - на гіпотиреоз, 1% - на тиреоїдит, 13% - на ожиріння, 10% - на інші. Визначте статистичний характер наведених показників:

*** А) Екстенсивний**

- В) Інтенсивний
- С) Співвідношення
- Д) Наочності
- Е) Середнього арифметичного

119. Пацієнт помер від гострої серцевосудинної недостатності. На секції: на передній стінці лівого шлуночка серця в міокарді виявлено фокус 1,5-2 см жовтувато-сірого кольору з червоним вінчиком. Коронарні артерії нерівномірно звужені на 50% з атеросклеротичними бляшками. Про яке захворювання можна думати?

- * А) Гострий інфаркт міокарда**
- В) Гострий міокардит
- С) Постінфарктний кардіосклероз
- Д) Хронічна аневризма серця

120. До медико-генетичної консультації звернулася мама з дівчинкою-підлітком зі скаргами на порушення статевого та фізичного розвитку. Мікроскопічне дослідження клітин слизової оболонки ротової порожнини показало відсутність статевого хроматину. Яке захворювання у дівчинки?

- * А) Синдром Шерешевського-Тернера**
- В) Синдром Клайнфельтера
- С) Хвороба Дауна
- Д) Трисомія за Х-хромосомою
- Е) Синдром Патау

121. Експертизу інвалідності встановлює МСЕК. Яку групу інвалідності встановлюють особам з постійною чи тривалою втратою працездатності, що потребують постійного догляду, нагляду чи допомоги?

- * А) Першу**
- В) Другу
- С) Третю
- Д) Четверту

122. У 20-річного наркомана з'явилися скарги на слабкість, артралгії, нудоту. Через 5 днів шкіра та склери стали жовтушними, сеча - темна, кал - світлий, спостерігається збільшення печінки: +2,0 см, селезінки: +1,0 см. В крові: лейкоцити - $3,5 \cdot 10^9$ /л, лімфоцити - 45%, загальний білірубін 180 мкмоль/л, АлАТ- 72 Од/л, протромбіновий індекс - 76%. Методом ІФА в крові виявлені: HbsAg, anti-HBcIgM. Вкажіть діагноз:

*** А) Гострий гепатит В**

В) Гострий гепатит С

С) Хронічний гепатит В

Д) Хронічний гепатит С

Е) Гепатит А

123. При контролі якості роботи біохімічного аналізатора виявлено відхилення показників білкових фракцій у бік зниження при всіх видах вимірювань. Який тип виявлених помилок?

*** А) Систематичні**

В) Похибки вимірювання

С) Технічний збій

Д) Випадкові

Е) Грубі

124. При оцінці структури ендокринної патології в Україні було встановлено, що 30% припадає на цукровий діабет, 35% на дифузний зоб, 5% - на вузловий зоб, 4% - на дифузний токсичний зоб, 2% - на гіпотиреоз, 1% - на тиреоїдит, 13% - на ожиріння, 10% - на інші. Визначте статистичний характер наведених показників:

*** А) Екстенсивний**

В) Інтенсивний

С) Співвідношення

Д) Наочності

Е) Середнього арифметичного

125. При контролі якості роботи біохімічного аналізатора виявлено відхилення показників білкових фракцій у бік зниження при всіх видах вимірювань. Який тип виявлених помилок?

*** А) Систематичні**

- В) Похибки вимірювання
- С) Технічний збій
- Д) Випадкові
- Е) Грубі

126. При оцінці структури ендокринної патології в Україні було встановлено, що 30% припадає на цукровий діабет, 35% на дифузний зоб, 5% - на вузловий зоб, 4% - на дифузний токсичний зоб, 2% - на гіпотиреоз, 1% - на тиреоїдит, 13% - на ожиріння, 10% - на інші. Визначте статистичний характер наведених показників:

*** А) Екстенсивний**

- В) Інтенсивний
- С) Співвідношення
- Д) Наочності
- Е) Середнього арифметичного

127. Пацієнт помер від гострої серцевосудинної недостатності. На секції: на передній стінці лівого шлуночка серця в міокарді виявлено фокус 1,5-2 см жовтувато-сірого кольору з червоним вінчиком. Коронарні артерії нерівномірно звужені на 50% з атеросклеротичними бляшками. Про яке захворювання можна думати?

*** А) Гострий інфаркт міокарда**

- В) Гострий міокардит
- С) Постінфарктний кардіосклероз
- Д) Хронічна аневризма серця

128. При контролі якості роботи біохімічного аналізатора виявлено відхилення показників білкових фракцій у бік зниження при всіх видах вимірювань. Який тип виявлених помилок?

*** А) Систематичні**

- В) Похибки вимірювання
- С) Технічний збій
- Д) Випадкові
- Е) Грубі

129. При оцінці структури ендокринної патології в Україні було встановлено, що 30% припадає на цукровий діабет, 35% на дифузний зоб, 5% - на вузловий зоб, 4% - на дифузний токсичний зоб, 2% - на гіпотиреоз, 1% - на тиреоїдит, 13% - на ожиріння, 10% - на інші. Визначте статистичний характер наведених показників:

*** А) Екстенсивний**

- В) Інтенсивний
- С) Співвідношення
- Д) Наочності
- Е) Середнього арифметичного

130. Пацієнт помер від гострої серцевосудинної недостатності. На секції: на передній стінці лівого шлуночка серця в міокарді виявлено фокус 1,5-2 см жовтувато-сірого кольору з червоним вінчиком. Коронарні артерії нерівномірно звужені на 50% з атеросклеротичними бляшками. Про яке захворювання можна думати?

*** А) Гострий інфаркт міокарда**

- В) Гострий міокардит
- С) Постінфарктний кардіосклероз
- Д) Хронічна аневризма серця

131. При контролі якості роботи біохімічного аналізатора виявлено відхилення показників білкових фракцій у бік зниження при всіх видах вимірювань. Який тип виявлених помилок?

*** А) Систематичні**

- В) Похибки вимірювання
- С) Технічний збій
- Д) Випадкові
- Е) Грубі

132. При оцінці структури ендокринної патології в Україні було встановлено, що 30% припадає на цукровий діабет, 35% на дифузний зоб, 5% - на вузловий зоб, 4% - на дифузний токсичний зоб, 2% - на гіпотиреоз, 1% - на тиреоїдит, 13% - на ожиріння, 10% - на інші. Визначте статистичний характер наведених показників:

*** А) Екстенсивний**

- В) Інтенсивний
- С) Співвідношення
- Д) Наочності
- Е) Середнього арифметичного

133. При контролі якості роботи біохімічного аналізатора виявлено відхилення показників білкових фракцій у бік зниження при всіх видах вимірювань. Який тип виявлених помилок?

*** А) Систематичні**

- В) Похибки вимірювання
- С) Технічний збій
- Д) Випадкові
- Е) Грубі

134. При оцінці структури ендокринної патології в Україні було встановлено, що 30% припадає на цукровий діабет, 35% на дифузний зоб, 5% - на вузловий зоб, 4% - на дифузний токсичний зоб, 2% - на гіпотиреоз, 1% - на тиреоїдит, 13% - на ожиріння, 10% - на інші. Визначте статистичний характер наведених показників:

*** А) Екстенсивний**

- В) Інтенсивний
- С) Співвідношення
- Д) Наочності
- Е) Середнього арифметичного

135. Пацієнт помер від гострої серцевосудинної недостатності. На секції: на передній стінці лівого шлуночка серця в міокарді виявлено фокус 1,5-2 см жовтувато-сірого кольору з червоним вінчиком. Коронарні артерії нерівномірно звужені на 50% з атеросклеротичними бляшками. Про яке захворювання можна думати?

*** А) Гострий інфаркт міокарда**

- В) Гострий міокардит
- С) Постінфарктний кардіосклероз
- Д) Хронічна аневризма серця

136. При контролі якості роботи біохімічного аналізатора виявлено відхилення показників білкових фракцій у бік зниження при всіх видах вимірювань. Який тип виявлених помилок?

*** А) Систематичні**

- В) Похибки вимірювання
- С) Технічний збій
- Д) Випадкові
- Е) Грубі

137. При оцінці структури ендокринної патології в Україні було встановлено, що 30% припадає на цукровий діабет, 35% на дифузний зоб, 5% - на вузловий зоб, 4% - на дифузний токсичний зоб, 2% - на гіпотиреоз, 1% - на тиреоїдит, 13% - на ожиріння, 10% - на інші. Визначте статистичний характер наведених показників:

*** А) Екстенсивний**

- В) Інтенсивний
- С) Співвідношення
- Д) Наочності
- Е) Середнього арифметичного

138. При контролі якості роботи біохімічного аналізатора виявлено відхилення показників білкових фракцій у бік зниження при всіх видах вимірювань. Який тип виявлених помилок?

*** А) Систематичні**

- В) Похибки вимірювання
- С) Технічний збій
- Д) Випадкові
- Е) Грубі

139. При оцінці структури ендокринної патології в Україні було встановлено, що 30% припадає на цукровий діабет, 35% на дифузний зоб, 5% - на вузловий зоб, 4% - на дифузний токсичний зоб, 2% - на гіпотиреоз, 1% - на тиреоїдит, 13% - на ожиріння, 10% - на інші. Визначте статистичний характер наведених показників:

*** А) Екстенсивний**

- В) Інтенсивний
- С) Співвідношення
- Д) Наочності
- Е) Середнього арифметичного

140. При контролі якості роботи біохімічного аналізатора виявлено відхилення показників білкових фракцій у бік зниження при всіх видах вимірювань. Який тип виявлених помилок?

*** А) Систематичні**

- В) Похибки вимірювання
- С) Технічний збій
- Д) Випадкові
- Е) Грубі

141. При оцінці структури ендокринної патології в Україні було встановлено, що 30% припадає на цукровий діабет, 35% на дифузний зоб, 5% - на вузловий зоб, 4% - на дифузний токсичний зоб, 2% - на гіпотиреоз, 1% - на тиреоїдит, 13% - на ожиріння, 10% - на інші. Визначте статистичний характер наведених показників:

*** А) Екстенсивний**

- В) Інтенсивний
- С) Співвідношення
- Д) Наочності
- Е) Середнього арифметичного

142. При контролі якості роботи біохімічного аналізатора виявлено відхилення показників білкових фракцій у бік зниження при всіх видах вимірювань. Який тип виявлених помилок?

*** А) Систематичні**

- В) Похибки вимірювання
- С) Технічний збій
- Д) Випадкові
- Е) Грубі

143. При оцінці структури ендокринної патології в Україні було встановлено, що 30% припадає на цукровий діабет, 35% на дифузний зоб, 5% - на вузловий зоб, 4% - на дифузний токсичний зоб, 2% - на гіпотиреоз, 1% - на тиреоїдит, 13% - на ожиріння, 10% - на інші. Визначте статистичний характер наведених показників:

*** А) Екстенсивний**

- В) Інтенсивний
- С) Співвідношення
- Д) Наочності
- Е) Середнього арифметичного

144. Пацієнт помер від гострої серцевосудинної недостатності. На секції: на передній стінці лівого шлуночка серця в міокарді виявлено фокус 1,5-2 см жовтувато-сірого кольору з червоним вінчиком. Коронарні артерії нерівномірно звужені на 50% з атеросклеротичними бляшками. Про яке захворювання можна думати?

*** А) Гострий інфаркт міокарда**

- В) Гострий міокардит
- С) Постінфарктний кардіосклероз
- Д) Хронічна аневризма серця

145. При оцінці структури ендокринної патології в Україні було встановлено, що 30% припадає на цукровий діабет, 35% на дифузний зоб, 5% - на вузловий зоб, 4% - на дифузний токсичний зоб, 2% - на гіпотиреоз, 1% - на тиреоїдит, 13% - на ожиріння, 10% - на інші. Визначте статистичний характер наведених показників:

*** А) Екстенсивний**

- В) Інтенсивний
- С) Співвідношення
- Д) Наочності
- Е) Середнього арифметичного

146. Пацієнт помер від гострої серцевосудинної недостатності. На секції: на передній стінці лівого шлуночка серця в міокарді виявлено фокус 1,5-2 см жовтувато-сірого кольору з червоним вінчиком. Коронарні артерії нерівномірно звужені на 50% з атеросклеротичними бляшками. Про яке захворювання можна думати?

- * А) Гострий інфаркт міокарда**
- В) Гострий міокардит
- С) Постінфарктний кардіосклероз
- Д) Хронічна аневризма серця

147. До медико-генетичної консультації звернулася мама з дівчинкою-підлітком зі скаргами на порушення статевого та фізичного розвитку. Мікроскопічне дослідження клітин слизової оболонки ротової порожнини показало відсутність статевого хроматину. Яке захворювання у дівчинки?

- * А) Синдром Шерешевського-Тернера**
- В) Синдром Клайнфельтера
- С) Хвороба Дауна
- Д) Трисомія за Х-хромосомою
- Е) Синдром Патау

148. Експертизу інвалідності встановлює МСЕК. Яку групу інвалідності встановлюють особам з постійною чи тривалою втратою працездатності, що потребують постійного догляду, нагляду чи допомоги?

- * А) Першу**
- В) Другу
- С) Третю
- Д) Четверту

149. У молодій дівчини після укусу змії з'явилося жовте забарвлення шкіри, слизових оболонок і склер. За рахунок якого пігменту виникло таке забарвлення?

*** А) Непрямий білірубін**

- В) Стеркобілін
- С) Прямий білірубін
- Д) Уробілін

150. При оцінці структури ендокринної патології в Україні було встановлено, що 30% припадає на цукровий діабет, 35% на дифузний зоб, 5% - на вузловий зоб, 4% - на дифузний токсичний зоб, 2% - на гіпотиреоз, 1% - на тиреоїдит, 13% - на ожиріння, 10% - на інші. Визначте статистичний характер наведених показників:

*** А) Екстенсивний**

- В) Інтенсивний
- С) Співвідношення
- Д) Наочності
- Е) Середнього арифметичного

151. Пацієнт помер від гострої серцевосудинної недостатності. На секції: на передній стінці лівого шлуночка серця в міокарді виявлено фокус 1,5-2 см жовтувато-сірого кольору з червоним вінчиком. Коронарні артерії нерівномірно звужені на 50% з атеросклеротичними бляшками. Про яке захворювання можна думати?

*** А) Гострий інфаркт міокарда**

- В) Гострий міокардит
- С) Постінфарктний кардіосклероз
- Д) Хронічна аневризма серця

152. До медико-генетичної консультації звернулася мама з дівчинкою-підлітком зі скаргами на порушення статевого та фізичного розвитку. Мікроскопічне дослідження клітин слизової оболонки ротової порожнини показало відсутність статевого хроматину. Яке захворювання у дівчинки?

*** А) Синдром Шерешевського-Тернера**

- В) Синдром Клайнфельтера
- С) Хвороба Дауна
- Д) Трисомія за Х-хромосомою
- Е) Синдром Патау

153. Експертизу інвалідності встановлює МСЕК. Яку групу інвалідності встановлюють особам з постійною чи тривалою втратою працездатності, що потребують постійного догляду, нагляду чи допомоги?

*** А) Першу**

- В) Другу
- С) Третю
- Д) Четверту

154. У молодого чоловіка після втрати 25% об'єму крові внаслідок травми у крові з'явилися поодинокі оксифільні нормоцити, ретикулоцитоз - 20%. Яка анемія за здатністю кісткового мозку до регенерації розвинулася у пацієнта?

*** А) Гіперрегенераторна**

- В) Арегенераторна
- С) Регенераторна
- Д) Гіпорегенераторна
- Е) Дисрегенераторна

155. При оцінці структури ендокринної патології в Україні було встановлено, що 30% припадає на цукровий діабет, 35% на дифузний зоб, 5% - на вузловий зоб, 4% - на дифузний токсичний зоб, 2% - на гіпотиреоз, 1% - на тиреоїдит, 13% - на ожиріння, 10% - на інші. Визначте статистичний характер наведених показників:

*** А) Екстенсивний**

В) Інтенсивний

С) Співвідношення

Д) Наочності

Е) Середнього арифметичного

156. Пацієнт помер від гострої серцевосудинної недостатності. На секції: на передній стінці лівого шлуночка серця в міокарді виявлено фокус 1,5-2 см жовтувато-сірого кольору з червоним вінчиком. Коронарні артерії нерівномірно звужені на 50% з атеросклеротичними бляшками. Про яке захворювання можна думати?

*** А) Гострий інфаркт міокарда**

В) Гострий міокардит

С) Постінфарктний кардіосклероз

Д) Хронічна аневризма серця

157. До медико-генетичної консультації звернулася мама з дівчинкою-підлітком зі скаргами на порушення статевого та фізичного розвитку. Мікроскопічне дослідження клітин слизової оболонки ротової порожнини показало відсутність статевого хроматину. Яке захворювання у дівчинки?

*** А) Синдром Шерешевського-Тернера**

В) Синдром Клайнфельтера

С) Хвороба Дауна

Д) Трисомія за Х-хромосомою

Е) Синдром Патау

158. Експертизу інвалідності встановлює МСЕК. Яку групу інвалідності встановлюють особам з постійною чи тривалою втратою працездатності, що потребують постійного догляду, нагляду чи допомоги?

- * А) Першу**
- В) Другу
- С) Третю
- Д) Четверту

159. При оцінці структури ендокринної патології в Україні було встановлено, що 30% припадає на цукровий діабет, 35% на дифузний зоб, 5% - на вузловий зоб, 4% - на дифузний токсичний зоб, 2% - на гіпотиреоз, 1% - на тиреоїдит, 13% - на ожиріння, 10% - на інші. Визначте статистичний характер наведених показників:

- * А) Екстенсивний**
- В) Інтенсивний
- С) Співвідношення
- Д) Наочності
- Е) Середнього арифметичного