

ЗАВАНТАЖЕНО З САЙТУ ТЕСТУВАННЯ.УКР

Сестринська справа - Клінічне медсестринство у внутрішній медицині - база тестів 2017 року

Категорія: **Бази тестів українською мовою 2017 року**

Кількість запитань: **300**

1. Які ознаки кровотечі вказують на її легеневе походження?

*** А) Кров яскраво-червона, піниста**

- В) Кров темна, вигляду “кавової гущі”
- С) Кров темна, виділяється при блюванні
- Д) Кров з домішками їжі
- Е) -

2. Вкажіть, наявність яких клітин в харкотинні характерна для раку легень?

*** А) Атипових клітин**

- В) Еритроцитів
- С) Еозинофілів
- Д) Лейкоцитів
- Е) Тромбоцитів

3. При наявності у хворого симптомів шлункової кровотечі його необхідно підготувати до такого обстеження:

*** А) Фіброгастроудоденоскопії**

- В) Оглядової рентгенографії органів грудної клітки та черевної порожнини
- С) Рентгенографії шлунку з барієм
- Д) Колоноскопії
- Е) Ректороманоскопії

4. При обстеженні хворого з нефротичним синдромом виявлені зміни в клінічному аналізі сечі. Яка з перерахованих змін в клінічному аналізі сечі найхарактерніша для даного синдрому?

*** А) Протеїнурія**

- В) Еритроцитурія
- С) Зрушення рН сечі в лужну сторону
- Д) Лейкоцитурія
- Е) Поява “активних лейкоцитів”

5. Хворий тривалий час перебуває в непритомному стані у зв'язку з важкою черепно-мозковою травмою. Який метод харчування слід використати в такому разі?

*** А) Через назоентеральний зонд**

- В) Парентеральне
- С) Через живильні клізми
- Д) Через гастростому
- Е) Через ентеростому

6. Хворий 58-ми років тривалий час страждає виразковою хворобою шлунка. В останній рік його постійно турбує шлунковий дискомфорт у вигляді втрати апетиту, почуття незадоволення від їжі, розпирання і тяжкість в ділянці шлунка, відрижки. Відзначає зниження маси тіла за 2 місяці до 10 кг. У клінічному аналізі крові ознаки анемії. Про яке захворювання слід думати в першу чергу?

*** А) Малігнізацію виразки шлунка**

- В) Загострення виразкової хвороби шлунка
- С) Залізодефіцитну анемію
- Д) Ускладнення виразкової хвороби шлунка з кровотечею
- Е) Аліментарне виснаження

7. Хворому необхідно виконати переливання еритроцитарної маси з приводу гострої крововтрати. При огляді флакону виявилось забарвлення верхнього шару плазми у рожевий кольор. Що необхідно зробити в даній ситуації?

*** А) Повернути флакон у відділення переливання крові**

- В) Виконати переливання так як випадок ургентний
- С) Обережно відділити плазму а еритроцити перелити
- Д) Відмити еритроцити ізотонічним розчином натрію хлориду
- Е) Виконати пробу на прихований гемоліз

8. Хворий М., 24 роки, внаслідок автодорожньої аварії отримав черепно-мозкову травму і втратив свідомість. При обстеженні хворого на місці аварії шкіра бліда, з ціанотичним відтінком; пульс - 140/хв., дихальні рухи грудної клітки відсутні; реакція зіниць на світло збережена. Визначити обсяг первинної допомоги:

*** А) Усунення западання язика, надання лежачого положення на правому боці, при необхідності - штучна вентиляція легень**

- В) Термінова госпіталізація до стаціонару
- С) Штучна вентиляцію легень потерпілому
- Д) Масаж грудної клітки
- Е) Надання хворому напівсидячого положення

9. У хворого Я., 40 років з опіками верхніх кінцівок на третю добу після травми раптово виник стискуючий біль за грудиною і в ділянці серця. Які з наведених засобів може призначити хворому медсестра?

*** А) Валідол, нітрогліцерин**

- В) Компрес з камфорного спирту
- С) Вдихання нашатирного спирту
- Д) Настойка валеріани
- Е) Холодний компрес

10. У хворобі Б., 17 років під час перев'язки з приводу підшкірного панарицію 2 пальця лівої кисті раптом з'явилась нудота, відчуття різкої слабості, потемніння в очах. Обличчя стало блідим, на шкірі виступив піт. Які дії повинна здійснити медсестра?

*** А) Дати понюхати ватку, змочену нашатирним спиртом**

- В) Провести штучне дихання
- С) Провести непрямий масаж серця
- Д) Покласти хвору на кушетку з піднятим головним кінцем
- Е) Холодний компрес на чоло

11. У хворої через 10 днів після внутрім'язевої ін'єкції утворилось болісне запальне утворення в ділянці верхньо-зовнішнього квадранта правої сідниці, температура тіла до 38°C в вечірній час на протязі останніх 3 діб. Назвіть найбільш вірогідний діагноз:

*** А) Постін'єкційний абсцес сідниці**

- В) Гематома сідниці
- С) Рожисте запалення
- Д) Гнійний натічник
- Е) Флегмона

12. У хворого 66 р. туберкульоз легень. Який препарат можна використати з метою вторинної профілактики цього захворювання?

*** А) Ізоніазід**

- В) Біцилін-5
- С) Левамизол
- Д) Амоксицилін
- Е) Ремантадин

13. Хворий Е. 15 років страждає ревматичною вадою серця. Впродовж останнього місяця скаржиться на задишку інспираторного характеру при мінімальному фізичному навантаженні. При аускультатії серця: на верхівці І тон різко ослаблений, грубий пансистолічний шум. При аускультатії легенів - дихання везикулярне, послаблене в нижніх відділах з обох сторін, у зоні послабленого дихання - вологі хрипи. У даного пацієнта має місце:

*** А) Хронічна лівошлуночкова недостатність**

- В) Гостра лівошлуночкова недостатність
- С) Гостра правошлуночкова недостатність
- Д) Хронічна правошлуночкова недостатність
- Е) Гостра судинна недостатність

14. Жінка 36 років народила 1 годину тому. Крововтрата у пологах склала 1 літр. З'явився шум у голові, потемніння в очах, короткочасна втрата свідомості. Діагностовано гостру судинну недостатність. Що з нижче перерахованого є характерних для колапсу?

*** А) Блідість шкіри**

- В) Глибоке, шумне дихання
- С) Високий систолічний тиск
- Д) Уповільнення пульсу
- Е) Дифузний ціаноз

15. Хворий К., 42 роки, страждає впродовж 8 років на гіпертонічну хворобу. Сьогодні після емоційного стресу на роботі став дратівливим, відчуває сухість у роті. Об'єктивно: у свідомості, тремор рук, обличчя гіперемовано, шкіра зволожена, поліурія. АТ- 210/100 мм рт.ст., ЧСС- 110/хв., рухових і чутливих порушень немає. Глюкоза крові - 4,5 ммоль/л. Яке ускладнення розвинулося у хворого?

*** А) Гіпертонічна криза**

- В) Гіпоглікемія
- С) Ішемічний інсульт
- Д) Геморагічний інсульт
- Е) Гиперглікемічна кома

16. Хворий скаржиться на стискаючі болі за грудниною з іррадіацією в ліву руку, лопатку, які виникають при фізичному навантаженні, купіруються нітрогліцерином протягом 1 хвилини. Об'єктивно: наявних набряків немає. Пульс - 72/хв., ритмічний. АТ- 135/90 мм рт.ст. Про яку патологію йдеться?

*** А) Стенокардія напруження**

- В) Міжреберна невралгія
- С) Дрібновогнищевий (не Q) інфаркт міокарда
- Д) Крупновогнищевий (Q) інфаркт міокарда
- Е) стенокардія спокою

17. У хворого на хронічний гломерулонефрит в клінічному аналізі сечі виявлені зміни: відносна густина - 1,005, білок - 0,99 г/л, еритроцити змінені 15-20 в полі зору. Призначений аналіз сечі за Зимницьким. Які показники відносної густини сечі в пробі за Зимницьким характерні для гіпоізостенурії?

*** А) 1,008-1,010**

В) 1,020-1,022

С) 1,015-1,018

Д) 1,018-1,020

Е) 1,020-1,025

18. Для якого з перерахованих патологічних станів найбільш характерний наступний клінічний аналіз сечі: відносна густина - 1,018, білок - 0,033 г/л, еритроцити незмінені 10-20 в полі зору, лейкоцити - 3-5 в полі зору, епітелій сечового міхура - місцями, солі - оксалати в значній кількості?

*** А) Сечокам'яна хвороба**

В) Пієліт

С) Гострий пієлонефрит

Д) Гострий гломерулонефрит

Е) Уретрит

19. Дуоденальне зондування: порція А - ясно-жовта, лейкоцити - 6-8 у п/зр., порція В - маслинова, багато слизу, пластівців, лейкоцити - 1/2 у п/зр., порція С - ясно-жовта, лейкоцити - 10-15 у п/зр. Виберіть ознаку запалення жовчного міхура:

*** А) Підвищення лейкоцитів у порції В**

В) Наявність лейкоцитів протягом 1-й фази

С) Наявність лейкоцитів протягом 2-й фази

Д) Підвищення лейкоцитів у порції А

Е) Підвищення лейкоцитів у порції С

20. У пацієнта на фоні гіпертермії виникли судомні посмикування. Який препарат використовується у даному випадку для зняття судом?

*** А) 0,5% розчин сибазону**

В) 50% розчин анальгіну

С) 1% розчин димедролу

Д) 10% розчин кальцію глюконату

Е) 0,1% розчин адреналіну гідрохлориду

21. Пацієнт С., 26 років, в присутності якого медична сестра виконувала ін'єкцію іншому пацієнту, поскаржився на слабкість і запаморочення та раптово знепритомнів. Як розпочне допомогу медична сестра при непритомності?

*** А) Надасть положення пацієнтові на спині з припіднятими ногами та звільнить від тісного одягу**

В) Зробить ін'єкцію кордіаміну

С) Використає холодну воду

Д) Зігріє кінцівки грілками

Е) Забезпечить сидяче положення

22. У пацієнта Р., 42 років, розвинулася тяжка ангінозна форма гострого інфаркту міокарда. Найбільш вірогідне ускладнення:

*** А) Кардіогенний шок**

В) Аритмія

С) Напад ядухи

Д) Непритомність

Е) Гіпертермія

23. Медична сестра обстежує пацієнта з хронічною серцевою недостатністю. Що є найбільш інформативним у діагностиці даного стану?

*** А) Наявність набряків на ногах та задишки**

В) Слабкість, поганий апетит

С) Кашель та підвищена температура тіла

Д) Біль у серці ниючого характеру та біль у великих суглобах

Е) Пульсація сонних артерій, жовтяниця

24. Хворий Ж., 35 років, скаржиться на слабкість, нездужання, задишку, кашель із виділенням рясного слизисто-гнійного мокротиння без запаху, особливо ранком, за добу виділяється до 300 мл. Об'єктивно: температура - 37,4°C, шкіра бліда, підшкірно жирова клітковина розвинена недостатньо, нігтьові фаланги пальців ніг і рук у формі "барабанних паличок", нігті у формі "годинникових скелець", ЧДР- 22/хв. Пульс - 96/хв., ритмічний. АТ- 130/60 мм рт.ст. Що є найбільш інформативним методом у діагностиці даного захворювання?

*** А) Бронхографія**

В) Оглядова рентгенографія

С) Оглядова рентгеноскопія

Д) Томографія

Е) Флюорографія

25. Хвора О., 25 років, госпіталізована зі скаргами на слабкість, тупий біль у попереку, що поширюється за ходом сечоводів у надлобкову ділянку, низ живота, підвищення температури тіла, збільшення сечовипускання, зниження апетиту. Під час обстеження позитивний симптом Пастернацького з обох боків. Які основні лабораторні ознаки характерні для даної патології?

*** А) Лейкоцитурія, бактеріурія**

- В) Олігурія
- С) Циліндрурія
- Д) Мікрогематурія
- Е) Макрогематурія

26. Пацієнт 52 р., поступив у приймальне відділення з такими проблемами: сильний біль у ділянці серця стискаючого характеру, який віддає в ліву руку, тривалістю більше 30 хв. Застосування нітрогліцерину ефекту не дало. Яке захворювання слід запідозрити?

*** А) Інфаркт міокарда**

- В) Стенокардію
- С) набряк легень
- Д) Остеохондроз
- Е) Пневмонію

27. В лікарню звернувся хворий В., 24 років, зі скаргами на біль в животі, нудоту, блювання, підвищення температури тіла до 38°C. Останній раз приймав їжу 6 годин тому. Об'єктивно: шкіра бліда, вкрита холодним потом, відзначається біль в ділянці епігастрію. Пульс - 95/хв. Язик обкладений брудним нальотом. Яку маніпуляцію за призначенням лікаря перш за все зробить медична сестра?

*** А) Промивання шлунку**

- В) Введення антибіотиків
- С) Фракційне зондування шлунку
- Д) введення вітамінів
- Е) Введення ферментних препаратів

28. Хворий В., 50 років, звернувся зі скаргами на виділення крові під час дефекації, рідкі випорожнення (до 10 разів на добу), біль внизу живота, втрату маси тіла, адінамію. Об'єктивно: шкіряні покриви та видимі слизові бліді, пульс - 90/хв., АТ- 100/60 мм рт.ст., язик обкладений білим нальотом. При пальпації живота розлита болючість та ущільнення нисхідного відділу товстої кишки. Розвиток якого захворювання можна запідозрити у хворого?

*** А) Виразковий коліт**

- В) Ентерит
- С) Коліт
- Д) Виразкова хвороба шлунку
- Е) Хронічний панкреатит

29. Пацієнт 60 р., з діагнозом ІХС: гострий коронарний синдром. Після порушення ліжкового режиму стан пацієнта погіршився. Посилились болі за грудиною, задишка, загальна слабкість АТ- 80/50 мм рт.ст., ЧСС- 110/хв., в легенях вислуховуються вологі різнокаліберні хрипи, пацієнт вкритий холодним липким потом. Який з препаратів застосуєте для корекції гемодинаміки?

*** А) Дофамін**

- В) Корглюкон
- С) Ефедрин
- Д) Строфантин
- Е) Атропін

30. Сімейна медсестра при проведенні ІІ етапу медсестринського процесу у пацієнта з серцевою астмою формулює та класифікує проблеми. Яка проблема буде пріоритетною?

*** А) Напад ядухи**

- В) Біль в грудній клітці
- С) Загальна слабкість
- Д) Вологий кашель
- Е) Сухий кашель

31. Жінка 30 років звернулася до сімейної медсестри зі скаргами на сильний головний біль. При обстеженні: АТ -160/90мм рт.ст. Які першочергові дії медичної сестри?

*** А) Гірчичники на потиличну ділянку**

- В) Міхур з льодом до потилиці
- С) Грілку до ніг
- Д) Гірчичники на грудну клітку
- Е) Підняти нижні кінцівки

32. Сімейний лікар після проведення клінічного обстеження та оцінювання додаткових методів обстеження діагностував у хворого виразкову хворобу. Яку медичну документацію повинна заповнити сімейна медсестра на диспансерного хворого?

*** А) Контрольну карту диспансерного спостереження (Ф-030/о)**

В) Карту профілактичних щеплень (Ф-063/о)

С) Санаторно-курортну карту (Ф-072/о)

Д) Довідку про тимчасову непрацездатність (Ф-095/о)

Е) Екстрене повідомлення про інфекційне захворювання, харчове, гостре професійне отруєння, незвичну реакцію на щеплення (Ф-058/о)

33. Пацієнт 45 р. знаходиться на лікуванні в психіатричному відділенні. Хворий сидить на ліжку, відмовляється встати, загальмований, відповідає тихим сумним голосом. При розмові хворого з медичною сестрою стверджує, що “марно прожив життя”, “нічого доброго не зробив”, “немає більше для чого жити”. Часто плаче, просить позбавити його життя. Який психічний розлад може виявити медична сестра у хворого?

*** А) Депресивний синдром**

В) Маніакальний синдром

С) Параноїдне маячення

Д) Гебефренічне збудження

Е) Кататонічне збудження

34. В приймальне відділення доставлений чоловік 35 р., який помилково випив 150 мл метилового спирту. Який антидот необхідно застосувати для профілактики отруєння метиловим спиртом?

*** А) Етиловий спирт**

В) Унітіол

С) Активоване вугілля

Д) Розчин гідрокарбонату натрію

Е) Атропіну сульфат

35. Ви - медична сестра-бакалавр виявили у пацієнта рухове збудження. Хворий ходить по палаті, розглядає щось у себе під ногами, не реагує на звернення, прислуховується до чогось. Обличчя червоне, дихання шумне. При спробі наблизитися - погрозово замахнувся на медичну сестру. Яка тактика медичної сестри і даному випадку?

*** А) Негайно повідомити про стан пацієнта лікарю**

- В) Психологічно заспокоїти хворого
- С) Ввести транквілізатори хворому
- Д) Негайно виписати хворого з відділення
- Е) Залишити хворого в палаті самого

36. У пацієнта підозра на виразкову хворобу шлунка. Що із перерахованого буде найбільш інформативним для підтвердження діагнозу?

*** А) Фіброгастроудоденоскопія**

- В) Колоноскопія
- С) УЗД-діагностика
- Д) Іригоскопія
- Е) Ph-метрія

37. Чоловік 47 років скаржиться на тяжкість у правому підребер'ї, загальну слабкість. Три роки тому хворів на вірусний гепатит В. Об'єктивно: склери та шкіра жовтяничні. "Судинні зірочки" на шкірі грудної клітки. Гінекомастія. Печінка збільшена на 3 см. У крові - підвищений рівень білірубіну і трансаміназ. Ваш попередній діагноз?

*** А) Хронічний гепатит**

- В) Хронічний панкреатит
- С) Хронічний холецистит
- Д) Жовчокам'яна хвороба
- Е) Дискінезія жовчевого міхура

38. Чоловік 58 років скаржиться на загальну слабкість, зниження працездатності, тяжкість у лівому підребер'ї. Хворіє 7 міс. По медичну допомогу не звертався. Об'єктивно: шкіра бліда. Печінка збільшена на 4 см, селезінка - на 8 см. Загальний аналіз крові: ер. - $3,3 \cdot 10^{12}/л$, гемоглобін - 100 Г/л, КП - 0,9, лейкоц. - $112 \cdot 10^9/л$, баз. - 2%, еоз. - 7%, мієлобласти - 1%, промієлоцити - 7%, мієлоцити - 10% , юні - 4% , пал. - 10%, сегм. - 32%, ШОЕ - 28 мм/год. Ваш діагноз?

*** А) Хронічний мієлолейкоз**

- В) Хронічний лімфолейкоз
- С) Лімфогранулематоз
- Д) Залізодефіцитна анемія
- Е) В12 анемія

39. Під час проведення першого етапу медсестринського обстеження, виявили у пацієнтки: кровотечі зі слизових оболонок, метрорагії, “шкіра леопарда”, час кровотечі збільшений. Ваш діагноз?

*** А) Тромбоцитопенічна пурпура**

- В) Геморагічний васкуліт
- С) Лімфогранулематоз
- Д) Гемофілія
- Е) Гострий лейкоз

40. Після проведенного обстеження пацієнту виставлено діагноз - залізодефіцитна анемія. Який із перерахованих препаратів слід застосувати?

*** А) Ферум-лек**

- В) Преднізолон
- С) Циклофосфан
- Д) Ціанокобаламін
- Е) Вінкристин

41. Хворий 45 р. знаходиться на лікуванні в терапевтичному відділенні онкодиспансеру з приводу раку легень. Хворого турбує схуднення, біль в грудній клітці, кашель з виділенням харкотиння. Яке харкотиння є характерним для даної патології?

*** А) У вигляді “малинового желе”**

- В) Слизисте
- С) Гнійне
- Д) Сковидне
- Е) ржаве

42. Пацієнтка 50 років скаржиться на біль за грудиною стискаючого характеру, який віддає в ліве плече, лопатку. Біль виникає після фізичного та психічного перевантаження. Застосування якого препарату буде першочерговим?

*** А) Нітрогліцерину**

- В) Ніфедипіну
- С) Атенололу
- Д) Аспіріну
- Е) Папаверину

43. Пацієнт з хронічним гломерулонефритом скаржиться на біль голови, шум у вухах, біль в ділянці серця. Вкажіть для якого синдрому характерні ці ознаки:

*** А) Гіпертензивного**

- В) Інтоксикаційного
- С) Гіпертермічного
- Д) Сечового
- Е) набрякового

44. Найбільш інформативною ознакою в загальному аналізі сечі хворого на гострий гломерулонефрит буде:

*** А) Гематурія**

- В) Циліндрурія
- С) Гіпоізостенурія
- Д) Бактеріурія
- Е) Лейкоцитурія

45. У хворого скарги на кровохаркання впродовж тривалого часу. Яке захворювання слід запідозрити?

*** А) Рак легенів**

- В) Хронічний бронхіт
- С) Ексудативний плеврит
- Д) Бронхіальна астма
- Е) Нозокоміальна пневмонія

46. Хворий скаржиться на біль в грудній клітині, кашель з виділенням “ржавого” мокротиння, підвищення температури тіла до 39°C. Яке захворювання можна запідозрити у пацієнта?

*** А) Пневмонію**

- В) Ларингіт
- С) Фарингіт
- Д) Гнійний бронхіт
- Е) Абсцес легенів

47. Пацієнтка 40 років скаржиться на періодичне підвищення артеріального тиску після емоційного напруження, яке проходить при прийомі заспокійливих препаратів. Які ознаки характерні для I стадії гіпертонічної хвороби?

*** А) Нестійке підвищення АТ без ознак ураження органів-мішеней**

- В) Гіпертрофія лівого шлуночка серця
- С) Протеїнурія
- Д) Ділятація лівого шлуночка серця
- Е) Органічні ураження органів-мішеней

48. Пацієнт госпіталізований з приводу пневмонії. Лікар призначив антибіотик - цефазолін. Раптово після першої ін'єкції у пацієнта з'явилося відчуття жару, утруднення дихання, став блідим, пульс ниткоподібний, артеріальний тиск - 85/60 мм рт.ст. Яке ускладнення виникло у пацієнта?

*** А) Анафілактичний шок**

- В) набряк Квінке
- С) Кропив'янка
- Д) набряк легень
- Е) Серцева астма

49. Пацієнту Р. лікар діагностував гострий гломерулонефрит. Дотримання якої дієти пацієнтом повинна контролювати медична сестра?

*** А) Стіл №7**

- В) Стіл №15
- С) Стіл №3
- Д) Стіл №9
- Е) Стіл №4

50. У пацієнта непропорційне збільшення носа, губ, підборіддя, кистей рук, ступні. Скаржиться на головний біль, запаморочення, біль у суглобах. На рентгенограмі черепа виявлено збільшення розмірів “турецького сидла”, витончення його стінок. Вказані ознаки характерні для:

*** А) Акромегалії**

- В) Хвороби Іценка-Кушінга
- С) Гігантизму
- Д) Пухлини наднирника
- Е) Стовбурового енцефаліту

51. Пацієнт 45 років звернувся зі скаргами на слабкість, помірне підвищення температури тіла, набряки на обличчі, зміну кольору кількості сечі. Хворіє тиждень після перенесеної ангіни. Об’єктивно: шкіра бліда, набряк повік, АТ-170/100 мм рт.ст., пульс - 90/хв., тони серця приглушені, симптом Пастернацького позитивний. Яке дослідження необхідно провести для уточнення діагнозу?

*** А) Аналіз сечі за Нечипоренком**

- В) Аналіз сечі на глюкозу
- С) Аналіз сечі за Зимницьким
- Д) Загальний аналіз крові
- Е) Аналіз сечі на діастазу

52. Пацієнтка 26 років скаржиться на біль у колінних, ліктьових суглобах “летючого характеру”, який підсилюється при рухах, підвищення температури до 37,5°C ввечері. З анамнезу відомо, що пацієнтка часто хворіє ангіною. При огляді суглобів спостерігаються припухлість, почервоніння. Для якого захворювання характерні дані ознаки?

*** А) Ревматичний артрит**

- В) Туберкульозний артрит
- С) Ревматоїдний артрит
- Д) Гонорейний артрит
- Е) Деформуючий остеоартроз

53. Хворий скаржиться на часті носові кровотечі, свербіж шкіри, кровоточивість, “судинні зірочки” на шкірі, ксантоми. В аналізі крові - білірубінемія, збільшення рівня ліпідів. Про який діагноз можна думати?

*** А) Цироз печінки**

- В) Виразкова хвороба
- С) Холецистит
- Д) Вірусний гепатит
- Е) Ентероколіт

54. Пацієнтка звернулась зі скаргами на біль оперізуючого характеру, нудоту, блювання, діарею, слабкість, які виникли після вживання смаженої картоплі. Визначити можливу патологію:

*** А) Панкреатит**

- В) Виразкова хвороба
- С) Гастрит
- Д) Ентероколіт
- Е) Жовчнокам'яна хвороба

55. Хвора 24 років скаржиться на біль у суглобах нижніх кінцівок, який посилюється при незначних рухах, неприємні відчуття і біль у ділянці серця, задишку, загальну слабкість, підвищення температури тіла до 37,8°C. Захворіла через 2 тижні після перенесеної ангіни. Об'єктивно: тони серця приглушені, м'який систолічний шум на верхівці серця. Правий колінний суглоб припухлий, шкіра над ним червона, гаряча на дотик. Загальний аналіз крові:

А) л.- 9,9·10⁹/л, ШОЕ - 28 мм/год. Hb- 105 г/л. Який найбільш імовірний діагноз?

*** В) Ревматична хвороба**

С) Стенокардія

Д) Ревматоїдний артрит

Е) Кардіосклероз

Ф) Інфекційно-алергічний міокардит

56. Хворий 48 років звернувся зі скаргами на приступи стискаючого болю за грудиною під час ходьби та емоційних стресів з іррадіацією в ліву руку, під ліву лопатку. Яка найбільш доцільна лікувальна тактика у даному випадку?

*** А) Призначити нітрогліцерин**

В) Ввести анальгін і димедрол

С) Призначити но-шпу .

Д) Призначити папаверин

Е) Призначити анаприлін

57. До терапевтичного відділення доставлено хворого, у якого годину тому після фізичного навантаження раптом з'явився сильний біль за грудиною, який іррадіював у міжлопаткову ділянку. Під час огляду: стан тяжкий, шкіра бліда, волога, пульс - 100/хв., ритмічний, АТ- 80/60 мм рт.ст.; тони серця глухі. На ЕКГ - глибокий зубець Q та куполоподібний сегмент ST у відведеннях II - III. Який найбільш імовірний діагноз?

*** А) Гострий інфаркт міокарда**

В) Стенокардія

С) Тромбоемболія легеневої артерії

Д) Міокардит

Е) Ревматична хвороба

58. До Вас звернулась хвора зі скаргами на головний біль, шум в голові, біль у ділянці серця, зниження працездатності та іноді носові кровотечі. Під час огляду: верхівковий поштовх посилений, акцент II тону над аортою, АТ- 185/100 мм рт.ст. Яка патологія у хворої?

*** А) Гіпертонічна хвороба**

В) Ішемічна хвороба серця

С) Гіпотонічна хвороба

Д) Міокардит

Е) Ревматична хвороба

59. З якого із наведених заходів необхідно починати невідкладну допомогу при гіпоглікемічній комі?

*** А) Внутрішньовенне струминне введення 40% р-ну глюкози**

В) Внутрішньовенне струминне введення 5% р-ну глюкози

С) Внутрішньовенне струминне введення інсуліну

Д) Внутрішньовенне краплинне введення 5% р-ну глюкози

Е) Внутрішньовенне краплинне введення 10% р-ну глюкози

60. Хворий скаржиться на гострий, “кинжальний” біль у животі, різку слабкість. Захворів раптово після фізичного навантаження. В анамнезі - виразкова хвороба дванадцятипалої кишки. Під час огляду: обличчя бліде, шкіра вкрита холодним потом, живіт дошкоподібний. Яке ускладнення розвинулося у хворого?

*** А) Перфоративна виразка дванадцятипалої кишки**

- В) Шлункова кровотеча
- С) Гострий гастрит
- Д) Синдром подразненого кишечника
- Е) Гострий панкреатит

61. Хвора скаржиться на різкий біль у правому підребер'ї, який іррадіює у праве плече, лопатку, нудоту, блювання. Хворіє понад 5 років. Під час огляду: хвора збуджена, шкіра волога, язик обкладений білим нальотом. Живіт здутий, болючий в правому підребер'ї, позитивні симптоми Ортнера, Кера. Який діагноз у хворої?

*** А) Загострення хронічного холециститу**

- В) Виразкова хвороба
- С) Гострий гастрит
- Д) Загострення панкреатиту
- Е) Синдром подразненого кишечника

62. Хворий скаржиться на нудоту, блювання, біль оперізуючого характеру, слабкість. Такий стан розвинувся після вживання алкоголю та гострої, жирної їжі. Під час огляду: шкіра бліда, язик обкладений сірим нальотом, живіт болючий більше в епігастрії та лівому підребер'ї. Яке дослідження найбільш інформативне для встановлення діагнозу?

*** А) Аналіз сечі та крові на діастазу**

- В) Загальний аналіз сечі
- С) Аналіз крові на глюкозу
- Д) Копрограма
- Е) Аналіз калу на приховану кров

63. Пацієнт 21 року скаржиться на появу сечі кольору “м’ясних помиїв”, головний біль, набряки на обличчі. Три тижні тому хворів на ангіну. Об’єктивно: обличчя бліде, одутле, АТ- 145/90 мм рт.ст. Симптом Пастернацького слабо позитивний. Який найбільш імовірний діагноз?

*** А) Гострий гломерулонефрит**

- В) Гіпертонічна хвороба
- С) Гострий пієлонефрит
- Д) Хронічний пієлонефрит
- Е) Сечокам’яна хвороба

64. Хворий скаржиться на напад ядухи з утрудненим видихом, незначну кількість харкотиння, відчуття стиснення в грудях, сухі свистячі хрипи, які чути на відстані. Захворів раптово після вдихання запаху фарби у приміщенні. Об’єктивно: шкіра бліда з ціанотичним відтінком. Грудна клітка у стані глибокого вдиху. В легенях при аускультатії на тлі жорсткого дихання сухі свистячі хрипи, ЧД- 29/хв. Який найбільш імовірний діагноз?

*** А) Бронхіальна астма**

- В) Бронхоектатична хвороба
- С) Пневмонія
- Д) Сухий плеврит
- Е) Гострий трахеобронхіт

65. Хворий, який знаходиться на диспансерному обліку з приводу виразкової хвороби шлунка, звернувся зі скаргами на постійний біль у животі, який посилюється надвечір, відрижку “тухлим яйцем”, блювання зранку їжею, спожитою напередодні. Під час огляду: ріст - 178 см, маса тіла - 52 кг, шкіра суха, язик вкритий біло-сірим нальотом. Тони серця приглушені, живіт болісний в епігастрії, видима перистальтика. Яке ускладнення виникло у пацієнта?

*** А) Стеноз вороторя**

- В) Кровотеча
- С) Пенетрація
- Д) Перфорація
- Е) Малігнізація

66. Хвора скаржиться на серцебиття, підвищену збудливість, плаксивість, втрату маси тіла на тлі збереженого апетиту, загальну слабкість, відчуття жару, підвищення температури тіла до 37,1-37,5°C. В анамнезі - часті стреси. Об'єктивно: пацієнтка зниженого харчування, метушлива, відмічається витрішкуватість очей. дрібний тремор закритих повік. Вираз обличчя здивований. Шия потовщена за рахунок збільшеної щитоподібної залози. Який найбільш імовірний діагноз?

*** А) Дифузний токсичний зоб**

- В) Цукровий діабет
- С) Гіпотиреоз
- Д) Акромегалія
- Е) Феохромоцитома

67. Хворий звернувся зі скаргами на слабкість, головний біль, зниження зору, запаморочення, зміну зовнішнього вигляду. З анамнезу - біля двох років тому переніс травму черепа. Об'єктивно: шкіра та видимі слизові оболонки потовщені, вилиці, нижня щелепа, лобові горби, ніс, надбрівні дуги та губи збільшені. Язик великий, товстий, з відбитками зубів. Який найбільш імовірний діагноз?

*** А) Акромегалія**

- В) Феохромоцитома
- С) Цукровий діабет
- Д) Дифузний токсичний зоб
- Е) Гіпотиреоз

68. У пацієнта два тижні тому з'явились кашель з виділенням мокротиння з неприємним запахом, з підвищенням температури тіла до 39°C. Об'єктивно: стан пацієнта тяжкий, ЧД- 24/хв. Рентгенологічно виявлено порожнину до 3 см в діаметрі з горизонтальним рівнем рідини. Який найбільш вірогідний діагноз?

*** А) Абсцес легені**

- В) Пневмонія
- С) Ексудативний плеврит
- Д) Інфільтративний туберкульоз
- Е) Рак легенів

69. У пацієнта скарги на постійний ниючий біль у правому підребер'ї, нудоту, відрижку, метеоризм, кровотечі з ясен, загальну слабкість. Курить, зловживає алкогольними напоями. Об'єктивно: на шкірі "судинні зірочки", долонна еритема, набряки гомілок. Живіт різко збільшений, пупок випнутий, навколо нього - венозна сітка у вигляді "голови медузи". Асцит. Прояви якого клінічного синдрому свідчать про цироз печінки?

*** А) Синдром портальної гіпертензії**

- В) Больовий синдром
- С) Синдром жовтяниці
- Д) Геморагічний синдром
- Е) Нефротичний синдром

70. Пацієнтка скаржиться на спотворення смаку, появу "заїдів" у куточках рота, підвищену ламкість нігтів і волосся, загальну слабкість. Протягом останніх 10 років хворіє хронічним гастритом зі зниженою кислотністю. Про яку анемію йдеться мова?

*** А) Залізодефіцитна анемія**

- В) Постгеморагічна анемія
- С) Гемолітична анемія
- Д) В12 дефіцитна анемія
- Е) Гіпопластична анемія

71. Після введення інсуліну пацієнт відчув тремтіння кінцівок, з'явилося відчуття голоду, шкіра вкрилася холодним потом. Який стан розвивається у пацієнта?

*** А) Гіпоглікемічна кома**

- В) Судомна криза
- С) Колапс
- Д) Гіперглікемічна кома
- Е) Непритомність

72. Для виявлення хронічної ниркової недостатності найбільш інформативним методом дослідження сечі буде:

*** А) Проба за Зимницьким**

- В) Аналіз сечі за Амбурже
- С) Аналіз сечі за Нечипоренком
- Д) Аналіз сечі на глюкозу
- Е) Загальний аналіз сечі

73. Пацієнт скаржиться на виникнення раптової ядухи з утрудненим видихом, наприкінці нападу кашель з виділенням незначної кількості склоподібного харкотиння. При аналізі харкотиння виявлені еозинофіли, кристали Шарко-Лейдена, спіралі Куршмана. Яке захворювання у пацієнта?

*** А) Бронхіальна астма**

- В) Серцева астма
- С) Гострий бронхіт
- Д) Рак легень
- Е) Туберкульоз легень

74. При обстеженні пацієнта виявлено: біль у поперековій ділянці справа, який іррадіює вздовж сечоводу в сечовий міхур, у праве яєчко. Сечовипускання утруднене, болісне. Нудота, блювання. Пацієнт збуджений, не знаходить місця від болю. Визначається позитивний симптом Пастернацького справа. Для якого захворювання характерні ці ознаки?

*** А) Сечокам'яна хвороба**

- В) Гострий пієлонефрит
- С) Гострий гломерулонефрит
- Д) Гострий панкреатит
- Е) Гострий холецистит

75. У пацієнта, який хворіє на виразкову хворобу шлунка понад 6 років, з'явилися відчуття тяжкості і переповнення в епігастрії після їди, відрижка тухлим, блювання їжею. Яке ускладнення розвинулось?

*** А) Стеноз пілоруса**

- В) Малігнізація
- С) Шлункова кровотеча
- Д) Перфорація
- Е) Пенетрація

76. У пацієнта виявлені зменшення апетиту, відраза до м'яса, відчуття тяжкості в надчеребній ділянці, втрата ваги - 5 кг за місяць, загальна слабкість, стомлюваність, зниження працездатності. При огляді - землисте забарвлення обличчя. Для якого захворювання характерні дані ознаки?

*** А) Рак шлунка**

- В) Виразкова хвороба шлунка
- С) Хронічний гепатит
- Д) Цироз печінки
- Е) Хронічний гастрит

77. У пацієнта з інфарктом міокарда раптово вночі виник напад ядухи, який супроводжувався кашлем з виділенням пінистого харкотиння рожевого кольору. При обстеженні шкіра і слизові оболонки бліді, акроціаноз. Шкіра вкрита холодним липким потом. Під час вислуховування легень відзначаються негучні дрібно- і середньоміхурцеві хрипи в нижніх відділах. Яке ускладнення виникло?

*** А) Набряк легенів**

- В) Кардіогенний шок
- С) Пневмонія
- Д) Легенева кровотеча
- Е) Бронхіальна астма

78. У пацієнтки, якій було проведено струмектомію, виникли зниження пам'яті, мерзлякуватість, сонливість удень, в'ялість, загальна слабкість, зниження працездатності. Об'єктивно: шкіра суха, лущиться, не береться в складку; волосся сухе, ламке, випадає. Про яке захворювання можна думати?

*** А) Гіпотиреоз**

- В) Гіпертиреоз
- С) Цукровий діабет
- Д) Атеросклероз
- Е) Акромегалія

79. Пацієнтка скаржиться на загальну слабкість, запаморочення, відчуття повзання “мурашок”, затерплість нижніх кінцівок, періодично прострілюючий біль у кінцівках, а також на відчуття печії в кінчику язика. При обстеженні: шкіряні покрови бліді, субіктеричність склер, язик яскравочервоний, блискучий, гладенький. В аналізі крові: кольоровий показник - 1,4, макроцитоз еритроцитів, анізоцитоз, тільця Жолі, кільця Кебота. Для якого захворювання типові ці ознаки?

*** А) В12-фолієводефіцитна анемія**

- В) Залізодефіцитна анемія
- С) Хронічна постгеморагічна анемія
- Д) Гемолітична анемія
- Е) Тромбоцитопенія

80. У пацієнта на виразкову хворобу шлунка 30 хвилин тому з'явилися загальна слабкість, запаморочення, шум у вухах, “мерехтіння мушок” перед очима. Було блювання у вигляді “кавової гущі”. Яке ускладнення розвинулось у хворого?

*** А) Шлункова кровотеча**

- В) Перфорація
- С) Пенетрація
- Д) Малігнізація
- Е) Стеноз воротаря

81. Пацієнт пульмонологічного відділення при кашлі виділяє ржаве мокротиння. Для якого захворювання це характерно?

- * А) Дольова пневмонія**
- В) Гострий бронхіт
- С) Бронхіальна астма
- Д) Часточкова пневмонія
- Е) Бронхоектатична хвороба

82. В аналізі крові пацієнта А. виявлений С-реактивний протеїн. Для якого захворювання характерний цей показник?

- * А) Ревматична хвороба**
- В) Тиреотоксикоз
- С) Хронічна ниркова недостатність
- Д) Залізодефіцитна анемія
- Е) Ішемічна хвороба серця

83. Хворий знаходиться в терапевтичному відділенні з приводу виразкової хвороби 12-п кишки. Застосування яких ліків є найбільш ефективним для знищення хелікобактерної інфекції?

- * А) Омепразол, метранідазол**
- В) Метилурацил, но-шпа
- С) Альмагель, но-шпа
- Д) Церукал, вікалін
- Е) Вікалін, альмагель

84. Поєднання яких синдромів найбільш характерно для гострого гломерулонефриту:

*** А) набряковий, гіпертензивний, сечовий**

- В) Астеновегетативний, інтоксикаційний, сечовий
- С) Диспептичний, астеновегетативний, ішемічний
- Д) набряковий, ішемічний, сечовий
- Е) Гіпертензивний, суглобовий, сечовий

85. У хворого 18 років схильність до фурункульозу, спрага, поліурія, свербіж, сухість шкіри. Яке дослідження крові необхідно призначити для встановлення діагнозу?

*** А) Аналіз крові на глюкозу**

- В) Аналіз крові на С-реактивний протеїн
- С) Аналіз крові на білірубін
- Д) Аналіз крові на холестерин
- Е) Аналіз крові на креатинін

86. Хворому К. лікар призначив аналіз сечі за методом Нечипоренка. Медична сестра пояснює пацієнту, що сечу слід зібрати:

*** А) Середню порцію сечі**

- В) Кінцеву порцію сечі
- С) всю сечу
- Д) початкову порцію сечі
- Е) -

87. Хворий скаржиться на біль у кістках, підвищену кровоточивість, збільшення лімфовузлі. Для ураження якої системи характерний даний симптомокомплекс?

*** А) Кровотворної**

В) Ендокринної

С) Сечовидільної

Д) Серцево-судинної

Е) Травної

88. Під час нападу стенокардії хворий приймає нітрогліцерин під язик. Про які побічні дії препарату повинна попередити медсестра?

*** А) Головний біль, шум у голові, запаморочення**

В) Біль в епігастрії, нудота

С) Погіршення пам'яті, запаморочення

Д) Відчуття жару, почервоніння шкіри

Е) -

89. Старша медсестра зробила зауваження медсестрі маніпуляційного кабінету з приводу неправильного зберігання інсуліну. Запаси інсуліну слід зберігати:

*** А) В холодильнику при температурі від +2 до +8**

В) В холодильнику при температурі від +0 до +2

С) В холодильнику при температурі від -5 до -8

Д) В сейфі для зберігання медикаментів групи А

Е) В шафі для медикаментів на верхній полиці

90. Жінці 27 років поставлено діагноз “В12 дефіцитна анемія”. Які синдроми переважають у клініці цього захворювання?

*** А) Анемічний, ураження нервової системи, травного каналу**

- В) Анемічний, гіпертензивний, ураження нервової системи
- С) Анемічний, ураження травного каналу, сечовий
- Д) Анемічний, набряковий, обструктивний
- Е) Анемічний, ураження серцево-судинної системи, набряковий

91. У хворі 54 років з’явився головний біль, запаморочення, шум у вухах, миготіння темних “мушок” перед очима, біль у ділянці серця, нудота, серцебиття. Яке першочергове обстеження повинна зробити медсестра?

*** А) Виміряти артеріальний тиск**

- В) Зняти ЕКГ
- С) Визначити дефіцит пульсу
- Д) Визначити наповнення пульсу
- Е) Визначити напруження пульсу

92. У хворого 20 років після укусу бджоли розпочались наступні симптоми: охриплість голосу, “гавкаючий” кашель, утруднене дихання, набряк обличчя та шиї. Для якого захворювання характерні такі симптоми?

*** А) Набряк Квінке**

- В) Бронхіальна астма
- С) Гостра лівошлункова недостатність
- Д) Ларингоспазм
- Е) Гостра правошлункова недостатність

93. Хворій на токсичний дифузний зоб призначено консервативне лікування. Які препарати є обов'язковими для лікування даного захворювання?

*** А) Меркозаліл, метімазол**

- В) Тиреоїдин, тироксин
- С) Тиреокомб, тироксин
- Д) Метотрексат, метилурацил
- Е) Гідрокортизон, преднізолон

94. У хворої з бронхіальною астмою, раптом з'явилося: задуха з ускладненням видиху, чутні на відстані сухі свистячі, жжужачі шумні хрипи. Хвора у вимушеному положенні: сидючи з нахилом уперед, спершись руками на спинку крісла. Які ваші дії на долікарському етапі?

*** А) Допомогти скористуватись бронхолітичним аерозолем.**

- В) В/в введення еуфіліну;
- С) П/ш введення ефедрину;
- Д) Надати горизонтальне положення
- Е) Застосувати теплу грілку.

95. Хвора 40 р. скаржиться на головний біль, шум у вухах, серцебиття, біль у серці, загальну слабкість. Останній рік лікувалась у гінеколога з приводу надмірних, тривалих менструацій. Шкіра бліда, пульс - 98/хв., слабкий, аритмічний, АТ- 100/60 мм рт.ст. Аускультативно - систолічний шум на верхівці серця. Яке обов'язкове дослідження треба зробити?

*** А) Загально клінічний аналіз крові**

- В) Біохімічний аналіз крові
- С) Стернальну пункцію
- Д) ЕКГ
- Е) ЕхоКГ

96. Лікарем у пацієнта діагностовано залізодефіцитну анемію. Призначено аналіз калу на приховану кров. Про що повинна попередити медична сестра пацієнта в плані підготовки до цього дослідження?

*** А) Відміна продуктів, які містять залізо**

- В) Призначення продуктів, які містять залізо
- С) Призначення продуктів, які містять вуглеводи
- Д) Відміна жирної їжі
- Е) Призначення продуктів, які містять білок рослинного походження

97. Хворий 20 р госпіталізований у тяжкому стані, скаржиться на біль у груді, кровоточивість ясен, підвищення температури до 38°C, озноб, загальну слабкість. Шкіра бліда, шийні і пахвові лімфовузли збільшені, неболючі. Аналіз крові: гем.- 56 г/л, ер. - $2,2 \cdot 10^{12}/л$, кол. пок.- 0,8, ретикулоцити - 0,1%, лейкоц.- $80 \cdot 10^9/л$, бласти - 40, палочк.- 2, сегмент.- 28, лімф.- 10, моноцит.- 18, тромбоцит.- $76 \cdot 10^9/л$, ШОЕ- 38 мм/г. Що у хворого?

*** А) Гострий лейкоз**

- В) Хронічний лейкоз
- С) Апластичну анемію
- Д) Гіпсохромну анемію
- Е) Геморагічний діатез

98. Хвора 62 р скаржиться на питливість, серцебиття, тремор, почуття голоду. Хворіє цукровим діабетом 4 роки, приймає 20 од інсуліну. Яке додаткове обстеження треба провести першочергово?

*** А) Аналіз крові на глюкозу**

- В) Аналіз сечі на діастазу
- С) Загальний аналіз крові
- Д) Аналіз крові на амілазу
- Е) Аналіз крові на білірубін

99. У хворої після проведення проби на пеніцилін в медичному пункті, з'явилися гіпереміровані висипання, свербіж шкіри, головокружіння, задишка. Що треба зробити негайно за призначенням лікаря?

*** А) Ввести в/м дімедрол**

- В) Госпіталізувати хвору
- С) Прикласти грілку до кінцівок
- Д) Викликати швидку допомогу
- Е) Провести повторно пробу

100. При проведенні ЕКГ у хворого з аритмією, медсестрою були накладені основні електроди: права рука - жовтий, ліва рука - червоний, ліва нога - зелений, права нога - чорний. Які треба провести зміни при накладанні електродів?

*** А) Змінити електроди на руках**

- В) Змінити електроди на ногах
- С) Змінити електроди на правій руці і правій нозі
- Д) Змінити електроди на лівій руці і лівій нозі
- Е) Змінити електроди на правій руці і лівій нозі

101. Хворому на пієлонефрит лікар призначив аналіз сечі за Зимницьким. Вам необхідно пояснити, як правильно збирати сечу?

*** А) Кожну порцію через 3 години**

- В) Добову кількість сечі
- С) Ранішню порцію сечі
- Д) Середню порцію сечі
- Е) Вечірню та ранішню порції сечі

102. Хворий К., 45 р., лікується з приводу раку легенів. Під час кашлю у хворого почало виділятися пінисте яскраво-червоного кольору мокротиння, з'явилась загальна слабкість, головокружіння. Об'єктивно: шкірні покриви бліді, АТ- 110/60 мм рт.ст., пульс - 110/хв. Яке медсестринське втручання необхідно виконати при даному стані?

*** А) Надати положення Фаулера, холод на грудну клітку**

В) Заспокоїти, заборонити розмовляти

С) Надати горизонтальне положення

Д) Оксигенотерапія

Е) Надати зручне положення тіла

103. Яка дієта рекомендована хворим на туберкульоз органів дихання з бациловиділенням (МТ+)?

*** А) №11**

В) №7

С) №1

Д) №9

Е) №15

104. Яким чином проводиться специфічна профілактика туберкульозу?

*** А) Вакцинація БЦЖ, з обов'язковою ревакцинацією кожні 5-7 років до 30 років**

В) Проба Манту кожен рік

С) Дотримання санітарно-протиепідемічного режиму

Д) ЛФК та загартовування

Е) Вживання вітамінів та кальцію

105. Хворий Б., 33 р., знаходиться на лікуванні в гастроентерологічному відділенні з діагнозом: Хронічний гастрит типу А. Яке захворювання крові може розвинути у хворого?

*** А) В12 дефіцитна анемія**

- В) Постгеморагічна анемія
- С) Гіпопластична анемія
- Д) Гемолітична анемія
- Е) Апластична анемія

106. Хворий А. Знаходиться на лікуванні з приводу хронічного холециститу. Які жовчогінні препарати є справжніми холеретиками?

*** А) Алохол, холензим**

- В) Сорбіт, магнію сульфат
- С) Олія оливкова, обліпихова
- Д) Гепабене, карсіл
- Е) Одестон, дуспаталін

107. З метою оцінки ступеня порушення азотовидільної функції нирок у крові визначають:

*** А) Сечовину, креатинін**

- В) Прямий білірубін, загальний білірубін
- С) Тригліцериди, холестерин
- Д) Альбуміни, глобуліни
- Е) Глюкозу, холестерин

108. У пацієнта екзофтальм, рідке моргання повіками, слабкість конвергенції, посилений блиск очей, відставання верхньої повіки при русі очного яблука вниз. Для якого захворювання характерні ці симптоми?

*** А) Базедової хвороби**

- В) Гіпотиреозу
- С) Глаукоми
- Д) Ендемічного еутиреоїдного зобу
- Е) Катаракти кришталика

109. У хворого Л, 19 р., гемофілія А. Яке медикаментозне лікування призначається при даному захворюванні?

*** А) Уведення антигемофільної плазми, концентрату VIII чинника**

- В) Уведення плазми, концентрату IX чинника
- С) Уведення свіжозамороженої плазми, концентрованого чинника XI
- Д) Уведення свіжезамороженої або сухої плазми, концентрованого XII чинника
- Е) Епсилон-амінокапронової кислоти

110. Яка бактеріальна інфекція зумовлює розвиток ревматичної хвороби?

*** А) β -гемолітичний стрептокок групи А**

- В) Стафілокок
- С) Паличка Коха
- Д) Пірохета
- Е) Кишкова паличка

111. Пацієнтка 35 р. скаржиться на спрагу, поліурію, свербіж шкіри, загальне нездужання, надмірний апетит. Для якого захворювання характерні ці симптоми?

*** А) Цукрового діабету**

- В) Ожиріння
- С) Гострого гастриту
- Д) Дифузного токсичного зобу
- Е) Гіпотиреозу

112. У хворі 27 р. кропив'янка. Які препарати рекомендовані при даній патології?

*** А) Діазолін**

- В) Дібазол
- С) Дігосин
- Д) Діклофенак натрію
- Е) Діакарб

113. Для ліквідації болювого синдрому при інфаркті міокарда використовують метод нейролептанальгезії. Які препарати використовуються в даному випадку?

*** А) Фентаніл + дроперидол**

- В) Промедол+морфін
- С) Морфін+ седуксен
- Д) Закис азоту+ кисень
- Е) Морфін + сибазон

114. Яке ускладнення виникає при тривалому вживанні нестероїдних протизапальних засобів?

*** А) Гастрит**

- В) Панкреатит
- С) Коліт
- Д) Стоматит
- Е) Холецистит

115. У пацієнтки з виразковою хворобою шлунка виникло блювання “кавовою гущею”. Яку невідкладну допомогу слід надати пацієнтці?

*** А) Міхур з льодом на живіт**

- В) Промити шлунок
- С) Ввести анальгін
- Д) Прикласти грілку до живота
- Е) Дати тепле пиття

116. Хвора 26 років занедужала через 2 години після вживання кремового тарту, коли виникли загальна слабкість, нудота, багаторазова блювота. Які заходи за призначенням лікаря треба провести щодо хворої в першу чергу?

*** А) Промивання шлунку**

- В) Введення антибіотиків
- С) Введення платифіліну
- Д) Введення реополіглюкіну
- Е) Введення преднізолону

117. У хворого Л., 52 років запідозрено дифтерію ротоглотки. Які характерні ознаки типового перебігу цього захворювання?

*** А) Помірні болі у горлі, щільні нальоти, що не знімаються**

В) Нормальна температура, відсутність інтоксикації

С) Сильні болі у горлі, температура - 40°C

Д) Пухкі нальоти, що легко знімаються

Е) Закладеність носа

118. Хвора Р., 45 років, яка хворіє на виразкову хворобу шлунку, після нервового напруження та фізичного навантаження скаржиться на гострий біль у епігастрії, нудоту, блювоту, сухість у роті. Об'єктивно: блідість шкіри, сухість язика, пульс - 90/хв., АТ- 90/65 мм рт.ст., живіт дошкоподібний, не приймає участі в акті дихання. Який стан розвився у хворої?

*** А) Перфоративна виразка**

В) Ниркова колька

С) Напад жовчної кольки

Д) Шлункова кровотеча

Е) Дискінезія жовчного міхура

119. Хвора Т., 44 років, скаржиться на серцебиття, задишку, пітливість, пронос, почуття страху. В анамнезі: дифузний токсичний зоб на протязі двох років. При огляді: хвора збуджена, шкіра волога, гаряча на дотик. Тони серця приглушені, тахікардія. Живіт м'який, безболісний. Яке лабораторне дослідження підтверджує діагноз?

*** А) Вміст тиреоїдних гормонів**

В) Вміст цукру крові

С) Вміст у крові загального білка

Д) Вміст адреналіну та норадреналіну крові

Е) Вміст трансаміназ сироватки крові

120. У хворого 6 годин тому з'явився інтенсивний пекучий біль за грудиною. При огляді температура тіла - 37,2°C. Діяльність серця ритмічна. ЧСС- 68/хв. АТ- 110/75 мм рт.ст. Живіт м'який, безболісний при пальпації. До якого інструментального дослідження необхідно підготувати медичній сестрі пацієнта першочергово?

*** А) Електрокардіографії**

- В) Ехокардіоскопії
- С) Коронарографії
- Д) Велоергометрії
- Е) Добового моніторування

121. У хворого Н., 37 років, о 10 годині ранку з'явилося відчуття голоду, збудження, головний біль, виражена пітливість. Страждає на цукровий діабет 1 типу, остання ін'єкція інсуліну о 8 годині. При огляді: хворий збуджений, дезорієнтований, шкіряні покрови бліді, вологі, зіниці розширені, пульс та артеріальний тиск нормальні. Які долікарняні заходи може вжити медична сестра при цьому стані?

*** А) Дати хворому з'їсти чи випити щось солодке**

- В) Застосувати фізичне навантаження
- С) Рекомендувати обмеження їжі
- Д) Застосувати теплі та холодні обтирання
- Е) Застосувати клізму

122. Хворий 58 років, відмічає збільшення шийних та пахвових лімфовузлів, загальну слабкість, болі в кістках, свербіж шкіри. Вважає себе хворим близько року. При обстеженні: лімфовузли шийні, потиличні, пахвові розміром - 3х4 см, безболісні, м'які, не зв'язані з оточуючими тканинами. Шкіра над ними без змін. З боку внутрішніх органів патології не виявлено. Врач діагностував хронічний лімфолейкоз. Який ведучий клінічний синдром може виділити медична сестра при обстеженні?

*** А) Лімфаденопатія**

- В) Спленомегалія
- С) Гепатомегалія
- Д) Геморагічний
- Е) Артралгія

123. Ви медична сестра ендокринологічного кабінету, проводите обстеження хворого на гіпотиреоз. Де найбільше локалізується гіпотиреозний набряк?

*** А) На обличчі**

- В) На верхніх кінцівках
- С) На тулубі
- Д) На нижніх кінцівках
- Е) -

124. Під час патронажу Ви зіткнулися з хворим, у якого виник приступ стенокардії. Яку невідкладну допомогу Ви надасте ?

*** А) Заспокоїти хворого, дати 1 таблетку нітрогліцерину під язик**

- В) Прикласти грілку до ніг
- С) Викликати швидку допомогу
- Д) Скерувати хворого на консультацію до кардіолога
- Е) Терміново госпіталізувати хворого підручними транспортними засобами

125. Ви медична сестра кардіологічного відділення. Під час чергування у хворого виникла зупинка дихання і відсутність пульсації на сонній артерії. Який стан у хворого?

*** А) Клінічна смерть**

В) Біологічна смерть

С) Агонія

Д) Передагонія

Е) Соціальна смерть

126. Ви берете участь у обстеженні хворого з підозрою на сухий плеврит. Яке положення буде займати хворий при цій патології?

*** А) Лежати на хворому боці**

В) Вільно сидіти

С) Лежати на здоровому боці

Д) Лежати у положенні ембріона

Е) Вимушене положення не займає

127. Ви медсестра сімейного лікаря - контролюєте лікування хворого на бронхіальну астму. Які лікарські засоби він повинен вживати ?

*** А) Сальбутамол, беротек**

В) Кетотифен, лазолван

С) Строфантин, мукалтин

Д) Корглікон

Е) Атропін

128. Ви медсестра терапевтичного відділення берете участь у лікуванні хворого на гострий гломерулонефрит. Дайте поради щодо дієтичного режиму:

*** А) Обмежити вживання рідини, солі, білків тваринного походження**

- В) Обмежити вживання жирів
- С) Обмежити вживання рідини та вуглеводів
- Д) Посилене вживання рідини з обмеженням вживання солі
- Е) Виключення смажених, жирних страв

129. При обстеженні хворого Ви отримали результати лабораторних аналізів, і, зокрема, наявність LE - клітин. Яку патологію у хворого Ви запідозрите?

*** А) Системний червоний вовчак**

- В) Ревматичну хворобу
- С) Первинно-деформуючий остеоартроз
- Д) Кістковий туберкульоз
- Е) Ревматоїдний артрит

130. При огляді хворого у офтальмологічному кабінеті Ви виявили позитивні симптоми Штельвага, Грефе, Елінека, Дельрімпля. Яке захворювання Ви запідозрите?

*** А) Тіреотоксикоз**

- В) Гіпотиреоз
- С) Глаукому
- Д) Ревматичну хворобу
- Е) Кон'юнктивіт

131. Ви медсестра ендокринологічного відділення. Який дієтичний стіл Ви запропонуєте хворому на ожиріння?

*** А) Стіл №8**

В) Стіл №5

С) Стіл №11

Д) Стіл №10

Е) Стіл №15

132. У пацієнта Ви визначили позитивні симптоми Ортнера, Кера, Мерфі, Френікус - симптом. Для якого захворювання вони характерні?

*** А) Жовчно-кам'яна хвороба**

В) Виразкова хвороба шлунку

С) Гострий панкреатит

Д) Сечокам'яна хвороба

Е) Гострий апендицит

133. При проведенні медичного огляду Ви виявили хворого з болями у верхніх відділах живота через 1,5-3 години після їди “пізні”, “голодні” або “нічні” болі. Для якого захворювання характерні ці симптоми?

*** А) Виразкова хвороба 12-ти палої кишки**

В) Хронічний гепатит

С) Виразкова хвороба шлунку

Д) Гострий гастрит

Е) Хронічний гастрит

134. Ви медична сестра терапевтичного відділення, берете участь у лікуванні хворого на хронічний ентероколіт. Який дієтичний стіл Ви будете рекомендувати хворому із кишковими розладами?

*** А) Стіл №4**

В) Стіл №1

С) Стіл №5

Д) Стіл №7

Е) Стіл №11

135. У хворого К. 48 років, після швидкої ходи, піднімання по сходах виник біль за грудиною тиснучого характеру тривалістю 5 хв, який віддає у ліве плече, ліву руку. Біль минає у спокої. Який найбільш вірогідний діагноз?

*** А) Стенокардія напруження**

В) Перикардит

С) Ревмокардит

Д) Інфаркт міокарду

Е) Міокардит

136. Пацієнт 38 років, звернувся зі скаргами на головний біль в потилиці, мерехтіння мушок перед очима, серцебиття. АТ- 160/100 мм рт.ст. Для якого синдрому характерні такі ознаки?

*** А) Гіпертензивного синдрому**

В) Гіпотензивного синдрому

С) Обструктивного синдрому

Д) Анемічного синдрому

Е) Астено-вегетативного синдрому

137. До дільничного лікаря на прийом з'явилась жінка із скаргами на різку слабкість, утруднений видих та напад ядухи, який закінчується виділенням невеликої кількості густого, в'язкого харкотиння. Вкажіть найбільш ймовірний попередній діагноз?

- * А) Бронхіальна астма**
- В) Хронічний бронхіт
- С) Трахеїт
- Д) Грипозна пневмонія
- Е) Бронхоектатична хвороба

138. У пацієнта сухий плеврит. Під час оцінки загального стану пацієнта аускультативно визначається:

- * А) Шум тертя плеври**
- В) Крепітація
- С) Сухі свистячі хрипи
- Д) Вологі хрипи
- Е) Посилене везикулярне дихання

139. Пацієнт 38 років протягом 8 років хворіє обструктивним бронхітом. Турбує задишка, котра посилюється навіть при незначному навантаженні, малопродуктивний кашель. Найбільш інформативним методом для визначення дихальної недостатності є:

- * А) Спірографія**
- В) Бронхографія
- С) Бронхоскопія
- Д) Рентгенографія органів грудної клітки
- Е) Комп'ютерна томографія легень

140. Пацієнт 42 роки поступив в стаціонар в тяжкому стані, температура 39,8°C. Скарги на біль в грудній клітці справа, посилюється під час кашлю, головний біль, кашель з виділенням "ржавого" харкотиння. Скарги найбільш характерні для:

*** А) Пневмонії**

- В) Бронхіту
- С) Бронхіальної астми
- Д) Емфіземи легень
- Е) Бронхоектатичної хвороби

141. Хворий з'явився на прийом до лікаря зі скаргами на t° тіла 38°C, пітливість уночі, сухий кашель, біль у грудній клітці, кровохаркання. Ваш попередній діагноз:

*** А) Туберкульоз легень**

- В) Бронхіт
- С) Плеврит
- Д) Гангрена легень
- Е) Пневмонія

142. У чоловіка 62 років після психологічного перенапруження, годину тому виник приступ пекучого за грудинного болю, який ірадіює в ліву руку. Нітрогліцерин біль не знімає. Ваш попередній діагноз?

*** А) Інфаркт міокарду**

- В) Стенокардія спокою
- С) набряк легень
- Д) Кардіогенний шок
- Е) Гіпертонічна криза

143. У хворої 68 років - інфаркт міокарду. Який з названих лікарських засобів застосовується для зняття больового синдрому?

*** А) Промедол**

- В) Анаприлін
- С) Клофелін
- Д) Еуфілін
- Е) Строфантин

144. Що вислуховується при аускультатії легень під час нападу бронхіальної астми?

*** А) Сухі свистячі хрипи**

- В) Амфоричне дихання
- С) Крепітація
- Д) Жорстке дихання
- Е) Шум тертя плеври

145. Пацієнтка 15 років місяць тому перенесла ангіну. Скаржиться на плаксивість, дратівливість, гримаси, порушення почерку, дизартрію, некоординовані рухи голови, кінцівок. Лабораторно: позитивні ревмопроби. Вкажіть, яка з клінічних форм ревматичної хвороби розвинулась у пацієнтки?

*** А) Мала хорея**

- В) Ревмокардит
- С) Поліартрит
- Д) Кільцева еритема
- Е) -

146. Клінічні ознаки: кардит, артрит, кільцева еритема, вузлики, мала хорея характерні для:

*** А) Ревматичної хвороби**

- В) Ревматоїдного артрити
- С) Системного червоного вовчака
- Д) Деформуючого остеоартрозу
- Е) Склеродермії

147. Пацієнтка 35 років звернулась із скаргами на ранкову скутість, біль і деформацію дрібних суглобів кистей рук і стоп. При огляді-кисті рук у вигляді “ластів моржа”. Для якого захворювання характерні дані клінічні ознаки?

*** А) Ревматоїдного артрити**

- В) Деформуючого остеоартрозу
- С) Остеохондрозу
- Д) Ревматичного поліартрити
- Е) Системного червоного вовчака

148. Хворий Б.30 років скаржиться на висипання на обличчі. Об'єктивно: еритематозний висип на спинці носа і вилицях у вигляді метелика, температура 38°C. В аналізі крові: LE- клітини. Для якого захворювання характерна дана клінічна картина?

*** А) Системного червоного вовчака**

- В) Склеродермії
- С) Ревматоїдного артрити
- Д) Кропив'янки
- Е) Ревматичної хвороби

149. У пацієнтки К. 27 років після вживання їжі в їдальні через 3 години виникла слабкість, нудота, часте блювання, біль в животі. Об'єктивно: язик обкладено білим нальотом, температура - 38°C. з рота неприємний запах, живіт м'який болючий в епігастрії. Яке незалежне втручання повинна виконати медична сестра?

*** А) Промити шлунок**

- В) Дати знеболюючі засоби
- С) Направити на Ro дослідження шлунку
- Д) Покласти грілку
- Е) Покласти міхур з льодом

150. Хворий К знаходиться на обліку з приводу виразкової хвороби шлунка. Раптово з'явилась слабкість, головокружіння, нудота і блювання. Блювотні маси кольору "кавової гущі". Про яке ускладнення можна думати?

*** А) Шлункову кровотечу**

- В) Стеноз ворота
- С) Перфорацію виразки
- Д) Пенетрацію виразки
- Е) Малігнізацію виразки

151. При якому захворюванні спостерігаються: "судинні зірочки", "голова медузи", гіперемія долоней, асцит?

*** А) Цирозі печінки**

- В) Холециститі
- С) Панкреатиті
- Д) Раку шлунку
- Е) Гастриті

152. Пацієнтці, яка лікувалась з приводу хронічного холециститу, лікар призначив дуоденальне зондування. В якій порції будуть зміни жовчі, характерні для даного захворювання?

*** А) Лейкоцити в порції В**

- В) Лейкоцити в порції А
- С) Лейкоцити в порції С
- Д) Еритроцити в порції А
- Е) Еритроцити в порції В

153. Пацієнту, що поступив в приймальне відділення з підозрою на ниркову кольку, проведено загальний аналіз сечі. Які зміни в аналізі сечі найбільш типові для сечокам'яної хвороби?

*** А) Наявність в сечі свіжих еритроцитів**

- В) Лейкоцитурія
- С) Протеїнурія
- Д) Бактеріюрія
- Е) Циліндрурія

154. Хворому на залізодефіцитну анемію призначили препарат заліза. Який препарат прискорює всмоктування заліза в організмі?

*** А) Аскорбінова кислота**

- В) Атропін
- С) Ранітідін
- Д) Ціанокобаламін
- Е) Альмагель

155. Вкажіть гематологічний показник гострого лейкозу?

*** А) Бластні клітини**

- В) Прискорена ШОЕ
- С) Тромбоцитоз
- Д) Збільшення кількості еритроцитів
- Е) Кольоровий показник - 0,85

156. Хворий на цукровий діабет ввів інсулін та забув прийняти їжу. Виникло запаморочення, потім втрата свідомості та судоми. Який медикаментозний засіб потрібно ввести хворому?

*** А) Розчин глюкози 40%**

- В) Манініл
- С) Бутамід
- Д) Глібенкламід
- Е) Метформін

157. Хворому на ревматичну хворобу. Лікар призначив диклофенак натрію. Через загострення супутнього захворювання препарат відмінили. Яке захворювання є протипоказанням для призначення диклофенаку натрію?

*** А) Виразкова хвороба шлунку**

- В) Стенокардія
- С) Цукровий діабет
- Д) Артрит
- Е) Бронхіт

158. Хворому було призначено доксицикліну гідрохлорид. Поясніть правила прийому:

*** А) Приймати після їди**

- В) Приймати разом з антацидом
- С) Розжовувати таблетку
- Д) Вживати до їди, запиваючи молоком
- Е) Тримати в ротовій порожнині до розсмоктування

159. Хворий переніс інсульт. Який з перерахованих засобів необхідно включити в комплексну терапію для нормалізації нейрометаболічних процесів у головному мозку?

*** А) Пірацетам**

- В) Но-шпу
- С) Седуксен
- Д) Кофеїн
- Е) Дроперидол

160. В пульмонологічному відділенні знаходиться пацієнт з діагнозом сухий плеврит. Який суб'єктивний симптом є найхарактернішим для даного захворювання?

*** А) Біль в грудній клітці при диханні**

- В) Кашель
- С) Гарячка
- Д) Нездужання
- Е) Наростаюча задишка

161. Пацієнт 40 років знаходиться в стаціонарі з приводу позалікарняної пневмонії з яскраво вираженою клінічною симптоматикою. Що може виникнути у нього в період різкого зниження температури тіла?

*** А) Колапс**

- В) Інсульт
- С) Інфаркт
- Д) Кома
- Е) Жовчна колька

162. Під час проведення об'єктивного обстеження пацієнта з діагнозом: гострий пієлонефрит спостерігається біль в поперековій ділянці при постукуванні. Як називається такий симптом?

*** А) Пастернацького**

- В) Ортнера
- С) Мерфі
- Д) Френікус - симптом
- Е) Керте

163. Пацієнт скаржиться на постійні болі в епігастрії, загальну слабкість, відсутність апетиту, відразу до м'ясної їжі. В анамнезі виразкова хвороба шлунку. Який метод обстеження є найінформативнішим у диференціальній діагностиці виразкової хвороби та раку шлунка?

*** А) Гастродуоденоскопія з біопсією**

- В) Дослідження шлункової секреції з гістаміном
- С) Рентгенологічне обстеження
- Д) Цитологічне дослідження промивних вод шлунка
- Е) Дослідження калу на приховану кров

164. У нефрологічному відділенні пацієнтка з хронічним захворюванням нирок скаржиться на нудоту, відразу до їжі, головні болі, свербіж шкіри. Яке обстеження треба провести пацієнтці для підтвердження недостатності функції нирок?

*** А) Визначити рівень сечовини та креатиніну в крові**

- В) Загальний аналіз сечі
- С) Дослідження за Нечипоренком
- Д) Бактеріологічне дослідження сечі
- Е) Загальний аналіз крові

165. Пацієнтові 32 роки, що лікується в гематологічному відділенні з діагнозом тромбоцитопенічна пурпура, проведено взяття крові для загального аналізу. Які зміни в крові будуть найбільш характерні?

*** А) Тромбоцитопенія**

- В) Лейкопенія
- С) Лейкоцитоз
- Д) Тромбоцитоз
- Е) Еритроцитоз

166. При обстеженні пацієнта з ревматоїдним артритом виявлено проблему: біль у суглобах. З яких суглобів починається дане захворювання?

*** А) Дрібних суглобів кистей рук і стоп**

- В) Великих суглобів верхніх кінцівок
- С) Кульшових суглобів
- Д) Плечових суглобів
- Е) Великих суглобів нижніх кінцівок

167. У пацієнта 36 р., що лікується в пульмонологічному відділенні з приводу бронхіальної астми, взяли харкотиння на дослідження. Які зміни є характерними?

*** А) Склоподібне, еозинофіли, спіралі Куршмана кристали Шарко-Лейдена**

- В) "Ржаве", еритроцити, лейкоцити
- С) Гнійне, лейкоцити, злущений епітелій
- Д) Слизисте, поодинокі лейкоцити
- Е) Геморагічне, атипові клітини

168. Пацієнта турбує кашель зранку з виділенням харкотиння "повним ротом". При огляді: пальці у вигляді "барабанних паличок", нігті мають форму "годинникових скелець". Для якого захворювання це характерне?

*** А) Бронхоектатична хвороба**

- В) Емфізема легень
- С) Туберкульоз легень
- Д) Плеврит
- Е) Пневмонія

169. У пульмонологічне відділення поступив пацієнт, якому виставили попередній діагноз бронхіальна астма. Яка тріада клінічних ознак може характеризувати дане захворювання?

*** А) Експіраторна задишка, сухі хрипи, скловидне харкотиння**

- В) Змішана задишка, кашель, крепітація
- С) Інспіраторна задишка, клекочуче дихання, вологі хрипи
- Д) Задишка, вологі хрипи, крепітація
- Е) Задишка, сухий кашель, кровохаркання

170. У пацієнта з виразковою хворобою шлунка з'явилися скарги на загальну слабкість, швидку втому, похудання, відразу до м'ясної їжі, постійні болі в епігастрії. Про яке ускладнення можна думати?

*** А) Малігнізація**

- В) Перфорація
- С) Кровотеча
- Д) Пілоростеноз
- Е) Пенетрація

171. При проведенні дуоденального зондування в порції "В" виявлено велику кількість лейкоцитів, злуценого епітелію. Для якого захворювання це характерне?

*** А) Холецистит**

- В) Гепатиту
- С) Холелітіазу
- Д) Дискінезії жовчевих шляхів
- Е) Холангіту

172. Пацієнтові встановлено діагноз гострий пієлонефрит. Яка тріада симптомів буде найбільш характерною?

*** А) Остуда, біль у попереку, дизурія**

- В) Нудота, пронос, біль у животі
- С) Дизурія, поллакіурія, ніктурія
- Д) Спрага, анорексія, нудота
- Е) Біль у животі, поллакіурія, остуда

173. Пацієнта 36 р., що страждає цукровим діабетом та отримує інсулін, доставлено у відділення в тяжкому стані непритомним. Об'єктивно: відмічаються судомні посмикування м'язів, блідість та вологість шкіри, запах ацетону відсутній. Який із препаратів потрібно приготувати в першу чергу?

*** А) 40% р-н глюкози**

В) 5% р-н глюкози

С) Глюкагон

Д) Інсулін

Е) Норадреналін

174. У пацієнта із захворюванням нирок необхідно провести диференціальну діагностику гострого гломерулонефриту та гострого пієлонефриту. Які зміни в сечі характеризують гострий гломерулонефрит?

*** А) Макрогематурія, протеїнурія**

В) Виражена протеїнурія, піурія

С) Піурія, циліндрурія

Д) Піурія, макрогематурія

Е) Бактеріурія, піурія

175. Один з побічних дихальних шумів виникає в альвеолах внаслідок наявності в їх просвіті невеликої кількості рідкого секрету. При цьому у фазі вдиху альвеолярні стінки злипаються, а у фазі видиху - розлипаються. Який шум вислуховується в даному випадку?

*** А) Крепітація**

В) Дрібноміхурцеві хрипи

С) Шум тертя плеври

Д) Шум тертя перикарду

Е) Плевроперикардіальний шум

176. В ендокринологічне відділення поступила пацієнтка із скаргами на серцебиття, тремор кінцівок, плаксивість, похудання, порушення сну. Об'єктивно: пульс - 120/хв., тони серця ритмічні, АТ- 150/90 мм рт.ст. При пальпації щитоподібної залози відмічається збільшення перешийка. Який препарат необхідно застосувати при лікуванні даної пацієнтки?

*** А) Мерказоліл**

В) Тиреоїдин

С) Тиреокомб

Д) Гіпотіазид

Е) Фуросемід

177. В гематологічне відділення поступила жінка із скаргами на загальну слабкість, головокружіння, серцебиття, бажання їсти крейду. Об'єктивно: хвора бліда, шкіра суха, в куточках рота заїди. Для якої анемії характерне перераховане вище?

*** А) Залізодефіцитної анемії**

В) Гемолітичної анемії

С) В12-дефіцитної анемії

Д) Гострої постгеморагічної анемії

Е) Апластичної анемії

178. В ендокринологічному відділенні лікується пацієнт із захворюванням щитоподібної залози. Які з перерахованих нижче ознак можуть характеризувати мікседему?

*** А) Загальмованість, мерзлякуватість**

В) Дратівливість, відчуття жару, схуднення

С) Тремор кінцівок, екзофтальм

Д) Збільшення щитоподібної залози, охриплість голосу

Е) Тахікардія, болючість при пальпації щитоподібної залози

179. У гематологічному відділенні лікується пацієнт з анемією. Які скарги будуть свідчити про залізодефіцитну анемію?

*** А) Спотворення смаку, поява тріщин у куточках рота, ламкість нігтів**

- В) Зміна ходи, жовтяниця, головні болі
- С) Баштоподібний череп, жовтяниця
- Д) Глосит, зміна ходи, жовтушність склер
- Е) Кровоточивість ясен, лихоманка

180. У гастроентерологічному відділенні у пацієнта з портальним цирозом печінки в стадії декомпенсації після прийому їжі виникло блювання з виділенням великих згустків крові, різка слабкість, серцебиття. Що необхідно зробити в першу чергу?

*** А) Міхур з льодом, епсилонамінокапронова кислота**

- В) Міхур з льодом, платифілін, димедрол
- С) Грілка, но-шпа, платифілін
- Д) Грілка, анальгін, димедрол
- Е) Гепарин, анальгін, дімедрол

181. У відділення поступив пацієнт із скаргами на нападоподібні інтенсивні болі у правому підребер'ї з іррадіацією в праве плече, руку, нудоту, блювання. Напад пов'язує із вживанням жирної їжі. При огляді іктеричність склер. Яке обстеження необхідно провести в першу чергу?

*** А) УЗД органів черевної порожнини**

- В) Загальний аналіз крові
- С) Загальний аналіз сечі
- Д) Кров на діастазу
- Е) Кров на визначення рівня холестерину

182. Медична сестра нефрологічного відділення на поставлене хворим запитання відповідає, що ніктурія це:

*** А) Виділення більшої кількості сечі вночі**

- В) Нічне нетримання сечі
- С) Болюче сечовиділення краплями
- Д) Часте сечовипускання
- Е) Утруднене сечовипускання

183. Медична сестра кардіологічного відділення викликана в палату о 3 годині ночі до пацієнта, який скаржиться на сильну ядуху, біль за грудиною, серцебиття. Об'єктивно: обличчя ціанотичне, частота дихання - 30/хв., пульс - 130/хв., АТ- 110/60 мм рт.ст.; на відстані чути клекочучі вологі хрипи. Яке втручання необхідно виконати в першу чергу?

*** А) Надати напівсидяче положення**

- В) Провести інгаляцію бронхолітика
- С) Покласти горизонтально
- Д) Дати відхаркуючі засоби
- Е) Дати заспокійливі засоби

184. У пацієнта, що хворіє бронхіальною астмою, напад ядухи триває 2 години. Інгаляції сальбутамолу неефективні. Об'єктивно: вимушене положення тіла, кашель з виділенням незначної кількості харкотиння, дистанційні сухі хрипи. Який медикамент необхідно приготувати?

*** А) Преднізолон**

- В) Ефедрин
- С) Астмопент
- Д) Морфін
- Е) Анальгін

185. У пацієнта, який лікується з приводу гострого інфаркту міокарда, раптово виникла задишка, дихання стало клекочучим, з рота та носа виділяється пінисте рожеве харкотиння. Яке ускладнення виникло?

*** А) Набряк легень**

- В) Носова кровотеча
- С) Астматичний статус
- Д) Серцева астма
- Е) Легенева кровотеча

186. У приймальне відділення звернувся пацієнт зі скаргами на запаморочення, нудоту, сильний біль в потилиці, “мигтіння” мушок перед очима. Об’єктивно: обличчя гіперемоване, пульс - 92/хв., АТ- 180/120 мм рт.ст. Що необхідно приготувати для надання невідкладної допомоги?

*** А) Фуросемід**

- В) Анальгін
- С) Церукал
- Д) Трентал
- Е) Промедол

187. Чоловік, 36 років, тривалий час зловживає спиртними напоями. Після 5-денного запою став збудженим, агресивним, увечері з’явилися галюцинації загрозливого характеру. Куди треба направити хворого для профілактики суспільно - небезпечних дій?

*** А) Психіатрична лікарня**

- В) Денний стаціонар
- С) Соматична поліклініка
- Д) Неврологічне відділення
- Е) Залишити вдома

188. Медична сестра за призначенням лікаря повинна зробити пацієнту пробу Манту. Яку кількість туберкуліну слід ввести?

*** А) 0,1 мл**

В) 0,2 мл

С) 0,3 мл

Д) 0,4 мл

Е) 0,5 мл

189. Особам, які спілкувалися з хворим на холеру, призначено термінову профілактику. Який препарат слід застосувати?

*** А) Антибіотик**

В) Бактеріофаг

С) Анатоксин

Д) Імуноглобулін

Е) Сироватку

190. Медична сестра-бакалавр приймального відділення провела клінічне обстеження пацієнта. Який з перерахованих методів відноситься до суб'єктивних?

*** А) Опитування**

В) Огляд

С) Пальпація

Д) Перкусія

Е) Аускультация

191. У районну поліклініку звернувся пацієнт 29 р. Після проведеного клінічного обстеження (опитування, огляд, пальпація, перкусія, аускультация), встановлено діагноз. Для встановлення якого діагнозу достатньо даних методів обстеження?

*** А) Попереднього**

- В) Клінічного
- С) Заключного
- Д) Патологоанатомічного
- Е) Остаточного

192. Медсестрою-бакалавром приймального покою проведено опитування пацієнта 72 р. Після цього вона поговорила з родичами пацієнта, які супроводжували його і дізналась, що пацієнт перебільшує симптомами свого захворювання. Як називається така поведінка пацієнта?

*** А) Агривація**

- В) Симуляція
- С) Дисимуляція
- Д) Апеляція
- Е) Атаксія

193. У пацієнта діагностовано гіпоацидний гастрит. На фоні такого стану найчастіше розвивається рак шлунку. Який клінічний метод обстеження допоможе встановити діагноз?

*** А) Фіброгастроуденоскопія з прицільною біопсією**

- В) Фракційне дослідження шлункового вмісту
- С) Цитологічне дослідження промивних вод шлунка
- Д) УЗД
- Е) Рентгенологічне дослідження шлунка

194. Під час обстеження пацієнта медсестра-бакалавр провела топографічну перкусію. Що визначають за допомогою даного обстеження?

*** А) Межі органів**

- В) Функціональні шуми
- С) Звуки в симетричних ділянках
- Д) Флюктуацію
- Е) Патологічні рефлекси

195. У клініку звернувся пацієнт 29 р. зі скаргами на біль в животі, який виникає через 15-20 хв. після прийому їжі, відрижку кислим. Як характеризується цей біль?

*** А) Ранній**

- В) Пізній
- С) Голодний
- Д) Оперізуючий
- Е) Періодичний

196. При огляді в пацієнта форма грудної клітки нагадує гіперстенічну, але відрізняється бочкоподібним виглядом. Міжреберні проміжки збільшені, надключичні та підключичні ямки вибухають, збільшені розміри грудної клітки в задньо-бокових відділах. Яка форма грудної клітки у пацієнта?

*** А) Емфізематозна**

- В) Човноподібна
- С) Рахітична
- Д) Паралітична
- Е) Астенічна

197. Під час мікроскопічного дослідження в харкотинні виявлено еозинофільні лейкоцити, кристали Шарко - Лейдена і спіралі Куршмана. Про який діагноз можна думати?

*** А) Бронхіальна астма**

- В) Туберкульоз
- С) Ексудативний плеврит
- Д) Алергічний риніт
- Е) Бронхоектатична хвороба

198. Під час проведення профілактичного огляду пацієнту 42 р. поставлено діагноз: туберкульоз легень. Який метод обстеження найінформативніший для підтвердження даного діагнозу?

*** А) Рентгенологічна діагностика**

- В) Опитування пацієнта
- С) Дослідження функціонального стану легень
- Д) Об'єктивне обстеження
- Е) Загальний аналіз крові

199. У клініку звернувся пацієнт 51 р., зі скаргами на різкий біль в ділянці серця з іррадіацією в ліве плече та лопатку, які тривають вже 40 хв. і не знімаються прийомом нітрогліцерину. Який метод обстеження необхідно провести в першу чергу?

*** А) Електрокардіографію**

- В) Ехокардіографію
- С) УЗД
- Д) Радіоізотопне сканування
- Е) Вимірювання АТ

200. Машиною швидкої допомоги в клініку доставлено пацієнта з попереднім діагнозом: Виразкова хвороба шлунку. Перфорація виразки. Який характер болю у пацієнта при цій патології?

*** А) “Кинжальний”**

- В) Тиснучий
- С) Пекучий
- Д) Колька
- Е) Оперізуючий

201. У пацієнта відмічаються болі в епігастральній ділянці, періодичні, сезонні, тісно пов'язані з прийомом їжі (через 15-45 хв. після їжі), зменшуються після блювання та застосовування тепла. Для якого захворювання характерна дана картина?

*** А) Виразкової хвороби шлунку**

- В) Жовчнокам'яної хвороби
- С) Гастрит
- Д) Езофагіту
- Е) Дискінезії жовчновивідних шляхів

202. Після проведення додаткових методів обстеження у шлунку виявили *Helicobacter pylori*. Яке захворювання викликає даний збудник?

*** А) Гастрит типу “В”**

- В) Гастрит типу “А”
- С) Гострий холецистит
- Д) Хронічний панкреатит
- Е) Цироз печінки

203. На яке захворювання вказують ознаки, які виникають внаслідок інтоксикації організму азотистими шлаками: різка слабкість, аміачний запах з ротової порожнини, відсутність апетиту, нудота, блювота, проноси, біль у грудній клітці, біль у ділянці серця, зниження зору, блідість і свербіж шкіри, різка втрата маси тіла?

*** А) Хронічна ниркова хвороба**

- В) Отруєння газами
- С) Харчове отруєння
- Д) Алергічна реакція
- Е) Хронічна серцева недостатність

204. У пацієнта виявлено сечовий синдром: сеча мутна з неприємним запахом, протеїнурія (0,99 г/л), піурія, циліндрурія, бактеріурія. Яке захворювання можна запідозрити?

*** А) Пієлонефрит**

- В) Хронічну ниркову хворобу
- С) Гломерулонефрит
- Д) Цистит
- Е) Нефротичний синдром

205. Після проведеного обстеження у пацієнтки 39 р. виявлено скарги на різкий біль в поперековій ділянці, незначне підвищення температури. Встановлено попередній діагноз: сечокам'яна хвороба. Яке із досліджень має найбільше значення для діагностики даного захворювання?

*** А) Загальний аналіз сечі**

- В) Проба за Зимницьким
- С) Дослідження сечі за методом Нечипоренка
- Д) Визначення креатиніну
- Е) Визначення протеїнурії

206. Пацієнтка 18 р. скаржиться на часте болюче сечовипускання, підвищення температури тіла до 38,2°C, які виникли після переохолодження. Які синдроми наявні в пацієнтки?

*** А) Болювий і дизурічний**

- В) Болювий і абдомінальний
- С) Болювий і астеничний
- Д) Сечовий і нефротичний
- Е) -

207. Медична сестра-бакалавр виявила у пацієнтки 63 р. тріаду симптомів: збільшення щитоподібної залози, екзофтальм, тахікардію. Для якого захворювання характерна дана картина?

*** А) Тиреотоксикозу**

- В) Ендемічного еутиреоїдного вола
- С) Мікседеми
- Д) Ендемічного гіпотиреоїдного вола
- Е) Синдрому Іценко-Кушинга

208. Під час обстеження пацієнта бригадою швидкої допомоги виявлено: він сидить, не змінюючи пози (зі слів родичів багато годин), на запитання відповідає повільно, після паузи окремими словами; самостійно не їсть. Який ступінь пригнічення психічної активності?

*** А) Ступор**

- В) Сопор
- С) Кома
- Д) Обнубіляція
- Е) Сомнолентність

209. У пацієнтки сумний вираз обличчя, уповільнене мислення. Відмічає пригнічений настрій, зниження працездатності, апетиту. Переважають думки про власну неповноцінність, безнадійність своєї життєвої ситуації та песимістичні прогнози на майбутнє. Визначте психічний розлад:

*** А) Депресія**

- В) Апатія
- С) Дисфорія
- Д) Амнезія
- Е) Астенія

210. Ви - медсестра в кабінеті лікаря-кардіолога. На щорічний диспансерний огляд звернувся пацієнт з ішемічною хворобою серця. На яке дослідження в першу чергу необхідно направити пацієнта?

*** А) Електрокардіографія**

- В) Ехокардіографія
- С) Фонокардіографія
- Д) Реовазограма
- Е) Ангіографія

211. До поліклініки звернувся пацієнт зі скаргами на вологий кашель, підвищення температури тіла до 39°C та біль в грудній клітці. Був поставлений попередній діагноз: Пневмонія. За допомогою якого додаткового методу обстеження можливо з великою достовірністю виявити пневмонію?

*** А) Рентгенографії**

- В) Спірографії
- С) Пневмотахометрії
- Д) Пікфулометрії
- Е) Бронхоскопії

212. Хворий звернувся зі скаргами на кашель з виділенням харкотиння вигляду малинового желе, задишку та біль в правій половині грудної клітки. Під час огляду у пацієнта виявлено: схуднення, бліда шкіра з сірим відтінком, набряк шиї та обличчя, збільшені надключичні лімфатичні вузли. Яке захворювання слід запідозрити?

*** А) Рак легенів**

- В) Пневмонію
- С) Бронхоектатичну хворобу
- Д) Туберкульоз легенів
- Е) Емфізему легенів

213. Хворий 30 років скаржиться на охриплість голосу, надсадний кашель, інспіраторну задишку. Під час обстеження виявили стридорозне дихання, обличчя та шия бліді, набряклі. Набряк щільний з переважною локалізацією на губах, повіках і шиї. Із анамнезу відомо, що у пацієнта алергія на деякі харчові продукти. Для якого захворювання характерні такі симптоми?

*** А) Набряк Квінке**

- В) Бронхіальна астма
- С) Гострий бронхіт
- Д) Пневмонія
- Е) Серцева недостатність

214. Ви проводите огляд тяжкохворого пацієнта. Як називається положення хворого в ліжку, при якому він самотійно не може його змінити?

*** А) Пасивне**

- В) Активне
- С) Вимушене
- Д) Довільне
- Е) -

215. Ви - медсестра нефрологічного відділення. Лікар призначив пацієнту дієту №7. Пацієнт звернувся до вас за поясненням мети призначеної дієти:

- * А) Збереження функції нирок**
- В) Відновлення вітамінного балансу
- С) Збереження функції шлунка
- Д) Нормалізація функції кишечника
- Е) Відновлення функції печінки

216. Ви здійснюєте догляд за пацієнтами гастроентерологічного відділення. Назвіть особливості дієтотерапії у разі виразкової хвороби шлунка:

- * А) Їжа відварена і перетерта**
- В) Обмеження вживання рідини
- С) Збільшення кількості вуглеводів
- Д) Виключення молочних продуктів
- Е) Розвантажувальні дні

217. У приймальне відділення доставлено пацієнта з виразковою хворобою шлунка. Раптово у хворого розпочалося блювання кольору кавової гущі. Суб'єктивно пацієнт почуває себе задовільно, може рухатись самостійно. Як хворого необхідно транспортувати?

- * А) На каталці-ношах**
- В) На кріслі-каталці
- С) Самостійною ходою
- Д) Пішки при підтримці медсестри
- Е) Ліфтом у супроводі медсестри

218. Ви здійснюєте догляд за пацієнтом з гіпертензивною кризою. Назвіть анатомічну ділянку на яку слід накласти гірчичники:

*** А) Потилиця**

- В) Ділянка серця
- С) Міжлопаткова
- Д) Чоло
- Е) Грудина

219. У пацієнта під час сну раптово виникли виражена інспіраторна задишка і сухий кашель. Стан хворого прогресивно погіршився, шкіра обличчя ціанотична, виникло клекотливе шумне дихання, під час кашлю почало виділятися пінисте мокротиння рожевого кольору. Пацієнту призначено інгаляційне введення кисню. Зволоження кисню необхідно здійснити:

*** А) Етиловим спиртом**

- В) Дистильованою водою
- С) Водопровідною водою
- Д) Метиловим спиртом
- Е) Сольовим розчином

220. Дільнична медична сестра проводить санітарно-освітню роботу з приводу профілактики туберкульозу. До якого виду профілактики відноситься вакцинація і ревакцинація БЦЖ, хіміопрофілактика:

*** А) Специфічної**

- В) Соціальної
- С) Санітарної
- Д) Неспецифічної
- Е) Загальнодержавної

221. У хворої 58 років 2 тижні тому з'явився сильний нападopodobний біль в нижній щелепі, тривалістю 5-20 хв. З часом біль став частішати, до 10 разів на добу. Прийом анальгетиків та спазмолітиків безрезультатний, однак краще стало після прийому 3-х таблеток нітрогліцерину. Який додатковий метод дослідження найбільш інформативний для оцінки стану міокарду?

*** А) ЕКГ**

- В) Доплерографія
- С) Рентгенографія органів грудної клітки
- Д) Ангіографія
- Е) МРТ

222. Хворий Л., 56 років скаржиться на: біль в грудній клітці, який підсилюється при глибокому диханні, сухий кашель, підвищення температури до 38,6°C. При пальпації міжреберних проміжків болючість відсутня. Аускультативно - дихання везикулярне, шум тертя плеври справа. Яким захворюванням обумовлено важкість стану хворого?

*** А) Сухий плеврит**

- В) Вогнищева пневмонія
- С) Невралгія міжреберних нервів
- Д) Перикардит
- Е) Ексудативний плеврит

223. Через 10 днів після перенесеної ангіни дівчина 19 років звернулась до дільничного лікаря у зв'язку з наявністю набряків на обличчі, різкої слабкості. При огляді шкірні покриви бліді., температура - 37,4°C; ЧСС- 98/хв., АТ- 165/98 мм рт.ст. Серцеві тони приглушені, акцент II тону над аортою. Сеча - темно-червоного кольору, 400 мл на добу. В яке відділення слід госпіталізувати хвору?

*** А) Нейрологічне**

В) Терапевтичне

С) Урологічне

Д) Кардіологічне

Е) Інфекційне

224. Хвора 45 р. скаржиться на інтенсивний біль в поперековій ділянці з обох сторін, який супроводжується гематурією. При УЗД в нирках виявлені численні кристалічні включення від 0,5 до 3,0 мм в діаметрі. Яка найбільш ймовірна причина гематурії?

*** А) Сечокам'яна хвороба**

В) Множинні метастази пухлини в нирці

С) Хронічний гломерулонефрит

Д) Хронічний пієлонефрит

Е) Полікістоз нирок з вторинним хронічним пієлонефритом

225. Дефіцит якого макроелементу може виникнути в організмі при безконтрольному вживанні фуросеміду:

*** А) Калію**

В) Натрію

С) Кобальту

Д) Магнію

Е) Заліза

226. У пацієнтки 47 років проблеми: слабкість, сонливість, байдужість, збільшення ваги, закрепи. Медична сестра звернула увагу на сповільнену мову пацієнтки, низький і хриплий голос, повільні рухи. Шкіра бліда, холодна, суха. При пальпації щитоподібна залоза не збільшена. На який лабораторний показник слід звернути особливу увагу для встановлення діагнозу захворювання?

*** А) Зниження рівня тиреоїдних гормонів**

- В) Підвищення рівня тиреоїдних гормонів
- С) Підвищення рівня соматотропного гормону
- Д) Зниження рівня глюкози крові
- Е) Зниження рівня парат-гормону

227. У пацієнта 19 років після укусу невідомої комахи раптово з'явився інтенсивний свербіж шкіри, почервоніння, висипання, які виступають над поверхнею шкіри. Пізніше виникли різні по величині пухирці, заповнені прозорою рідиною, підвищилась температура тіла до 38°C. Який діагноз найбільш вірогідний?

*** А) Кропив'янка**

- В) Сироваткова хвороба
- С) Геморагічний діатез
- Д) набряк Квінке
- Е) Анафілактичний шок

228. У пацієнта 21 року після вживання креветок раптово, без передвісників, виник набряк губ, язика, м'якого піднебіння, мигдаликів, гортані, охриплість голосу, надсадний кашель, утруднення дихання. Що може призвести до смерті пацієнта?

*** А) Асфіксія**

- В) Анорексія
- С) Аритмія
- Д) Різке зниження артеріального тиску
- Е) Судоми

229. В урологічному відділенні у пацієнта 26 років розвинувся анафілактичний шок на внутрішньовенне введення рентгенконтрасної речовини. АТ- 70/50 мм рт.ст. П- 46/хв., слабкого наповнення. ЧДР- 32/хв., дихання утруднене. Який препарат необхідно терміново ввести парентерально за стандартом надання невідкладної допомоги?

*** А) 0,1% розчин адреналіну гідрохлориду**

- В) 0,1% розчин атропіну сульфату
- С) 50% розчин анальгіну
- Д) 2% розчин еуфіліну
- Е) 1% розчин мезатону

230. Під час проведення плевроцентезу пацієнт 65 років став блідим, млявим, шкіра вкрилась холодним потом. Дихання прискорене, поверхневе, пульс частий, слабкого наповнення, артеріальний тиск знижений. Який препарат необхідно терміново ввести парентерально за стандартом надання невідкладної допомоги?

*** А) Кофеїн**

- В) Атропін сульфат
- С) Корглікон
- Д) Глюкозу
- Е) Реополіглюкін

231. У пацієнта 29 років підозра на хронічну ниркову недостатність. Яке додаткове обстеження пацієнта доцільно провести для уточнення діагнозу?

*** А) Креатинін крові**

- В) Бактеріологічне дослідження сечі
- С) Екскреторну урографію
- Д) УЗД нирок
- Е) Абдомінальну пункцію

232. У пацієнта 60 років пригнічений настрій, він бачить все похмурим, відчуває тугу, тривогу, страх, виникають думки про самогубство. Який це розлад емоцій?

*** А) Депресія**

- В) Апатія
- С) Ейфорія
- Д) Дисфорія
- Е) Слабодухість

233. При активному патронажі медична сестра проводить обстеження пацієнтки П., 32 р., з ознаками залізодефіцитної анемії. Вкажіть основну можливу причину, визначену медичною сестрою, яка спровокувала дану патологію:

*** А) Постійна крововтрата**

- В) Аутоімунні захворювання крові
- С) Хронічний гепатит
- Д) Вплив іонізуючого опромінення
- Е) Резекція тонкої кишки

234. Пацієнт Ю. 17 років, скаржиться на болі в правому колінному суглобі. Вважає себе хворим з дитинства, часто відмічає носові кровотечі. В сім'ї троє дітей: 2 хлопчика і дівчинка. У брата відмічається подібне захворювання. Об'єктивно: правий колінний суглоб припухлий, болючий при пальпації і рухах. Яке це захворювання?

*** А) Гемофілія**

- В) Хвороба Верльгофа
- С) Хвороба Шенлейна-Геноха
- Д) Гострий лейкоз
- Е) Хронічний лейкоз

235. У пацієнта В., 55 р., через деякий час після введення йому вітаміну "В1" обличчя набрякло, повіки стали важкими, перешкоджають відкриванню очей, очні яблука "ін'єковані". Губи збільшились. Шкіра в місцях набряку бліда, із жовтуватим відтінком, не гаряча на дотик, не болюча, не свербить. Вкажіть, який стан розвинувся у пацієнта:

*** А) Набряк Квінке**

- В) Анафілактичний шок
- С) Сироваткова хвороба
- Д) Кропив'янка
- Е) Бронхоспазм

236. Під час медсестринського обстеження пацієнта Х., 70 р., з приводу хронічного атонічного коліту, виявлені такі проблеми: нудота, здуття живота, затримка випорожнень більше 3 діб. Вкажіть, які продукти харчування повинна порекомендувати медична сестра пацієнту для профілактики закрепів:

*** А) Буряки, моркву, чорнослив**

- В) Консерви, білий хліб, капусту
- С) Молоко, чорний хліб, свинину
- Д) Овочі, свіже молоко, твердий сир
- Е) Овочі, фруктові соки, тістечка

237. Медичну сестру терапевтичного відділення викликали до пацієнта З., 59 р. Об'єктивно: пацієнт збуджений, сидить у ліжку, ловить повітря ротом. Шкіра з ціанотичним відтінком, дихання прискорене, на відстані чути клекочучі хрипи. Кашель із виділенням рожевого пінистого харкотиння. Над легеньми вислуховуються розсіяні різнокаліберні вологі хрипи. Про який невідкладний стан свідчать дані наявні проблеми пацієнта?

*** А) набряк легень**

- В) Приступ бронхіальної астми
- С) Приступ серцевої астми
- Д) Гіпертонічний криз
- Е) Приступ стенокардії

238. У пацієнтки К, 48 р., періодично виникають скарги на виражений біль у поперековій ділянці справа, який посилюється при найменших рухах та іррадіює в статеві органи, часте болюче сечовиділення, нудоту, слабкість, Т-37,2°C. Яка з даних проблем пацієнтки є пріоритетною?

*** А) Біль у попереку**

- В) Нудота
- С) Слабкість
- Д) Часте сечовиділення
- Е) Підвищення температури

239. Медична сестра здійснює медсестринський процес пацієнтці Є., 19 р., яка скаржиться на колючі болі в ділянці серця, серцебиття, задишку при фізичному навантаженні, ниючі болі в ліктьових та колінних суглобах, підвищення температури ввечері до 38,3°C. В анамнезі: часті ангіни. Місяць тому перенесла ангіну “на ногах”, після чого з’явилися вищеназвані проблеми. Для якого захворювання характерні дані проблеми пацієнтки?

*** А) Ревматичної хвороби**

- В) Ревматоїдного артрит
- С) Деформуючого остеоартрозу
- Д) Гломерулонефриту
- Е) -

240. Пацієнтка Ю, 22 р., лікується у відділенні з приводу пневмонії. Після першої ін’єкції антибіотика у пацієнтки з’явилась різка слабкість, утруднене дихання, набряк і блідість шкіри обличчя. ЧП- 96/хв, АТ- 50/20 мм рт.ст. Вкажіть, про яке ускладнення свідчать дані наявні проблеми?

*** А) Анафілактичний шок**

- В) Гіпертонічна криза
- С) Колапс
- Д) Астматичний стан
- Е) Інфаркт міокарда

241. Хворому Д. з діагнозом пієлонефрит призначена проба Зимницького. Яке пояснення треба надати хворому для правильного збору сечі?

*** А) Збирати сечу цілодобово, кожні 3 години в окремий посуд**

- В) Збирати сечу цілодобово в один посуд
- С) Збирати сечу вранці і ввечері
- Д) Збирати сечу вранці одноразово
- Е) Збирати середню порцію сечі вранці

242. Хворому Д. з діагнозом: “Пієлонефрит” призначена проба Зимницького. Яку функцію нирок допомагає оцінити ця проба?

*** А) Концентраційну**

- В) Фільтраційну
- С) Азотовидільну
- Д) Еритропоетичну
- Е) Кислотовидільну

243. При медсестринському обстеженні пацієнта виявлено: обличчя одутле, синюшне; шия широка з набряклими венами; діжкоподібна грудна клітка; коробковий перкуторний звук; обмеження експерсії легень. Яке це захворювання?

*** А) Емфізема легень**

- В) Плеврит ексудативний
- С) Пневмонія
- Д) Пневмосклероз
- Е) Бронхіт гострий

244. Виберіть пріоритетну проблему у разі сухого плевриту:

*** А) Гострий біль у грудній клітці, який посилюється при диханні**

- В) Нездужання
- С) Серцебиття
- Д) Задишка
- Е) Головокружіння

245. Виберіть препарат для проведення хіміопрофілактики туберкульозу:

*** А) Ізоніазид**

- В) Месулід
- С) Біцилін-3
- Д) Ретарпен
- Е) Біцилін-5

246. У пацієнта зі стенокардією біль за грудиною виникає при виконанні фізичних навантажень одакової інтенсивності. Який це вид стенокардії?

*** А) Стабільна напруження**

- В) Прогресуюча
- С) Принцметала
- Д) Нестабільна
- Е) Спокою

247. Виберіть вид шоку, що ускладнює інфаркт міокарда:

*** А) Кардіогенний**

- В) Гіповолемічний
- С) Септичний
- Д) Неврогенний
- Е) Анафілактичний

248. Медична сестра-бакалавр пояснює медичній сестрі, що для зменшення задишки хворому з ХСН необхідно надати положення:

*** А) Напівсидяче**

- В) Горизотальне
- С) Ноги припідняті
- Д) На лівому боці
- Е) На правому боці

249. Для поліпшення якості їжі хворим з виразковою хворобою медична сестра порекомендує до страв (супи, протерті каші) додавати:

*** А) Протерті овочі**

- В) Грибні відвари
- С) Квашену капусту
- Д) Солоні огірки
- Е) Приправи з перцем

250. Медична сестра хворому з цукровим діабетом рекомендує після введення інсуліну простого через 30 хвилин поїсти. З метою попередження якого ускладнення?

*** А) Гіпоглікемічної коми**

- В) Гіперглікемічної коми
- С) Гіперосмолярної коми
- Д) Молочнокислої коми
- Е) Тиреотоксичної коми

251. Найбільш частою причиною легеневої кровотечі є:

*** А) Туберкульоз легень**

- В) Хронічний бронхіт
- С) Пневмосклероз
- Д) Пневмонія
- Е) Емфізема легень

252. При гіпертензивній кризі під язик застосовують:

*** А) Ніфідепін**

- В) Аналгін
- С) Валідол
- Д) Ефедрин
- Е) Преднізолон

253. Перебіг хронічного гломерулонефриту ускладнився нирковою недостатністю. Які зміни в пробі Зимницького характерні?

*** А) Олігурія, гіпоізостенурія**

- В) Поліурія, лейкоцитурія
- С) Еритроцитурія, протеїнурія
- Д) Бактеріурія, протеїнурія
- Е) Лейкоцитурія, протеїнурія

254. Порекомендуйте хворому залізодефіцитною анемією м'ясні продукти, яким необхідно надавати перевагу:

*** А) Телятина**

- В) Свинина
- С) Курятина
- Д) Гусятина
- Е) -

255. Виберіть симптоми характерні для хронічного атрофічного гастриту із зниженою секрецією:

*** А) Відрижка повітрям, нудота**

- В) Печія, відрижка кислим
- С) Нападopodobний біль в епігастральній ділянці
- Д) Оперізуючий біль
- Е) "Кинжалоподобний біль"

256. Натуральний шлунковий сік, платаглюцид призначають при такій патології:

*** А) Гастриті із зниженою секрецією**

- В) Гастриті із збереженою секрецією
- С) Хронічному холециститі
- Д) Виразковій хворобі шлунка
- Е) Виразковій хворобі дванадцятипалої кишки

257. Медична сестра-бакалавр пояснює медичній сестрі, щоб вона особливу увагу на дотримання хворими з хронічними гепатитами, цирозами печінки дієти №:

- * А) 5**
- В) 1
- С) 7
- Д) 10
- Е) 11

258. Медична сестра-бакалавр при проведенні санітарно-освітньої роботи щодо профілактики гломерулонефритів акцентує увагу на тому, що одним із найважливіших заходів профілактики є:

- * А) Санація осередків стрептококової інфекції**
- В) Раціональне харчування
- С) Відмова від тютюнопаління
- Д) Тверезий спосіб життя
- Е) Активний спосіб життя

259. Пацієнт скаржиться на оперізувальний біль у надчереvній ділянці, блювання, метеоризм. Такі симптоми характерні для:

- * А) Гострого панкреатиту**
- В) Гострого гастриту
- С) Печінкової кольки
- Д) Гострого холециститу
- Е) Гострого ентероколіту

260. Медична сестра визначила добовий діурез (він становив - 450 мл) і доповідає лікарю що у хворого:

*** А) Олігурія**

- В) Дизурія
- С) Поліурія
- Д) Ніктурія
- Е) Анурія

261. Пацієнтка, 49 р., звернулася зі скаргами на періодичний біль в правій поперековій ділянці, підвищення температури тіла до 37-38°C, часте сечовипускання. Був діагностований хронічний пієлонефрит у фазі загострення. Які зміни в аналізі сечі підтвердять цей діагноз?

*** А) Лейкоцитурія, бактеріурія**

- В) Лейкоцитурія, гематурія
- С) Лейкоцитурія, глюкозурія
- Д) Глюкозурія, циліндурія
- Е) Гематурія, протеїнурія

262. Пацієнт Б., 23 років, знаходиться на лікуванні в ендокринологічному відділенні з приводу цукрового діабету. За дотриманням пацієнтом якої дієти повинна стежити медична сестра?

*** А) №9**

- В) №1
- С) №5
- Д) №7
- Е) №10

263. Хворий 28 років, знаходиться на диспансерному обліку з приводу ревматичної хвороби. Призначено профілактичне лікування. Який з перерахованих лікарських засобів треба призначити?

*** А) Біцілін-5**

- В) Папаверин
- С) Преднізолон
- Д) Дігосин
- Е) Дімедрол

264. Ви - медсестра-бакалавр гастроентерологічного відділення, спостерігаєте за пацієнтом з загостренням виразкової хвороби шлунка. До якого найінформативнішого методу дослідження Ви підготуєте пацієнта?

*** А) Фіброгастроудоденоскопії**

- В) Шлункового зондування
- С) Рентгеноскопії шлунка
- Д) Дуоденального зондування
- Е) УЗД органів черевної порожнини

265. Ви - медсестра-бакалавр гастроентерологічного відділення. У пацієнта К. 56 років з виразковою хворобою шлунка виникло ускладнення - малігнізація виразки. Які симптоми Ви виявили у пацієнта?

*** А) Схуднення, відраза до м'яса, блідість шкіри**

- В) Зниження апетиту, біль в животі, нудота
- С) Запаморочення, мелена, біль в животі
- Д) Нудота, блювання, пронос
- Е) Блювання "кавовою гущею", запаморочення, тахікардія

266. Ви - медсестра-бакалавр гастроентерологічного відділення, у пацієнта К. 56 років з виразковою хворобою шлунка запідозрили ускладнення - малігнізацію виразки. До якого обстеження необхідно підготувати пацієнта?

*** А) Фіброгастроскопії з прицільною біопсією**

- В) Фракційного зондування
- С) УЗД органів черевної порожнини
- Д) Рентгеноскопії шлунка
- Е) Діагностичної лапароскопії

267. Пацієнт 32 років хворіє на ревматоїдний артрит. При обстеженні Ви виявите наступні симптоми:

*** А) Ранкова скутість, деформація дрібних суглобів**

- В) Почервоніння, набряклість великих суглобів
- С) Тахікардія, зниження АТ
- Д) Кільцеподібна еритема, ревматичні вузлики
- Е) Лімфоаденопатія, спленомегалія

268. У пацієнта 42 років на підставі скарг встановлено діагноз: туберкульоз легень. Вкажіть найбільш оптимальний препарат для терапії даного пацієнта:

*** А) Ріфампіцин**

- В) Канаміцин
- С) Ампіокс
- Д) Цефтріаксон
- Е) Еритроміцин

269. Пацієнт скаржиться на спрагу, поліурію, свербіж шкіри, нудоту, блювання, біль у животі. Хворий загальмований, дихання шумне, запах ацетону з рота, шкіра та слизові оболонки сухі, тони серця приглушені, ЧСС- 102/хв., АТ- 100/60 мм рт.ст. Живіт болючий. Під час обстеження хворий втратив свідомість. Яке ускладнення виникло у хворого?

*** А) Гіперглікемічна кома**

В) Гіпоклікемічна кома

С) Ліподистрофія

Д) Печінкова кома

Е) Уремична кома

270. У пацієнта на хронічний гломерулонефрит нудота, блювання, свербіж шкіри. Об'єктивно: стан важкий, загальмованість, шкіра суха, запах аміаку з рота, АТ- 190/110 мм рт.ст., тони серця приглушені, аритмічні, ЧСС- 76/хв. Який стан виник у пацієнта?

*** А) Уремія**

В) Гіпоглікемія

С) Гіперглікемія

Д) Ниркова колька

Е) Набряк легенів

271. Пацієнтка 40 років скаржиться на болі в суглобах, субфебрильну температуру. При огляді - на спинці носа і щоках висип, що нагадує крила метелика. Погіршення стану пов'язує з перебуванням на сонці. Розвиток якого захворювання можна запідозрити?

*** А) Системний червоний вовчак**

В) Ревматичний артрит

С) Гострий лейкоз

Д) Ревматоїдний артрит

Е) Крапив'янка

272. Пацієнт скаржиться на болі в суглобах кистей та стоп, ранкову скутість в них, деформацію суглобів. Розвиток якого захворювання можна запідозрити?

- * А) Ревматоїдний артрит**
- В) Остеоартроз
- С) Ревматичний артрит
- Д) Подагра
- Е) Системний червоний вовчак

273. У пацієнта хворого на цукровий діабет, зменшилася спрага, поліурія, свербіння та сухість шкіри. Проведіть підсумкову оцінку ефективності догляду та оцініть результат:

- * А) Проблеми вирішені частково**
- В) Проблеми вирішені повністю
- С) Проблеми без змін
- Д) Проблеми не вдалося вирішити
- Е) Проблем стало більше

274. До Вас звернувся пацієнт з проблемами біль у ділянці серця після фізичного навантаження з ірадіацією у ліву руку, тривалістю 3 хвилини, серцебиття. Який препарат доцільно використати?

- * А) Нітрогліцерин**
- В) Вольтарен
- С) Анальгін
- Д) Корвалол
- Е) Кетанов

275. При обстеженні пацієнта, який хворіє на емфізему легень визначено двобічне опущення нижньої межі легенів. Яким методом дослідження це було виявлено?

*** А) Топографічної перкусії**

- В) Порівняльної перкусії
- С) Поверхневої пальпації
- Д) Глибокої пальпації
- Е) Аускультації легенів

276. При обстеженні пацієнта, хворого на рак легенів, виявлено кашель з домішками крові, слабкість, зниження апетиту, зниження ваги, біль у грудній клітці. Яка пріоритетна проблема у хворого у даному випадку?

*** А) Кровохаркання**

- В) Слабкість
- С) Біль у грудної клітки
- Д) Зниження апетиту
- Е) Зниження ваги

277. Пацієнт хворий на пневмонію, лікується антибіотиками. На 4-ту добу лікування з'явилися шкіряний свербіж, пухирцевий висип на шкірі, слабкість, головний біль, температуру - 37,2°C, зниження апетиту. Яка проблема пацієнта буде пріоритетною?

*** А) Свербіж шкіри**

- В) Слабкість
- С) Головний біль
- Д) Субфебрильна температура тіла
- Е) Зниження апетиту

278. У пацієнта після вживання лісових ягід виникли надсадний кашель, охриплість голосу, інспіраторна задишка. Пацієнт неспокійний, блідий, набряк обличчя, язика. Який препарат необхідно ввести за призначенням лікаря?

*** А) Преднізолон**

- В) Анальгін
- С) Кетанов
- Д) Баралгетекс
- Е) Но-шпа

279. Пацієнта турбує ранкова “скутість” у дрібних суглобах кистей, постійний біль у них, який посилюється при будь-яких рухах, неможливість одягатися. Для якого захворювання це характерно?

*** А) Ревматоїдного артриту**

- В) Ревматичного поліартриту
- С) Деформуючого остеоартрозу
- Д) Системного червоного вовчака
- Е) Склеродермії

280. Пацієнтка 57 років із хронічною недостатністю кровообігу отримує препарати наперстянки (дигоксин), на протязі 3-х тижнів. Поскаржилась на погіршення стану здоров'я: з'явилася нудота, одноразове блювання, перебої в роботі серця, пульс - 54/хв., АТ -130/80 мм рт.ст. З чим пов'язане погіршення стану пацієнтки?

*** А) Передозуванням серцевих глікозидів**

- В) Зниженням АТ
- С) Підвищенням АТ
- Д) Недостатньою дозою серцевих глікозидів
- Е) Порушенням дієти

281. Яку назву має хворобливий стан, який виник внаслідок неправильної поведінки медичного працівника?

- * А) Ятрогенія**
- В) Іпохондрія
- С) Депресія
- Д) Меланхолія
- Е) Шизофренія

282. Жінка 30 років, яка знаходиться в психіатричному диспансері з діагнозом маніакально-депресивний психоз у стані депресії, вже 3-й день поспіль відмовляється від приймання їжі. Яка найбільш доцільна тактика в даному випадку?

- * А) Вдатися до годування через зонд**
- В) Продовжувати переконувати у необхідності поїсти
- С) Дочекатися власної ініціативи пацієнтки поїсти
- Д) Попросити допомоги у сусідів по палаті
- Е) Ввести хворій снодійне

283. Хвора 42 років перебуває в депресивному стані: постійно сумна, задумана, неохоче спілкується з медсестрою, відмовляється від їжі, лежить в ліжку, відвернувшись до стіни. Яку загрозу для життя пацієнтки повинна запідозрити медсестра?

- * А) Суїцидальні думки і дії**
- В) Виникнення пролежнів
- С) Схуднення пацієнтки
- Д) Авітаміноз
- Е) Розвиток гіпостатичної пневмонії

284. Хвора Д. , 60 років, скаржиться на біль у суглобах, який виникає під час ходіння. З анамнезу: вважає себе хворою протягом останніх 10 років, коли почала турбувати ранкова скутість у суглобах, біль при навантаженні. Яку групу медикаментів найдоцільніше призначити?

*** А) Нестероїдних протизапальних засобів**

В) Антисклеротичних засобів

С) Антибіотиків

Д) Спазмолітиків

Е) Діуретиків

285. За класифікацією предметів навколишнього середовища щодо ризику поширення внутрішньолікарняної інфекції, предмети, що проникають в органи і порожнини тіла мають:

*** А) Високий ризик**

В) Середній ризик

С) Низький ризик

Д) Помірний ризик

Е) Нульовий ризик

286. Найпоширеніший шлях передачі внутрішньолікарняної інфекції в лікувально-профілактичному закладі це:

*** А) Контактний**

В) Повітряно-пиловий

С) Харчовий

Д) Водний

Е) Фекально-оральний

287. У хворої на дифузно-токсичний зоб збільшена щитоподібна залоза не тільки пальпується, а й помітна при ковтанні. Укажіть ступінь збільшення щитоподібної залози:

*** А) II ступінь**

В) III ступінь

С) I ступінь

Д) V ступінь

Е) IV ступінь

288. Пацієнту призначено внутрішньовенне введення лікарського засобу. Який рівень знезараження рук слід здійснити медичній сестрі перед процедурою?

*** А) Гігієнічний**

В) Руки не обробляють, одягають стерильні рукавички

С) Хірургічний

Д) Миття рук із звичайним милом

Е) Соціальний

289. У хворого спостерігається субфебрилітет, пітливість втрата працездатності протягом 2 місяців. Зниження ваги тіла пацієнт пов'язує з проносами. При огляді виявлено збільшення пахвових лімфатичних вузлів, печінки, множинні афти слизової оболонки рота. Пацієнт є ін'єкційним наркоманом. Про яке захворювання можна думати?

*** А) ВІЛ-інфекція**

В) Туберкульоз

С) Вірусний гепатит В

Д) Вірусний гепатит С

Е) Хронічний коліт

290. Перелік досліджень та заходів щодо виявлення хворих з артеріальною гіпертензією та принципи їх ведення визначені наказом МОЗ України:

*** А) №247**

В) №186

С) №205

Д) №207

Е) №236

291. У пацієнта 63 р., який протягом десяти років хворіє на хронічний лімфолейкоз, на фоні вираженого погіршення самопочуття в периферичній крові виявлено 15% лімфобластних клітин. Як називається такий стан?

*** А) Бластна криза**

В) Зсув лейкоцитарної формули вліво

С) Зсув лейкоцитарної формули вправо

Д) Лімфоцитоз

Е) Лейкемічний провал

292. У ревматологічному відділенні на лікуванні знаходиться хвора зі скаргами на субфебрилітет, загальну слабкість, болі в суглобах, стискаючі болі в серці. Лікар діагностував ревматичну лихоманку. Вкажіть збудника, що викликає дане захворювання:

*** А) β -гемолітичний стрептокок групи А**

В) β -гемолітичний стрептокок групи С

С) Стафілокок

Д) Пневмокок

Е) Вірус Епштейн-Барра

293. Жінка скаржиться на біль голови, порушення менструального циклу, поганий сон. Об'єктивно: ожиріння верхньої половини тіла. Обличчя місяцеподібне, червоного кольору, на обличчі надмірний ріст волосся. На шкірі живота червоно-фіолетові стрії. Пульс - 90/хв., АТ -170/110 мм рт.ст. Для якого захворювання це характерно?

*** А) Хвороби Іценка-Кушінга**

- В) Акромегалії
- С) Гіпертонічної хвороби
- Д) Ревматичної хвороби
- Е) Гіпотиреозу

294. Жінка скаржиться на тупий біль у навколупупковій ділянці, здуття живота, кашкоподібні випорожнення до 4-5 разів на добу, неbolючі. Відразу після акту дефекації з'являється нудота, холодний піт, тремтіння кінцівок. Хворіє 5 років. Під час пальпації - болючість у навколупупковій ділянці. Для якого захворювання це характерно?

*** А) Хронічного ентериту**

- В) Хронічного панкреатиту
- С) Хронічного пієлонефриту
- Д) Хронічного гастриту
- Е) Хронічного холециститу

295. Пацієнт скаржиться на появу сечі кольору "м'ясних ополосків", головний біль, набряки на обличчі. Три тижні тому хворів на ангіну. Об'єктивно: обличчя бліде, одутле, АТ- 145/90 мм рт.ст. Який найбільш імовірний діагноз?

*** А) Гострий гломерулонефрит**

- В) Гіпертонічна хвороба
- С) Гострий пієлонефрит
- Д) Хронічний пієлонефрит
- Е) Амілоїдоз нирок

296. Пацієнт поступив в пульмонологічне відділення зі скаргами на біль в правій половині грудної клітки, який посилюється під час кашлю і дихання, кашель з виділенням “іржавого” харкотиння, підвищення температури до 39,5°C, задишку. Вкажіть препарат, який застосовується з метою етіотропного лікування?

*** А) Цефтріаксон**

- В) Лазолван
- С) Аспірин
- Д) Сульфокамфокаїн
- Е) Лібексин

297. В маніпуляційному кабінеті після підшкірного введення ціанокобаламіну пацієнтка відчула себе зле, з'явився шум у вухах, відчуття ядухи, запаморочення. Які дії медичної сестри стосовно місця ін'єкції будуть доцільними?

*** А) Застосувати міхур з льодом**

- В) Накласти стискуючу пов'язку
- С) Обробити спиртом
- Д) Накласти компрес
- Е) Накласти грілку

298. Пацієнт поскаржився на часті головокружіння та втрату свідомості при фізичних навантаженнях. В анамнезі - ревматична хвороба протягом 23 років. При об'єктивному обстеженні виявлено блідість шкіряних покривів, пульсацію сонних артерій та похитування голови в такт пульсу. Для якої вади серця характерні дані симптоми?

*** А) Недостатності клапанів аорти**

- В) Тетради Фало
- С) Стенозу мітрального отвору
- Д) Недостатності мітрального клапану
- Е) Недостатності трьохстулкового клапану

299. Пацієнтка тривалий час скаржиться на нудоту, блювання, гіркоту у роті, тяжкість в правому підребір'ї, особливо після вживання жирної їжі. Об'єктивно: язик обкладено білим нальотом, живіт болючий у точці жовчного міхура. Розвиток якого захворювання можна запідозрити?

*** А) Хронічного холециститу**

В) Жовчнокам'яної хвороби

С) Виразкової хвороби

Д) Хронічного гепатиту

Е) Хронічного панкреатиту

300. У пацієнта два тижні тому з'явилися кашель з виділенням харкотиння з неприємним запахом, підвищення температури тіла до 38°C. Об'єктивно: стан пацієнта тяжкий, ЧДР- 24/хв., рентгенологічно в лівій легені виявлено порожнину до 3 см в діаметрі з горизонтальним рівнем рідини. Який найімовірніший діагноз?

*** А) Абсцес легені**

В) Пневмонія

С) Ексудативний плеврит

Д) Інфільтративний туберкульоз

Е) -