

ЗАВАНТАЖЕНО З САЙТУ ТЕСТУВАННЯ.УКР

Сестринська справа - Клінічне медсестринство в хірургії - база тестів 2017 року

Категорія: **Бази тестів українською мовою 2017 року**

Кількість запитань: **300**

1. Енергія першого розряду при використанні біполярного дефібрилятора має становити:

*** А) 150-200 Дж**

В) 200-250 Дж

С) 250-300 Дж

Д) 300-350 Дж

Е) 350-400 Дж

2. Ви медична сестра хірургічного відділення. Лікар призначив премедикацію. Вкажіть максимальний час, який відводиться для премедикації перед операцією:

А) 60 хв.

*** В) 90 хв.**

С) 30 хв.

Д) 120 хв.

Е) 150 хв.

3. У хворого А, 29 р. в ранньому післяопераційному періоді виникла аспірація шлунковим вмістом. Чим небезпечне дане ускладнення?

*** А) Розвитком пневмонії**

В) Розвитком циститу

С) Розвитком гастриту

Д) Евентерацією

Е) Розвитком ангіни

4. Ви надаєте допомогу постраждалому Щ., 35 р., в якого була здавлена нижня кінцівка більше 4-х годин. Ваша першочергова дія:

- * А) Накласти джгут вище здавлення**
- В) Ввести дихальні і серцеві анальгетики
- С) Провести інфузію реополіглюкіну
- Д) Звільнити здавлену кінцівку
- Е) Провести блокаду кінцівки

5. В післяопераційну палату доставили пацієнта якому проводили оперативне втручання під епідуральною анестезією. Які тимчасові зміни можуть спостерігатись у пацієнта?

- * А) Втрата чутливості**
- В) Порушення дихання
- С) Затримка сечовиділення
- Д) Патологічні рефлекси
- Е) Виникає біль

6. Хворий М., 34 роки, отримав різану рану в ділянці підколінної ямки розміром - 7х0,3 см. Краї рани зяють, кровоточать. Кров витікає пульсуючим струменем, яскраво-червоного кольору. Визначте обсяг першої допомоги:

- * А) Накладення джгута**
- В) Накладання оклюзійної пов'язки
- С) Накладення стискаючої пов'язки
- Д) Застосування протромбінової губки
- Е) Імобілізація шиною Дітерікса

7. У пацієнта 36 років, після оперативного втручання на шлунку під загальною анестезією через 2 години з'явилося порушення дихання - поверхневе, аритмічне, до 24-26 за хвилину. Ціаноз, тахікардія, АТ- 140/90 мм рт.ст., свідомість збережена. З чого почати первинну допомогу?

*** А) Переконатися в прохідності дихальних шляхів**

- В) Зробити хворому ін'єкцію розчину кофеїну
- С) Зробити хворому штучну вентиляцію легень
- Д) Продовжити активне спостереження за хворим
- Е) Підключити хворого до апарату штучної вентиляції легень

8. В клініку госпіталізовано хворого з діагнозом: анаеробна газова гангрена стегна. Який антисептик обов'язково повинен бути використаний при обробці інструментів після перев'язки?

*** А) 6% розчин перекису водню**

- В) 0,0002% розчин фурациліну
- С) 5% розчин йоду
- Д) 0,02% розчин декаметоксину
- Е) 0,1% розчин марганцевокислого калію

9. Хворий С., 31 р. звернувся із скаргами на підвищення температури до 38°C, біль у поперековій ділянці, припухлість. Об'єктивно: у правій поперековій ділянці болючий інфільтрат розміром - 5х6 см, шкіра над ним багряного кольору, у центрі багато гнійно-некротичних нориць. Який найбільш імовірний діагноз?

*** А) Карбункул**

- В) Абсцес
- С) Бешиха
- Д) Паранефрит
- Е) Фурункул

10. Хворий К., 36 років, готується до планового оперативного втручання з приводу пахової грижі. Яку клізму необхідно поставити для підготовки кишечника в день операції?

*** А) Очисну**

- В) Гіпертонічну
- С) Сифонну
- Д) Мильну
- Е) Лікувальну

11. Постраждалий 42 років, під час бійки отримав поранення грудної клітки гострим предметом. При огляді: рана в проекції ІХ міжребір'я по лопатковій лінії зліва. Із рани при вдиху виділяється із шумом повітря та бризки крові. Яку допомогу необхідно надати хворому в першу чергу?

*** А) Накласти оклюзійну пов'язку**

- В) Накласти асептичну пов'язку
- С) Ввести знеболюючі засоби
- Д) Негайно направити до лікаря
- Е) Ввести кровоспинні засоби

12. Хворий, 66 років, скаржиться на неприємні відчуття, свербіж в ділянці ануса, періодичну кровотечу наприкінці акту дефекації. Хворіє біля 3-х років. За останні 6 місяців епізоди кровотеч почастішали. В ділянці ануса на 7 та 11 години умовного циферблату визначаються вузли до 1см з синюшним відтінком. Яка найвірогідніша причина такого стану пацієнта?

*** А) Геморой**

- В) Тріщина
- С) Рак
- Д) Парапроктит
- Е) Випадіння

13. Вкажіть першочерговий елемент медичної допомоги на місці події при обмежених опіках кінцівки I-II-го ступеня:

*** А) Охолодження під проточною водою**

- В) Обробка вазеліновою олією
- С) Накладання сухої асептичної пов'язки
- Д) Застосування гіпертонічного розчину
- Е) Використання розчину декасану

14. У хворого, що перебуває в загальній 4-х місній палаті розвинулась анаеробна інфекція. Які протиепідеміні заходи необхідно провести?

*** А) Перевести хворого в окрему палату**

- В) Переписати контактних хворих
- С) Перевести хворого в інфекційне відділення
- Д) Ввести хворому протигангренозну сироватку
- Е) Провести хворому сеанс оксигенобаротерапії

15. Постраждалого, 45 років, звільнили з-під завалу в шахті, де йому придавило праву ногу. Встановлено синдром тривалого стиснення. Яким небезпечним ускладненням може закінчитись дана патологія?

*** А) Гострою нирковою недостатністю**

- В) Тромбофлебітом поверхневих вен гомілки
- С) Гострою дихальною недостатністю
- Д) Флегмоною стегна
- Е) Сухою гангrenoю

16. Хворий М., 26 років був прооперований з приводу гострого апендициту. На п'яту добу після накладання швів, медична сестра хірургічного відділення оглядає рану: пряма лінія швів, добре зіставлені краї, швидко загоюється, ознак інфікування немає. Яким способом відбувається загоєння рани?

*** А) Первинним натягом**

- В) Під струпом
- С) Вторинним раннім натягом
- Д) Вторинним пізнім натягом
- Е) -

17. Пацієнт К., 49 р. знаходиться у хірургічному відділенні в післяопераційному періоді. Виберіть умову виникнення тромбозу глибоких вен:

*** А) Обмеження рухливості після операції**

- В) Операція під неінгаляційним наркозом
- С) Використання місцевого знеболення
- Д) Застосування антикоагулянтів
- Е) Накладання еластичних бинтів

18. У пацієнта М, 50 років, який переніс травму живота, зі скаргами на біль у ділянці живота, нудоту, блювання при об'єктивному обстеженні виявлено позитивний симптом Щьоткіна-Блюмберга. На що це вказує:

*** А) Гострий живіт**

- В) Гострий панкреатит
- С) Гострий апендицит
- Д) Проривна виразка
- Е) Гострий холецистит

19. Пацієнт Н, потрапив до травматологічного відділення з травмами обличчя та ротоглотки. Внаслідок цього можуть виникнути такі потенційні проблеми, як аспірація блювотними масами, аспіраційна пневмонія. Основним методом вирішення цих проблем є:

*** А) Відсмоктування вмісту з дихальних шляхів**

- В) Дренажне положення в ліжку
- С) Застосування інгаляції зволоженого кисню
- Д) Дихальна гімнастика
- Е) Застосування дренажів

20. Вкажіть проблему доопераційного періоду, яка може стати причиною кровотечі з післяопераційної рани це:

*** А) Порушення згортання крові**

- В) Зниження АТ
- С) Серцева аритмія
- Д) Порушення обміну речовин
- Е) Раннє вставання з ліжка

21. Чоловік 59 р., ріст - 186 см., вага - 112 кг., скаржиться на поганий апетит, відразу до м'ясних і молочних страв. За останні 3 місяці схуд на 18 кг. Про що може свідчити вказаний симптомокомплекс?

*** А) Рак шлунку**

- В) Рак товстої кишки
- С) Синдром хронічної втоми
- Д) Астенічний синдром
- Е) Виразкова хвороба шлунка

22. Пацієнт 40 років, хворіє виразковою хворобою шлунка. Турбують наростаюча слабкість, запаморочення. Вранці при підйомі з ліжка, пацієнт на декілька секунд втратив свідомість, зблід. Симптоми подразнення очеревини відсутні. Яке ускладнення виразкової хвороби медична сестра запідозрила у пацієнта?

*** А) Кровоточива виразка**

- В) Стеноз ворота
- С) Пенетрація виразки
- Д) Перфорація виразки
- Е) Малігнізація виразки

23. Потерпілого Ж., 44 років, оперують з приводу внутрішньочеревної кровотечі після автомобільної катастрофи. В яких випадках можна використовувати кров пацієнта з черевної порожнини з метою аутогемотрансфузії?

*** А) Розрив селезінки**

- В) Розрив печінки
- С) Розрив тонкого кишківника
- Д) Розрив сечового міхура
- Е) Розрив шлунка

24. У приймальне відділення хірургічного стаціонару доставлено пацієнта з підозрою на розрив селезінки. Назвіть метод дослідження, що є найбільш інформативним для підтвердження діагнозу?

*** А) Лапароцентез**

- В) Рентгенографія
- С) Колоноскопія
- Д) УЗД
- Е) Фіброгастроскопія

25. Пацієнт 21 року, госпіталізований в хірургічне відділення зі скаргами на біль в нижній частині живота, нудоту, блювання. Об'єктивно: стан хворого середнього ступеня важкості, язик сухий. Живіт м'який, при пальпації різко болючий в правій здухвинній ділянці. Позитивні симптоми Щоткіна-Блюмберга, Ровзінга. В аналізі крові - лейкоцитоз - $14 \cdot 10^6/\text{л}$, із зсувом формули вліво. Вкажіть найвірогідніший діагноз у даного пацієнта?

*** А) Гострий апендицит**

- В) Гострий панкреатит
- С) Виразкова хвороба шлунку
- Д) Апоплексія яйника
- Е) Гострий холецистит

26. У пацієнта 49 років, на 4-й день після резекції шлунка виник постійний інтенсивний біль в животі. Положення в ліжку на спині з підтягнутими до живота ногами. Загальний стан важкий. Температура тіла - $37,8^{\circ}\text{C}$, АТ- 100/60 мм рт.ст., пульс - 104/хв. Язик сухий. Живіт здутий, ліва половина відстає під час дихання. Симптоми Воскресенського, Щоткіна-Блюмберга позитивні. Назвіть ймовірне післяопераційне ускладнення:

*** А) Перитоніт**

- В) Кишкова непрохідність
- С) Кровотеча
- Д) Панкреатит
- Е) Абсцес

27. Спостерігаючи за пацієнтом К., 20 р. після операції із застосуванням міорелаксантів, Ви помітили, що дихання стало поверхнєве, з'явилися брадіпное та легкий акроціаноз. Який лікарський засіб покращить стан пацієнта?

*** А) Атропіна сульфат 0,1%**

В) Прозерин 0,05%

С) Налорфіну гідро хлорид 0,5%

Д) Цитохром С 0,25%

Е) Розчин бемеґриду 0,5%

28. При огляді пацієнта у приймальному відділенні встановлено: передня черевна стінка не приймає участі в акті дихання, пальпаторно визначається напруження м'язів, болючість, позитивні симптоми подразнення очеревини. Печінкова тупість відсутня, перистальтика не прослуховується. Вкажіть найбільш вірогідний попередній діагноз?

*** А) Перфоративна виразка шлунка**

В) Гострий апендицит

С) Гострий панкреатит

Д) Гостра кишкова непрохідність

Е) Гострий холецистит

29. Пацієнтка скаржиться на біль в правому підребер'ї з іррадіацією в праву лопатку. Було блювання без полегшення. Температура тіла - 37,6°C. Живіт помірно здутий, напружений та болючий в правому підребер'ї. Відмічається помірне напруження м'язів черевної стінки в правому підребер'ї. Симптом Ортнера позитивний. Вкажіть попередній діагноз:

*** А) Гострий холецистит**

В) Гострий апендицит

С) Гострий панкреатит

Д) Гостра кишкова непрохідність

Е) Перфоративна виразка шлунку

30. У хлопчика 10 років різана рана передньої поверхні передпліччя. З рани витікає тонка цівка темної крові. Який метод тимчасової зупинки кровотечі слід застосувати в першу чергу?

- * А) Накласти тиснучу пов'язку**
- В) Пальцеве притиснення артерії
- С) Накласти джгут вище рани
- Д) Накласти джгут нижче рани
- Е) Застосувати міхур з льодом

31. Під час огляду потерпілої, яка доставлена з місця пожежі, медична сестра діагностувала: шкіра обох рук від плечових суглобів до пальців гіперемована, набрякла, з великою кількістю пухирів різної величини з прозорим та геморагічним вмістом. Рс- 110/хв., АТ- 100/70 мм рт.ст. Пацієнтка голосно скаржиться на біль в руках. Який вид шоку можливий у пацієнтки?

- * А) Опіковий**
- В) Травматичний
- С) Хірургічний
- Д) Септичний
- Е) Анафілактичний

32. Медсестра проводить обстеження пацієнта з відмороженням правої ступні. Виберіть, який із симптомів є характерним тільки для дореактивного періоду?

- * А) Втрата чутливості**
- В) Поява болю
- С) Гіперемія шкіри
- Д) набряк тканин
- Е) Підвищення температури

33. Дві години тому жінка впала на вулиці, самостійно пересуватись не може. Скарги на біль у лівій гомілці. При огляді ліва гомілка в нижній третині набрякла, а в середній тертині деформована. В місці деформації визначається біль і крепітація. Що може запідозрити медична сестра?

*** А) Перелом гомілки**

- В) Забій гомілки
- С) Розтягнення зв'язок
- Д) Вивих у суглобі
- Е) Розрив м'язів

34. Пацієнту з ВІЛ-інфекцією планується провести розкриття панарицію І пальця правої кисті. Який із названих антисептиків ви підготуєте для обробки рук хірурга?

*** А) Бетадин**

- В) Спирт етиловий
- С) Хлоргексидин
- Д) Хлорантоїн
- Е) Діамантовий зелений

35. До вас звернувся знайомий, який хворіє гемороєм. Просить пояснити найчастіші причини, що провокують загострення його захворювання. Яка з наведених провокацій є найімовірнішою?

*** А) Вживання алкоголю**

- В) Гарячі ванни
- С) Їзда на велосипеді
- Д) Відмова від жирної їжі
- Е) Застосування проносних

36. У потерпілого К., 39 р., термічний опік лівої кисті. Вкажіть препарат, який застосовують зовнішньо під час надання допомоги:

*** А) Пантенол**

В) Фукорцин

С) Первомур

Д) Бактосин

Е) Йодонат

37. У пацієнта постійні скарги на нудоту, відчуття дискомфорту після прийому густої їжі, періодичне блювання, що приносить полегшення. Яке імовірне ускладнення виразкової хвороби шлунка розвинулось у пацієнта?

*** А) Стеноз**

В) Малігнізація

С) Перфорація

Д) Кровотеча

Е) Пенетрація

38. Ви - медична сестра здоров'я. До вас звернулась жінка із скаргами на високу температуру тіла, серцебиття. Ви виявили напруження м'язів передньої черевної стінки, симптом Мерфі, Георгієвського-Мюсі позитивні. Яке захворювання ви підозрюєте?

*** А) Гострий холецистит**

В) Гострий панкреатит

С) Гострий аппендицит

Д) Гострий аднексит

Е) Гостра кишкова непрохідність

39. Ви - медична сестра. До вас звернувся пацієнт із скаргами на біль в правій здухвинній ділянці. Оглянувши хворого, ви встановили діагноз - гострий апендицит. Які характерні зміни в загальному аналізі крові при даній патології?

*** А) Лейкоцитоз**

В) Тромбоцитоз

С) Еритроцитоз

Д) Лімфоцитоз

Е) Моноцитоз

40. В хірургічне відділення поступив хворий Ж., 51 р., із скаргами на біль в правій гомілці, набряк. Об'єктивно: почервоніння шкіри над венами, вени м'які, різко болючі. Вкажіть ймовірний діагноз:

*** А) Флебїт**

В) Флеботромбоз

С) Артеріїт

Д) Тромбофлебїт

Е) Ліфмангоїт

41. На ФАПі у потерпілого виявлені клінічні ознаки внутрішньої кровотечі. До препаратів першої медичної допомоги при артеріальній кровотечі належить:

*** А) Діцинон**

В) Гідрокортизон

С) Альмагель

Д) Вікасол

Е) Креозол

42. При визначенні груп крові позитивна реакція ізогемаглютинації зі стандартними сироватками A(II) та B(III) груп та негативна з 0(I) та AB(IV) груп. Про що свідчить даний результат?

*** А) Непридатність стандартних сироваток**

- В) Кров A(II) групи
- С) Кров B(III) групи
- Д) Кров 0(I) групи
- Е) Кров AB(IV) групи

43. У хворого раптово виникла загальна слабкість, блювання у вигляді кавової гущі, чорні випорожнення. Яке обстеження потрібно виконати хворому для уточнення діагнозу в першу чергу?

*** А) Езофагогастродуоденофіброскопію**

- В) Рентгенографію шлунку
- С) УЗД органів черевної порожнини
- Д) Фіброколоноскопію
- Е) Ректороманоскопію

44. У хворого раптово виникла загальна слабкість, блювання у вигляді кавової гущі, чорні випорожнення. Який препарат потрібно ввести хворому для лікування?

*** А) Вікасол**

- В) Лазікс
- С) Папаверін
- Д) Но-шпу
- Е) Прозерін

45. Хворий К. 39 р. знаходиться в хірургічному відділенні з масивною крововтратою внаслідок шлунково-кишкової кровотечі. Ризик виникнення якого шоку має цей пацієнт?

- * А) Геморагічного**
- В) Анафілактичного
- С) Кардіогенного
- Д) Цитратного
- Е) Гемотрансфузійного

46. В післяопераційній палаті знаходиться пацієнт з ендотрахеальною трубкою. Вам потрібно провести пацієнтові ендотрахеальне відсмоктування. Що потрібно попередньо зробити?

- * А) Провести гіпервентиляцію 100% киснем**
- В) Надати пацієнту відповідну позицію
- С) Застосувати знеболюючі засоби
- Д) Пацієнт повинен глибоко подихати
- Е) Ввести спазмолітичні засоби

47. Перед апендектомією Ви проводите пацієнту К., 45 р. премедикацію. З якою метою Ви вводите розчин атропіну сульфату?

- * А) Зменшує секрецію залоз**
- В) Прискорює серцеві скорочення
- С) Запобігає блюванню
- Д) Посилює дію анальгетиків
- Е) Звужує зіниці

48. Під час профілактичного огляду пацієнтки Л., 53 р. встановлено втягнутість соска правої молочної залози, при натискуванні на сосок виділяється крапля крові. До якого спеціаліста слід звернутися пацієнтці на консультацію?

*** А) Онколога**

В) Рентгенолога

С) Терапевта

Д) Фтизіатра

Е) Ендокринолога

49. На прийом до хірурга поліклініки звернувся пацієнт О., 35 р. з пораненням правої гомілки. З'ясовано, що протягом 3-х останніх років пацієнт не отримував щеплення проти правця. Який препарат слід приготувати для екстреної профілактики правця у даного пацієнта?

*** А) Правцевий анатоксин**

В) Протиправцеву сироватку

С) Протиправцевий конячий імуноглобулін

Д) Правцевий анатоксин та протиправцеву сироватку

Е) АКДС

50. Пацієнт К., 43 р. скаржиться на переймоподібний біль в животі, нудоту, блювання, відсутність випорожнень та відходження газів. Живіт здутий, перистальтика кишечника відсутня. З чим пов'язаний даний стан пацієнта?

*** А) З гострою кишковою непрохідністю**

В) З перфоративною виразкою шлунку

С) З гострим апендицитом

Д) З гострим панкреатитом

Е) З гострим холециститом

51. Пацієнт А., 58 р. скаржиться на біль в животі, що з'явився після вживання жирної смаженої їжі. При обстеженні визначається напруження м'язів та болісність в правому підребер'ї. Позитивні симптоми Ортнера і Щоткіна-Блумберга. Який вірогідний діагноз у даного пацієнта?

*** А) Гострий холецистит**

- В) Гострий панкреатит
- С) Гострий апендицит
- Д) Проривна виразка шлунку
- Е) Гостра кишкова непрохідність

52. Пацієнт Б., 33 р. впав і вдарився головою, свідомості не втрачав, скаржився на головний біль. Прийшовши додому, через 2 години втратив свідомість. Під час огляду: свідомість відсутня, визначається анізокорія. Який вірогідний діагноз в даному випадку?

*** А) Здавлення головного мозку**

- В) Струс головного мозку
- С) Травматичний шок
- Д) Непритомність
- Е) Колапс

53. Пацієнт В., 19 р. отримав хімічний опік правої гомілки концентрованим розчином сірчаної кислоти. Яку речовину Ви застосуєте для нейтралізації кислоти?

*** А) 2% розчин натрію гідрокарбонату**

- В) 2% розчин борної кислоти
- С) 3% розчин пероксиду водню
- Д) 0,9% фізіологічний розчин
- Е) 0,02% розчин фурациліну

54. Для заміщення втраченої крові хірург призначив переливання 1 л свіжоцитратної крові. Медична сестра на кожні 500 мл перелитої донорської крові вводить внутрішньовенно 10 мл 10% розчину кальція хлориду. Якому ускладненню можна запобігти?

*** А) Цитратному шоку**

- В) Геморагічному шоку
- С) Тромбозу судин
- Д) Інфікуванню рани
- Е) Алергічній реакції

55. На місці пригоди Ви надаєте невідкладну допомогу потерпілому з відкритим переломом стегна, ускладненим артеріальною кровотечею. Проведено тимчасове спинення кровотечі за допомогою джгута, введено знеболюючі. Який етап надання допомоги буде наступним?

*** А) Накласти асептичну пов'язку**

- В) Доставити у стаціонар
- С) Покласти міхур з льодом
- Д) Провести іммобілізацію
- Е) Заповнити меддокументацію

56. Хворий знаходиться в післяопераційному періоді з приводу геморойектомії. Укажіть фактори високого ризику, які можуть затримувати відновлення сечовидільної системи:

*** А) Спинномозкова анестезія**

- В) Застосування м'язових релаксантів
- С) Діабет
- Д) Атонія кишок
- Е) Введення великої кількості рідини в/в

57. Жінка отримала опік полум'ям передньої поверхні грудної клітки. Її турбує сильний і пекучий біль. При огляді: гіперемія передньої поверхні грудної клітки, у деяких місцях утворилися пухирці, заповнені світложовтою рідиною.

Визначить площу і ступінь опіку:

- A) 9%, II ступінь
- B) 18%, II ступінь
- C) 9%, III А ступінь
- D) 18%, III Б ступінь
- E) 4%, IV ступінь

58. Пацієнтка Й., 65 р. лікується у травматологічному відділенні з приводу перелому шийки правого стегна. Проведено операцію, накладено скелетний витяг. Що може бути причиною розвитку остеомієліту?

*** А) Нестерильний інструментарій**

- B) Незростання перелому
- C) Суворий ліжковий режим
- D) Розвиток пролежнів
- E) Остеопороз кісток

59. В хірургічний кабінет поліклініки звернувся пацієнт Г., 28 р. зі скаргами на різкий біль, почервоніння з фістончатими межами, набряк шкіри в нижній третині правої гомілки, температуру тіла - 39°C. Про яке захворювання можна подумати ?

*** А) Бешиха**

- B) Варикозна хвороба
- C) Тромбофлебіт
- D) Лімфаденіт
- E) Облітеруючий ендартеріїт

60. За допомогою звернувся пацієнт Д., 58 р. зі скаргами на біль в животі, нудоту, блювання. Об'єктивно виявлено: напружене та болюче вип'ячування в паховій ділянці справа. Що можна запідозрити?

*** А) Защемлення пахової кили**

- В) Защемлення пупкової кили
- С) Незащемлену пахову килу
- Д) Незащемлена стегнова кила
- Е) Невправима калиткова кила

61. За порадою звернувся сусід М., 42 р. зі скаргами на біль в животі, загальну слабкість. Три години тому по дорозі додому зчинилася бійка, при якій отримав удар ногою в живіт. При огляді: живіт участі в акті дихання не бере, при пальпації м'який, справа відмічається біль і напруження м'язів. Пульс в межах норми. Що необхідно зробити в першу чергу?

*** А) Холод на живіт**

- В) Грілку на живіт
- С) Ввести знеболюючі
- Д) Ввести спазмолітики
- Е) Заборонити пити

62. До хірурга в поліклініку звернувся пацієнт Ж., 67 р. зі скаргами на біль в ногах, який виникає під час ходьби, що змушує його зупинятися. Через 1-2 хвилини біль зникає. Для якого захворювання характерні ознаки?

*** А) Облітеруючого атеросклерозу**

- В) Варикозного розширення вен
- С) Тромбофлебиту
- Д) Флеботромбозу
- Е) Хвороби Бюргера

63. Пацієнта Н., 25 р. прооперовано в хірургічному відділенні з приводу неускладненої перфоративної виразки дванадцятипалої кишки. З якого дня пацієнту починається ентеральне харчування?

*** А) 2-го дня**

В) 1-го дня

С) 4-го дня

Д) 5-го дня

Е) 7-го дня

64. Пацієнтка 46 р. перебуває на лікуванні в хірургічному відділенні після апендектомії. Виберіть, що є характерним для катаболічної фази післяопераційного періоду?

*** А) Підвищений розпад власних білків**

В) Початок активного синтезу білків

С) Загоєння рани

Д) Активне жирутворення

Е) Нормалізація температури тіла

65. Пацієнту С. зі шлунковою кровотечею призначено введення кровоспинних препаратів. Який з препаратів належить до біологічного методу гемостазу?

*** А) Фібриноген**

В) Вікасол

С) Андроксон

Д) Натрія етамзилат

Е) Амінокапронова кислота

66. Пацієнт Ф., 29 р., з травматичним ушкодженням нирок знаходиться першу добу на лікуванні в урологічному відділенні. Які зміни будуть інформативним при цьому стані?

*** А) Гематурія**

- В) Парадоксальна ішурія
- С) Поліурія
- Д) Полакіурія
- Е) Странгурія

67. Медична сестра проводить обстеження пацієнта Л., 35 р. з черепно-мозковою травмою. Що буде найдостовірнішим при забої головного мозку на 2 добу?

*** А) Вогнищева симптоматика**

- В) Загальна слабкість
- С) Головний біль
- Д) Порушення сну
- Е) Запаморочення

68. Пацієнтові, який знаходиться на лікуванні в онкологічному диспансері з приводу раку шлунка, призначено хіміотерапію. Яка побічна дія цитостатичних препаратів?

*** А) Блювання**

- В) Дисфагія
- С) Анізокорія
- Д) Закрепи
- Е) Гіпотермія

69. В поліклініку до хірурга звернувся пацієнт М., 59 р. з приводу виразкової хвороби шлунка. Який метод обстеження для виключення підозри на пухлину є надійшим та найдоступнішим?

*** А) Фіброгастроскопія**

- В) Рентгенографія
- С) Шлункове зондування
- Д) Рентгеноскопія
- Е) Лапароскопія

70. На лікуванні в онкологічному диспансері знаходиться пацієнт Н., 50 р. з приводу пухлини легень. Яке із досліджень є найінформативнішим?

*** А) Гістологічне**

- В) Бактеріологічне
- С) Імунологічне
- Д) Цитогенетичне
- Е) Біохімічне

71. До хірурга в поліклініку звернулась жінка С., 55 р. зі скаргами на збільшення родимої плями в ділянці правої скроні. При огляді: пігментна пляма чорно-коричневого кольору, виступає над поверхнею шкіри. Що Ви запідозрите?

*** А) Меланома**

- В) Саркома
- С) Епітеліома
- Д) Ангіома
- Е) Фіброма

72. Ви медсестра оглядового кабінету поліклініки, разом з лікарем-онкологом приймаєте участь в огляді пацієнтки К., 49 р. При пальпації лівої молочної залози у верхньозовнішньому квадранті виявили щільне, бугристе утворення, спаяне зі шкірою. Про яке захворювання можна подумати?

*** А) Рак молочної залози**

- В) Фібroadеному
- С) Ліпому
- Д) Аденому
- Е) Кісту молочної залози

73. У поліклініку звернувся пацієнт М., 42 р., зі скаргами на кашель з домішками крові, тяжкість при диханні. Помітно землистий колір обличчя. Курить по пачці цигарок в день. Для уточнення діагнозу лікар призначив рентгенографію органів грудної клітки. Про яке захворювання можна подумати?

*** А) Рак легені**

- В) Запалення легені
- С) Бронхіт
- Д) Бронхоектатичну хворобу
- Е) Абсцес легені

74. У жінки О., 63 р. під час проведення профілактичного огляду грудних залоз виявлено: почервоніння та потовщення соска лівої молочної залози, наявні кірочки, струпи. Після їх зняття з'явилася волога і зерниста поверхня шкіри. Як називається таке захворювання?

*** А) Рак Педжета**

- В) Рак медулярний
- С) Аденокарцинома
- Д) Аденома
- Е) Кіста

75. У проктологічне відділення на лікування поступив пацієнт М., 69 р. зі скаргами на біль в ділянці заднього проходу, який посилюється під час дефекації. Стілець у вигляді “стрічки”, зі свіжою кров’ю. Що можна запідозрити?

*** А) Рак прямої кишки**

- В) Поліп прямої кишки
- С) Тріщини прямої кишки
- Д) Парапроктит
- Е) Випадіння прямої кишки

76. Пацієнт Ф., 59 р. проводиться резекція шлунку під загальним знеболюванням. Об’єктивно: обличчя бліде, зіниці розширені, тонус м’язів різко знижений. АТ- 90/60 мм рт.ст. Якій стадії наркозу відповідають такі ознаки?

*** А) III**

- В) I
- С) II
- Д) IV
- Е) V

77. У потерпілого констатовано клінічну смерть. Проводиться серцево-легенева реанімація. Що з перерахованого нижче свідчить про ефективність непрямого масажу серця?

*** А) Пульсація на сонній артерії**

- В) Мимовільні рухи грудної клітки
- С) Підвищення температури тіла
- Д) Рухи епігастральної ділянки
- Е) Перелом ребер

78. Під час проведення проби на біологічну сумісність крові у пацієнта Ч., 29 р. з'явилися: стурбованість, утруднене дихання, свербіж шкіри. При огляді виявлена крупноплямиста висипка, набряк обличчя. Який стан розвинувся?

*** А) Анафілактична реакція**

- В) Септичний шок
- С) Пірогенна реакція
- Д) Гемолітична реакція
- Е) Цитратний шок

79. Для інтубації трахеї пацієнта використали міорелаксанти короткої дії - дитилін. Чим усунути його залишкову дію?

А) Адреналіном

*** В) Прозерином**

- С) Налоксоном
- Д) Мезатоном
- Е) Атропіном

80. Утопленого чоловіка доставили на берег через 6 хв. Розпочали непрямий масаж серця та ШВЛ. Яка з перерахованих нижче ознак свідчить про ефективність реанімаційних заходів?

*** А) Звуження зіниць**

- В) Підвищення АТ
- С) Прискорення пульсу
- Д) Розширення зіниць
- Е) Прискорення дихання

81. Пацієнтові в післяопераційний період помилково замість 5000 ОД ввели 10000 ОД гепарину. Який медикамент використаєте для нейтралізації його надлишку?

*** А) Протаміна сульфат**

- В) Адреналіна гідрохлорид
- С) Атропіна сульфат
- Д) Натрія гідрокарбонат
- Е) Кальція хлорид

82. Операція з приводу апендектомії закінчилась на 10 хв. раніше запланованого часу. Пацієнт перебуває під дією фентанілу. Що з перерахованого необхідно застосувати для його нейтралізації?

*** А) Налоксон**

- В) Атропін
- С) Мезатон
- Д) Прозерин
- Е) Адреналін

83. Під час профілактичного обстеження в жіночій консультації у пацієнтки Л., 65 р. при пальпації молочних залоз виявили ущільнення розміром - 0,5 см в діаметрі у верхньому квадранті правої молочної залози. Яке з перерахованих нижче обстежень слід провести першочергово?

*** А) Мамографію**

- В) Загальноклінічні аналізи
- С) Рентгенографію
- Д) Біопсію
- Е) Сцинтиграфію

84. В хірургічному відділенні готується до планової операції пацієнт К. 55 р., в анамнезі якого порушення периферичного кровообігу нижніх кінцівок. Яке ускладнення може виникнути в післяопераційному періоді?

*** А) Тромбоз вен**

- В) Розвиток пневмонії
- С) Динамічна кишкова непрохідність
- Д) Запалення країв рани
- Е) Реактивний психоз

85. Ви працюєте в урологічному відділенні. Вам запропонували підготувати розчин індигокарміну. До якого дослідження готується пацієнт?

*** А) Хромоцистоскопії**

- В) Внутрішньовенної урографії
- С) Ретроградної піелоуретерографії
- Д) Антеградна урографія
- Е) Ниркова флебографія

86. В хірургічне відділення поступив хворий для ургентної операції з приводу апендектомії. 2 години тому, під час обіду, виник біль у правій здухвинній ділянці. Що слід зробити при підготовці пацієнта до операції?

*** А) Відсмоктати шлунковий вміст**

- В) Повну санітарну обробку
- С) Пробу на антибіотик
- Д) Часткову санітарну обробку
- Е) Промити шлунок

87. До хірургічного відділення поступає пацієнт Р., 31 р., якому 20 хвилин тому електропилою відрізано II палець правої кисті. Пацієнт блідий, кисть замотана ганчіркою, яка сильно просякла кров'ю. В целофановому пакеті знаходиться відрізаний палець. Що слід зробити при наданні першої допомоги?

*** А) Накласти джгут на культю**

- В) Накласти асептичну пов'язку
- С) Ввести знеболюючі препарати
- Д) Ампутований палець помістити в пакет з холодною водою
- Е) Ввести мезатон

88. У хворого Р., 42 р. після трансфузії - 500 мл крові, стабілізованої цитратом натрію, з'явилися судом, неспокій, прискорення пульсу, зниження тиску, утруднення дихання. Яке ускладнення у хворого?

*** А) Цитратний шок**

- В) Алергічна реакція
- С) Анафілактичний шок
- Д) Пірогенна реакція
- Е) Гемотрансфузійний шок

89. У хворого Б., 45 р. з паховою грижою після важкої фізичної праці з'явився різкий біль в ділянці грижі, вона стала болючою, твердою, перестала вправлятися. Живіт нерівномірно здутий, гази не відходять. Яке ускладнення сталося у хворого?

*** А) Защемлення грижі**

- В) Невправимість грижі
- С) Запалення грижі
- Д) Копростаз
- Е) Кишкова непрохідність

90. У хворого А. 28 р. ін'єкційного наркомана, після внутрішньовенного введення розчину саморобного наркотику з'явився біль, почервоніння шкіри та ущільнення по ходу вени лівої ступні. Яке ускладнення трапилося?

*** А) Гострий тромбофлебіт**

- В) Гострий підшкірний абсцес
- С) Гостра флегмона
- Д) Постін'єкційний інфільтрат
- Е) Гангрена ноги

91. Пацієт К. 35 р. поступив у хірургічне відділення для хірургічного лікування грижі в плановому порядку. Скаржиться на алергію та безсоння. Вкажіть препарат вибору для вирішення проблем пацієнта:

*** А) Дімедрол**

- В) Еуноктин
- С) Фенкарол
- Д) Настоянка валеріани
- Е) Хлористий кальцій

92. В післяопераційному періоді у хворого почалося різке падіння артеріального тиску та пригнічення дихальної діяльності. Який препарат необхідно ввести хворому?

*** А) Кордіамін**

- В) Еуфілін
- С) Мезатон
- Д) Фенобарбітал
- Е) Адреналін

93. Після удару в живіт у хворого виникла паралітична кишкова непрохідність. Виберіть препарат для відновлення перистальтики кишок:

*** А) Прозерин**

- В) Но-шпа
- С) Адреналін
- Д) Спазмалгон
- Е) Дімедрол

94. На 7 день у пацієнта К., 48 р. після апендектомії турбує помірний біль у ділянці рани. Чим оптимально зняти біль?

*** А) Ненаркотичними анальгетиками**

- В) Наркотичними анальгетиками
- С) Димедролом
- Д) Транквілізаторами
- Е) Снодійними засобами

95. Що повинна зробити сімейна медична сестра, якщо у пацієнта в ділянці післяопераційного рубця з'явилося обмежене невелике болісне почервоніння?

*** А) Направити на консультацію до лікаря**

- В) Провести курс антибіотикотерапії
- С) Зробити розтин почервоніння
- Д) Прикласти серветку з гіпертонічним розчином
- Е) Порекомендувати носити бандаж в ділянці рубця

96. Хворий знаходиться в хірургічному відділенні після апендектомії. Укажіть фактор високого ризику, який затримує відновлення дихальної системи у даного пацієнта:

- * А) Застосування морфіну**
- В) Спинномозкова анестезія
- С) Тривалі блювання
- Д) Діабет
- Е) Зупинка дихання під час операції

97. Чотири дні тому хворий А, 56 р. прооперований з приводу варикозного розширення вен. Що в післяопераційному періоді сприяє тромбоутворенню у даного пацієнта?

- * А) Уповільнений кровотік у ногах**
- В) Раннє вставання з ліжка
- С) Пізнє вставання з ліжка
- Д) Захворювання серця
- Е) Гіпокоагуляція

98. Хворий Б, 35 р. знаходиться в післяопераційному періоді. Коли можливе виникнення післяопераційної злаякісної гіпертермії?

- * А) У межах 2-3-х годин після операції**
- В) Протягом усього раннього післяопераційного періоду
- С) Протягом першої доби після операції
- Д) У межах перших 2-х діб після операції
- Е) Протягом першої години після операції

99. Ви медична сестра хірургічного відділення, спостерігаєте у хворого Г., 48 р. післяопераційне тремтіння. Чим зняти даний стан у пацієнта?

*** А) Інгаляцією киснем**

- В) Зігріванням хворого
- С) Заспокоїти пацієнта
- Д) Заспокоїливими засобами
- Е) Протиаритмічними засобами

100. Після операції у хворого виникла гикавка. Як від неї звільнити пацієнта?

*** А) Повторним вдиханням вуглекислого газу протягом 5 хв.**

- В) Інгаляцією зволженим киснем протягом 5-7 хв.
- С) Допомогти затримати дихання протягом 3-5 хв.
- Д) Інтенсивно постукати по спині
- Е) Налякати

101. Ви медична сестра маніпуляційного кабінету хірургічного відділення, яка постійно займається визначенням груп крові. Що обов'язково повинно бути на вашому робочому місці?

*** А) Протиснідну аптечку**

- В) 2 пари гумових рукавичок
- С) Фартух
- Д) Маску
- Е) 1 пару гумових рукавичок

102. Пацієнтку Д., 35 р. готують до планового оперативного втручання. Яка проблема у даної хворої може стати причиною післяопераційної кровотечі?

*** А) Поява менструації в жінок**

- В) В анамнезі - носові кровотечі
- С) Підвищення температури тіла
- Д) Синусова аритмія
- Е) Часті проноси

103. Як часто медична сестра повинна контролювати пульс, артеріальний тиск та загальний стан хворого в перший день після операції?

*** А) Через кожні 2 години**

- В) Через кожну годину
- С) Через кожні 30 хвилин
- Д) Через кожні 4 години
- Е) Через кожні 6 годин

104. Хворий К., 2 доба після великої операції. Проводиться знеболення наркотичними анальгетиками згідно призначення лікаря. Яка ускладнення вони можуть викликати у хворого?

*** А) Пригнічують дихання**

- В) Спричиняють спазм периферійних судин
- С) Спричиняють брадикардію
- Д) Підвищують артеріальний тиск
- Е) Порушують мозковий кровообіг

105. Пацієнт М., 39 р. знаходиться другу добу в післяопераційній палаті відділення інтенсивної терапії. При якій умові хворого НЕ МОЖНА спонукати до кашлю?

*** А) Після нейрохірургічних операцій**

- В) У разі хронічної дихальної недостатності
- С) У разі великого післяопераційного розтину
- Д) У перші 3 доби після операції
- Е) За наявності трахеостомічної трубки

106. Ви - медсестра-анестезистка. Лікар проводить інтубацію трахеї. Для виконання цієї маніпуляції використовують:

*** А) Ларингоскоп**

- В) Стетоскоп
- С) Езофагоскоп
- Д) Фіброгастроскоп
- Е) Ірігоскопію

107. У приймальне відділення доставили хворого з підозрою на гострий панкреатит. Які із нижче приведених лабораторних досліджень найбільш інформативно підтверджують діагноз?

*** А) Аналіз сечі на діастазу**

- В) Загальний аналіз крові
- С) Аналіз крові на цукор
- Д) Аналіз сечі на цукор
- Е) Аналіз крові на білірубін

108. Який з методів обстеження прямої кишки дозволяє з'ясувати консистенцію та рухомість пухлини?

*** А) Пальцеве обстеження**

- В) Іригоскопія
- С) Ректороманоскопію
- Д) УЗД
- Е) Реографія

109. В приймальне відділення доставлено хворого з підозрою на перфорацію виразки шлунка. Який із методів діагностики може підтвердити діагноз?

*** А) Оглядова рентгенографія**

- В) УЗД органів живота
- С) Ірігоскопія
- Д) Контрасна рентгенографія
- Е) Реографія

110. В травматологічне відділення поступив пацієнт 23 р. з гемартрозом правого колінного суглоба. З анамнезу з'ясовано, що у пацієнта гемофілія. Вкажіть препарат, який необхідно обов'язково застосувати перед пункцією суглоба:

*** А) Кріопреципітат**

- В) Альбумін
- С) Фібрінолізин
- Д) Імуноглобулін
- Е) Плазма

111. Пацієнту 53 років була зроблена операція: апендиктомія дренування черевної порожнини. Він знаходиться у реаніміційному відділенні. Для запобігання скупчення ексудату в надпечінковому просторі медсестра повинна надати положення пацієнту:

*** А) Напівсидяче**

- В) На спині
- С) На правому боці
- Д) На лівому боці
- Е) З опущеним головним кінцем

112. В хірургічне відділення поступив пацієнт А., 48 років з діагнозом гострий апендицит. Для премедикації медсестрі необхідно підготувати наступні розчини:

*** А) Промедолу, димедролу, атропіну**

- В) Еуфіліну, анальгіну, мезатону
- С) Промедолу, анальгіну, адреналіну
- Д) Промедолу, хлористого кальцію, атропіну сульфату
- Е) Атропіну сульфату, еуфеліна, вікасолу

113. У пацієнта 45 р. скарги на сильний біль в лівій поперековій ділянці, який віддає в стегно; часте сечовипускання, одноразове блювання. Симптом Пастернацького позитивний зліва. Вкажіть препарат, який найдоцільніше використати для надання першої медичної допомоги:

*** А) Баралгін**

- В) Лазикс
- С) Нітроксолін
- Д) Цистінал
- Е) Авісан

114. Оглядаючи пацієнта Ч., 35 р., після побиття невідомими, Ви виявили наступні клінічні ознаки: біль, набряк тканин у лобковій та пахвинній ділянках живота, напруження м'язів, позитивний симптом Щоткіна-Блюмберга, анурію. Про що слід подумати?

*** А) Ушкодження сечового міхура**

- В) Ушкодження сечоводів
- С) Ушкодження нирок
- Д) Пошкодження уретри
- Е) Ушкодження товстого кишечника

115. В операційному залі хворому Д., 18 років, проводиться оперативне лікування - апендиктомія, під загальним знеболенням. Медична сестра анестезистка під час наркозу проводить заповнення медичної документації:

*** А) Анестезіологічну карту**

- В) Листок спостереження
- С) Температурний листок
- Д) Історію хвороби
- Е) Медичний кросворд

116. Пацієнт 55 р., в хірургічному відділенні, готується флебектомії лівої нижньої кінцівки. При підготовці операційного поля медична сестра помітила фурункул в нижній третині стегна. Лікар відмінив оперативне втручання. Виникнення якої потенційної проблеми було попереджено?

*** А) Нагноєння післяопераційної рани**

- В) Тромбофлебіт
- С) Підшкірну гематому
- Д) Варикозне розширення вен
- Е) Тромбоз

117. Пацієнту 75 років, виконана операція з приводу пухлини прямої кишки і накладена колостома. Визначте, яка потенційна проблема може виникнути у даного пацієнта в пізньому післяопераційному періоді?

A) Кишкова колька

*** B) Мацерація шкіри**

C) Біль у животі

D) Затримка стільця

E) Не може здійснити самоогляд

118. Пацієнт у плановому порядку готується до оперативного лікування. Назвіть стандартну процедуру для очищення травного каналу перед плановою операцією:

*** A) Ставлять очисну клізму**

B) Промивають шлунок

C) Відсмоктують шлунковий вміст

D) Призначають проносні засоби

E) Призначають білкову дієту

119. Пацієнт знаходиться в палаті інтенсивної терапії після операції на кишківнику. З якою метою медична сестра спонукає його до глибокого дихання в ранній післяопераційний період?

*** A) Для профілактики розвитку ателектазів**

B) Для усунення бронхоспазмів

C) Для зменшення хвилювання

D) Для усунення виділень з дихальних шляхів

E) Для профілактики дихальної недостатності

120. У пацієнта Ш., 49 р. після переливання крові виникла блідість обличчя, біль у поперековій ділянці. Прогресуюче знизився АТ. Яке ускладнення виникло у даного пацієнта?

*** А) Гемотрансфузійний шок**

- В) Кардіогенний шок
- С) Геморагічний шок
- Д) Гострий пієлонефрит
- Е) Гостра пневмонія

121. Прибувши на пожежу на машині швидкої допомоги Ви побачили людину в якої тліє одяг. На обличчі і кистях рук опіки II ступеня. З чого починається надання першої медичної допомоги?

*** А) Усунення дії термічного чинника**

- В) Закриття опікової рани
- С) Імобілізації рук
- Д) Евакуації постраждалого
- Е) Загальне знеболення

122. Реалізуючи план медсестринських втручань, медсестра хірургічного відділення повинна навчити пацієнта, після видалення вени (флебектомії):

*** А) Накладати еластичний бинт**

- В) Виконувати лікувальний масаж
- С) Міняти положення тіла в ліжку
- Д) Дотримуватися дієти
- Е) Вимірювати температуру тіла

123. На другу добу після лапаротомії, яка відбувалася під ендотрахеальним наркозом, лікар призначив пацієнту В. 31 р., повертатися збоку на бік, проводити дихальну гімнастику, лужні інгаляції. Для запобігання якого ускладнення це потрібно виконувати?

*** А) Бронхіту**

- В) Парезу кишківника
- С) Тромбозу
- Д) Емболії
- Е) Покращення виділення з дренажу

124. Швидка допомога доставила пацієнта в хірургічне відділення з травмою правої нижньої кінцівки. Стан постраждалого тяжкий; АТ- 100/60 мм рт.ст., Рс- 100/хв., пацієнт блідий, загальмований, об'єктивно: нижня кінцівка холодна на дотик, множинні рани забруднені землею, виражений набряк, м'язи сірого кольору, вибухають. Яке захворювання можна запідозрити?

*** А) Газова гангрена**

- В) Правець
- С) Синьогнійна інфекція
- Д) Флегмона кінцівки
- Е) Бешихове запалення

125. До вас звернувся сусід 45 років зі скаргами на біль у правій здухвинній ділянці. Після підйому вантажу з'явився різкий біль в місці випинання, яке пацієнт не зміг вправити у черевну порожнину. При огляді: у правій здухвинній ділянці - різкоболюче, напружене випинання. Який попередній діагноз можна запідозрити?

*** А) Защемлена грижа**

- В) Вправима грижа
- С) Невправима грижа
- Д) Незащемлена грижа
- Е) Неускладнена грижа

126. Ви проводите обстеження пацієнта Р., 42 р., який протягом останніх 7 років хворіє на виразкову хворобу шлунку. Під час роботи на присадибній ділянці у нього з'явився “кинджальний” біль в животі. При огляді - блідість шкіри та слизових, холодний піт, пульс - 115/хв., АТ- 105/65 мм рт.ст., живіт дошкоподібний, позитивний симптом Щоткіна-Блюмберга, перкуторно - зникнення печінкової тупості. Поставте попередній діагноз:

*** А) Перфоративна виразка**

- В) Кровоточива виразка
- С) Гострий холецистит
- Д) Гострий апендицит
- Е) Гострий панкреатит

127. Хворий, 30р., поступив у хірургічне відділення зі скаргами на біль у ділянці рани і посмикуванням м'язів, набряк кінцівки, головний біль, підвищення температури тіла до 39°C, серцебиття. Шкіра холодна на дотик, забруднена землею. Поставте діагноз:

*** А) Правець**

- В) Бешиха
- С) Флегмона
- Д) Ангіна
- Е) Газова гангрена

128. Ви проводите обстеження пацієнта, який звернувся зі скаргами на сіпаючий біль в ІІІ пальці правої кисті. Три дні тому під час роботи на присадибній ділянці поранив палець, але рану не обробив і за медичною допомогою не звертався. Останню ніч не спав внаслідок нестерпного болю. Призначено вскриття гнояка. Який вид знеболення тут застосують?

- A) За Оберстом-Лукашевичем
- B) За Школьніковим
- C) За Вишневським
- D) За Селівановим
- E) Загальне знеболення

129. В приймальному відділенні Ви проводите клінічне обстеження потерпілого В., 39 років з черепно-мозковою травмою. Об'єктивно: потерпілий непритомний, із зовнішнього слухового проходу та носових ходів повільно витікає рідина рожевого кольору. Навколо обох очей - крововилив. АТ- 105/55 мм рт.ст., пульс - 65/хв. Про який попередній діагноз можна подумати?

*** А) Перелом основи черепа**

- B) Перелом склепіння черепа
- C) Перелом скулових кісток
- D) Стиснення мозку
- E) Внутрішньочерепна гематома

130. При клінічному обстеженні пацієнта Н., 32 р., Ви виявили скарги на біль під час дефекації, виділення слизу та крові з анусу протягом 2 тижнів. Виберіть метод дослідження, який буде інформативним для уточнення діагнозу?

*** А) Ректороманоскопія**

- B) Рентгеноскопія
- C) Ультразвукове обстеження
- D) Гастроскопія
- E) Фіброгастроезофагоскопія

131. Ви проводите клінічне дослідження пацієнта К., 70 років. Об'єктивно: стан важкий, шкіра бліда, пульс - 120/хв., АТ- 85/55 мм рт.ст. Язик сухий, обкладений. Живіт незначно здутий, при пальпації виявлено позитивний симптом Валя, шум плеску. На оглядовій рентгенографії - наявність кількох горизонтальних рівнів рідини у кишківнику. Поставте попередній діагноз:

*** А) Кишкова непрохідність**

- В) Гострий холецистит
- С) Гострий панкреатит
- Д) Ниркова колька
- Е) Гострий апендицит

132. Хворий Н., 72 років скаржиться на утруднене сечовиділення. Він відмічає, що сеча виділяється тонким струменем, іноді краплями, часте сечовипускання вночі. Поставте попередній діагноз:

*** А) Аденома простати**

- В) Гострий простатит
- С) Гострий уретрит
- Д) Туберкульоз сечового міхура
- Е) Сечокам'яна хвороба

133. Ви проводите клінічне обстеження пацієнта Р., 46 років з опіком полум'ям до 20% поверхні тіла, із них глибокий опік - до 15%. На 3 день після опіку у нього підвищилась температура тіла до 39°C, з'явилися озноб, спрага, нудота, блювання, пацієнт став збудженим. Яка стадія опікової хвороби у хворого?

*** А) Стадія токсемії**

- В) Торпідна стадія шоку
- С) Стадія септико-токсемії
- Д) Стадія реконвалесценції
- Е) Ерективна стадія шоку

134. Ви проводите клінічне обстеження пацієнта з синдромом тривалого стиснення. Виберіть, який з симптомів буде характерним для II періоду даного захворювання:

*** А) Гостра ниркова недостатність**

- В) Нормалізація функції нирок
- С) Локальні зміни в ушкоджених тканинах
- Д) Бактеріальні ускладнення
- Е) Ендогенна інтоксикація

135. Ви проводите клінічне обстеження пацієнта С., 45 років з опіком гарячим металом першого пальця правої руки. Шкіра в місці ушкодження стала щільною, набула темно-коричневого кольору, з'явилась чітка межа із непошкодженими тканинами. Рухи і чутливість в пальці відсутні. Поставте діагноз:

*** А) Суха гангрена**

- В) Хімічний опік I ст.
- С) Хімічний опік II ст.
- Д) Волога гангрена
- Е) Термохімічний опік IV ст

136. За допомогою звернувся пацієнт Л., 25 років, у якого після катання на лижах наявне зниження чутливості в ділянках носа, щік та чола. При огляді шкіра бліда та холодна на дотик. Виберіть, що з переліченого характеризує стан потерпілого:

*** А) Дореактивний період відмороження**

- В) Початкова стадія загального відмороження
- С) Загальне переохолодження
- Д) Реактивний період відмороження
- Е) Відмороження II ступеню

137. Ви провели клінічне обстеження пацієнта Р., 46 років зі скаргами на оперізуючий біль у поперековій ділянці справа, часте сечовипускання, іррадіацію болю в промежину, одноразове блювання. При огляді: позитивний симптом Пастернацького справа. Про яке захворювання можна думати?

*** А) Сечокам'яна хвороба**

- В) Гострий панкреатит
- С) Гострий холецистит
- Д) Гострий апендицит
- Е) Кишкова непрохідність

138. Пацієнт Ф., 53 р. поступив у торакальне відділення з проникаючим пораненням грудної клітки, ускладненим ушкодженням легенів. здійснена операція - пульмонектомія, призначено дренування плевральної порожнини. Виберіть, необхідний пасивний дренаж:

*** А) Сифонний, за методом Бюлау**

- В) За допомогою 3-х ампульної системи
- С) За допомогою електричного пристрою
- Д) За допомогою водоструминного пристрою
- Е) За допомогою гумового балончика

139. Під час інгаляційного наркозу у хворого внаслідок западання язика виникла зупинка дихання. Ви використали потрібний прийом Сафара, однак це виявилось неефективним. Вкажіть подальшу допомогу у даному випадку:

*** А) Ввести повітровод**

- В) Ввести 2,4% розчин еуфіліну
- С) Ввести 10% розчин кальцію хлориду
- Д) Натискувати на грудну клітку
- Е) Провести дефібриляцію

140. Ви - сімейна медсестра. Вам поступив виклик від матері 4 річного хлопчика, який при купанні протягом 4 хв., знаходився під водою. Відсутній пульс на сонній артерії та дихання, виражений ціаноз шкірних покривів. З чого почнете свої дії?

*** А) Видалити воду з верхніх дихальних шляхів**

- В) Викликати швидку допомогу
- С) Провести масаж серця
- Д) Дати вдихнути нашатирний спирт
- Е) Заспокоїти матір

141. До Вас у медпункт заводу звернулася жінка з скаргами на розпираючий біль у лівій нижній кінцівці, набряк її. В анамнезі варикозне розширення глибоких вен зліва. При огляді Ви виявили збільшення об'єму кінцівки, синюшність. Пульс на артеріях стопи визначається. Ви запідозрили гострий тромбоз глибоких вен лівої ноги. Вкажіть першочергову дію:

*** А) Обкласти міхурами з льодом**

- В) Ввести спазмолітики
- С) Ввести сечогінні
- Д) Припідняти уражену кінцівку
- Е) Зігріваючий компрес на кінцівку

142. До Вас у медпункт звернувся чоловік 28 років, який минулого дня протягом 4-х годин працював на холоді. Скаржиться на біль в кистях, наявність пухирів. При огляді Ви виявили на кистях рук пухирі, заповнені прозорою рідиною, зниження чутливості шкіри у ділянках ураження. Вкажіть вид і ступінь ураження:

*** А) Відмороження II ст.**

- В) Відмороження III А ст.
- С) Опік II ст.
- Д) Опік III ст.
- Е) Відмороження III В ст.

143. Ви операційна медична сестра готуєтесь до виконання оперативного втручання - трахеостомії. Що з переліченого належить до спеціального інструментарію для цієї операції?

*** А) Розширник Труссо**

- В) Гачок Фарабефа
- С) Пінцет хірургічний
- Д) Тризубий гачок
- Е) Скальпель черевцевий

144. Після ДТП у потерпілого Н., 51 р. на місці пригоди визначено відкритий пневмоторакс. Які Ваші дії при наданні йому першої допомоги?

*** А) Накласти оклюзійну пов'язку на вдосі**

- В) Накласти спіралевидну пов'язку на вдосі
- С) Надати положення напівсидячи
- Д) Визначити шоківий індекс Альговера
- Е) Налагодити подачу зволоженого кисню

145. Ви операційна сестра готуєтесь до виконання операції трепанація черепу. Якій інструмент із спеціального набору необхідно підготувати?

*** А) Пила Джиглі**

- В) Пінцет хірургічний
- С) Скальпель ланцетоподібний
- Д) Гачки Фарабефа
- Е) Ампутаційний ретрактор

146. Ви медична сестра швидкої допомоги надаєте допомогу постраждалому після ДТП з відкритою черепно-мозковою травмою. В рані Ви бачите фрагменти кісток, що знаходяться в мозковій тканині. З чого треба почати надання допомоги?

*** А) Накласти на рану стерильну пов'язку**

- В) Ввести внутрішньом'язево морфін
- С) Видалити фрагменти кісток з рани
- Д) Накласти пов'язку "Чепець"
- Е) Провести ПХО рани

147. Пацієнт Н. з необачності взявся за оголений дріт під напругою - 380 вольт. Пацієнт знаходиться без свідомості. Визначте першочергові дії при наданні першої допомоги:

*** А) Звільнити від дії електричного струму**

- В) Провести реанімаційні заходи
- С) Накласти асептичну пов'язку
- Д) Провести туалет порожнини рота
- Е) Провести хірургічну обробку рани

148. Пацієнт 56 р. скаржиться на переймоподібний біль в животі, закрепи, рідкі випорожнення з кров'ю протягом року. Схуд на 15 кг. Шкіра бліда. Живіт м'який, у лівому підребр'ї пальпується помірно болюче, щільне утворення. Аналіз крові: ер.- 3,0-10¹²/л, Нб- 98 г/л. Назвіть найбільш інформативний метод діагностики:

*** А) Колоноскопія (з біопсією)**

- В) УЗД
- С) Комп'ютерна томографія
- Д) Ірігоскопія
- Е) Магніто-резонансна терапія

149. У пацієнтки 28 років, яка хворіє на виразкову хворобу 12-палої кишки серед повного благополуччя раптово виник сильний “кинджалоподібний” біль в пілородуоденальній ділянці. Прийом 2-х таблеток но-шпи біль не зняв. Об’єктивно: пульс - 90/хв., АТ- 125/70 мм рт.ст. Пальпація живота різко болюча в пілородуоденальній ділянці, симптоми подразнення очеревини позитивні. Ан. крові: Нb- 124 г/л, лейкоцити - 16,8·10⁹/л, ШОЕ - 12 мм/год. Ці скарги вказують на:

*** А) Перфорацію виразки**

- В) Гострий холецистит
- С) Гостру кишкову непрохідність
- Д) Гострий панкреатит
- Е) Пенетрацію виразки 12-палої кишки

150. У приймальному відділенні ЦРЛ під час обстеження хворого з підозрою на гострий перитоніт лікар відмічає посилення болю під час відведення руки після попереднього натискання на передню черевну стінку. Це є позитивний симптом:

*** А) Щоткіна-Блумберга**

- В) Грекова-Ортнера
- С) Ровзінга
- Д) Образцова
- Е) Мюссі-Георгієвського

151. До медичної сестри приймального відділення звернувся пацієнт, який протягом 5 років страждає на виразкову хворобу 12-палої кишки, яка супроводжується гострим болем у животі, нудотою, різкою слабкістю. Такий стан виник 6 год тому. Пацієнт блідий, АТ- 100/60 мм рт.ст., пульс - 96/хв. Язик сухий, живіт дошкоподібний. Симптоми подразнення очеревини на всьому протязі позитивні. Назвіть допоміжний метод обстеження органів черевної порожнини, який необхідно провести для діагностики захворювання:

*** А) Оглядова рентгенографія**

- В) УЗД
- С) Ірігоскопія
- Д) Лапароцентез
- Е) Колоноскопія

152. Під час медсестринського обстеження пацієнта, тривалий час страждаючого на захворювання цирозом печінки, виникло блювання свіжою кров'ю. Стан пацієнта тяжкий, шкірні покриви бліді, АТ- 90/60 мм рт.ст., пульс - 100/хв., слабкого наповнення. Вкажіть вірогідну причину кровотечі:

*** А) Варикозно-розширені вени стравоходу**

- В) Виразкова хвороба шлунку
- С) Перфоративна виразка шлунку
- Д) Пухлина шлунку
- Е) Виразка 12-палої кишки

153. У пацієнта 70 років раптово з'явилась слабкість, запаморочення. Виникло багаторазове випорожнення прямої кишки калом з рідиною темно-вишневого кольору. За останні 5 місяців схуд на 17 кг. Шкіра бліда. У лівій здухвинній ділянці пальпується нерухомий болісний інфільтрат. Які інструментальні обстеження на першому етапі будуть найбільш доцільними?

*** А) Ректороманоскопія, ірігоскопія, колоноскопія**

- В) УЗД, оглядова рентгенографія грудної клітки
- С) Рентгеноконтрастне дослідження шлунка, УЗД
- Д) Фіброгастроскопія, комп'ютерна томографія
- Е) Синцитіографія печінки, УЗД

154. Ви обстежуєте пацієнта 42 років, якого доставлено до травматологічного відділення після ДТП. Пацієнт загальмований, стогне, шкіра бліда, язик сухий. Частота дихання - 28/хв. Праве стегно деформоване, набрякле. У верхній третині стегна відчувається крепітація та патологічна рухливість. Пульс - 112/хв, АТ- 80/45 мм рт.ст. Стан пацієнта відповідає:

*** А) Шок II ступеню**

- В) Шок I ступеню
- С) Шок IV ступеню
- Д) Шок III ступеню
- Е) Предагонія

155. Медична сестра обстежує пацієнтку із забрудненою колото-різаною раною правої ступні, в зв'язку з чим була введена протиправцева сироватка. Раптово стан пацієнтки різко погіршився: з'явилася різка слабкість, часте серцебиття. Об'єктивно: блідість шкіри, холодний піт, частий пульс слабкого наповнення - 100/хв., АТ- 90/40 мм ртст. В зв'язку з чим відбулося різке погіршення стану пацієнта?

*** А) Гострим анафілактичним шоком**

- В) Гострим геморагічним шоком
- С) Гострим інфекційно-токсичним шоком
- Д) Сироватковою хворобою
- Е) Відстроченим больовим шоком.

156. Ви медична сестра сімейного лікаря. В одному із фермерських господарств травмувалася молода людина. Лікар запідозрив перелом стегна. Яку шину Ви повинні підготувати і застосувати?

*** А) Шину Дітеріхса**

- В) Шину Беллера
- С) Шину Фільберга
- Д) Шину Крамера
- Е) Шину Дельбе

157. Ви медична сестра сімейного лікаря до Вас звернулася пацієнтка 40 років зі скаргами на виділення з протока молочної залози. Який метод дослідження застосовується для обстеження протока молочної залози?

*** А) Мамографія**

- В) Ангіографія
- С) Ірігографія
- Д) Краніографія
- Е) Кардіографія

158. Ви медична сестра сімейного лікаря. В амбулаторію звернулася жінка зі скаргами на біль у животі, нудоту, блювання. При обстеженні позитивний симптом Воскресенського, Ровзінга, Щоткіна. Яку патологію Ви запідозрили?

*** А) Гострий апендицит**

- В) Гострий панкреатит
- С) Гострий холецистит
- Д) Жовчокам'яна хвороба
- Е) Хронічний панкреатит

159. До Вас звернувся сусід, у якого після напруження раптово виник різкий біль в лівій паховій ділянці. При огляді Ви встановили в паховій ділянці випинання розміром 2-3см, різко болюче, щільної консистенції. Вправити випинання не вдалося. Надайте першочергову допомогу:

*** А) Холод на нижню частину живота, викликати "швидку допомогу"**

- В) Холод на нижню частину живота, знеболити, термінова госпіталізація
- С) Ввести знеболюючі засоби, холод на нижню частину живота
- Д) Ввести спазмолітичні засоби, викликати "швидку допомогу"
- Е) Ввести спазмолітичні засоби, грілка на нижню частину живота

160. Хворий, 65 років, який страждає протягом 10 років хронічним ларингітом, скаржиться на зміну голосу, охриплість, біль. За останні два місяці схуд на 10 кг. Це патологія характерна для такого стану пацієнта:

*** А) Рак гортані**

- В) Рак стравоходу
- С) Рак щитоподібної залози
- Д) Зоб ендемічний
- Е) Рак шлунка

161. Постраждалий, 30 років, після завалу в шахті скаржиться на біль в грудній клітці, задишку. При обстеженні шкіра голови, шиї та грудної клітки вище сосків яскраво-червоного кольору з множинними фіолетовими і фіолетово-чорними дрібними крововиливами. Крововиливи спостерігаються також на слизовій оболонці рота, трахеї, в кон'юнктиві і сітківці очей. Вкажіть який патологічний стан виник у постраждалого:

*** А) Стиснення грудної клітки**

В) Забій грудної клітки

С) Перелом ребер

Д) Перелом ключиці

Е) Вивих ключиці

162. У пацієнта, 45 років, побутова рана , на лівій гомілці отримана 2 дні тому. В ділянці рани виявляється набряк, почервоніння, підвищення температури тканини, посилення болю, порушення функції пошкодженої кінцівки. Рана знаходиться за класифікацією М.І. Кузіна і Б.Н. Костюченко в фазі:

*** А) Фаза запалення, період судинних змін**

В) Фаза запалення, період очищення рани

С) Фаза регенерації і формування грануляцій

Д) Фаза дегідратації

Е) Фаза запалення, період нагноєння рани

163. Пацієнтка, 25 років, звернулась до лікарні на 5 день після появи болю у правій половині живота. Гострий біль у животі зменшився, загальний стан хворої покращився. При об'єктивному обстеженні у правій здухвинній ділянці пальпується щільний, малорухомий, болючий із нечіткими контурами утвір. Живіт навколо інфільтрату при пальпації м'який і слабо болісний. Який патологічний стан виник у пацієнта?

*** А) Апендикулярний інфільтрат**

- В) Гострий холецистит
- С) Гострий панкреатит
- Д) Гостра непрохідність
- Е) Хронічна непрохідність

164. Пацієнтка, 40 років, скаржиться на біль, який виник після фізичного навантаження. Біль іррадіює у пахову ділянку. Хвора збуджена, не знаходить собі місця від болю, кричить. Біль супроводжується нудотою, блюванням, затримкою газів та випорожнень. При обстеженні пацієнтки відмічається болючість у ділянці лівої нирки, позитивний симптом Пастернацького. Перша невідкладна допомога в даному випадку складається з:

*** А) Призначення спазмолітиків, гарячої ванни**

- В) Літотрипсія, грілка на поперек
- С) Призначення прийому рідини, гарячої ванни
- Д) Призначення антибіотиків та спазмолітиків
- Е) Заспокоїти хвору, холод на поперек

165. Перед входом в яку зону операційного блоку члени хірургічної бригади ЗОЗ надягають захисні медичні маски, шапочку, бахіли:

*** А) Зону обмеженого режиму**

- В) Зону суворого режиму
- С) Стерильну зону
- Д) Зону загального режиму
- Е) Зону напівсуворого режиму

166. Хірургічна обробка рук проводиться шляхом застосування антисептичних розчинів на:

*** А) Кисті рук, передпліччя, включаючи ліктьові суглоби**

- В) Кисті рук та до середньої третини передпліччя
- С) Кисті рук та нижньої третини передпліччя
- Д) Кисті рук, включаючи зап'ястковий суглоб
- Е) Кисті рук, верхньої третини передпліччя

167. Медична сестра може безпосередньо торкатися відкритої або свіжої рани тільки за умови, якщо:

*** А) На руки одягнуті стерильні рукавички**

- В) Є поруч стерильний перев'язувальний матеріал
- С) Виконана гігієнічна антисептика рук
- Д) Виконана хірургічна антисептика рук
- Е) Є поруч лікар

168. Генеральне прибирання (миття та дезінфекція) проводиться:

*** А) Один раз на сім днів**

- В) Щодня
- С) Один раз на три дні
- Д) Один раз на 10 днів
- Е) Один раз на місяць

169. Які ознаки кровотечі вказують на її легеневе походження?

*** А) Кров яскравочервона, піниста**

- В) Кров темна, має вигляд кавової гущі
- С) Кров темна, виділяється з блювотинням
- Д) Кров має кислу реакцію
- Е) Кров темна зі згустками

170. Який інструментальний метод обстеження є найінформативнішим для діагностики виразкової хвороби шлунка?

*** А) Фіброезофагогастродуоденоскопія**

- В) Фракційне зондування
- С) Іригоскопія
- Д) Колоноскопія
- Е) УЗД

171. Яке захворювання може розвинути після видалення щитоподібної залози?

*** А) Гіпотиреоз**

- В) Гіпертиреоз
- С) Ендемічний зоб
- Д) Цукровий діабет
- Е) Анемія

172. Визначіть групу крові у пацієнта, якщо аглютинація виникла у лунках з I і III групами:

*** А) Кров II групи**

- В) Кров I групи
- С) Кров III групи
- Д) Кров IV групи
- Е) Результат недостовірний

173. Високий ризик розвитку ателектазів та пневмоній мають пацієнти:

*** А) У яких операція виконувалась під інгаляційним наркозом**

- В) Яким призначена операція на серці
- С) У яких операція виконувалась під неінгаляційним наркозом
- Д) Які мають порушення периферійного кровообігу в анамнезі
- Е) Яким призначена операція в ділянці тазу

174. Визначіть групу крові у пацієнта, якщо аглютинація не виникла у жодній з лунок:

*** А) Кров I групи**

В) Кров II групи

С) Кров III групи

Д) Кров IV групи

Е) Результат недостовірний

175. На стаціонарне лікування до хірургічного відділення доставлено дитину 15 років з гострим апендицитом. Для виконання оперативного втручання у дитини необхідно:

*** А) Отримати дозвіл батьків або опікуна**

В) Отримати дозвіл головного лікаря

С) Отримати дозвіл старшої операційної сестри

Д) Отримати згоду дитини на оперативне втручання

Е) Отримати згоду оперуючого хірурга

176. На стаціонарне лікування до хірургічного відділення доставлено дитину сироту 15 років з гострим апендицитом. Для виконання оперативного втручання необхідна згода:

*** А) Консилиуму лікарів**

В) Головного лікаря

С) Чергового лікаря-хірурга

Д) Лікаря приймального відділення

Е) Старшої операційної медсестри

177. У хворого В., 42 років, після апендектомії в ранньому післяопераційному періоді виникли нудота, блювання. Який препарат використовують для зняття цих симптомів?

*** А) Церукал**

В) Седуксен

С) Промедол

Д) Фенобарбітал

Е) Атропін

178. Для попередження тромбоутворення в післяопераційному періоді хворим призначають:

*** А) Цібор**

В) Фенобарбітал

С) Атропін

Д) Радедорм

Е) Папаверін

179. В хірургічне відділення на планову операцію готується пацієнт К., 50 років. Виберіть комплекс препаратів для ранкової премедикації:

*** А) Промедол, атропін, димедрол**

В) Анальгін, піпольфен, ношпа

С) Димедрол, супрастин, промедол

Д) Омнопон, метацин, промедол

Е) Атропін, метацин, дімедрол

180. Пацієнт Г., 34 років перебуває у реанімаційному відділенні у важкому стані. Виберіть критичні показники стану серцево-судинної системи:

*** А) Частота пульсу понад 120 ударів**

- В) Частота пульсу понад 100 ударів
- С) Частота пульсу понад 110 ударів
- Д) Частота пульсу понад 90 ударів
- Е) Частота пульсу понад 80 ударів

181. Пацієнт Д., 28 років готується до виписки після апендектомії. Як повинна загоїтись післяопераційна рана у разі неускладненого післяопераційного перебігу?

*** А) Первинним натягом**

- В) Вторинним натягом
- С) Під струпом
- Д) Третинним натягом
- Е) За допомогою грануляцій

182. Хлопчик 9 років добу тому впав та вдарив праву нижню кінцівку. При обстеженні: температура тіла - 38°C. Відмічається загальмованість, млявість дитини. У верхній третині правої гомілки розлитий набряк, болісний при пальпації. Рухи у правому колінному суглобі різко обмежені із-за болю. З додаткового анамнезу стало відомо, що тиждень тому переніс фолікулярну ангіну. Який найбільш імовірний діагноз?

*** А) Гострий гематогенний остеомієліт**

- В) Флегмона правої гомілки
- С) Вивих правого колінного суглоба
- Д) Перелом правого колінного суглоба
- Е) Гострий артрит колінного суглоба

183. На шляху до роботи чоловіка збила автомашина. При обстеженні: свідомість відсутня, зіниці на світло не реагують, шкіра бліда, дихання рідке і поверхневе. Пульс слабкий, частий, АТ- 90/50 мм рт.ст. Із рота, носа і вух кров'яні виділення. Який імовірний діагноз?

*** А) Перелом основи черепа**

- В) Струс мозку
- С) Перелом склепіння черепа
- Д) Крововилив у мозок
- Е) Перелом кісток черепа обличчя

184. Виділіть найбільш ефективний інструментальний засіб діагностики внутрішньочеревної кровотечі при закритій травмі живота:

*** А) Лапароскопія**

- В) Сцинтиграфія
- С) Термографія
- Д) Рентгенографія
- Е) УЗД

185. Хворому Т, 63 р. переливається еритроцитарна маса. Для запобігання цитратної інтоксикації необхідно:

*** А) Вводити не більш 500 мл**

- В) Ввести хлорид калію
- С) Ввести антигістамінні засоби
- Д) Ввести хлорид натрію
- Е) Ввести гідрокарбонат натрію

186. У приймальне відділення доставлено хворого К., 56 років. Стан пацієнта важкий, шкіра блілого кольору, пульс - 132/хв., АТ- 80/60 мм рт.ст. Язик сухий. Живіт м'який, болючий. Позитивні симптоми Валя, шум плеску; на оглядовій рентгенограмі органів черевної порожнини - наявність чаш Клойбера. Вкажіть, на яке захворювання свідчать вище вказані ознаки?

*** А) Кишкову непрохідність**

В) Гострий апендицит

С) Асцит

Д) Перитоніт

Е) Гострий панкреатит

187. До хірургічного кабінету поліклініки звернувся пацієнт, 39 років зі скаргами на загальну слабкість, порушення сну, підвищення температури тіла до 39,5°C. На задній поверхні шиї в ділянці потилиці - інфільтрат червоного кольору, в центрі якого кілька гнійних стрижнів. Який найбільш ймовірний діагноз?

*** А) Карбункул**

В) Фурункул

С) Флегмона

Д) Абсцес

Е) Лімфангіт

188. В хірургічному відділенні знаходиться хворий К., 36 років у важкому стані. Скарги на загальну слабкість, безсоння, надсадний кашель, Об'єктивно температура тіла - 39,7°C, тахіпное. На 9 добу у хворого на фоні частого кашлю виділилось близько 600 мл гнійного харкотиння. Стан пацієнта дещо покращився. Про яке захворювання йде мова?

*** А) Абсцес легень**

- В) Пневмонія
- С) Плеврит
- Д) Емпієма плеври
- Е) Туберкульоз легень

189. Хворий 72 років скаржиться на утруднене сечовиділення, сеча виділяється тонким струменем, іноді краплями. Яке захворювання виникло у хворого?

*** А) Аденома передміхурової залози**

- В) Туберкульоз сечового міхура
- С) Сечокам'яна хвороба
- Д) Гострий простатит
- Е) Хронічний простатит

190. На прийом до травматолога звернувся потерпілий М., 42 роки, після отриманих побоїв у ділянці голови. Об'єктивно: рот широко відкритий, хворий не може закрити рота. Нижня щелепа висунута вперед, ковтання та мова утруднені. Жування неможливе. Відмічається слинотеча. Вкажіть найбільш ймовірний діагноз:

*** А) Вивих нижньої щелепи**

- В) Отруєння хімічними сполуками
- С) Забій нижньої щелепи
- Д) Рак стравоходу
- Е) Рання ознака сказу

191. Пацієнтка С., 34 р, звернулась до лікаря зі скаргами на сильний біль у лівій поперековій ділянці, загальну слабкість, підвищення температури тіла.

Об'єктивно: у лівій поперековій ділянці пальпується болючий інфільтрат розміром - 3,5х6,5 см. Шкіра над ним багряно-синього кольору, через виниклі отвори виділяється густий зеленувато-сірий гній та некротичні маси. Вкажіть діагноз:

*** А) Карбункул**

В) Гідраденіт

С) Бешиха

Д) Флегмона

Е) Паранефрит

192. У хворого, 46 р., скарги на гострий біль в животі оперізуючого характеру, багаторазове блювання, При пальпації живота визначається напруження черевної стінки в лівому підребер'ї, зникнення пульсації аорти в надчеревній ділянці. Лабораторні дані: в сечі збільшений вміст діастази:

*** А) Гострий панкреатит**

В) Кишкова непрохідність

С) Гострий апендицит

Д) Абсцес легені.

Е) Емпієма плеври

193. Підліток 14 років скаржиться на різкий біль у ділянці лівого стегна, почервоніння шкіри, підвищення температури тіла. Об'єктивно: на передній поверхні лівого стегна розлитий болючий інфільтрат, визначається флуктуація, регіонарні лімфатичні вузли збільшені та болючі. В крові - лейкоцитоз, підвищення ШОЕ. Вкажіть найбільш імовірний діагноз:

*** А) Флегмона**

- В) Фурункул
- С) Бешиха
- Д) Гангрена
- Е) Карбункул

194. Потерпілий Т, 32 років, звернувся в хірургічний кабінет поліклініки зі скаргами на пульсуючий біль в ІІІ пальці правої руки, який пошкодив напередодні цвяхом. При огляді шкіра пальця гіперемована, напружена, болюча. Вкажіть найбільш ймовірний діагноз:

*** А) Панарицій**

- В) Пандактиліт
- С) Епікондиліт
- Д) Тендовагініт
- Е) Флегмона

195. У приймальне відділення ЦРЛ доставили потерпілого Н., 30 років, після автоаварії. Потерпілий у непритомному стані, АТ- 90/60 мм рт.ст., Рs- 97/хв, із носа і вух витікає рідина червоного кольору. Вкажіть найбільш імовірний діагноз:

*** А) Перелом основи черепа**

- В) Перелом склепіння черепа
- С) Перелом лицевої частини черепа
- Д) Струс мозку
- Е) Субдуральна гематома

196. У приймальне відділення звернулась хвора С., 38 років, зі скаргами на біль у верхній половині живота, багаторазове блювання. Біль з'явився після прийому смаженого бекону. Об'єктивно: ЧСС- 102/хв., пальпаторно спостерігається напруження м'язів та біль в правому підребер'ї, який віддає в праву лопатку. Вкажіть найбільш імовірний діагноз:

- * А) Гострий холецистит**
- В) Гострий панкреатит
- С) Гострий перитоніт
- Д) Мезентеріальний тромбоз
- Е) Гострий апендицит

197. На прийом до онколога звернулась хвора М., 42 років, зі скаргами на появу ущільнення в лівій молочній залозі. При огляді - сосок втягнутий, симптом "лимонної кірки". Виберіть діагноз:

- * А) Рак молочної залози**
- В) Гострий мастит
- С) Медіастеніт
- Д) Рак легень
- Е) Гнійний плеврит

198. Хвора Л., 24 р. скаржиться на біль у правій здухвинній ділянці, нудоту, одноразове блювання, температура тіла - 37,6°C. Захворіла 9 годин тому. Об'єктивно: живіт симетричної форми, під час пальпації визначається біль у правій здухвинній ділянці, напруження м'язів, позитивний симптом Щоткіна-Блюмберга. Пульс - 92/хв., АТ- 110/70 мм рт.ст. Поставте діагноз:

- * А) Гострий апендицит**
- В) Гострий аднексит
- С) Гострий холецистит
- Д) Гостра кишкова непрохідність
- Е) Гострий панкреатит

199. У хворого Р., 46 років, з виразковим анамнезом, з'явилась слабкість, головокружіння. При огляді визначається блідість шкірних покривів, живіт помірно здутий, симптом Щоткіна-Блюмберга негативний, печінкове притуплення перкуторного звуку збережене. Пульс - 104/хв., АТ- 90/60 мм рт.ст. Яке ускладнення виникло у хворого?

*** А) Шлунково-кишкова кровотеча**

- В) Пенетрація
- С) Стеноз ворота
- Д) Малігнізація
- Е) Перфорація

200. В приймальне відділення за допомогою звернувся хворий В., 39 років, зі скаргами на біль у правому підребер'ї з іррадіацією в праву руку, нудоту, блювання, жовтяницю. Такий біль хворий відмічає вперше. Про яке захворювання можна думати?

*** А) Гострий холецистит**

- В) Хронічний холецистит
- С) Хронічний панкреатит
- Д) Гострий гастрит
- Е) Рак шлунка

201. Хворий В., 32 років, звернувся за допомогою на прийом до хірурга поліклініки з вогнепальним пораненням стегна. Скаржить на наростаючий біль та набряк, пов'язка стала тісною та врізалась в тканини. З рани виділяється геморагічна рідина, при пальпації - крепітація. Який діагноз?

*** А) Газова гангрена**

- В) Правець
- С) Флегмона
- Д) Абсцес
- Е) Фурункул

202. Пацієнт Т, 67 р. після вживання смаженої їжі скаржиться на гострий біль у правому підребер'ї, який іррадіює у спину, праву лопатку. Який найбільш ймовірний діагноз?

*** А) Гострий холецистит**

- В) Гострий апендицит
- С) Гострий панкреатит
- Д) Ниркова колька
- Е) Гостра кишкова непрохідність

203. Хворий С., 52 років, скаржиться на постійний біль в епігастральній ділянці, відразу до м'ясної їжі, відрижку сірководнем, схуднення за останній місяць. На диспансерному обліку з виразковою хворобою шлунка - 10 років. Ваш попередній діагноз:

*** А) Рак шлунку**

- В) Загострення виразкової хвороби шлунка
- С) Пенетрація виразки
- Д) Перфорація виразки
- Е) Рак стравоходу

204. В приймальне відділення транспортували потерпілого Н., 46 років, з травмою грудної клітки. При огляді пораненого виявили рану, що “дихає”, чути свист повітря, що входить то виходить з рани. Який діагноз?

*** А) Відкритий пневмоторакс**

- В) Поранення серця
- С) Поранення легенів
- Д) Клапаний пневмоторакс
- Е) Гемоторакс

205. Хворій С., 40 років, показана термінова лапаротомія. При обстеженні медсестра помітила на нижніх кінцівках розширені та звивисті вени, над якими шкіра пігментована. Як профілакувати тромбоутворення в післяопераційному періоді?

*** А) Перед операцією накласти еластичні бинти**

- В) Надати хворій положення Фаулера
- С) Накласти венозні джгути на ноги
- Д) Ввести антикоагулянти
- Е) Після операції накласти еластичні бинти

206. У хворої Ф., 38 років, після ін'єкції анальгіну в ділянці правої сідниці виник щільний, болючий інфільтрат, шкіра над яким гіперемована, набрякла, пальпаторно визначається розм'ягшення в центрі інфільтрату. Поставте діагноз:

*** А) Абсцес**

- В) Флегмона
- С) Карбункул
- Д) Фурункул
- Е) Остеомієліт

207. Пацієнт Ф., 30 років, звернувся зі скаргами на біль у правому плечовому суглобі після падіння на витягнуту руку. Об'єктивно: правий плечовий суглоб деформований, різко болючий при пальпації, активні рухи в суглобі відсутні, пасивні різко обмежені і носять пружний характер. Поставте діагноз:

*** А) Травматичний вивих правого плеча**

- В) Закритий перелом в/З правої плечової кістки
- С) Вивих акроміального кінця ключиці
- Д) Забій правого плечового суглоба
- Е) Відкритий перелом в/З правої плечової кістки

208. Потерпілий Т., 72 років, упав на витягнуту руку, відчув різкий біль у лівому передпліччі. Через годину з'явилися набряк, деформація в ділянці ключиці, різкий біль під час руху рукою. Якою пов'язкою краще виконати іммобілізацію перед скеруванням до травмпункту?

*** А) Хрестоподібною**

В) Колосоподібною

С) Вельпо

Д) Дезо

Е) Спіральною

209. Хворий Р., 35 років, звернувся до хірурга поліклініки зі скаргами на гострий біль у поперековій ділянці з іррадіацією в промежину, який з'явився після тривалої поїздки на велосипеді. Було блювання. Живіт не болючий, симптом Пастернацького праворуч позитивний. Який імовірний діагноз?

*** А) Ниркова колька**

В) Гострий цистит

С) Гострий пієлонефрит

Д) Аденома передміхурової залози

Е) Пахово-мошонкова грижа

210. Потерпіла Л., 25 років, отримала рану лівого передпліччя. В травмпункті виконана первинна хірургічна обробка рани. Через 6 днів ознаки запалення відсутні. Загоєння первинним натягом. Яке втручання з перелічених є найбільш прийнятним в даному випадку?

*** А) Зняття швів з рани**

В) Промивання рани фурациліном

С) Опромінення лазером

Д) Ультрафіолетове опромінення

Е) Накладання маzewої пов'язки

211. У потерпілого П., 20 років, ножове поранення грудної клітки. Положення вимушене, праворуч у V міжребер'ї різана рана розміром - 3х1 см, з якої витікає піниста кров, а під час вдиху чути всмоктування повітря. Яка травма імовірніше у хворого?

*** А) Відкритий пневмоторакс**

- В) Розрив легень
- С) Підшкірна емфізема
- Д) Різана рана
- Е) Клапанний пневмоторакс

212. До травматологічного відділення госпіталізовано потерпілого з діагнозом клапанний пневмоторакс. Медсестра взяла пункційну голку, надягла на неї гумову трубку, до якої прив'язала палець від гумової рукавички, розрізала його і занурила у флакон з 0,02% розчином фурациліну. Який дренаж наклала медична сестра?

*** А) Бюлау**

- В) Суботінім-Пертесом
- С) Кімбаровським
- Д) Букатко
- Е) Редоном

213. Хворий Р., 45 років, скаржиться на постійний біль у правій пахвинній ділянці, наявність пухлиноподібного утворення, яке не вправляється у черевну порожнину. Утворення уперше виявив 3 роки тому, не турбувало і самостійно втягувалось в черевну порожнину. При пальпації: живіт болючий у нижніх відділах. Симптом кашлевого поштовху негативний. Яке захворювання у цього хворого?

*** А) Защемлена грижа**

- В) Кишкова непрохідність
- С) Гострий апендицит
- Д) Пухлина пахвинної ділянки
- Е) Хронічний апендицит

214. Хворий В. , 37 років, звернувся зі скаргами на похолодання стоп, швидку втомлюваність та біль в литкових м'язах обох ніг під час ходи, який змушує зупинятись. Під час огляду: шкіра гомілок і стоп суха, блідо-синюшного кольору, стопи холодні, ослаблення пульсу на тильній артерії стопи. З чим пов'язані проблеми пацієнта?

*** А) Облітеруючий ендартеріїт**

- В) Хвороба Рейно
- С) Варикозне розширення вен
- Д) Облітеруючий артеріосклероз
- Е) Нейродистрофічний синдром

215. В хірургічному відділенні лікується хворий з газовою гангrenoю стегна. Який антисептик необхідно використовувати для передстерилізаційної обробки інструментів після перев'язок?

*** А) 6% розчин перекису водню**

- В) 5% розчин йоду
- С) Розчин фурациліну
- Д) 0,02% розчин декаметоксину
- Е) 0,1% розчин марганцевокислого калію

216. У хірургічному відділенні пацієнту 45 років з виразковою кровотечею, проведено гемотрансфузію. Яке лабораторне дослідження необхідно запланувати на наступний день?

*** А) Клінічний аналіз крові і сечі**

- В) Аналіз крові на RW
- С) Пробу за Зимницьким
- Д) Аналіз крові на цукор
- Е) Коагулограму

217. Хворому була проведена серединна лапаротомія, резекція частки тонкого кишечника у зв'язку з кишковою непрохідністю. Що повинна зробити медсестра для попередження ранньої кровотечі?

*** А) Покласти вагу на ділянку рани**

- В) Ввести атропіну сульфат
- С) Ввести децинон
- Д) Накласти тиснучу пов'язку
- Е) Провести кварцування рани

218. У хірургічному відділенні лікується хворий, якому проведена резекція шлунка у зв'язку зі стенозом воротаря. В чому полягатиме профілактика застійної пневмонії у такого пацієнта?

*** А) Проводити дихальну гімнастику**

- В) Часто провітрювати палату
- С) Дотримуватись суворого ліжкового режиму
- Д) Вводити сечогінні засоби
- Е) Надати сидячого положення

219. Хворий, 43 років, звернувся зі скаргами на сильний біль, почервоніння та набряк шкіри на лівій гомілці. Хворіє - 2 дні. Температура тіла - 39,5°C. При огляді: в ділянці середньої третини лівій гомілки відмічається набряк, почервоніння шкіри з чіткими фестончатими краями, місцями пухирі різних розмірів, заповнені серозно-геморагічним ексудатом. З чим пов'язані проблеми пацієнта?

*** А) Бешиха**

- В) Фурункульоз
- С) Гострий тромбофлебіт
- Д) Флегмона
- Е) Лімфангоїт

220. В хірургічне відділення госпіталізований хворий, який скаржиться на біль у правому підребер'ї, нудоту, блювання, відчуття гіркоти в роті. При пальпації живіт болісний в правому підребір'ї, позитивні симптоми Ортнера, Щоткіна-Блюмберга. З чим пов'язані проблеми пацієнта?

*** А) Гострий холецистит**

- В) Кишкова непрохідність
- С) Проривна виразка шлунку
- Д) Шлункова кровотеча.
- Е) Гострий панкреатит

221. В хірургічне відділення госпіталізований хворий, який скаржиться на біль і випинання в правій паховій ділянці, нудоту, блювання. При обстеженні в правій паховій ділянці невправиме напружене болісне випинання. З чим пов'язані проблеми пацієнта?

*** А) Защемлена пахова грижа**

- В) Абсцес правої пахової ділянки
- С) Ліпома правої пахової ділянки
- Д) Туберкульоз лімфатичних вузлів
- Е) Гострий лімфаденіт

222. В приймальне відділення доставлений хворий, який після травми відмічає біль і неможливість рухів у правому плечовому суглобі. При огляді правий плечовий суглоб деформований, рухи в суглобі різко обмежені, пружні. З чим пов'язані проблеми пацієнта?

*** А) Вивих плеча**

- В) Розрив м'язів плеча
- С) Перелом передпліччя
- Д) Перелом ключиці
- Е) Перелом плечової кістки

223. У хірургічному відділенні проводиться масивна гемотрансфузія внаслідок артеріальної кровотечі. Що повинна приготувати медсестра для попередження цитратного шоку?

*** А) Р-н хлориду кальцію 10% - 10 мл**

- В) Р-н хлориду кальцію 1% - 10 мл
- С) Р-н промедолу 1% - 1 мл
- Д) Р-н сульфату магнію 25% - 5 мл
- Е) Р-н хлориду калію 10% - 10 мл

224. У хірургічному відділенні пацієнтці 56-ти років з варикозним розширенням вен нижніх кінцівок проведена холецистектомія. Що необхідно зробити в післяопераційному періоді для профілактики тромбоутворення?

*** А) Накладати еластичних бинти на нижні кінцівки**

- В) Проводити переливання крові
- С) Вводити вікасол
- Д) Іммобілізувати нижні кінцівки
- Е) Вводити фібриноген

225. Хворому в положенні стоячи наклали на верхню третину стегна гумовий джгут. Протягом 3-х хвилин він енергійно ходив. Після цього вени нижньої кінцівки набухли, шкіра набула ціанотичного відтінку, з'явився біль у гомілці. Про що свідчить результат цієї проби?

*** А) Недостатність глибоких вен нижньої кінцівки**

- В) Добру прохідність поверхневих вен
- С) Недостатність поверхневих вен
- Д) Добрий стан комунікантних вен
- Е) Недостатність комунікантних вен

226. У відділенні гнійної хірургії лікується хворий 72 років з флегмоною кисті, яку розкрили вчора. Пов'язку з яким препаратом необхідно накладати для прискорення очищення рани?

*** А) Гіпертонічний розчин**

- В) Мазь Вишневського
- С) Тетрациклінову мазь
- Д) Пов'язку з фурациліном
- Е) Пов'язку з димексидом

227. Хворому 72 років проведена холецистектомія. Які заходи необхідно проводити для профілактики тромбоемболічних ускладнень?

*** А) Раннє вставання з ліжка.**

- В) Обмеження інфузійної терапії
- С) Проведення дихальної гімнастики
- Д) Введення фібриногену
- Е) Дотримання суворого ліжкового режиму

228. У хворого, прооперованого з приводу поранення гомілки розвинулася газова гангрена. Разом з ним в палаті знаходяться ще 3 прооперованих хворих. Які протиепідемічні заходи необхідно провести?

- * А) Перевести хворого в окрему палату**
- В) Перевести хворого в інфекційне відділення
- С) Ввести хворому протигангренозну сироватку
- Д) Обробити рану перекисом водню
- Е) Посилити санітарний режим в палаті

229. У хірургічному відділенні проведене ПХО рани у потерпілого, який тиждень тому поранив ступню, працюючи на огороді. Наступного дня пацієнт поскаржився на тягнучий біль в рані, сіпання м'язів навколо рани, надмірну пітливість. До якого відділення необхідно перевести цього хворого?

- * А) Реанімаційного**
- В) Терапевтичного
- С) Неврологічного
- Д) Кардіологічного
- Е) Пульмонологічного

230. У хірургічному відділенні лікується хворий з виразковою хворобою шлунка. Раптово у нього виникла загальна слабкість, блювання у вигляді кавової гущі. Медична сестра викликала лікаря. Що вона може виконати до його приходу?

- * А) Покласти на епігастральну ділянку міхур з льодом**
- В) Підготувати до рентгенографії шлунку
- С) Зондування шлунку
- Д) Ввести кетанов внутрішньом'язово
- Е) Транспортувати до реанімаційного відділення

231. У торакальному відділенні лікується хворий на абсцес легені. Вранці медсестра відмітила у нього відходження великої кількості харкотиння з неприємним запахом, полегшення стану. Про що це свідчить?

*** А) Про відкриття абсцесу у бронх**

- В) Про рак легені
- С) Про бронхоектатичну хворобу
- Д) Про гемопневмоторакс
- Е) Про емпієму плеври

232. Операційна медсестра травматологічного відділення готується до проведення оперативного втручання з приводу репозиції кісткових уламків та металоостеосинтезу. Вкажіть спеціальні інструменти, які вона повинна приготувати до операції:

*** А) Распатор Фарабефа, рашпіль.**

- В) Лопатка Ревердена, скальпель.
- С) Ранорозширювач Фарабефа, ножиці.
- Д) Затискач Мікуліча, ножиці.
- Е) Голка Дешана, пінцет.

233. Пацієнтку 55 р госпіталізовано в хірургічне відділення з діагнозом гострий тромбофлебіт вен правої нижньої кінцівки, призначено ліжковий режим. Вкажіть положення пацієнтки в ліжку, яке повинна надати медична сестра:

*** А) Підвищене положення нижньої кінцівки**

- В) Положення - лежачи на правому боці
- С) Покласти в положенні "жаби"
- Д) Розташувати в напівсидячому положенні
- Е) Положення - лежачи на лівому боці

234. Пацієнтка 48 років прооперована з приводу перфоративної виразки шлунка. З метою профілактики кровотечі на ділянку післяопераційної рани медична сестра поклала міхур з льодом. Вкажіть максимальний час, протягом якого можна тримати накладений міхур із льодом не знімаючи:

*** А) 2-3 години**

В) 1-2 години

С) 3-4 години

Д) 4-5 годин

Е) 5-6 годин

235. У пацієнта 38 років після бійки виявлено крововилив і крепітацію в ділянці нижньої щелепи. Вкажіть вид пов'язки, яку необхідно застосувати для іммобілізації нижньої щелепи під час транспортування:

*** А) "Вуздечка"**

В) "Чепець"

С) Хрестоподібна

Д) Колова

Е) Поворотна

236. Постраждалий отримав закритий перелом лівого стегна. Яку кількість суглобів необхідно фіксувати при наданні невідкладної допомоги?

*** А) 3**

В) 2

С) 1

Д) 4

Е) 5

237. Сторож будівельного майданчика отримав виробничу травму внаслідок завалу: бетонний стовпець придавив праву нижню кінцівку. З анамнезу: стиснення кінцівки тривало понад 7 годин. Надаючи невідкладну допомогу, медична сестра провела знеболення. Вкажіть її першочергову дію, яку слід здійснити перед звільненням нижньої кінцівки пацієнта:

*** А) Накласти джгут**

- В) Охолодити кінцівку
- С) Провести іммобілізацію
- Д) Накласти асептичну пов'язку
- Е) Накласти еластичний бинт

238. Пацієнт 28 років перебуває у хірургічному відділенні з приводу вогнепального поранення правої гомілки. Об'єктивно: на 3-ю добу після поранення виник розпираючий біль у ділянці рани, швидко наростає набряк; з рани виділяються пухирці газу, невелика кількість сукровичної рідини, що має неприємний запах. Вкажіть симптом, який є характерною ознакою для даного захворювання:

*** А) Симптом “лігатури”**

- В) Симптом “переміжної кульгавості”
- С) Симптом “Троянова-Тренделенбурга”
- Д) Симптом “прилиплої п'яти”
- Е) Симптом “Ларея”

239. Медична сестра стала свідком травми чоловіка, який пірнав у воду з висоти - 2 м. Об'єктивно: при пальпації визначається болісність у ділянці 5-го шийного хребця, крепітація остистого відростка. Вкажіть вид іммобілізації, який необхідно застосувати при транспортуванні пацієнта в лікарню:

*** А) Комірець Шанца**

- В) Шина Ентіна
- С) Шина Єланського
- Д) Шина Башмакова
- Е) Ватно-марлеве кільце

240. Пацієнтка 37 років поступила в хірургічне відділення. Проведена операція: лапаротомія, спленектомія. В черевній порожнині - 1,5 л крові. Під час операції перелито - 1 л консервованої крові. Вкажіть препарат, який необхідно ввести для профілактики цитратного шоку:

*** А) 10% розчин кальцію хлориду**

- В) 5% розчин амінокапронової кислоти
- С) 1% розчин вікасолу
- Д) 12,5% розчин дицинона
- Е) 0,9% розчин натрію хлориду

241. Пацієнт 49 р. доставлений в хірургічне відділення з різаною раною лівого стегна. Після зупинки кровотечі лікар призначив переливання крові. Вкажіть, що необхідно підготувати медсестрі для проведення проби на індивідуальну сумісність:

*** А) Сироватку пацієнта та еритроцити донора**

- В) Еритроцити пацієнта і сироватку донора
- С) Еритроцити пацієнта і розчин желатину
- Д) Сироватку пацієнта і сироватку донора
- Е) Сироватку пацієнта і розчин поліглюкіну

242. В хірургічне відділення поступила пацієнтка 63 років зі скаргами на біль і посмикування м'язів в ділянці колотої рани лівої стопи, яку отримала 5 днів тому, коли випадково наступила на цвях. Вкажіть клінічну ознаку при подальшому обстеженні та прогресуванні захворювання:

*** А) “Сардонічна посмішка”**

В) Обличчя “Гіппократа”

С) Симптом “окулярів”

Д) Гнівний погляд

Е) Симптом Грефе

243. Операційна медсестра готується до планової операції - герніотомія. Після миття рук та висушування стерильним рушником, обробляє двічі по 2 хвилини розчином антисептика. Вкажіть, який антисептик застосувала медична сестра згідно даної методики:

*** А) Стериліум**

В) Первомур

С) Йодопірон

Д) Нашатирний спирт

Е) Дегміцид

244. Пацієнтці 46 років призначена планова операція - холецистектомія. Вкажіть, препарат, який необхідно підготувати медсестрі - анестезистці для в/в наркозу:

*** А) Тіопентал натрію**

В) Фторотан

С) Закис азоту

Д) Дикаїн

Е) Лідокаїн

245. В травмпункт доставлений пацієнт 23 років, який 40 хв. тому впав на вулиці зі скутера. Об'єктивно: в середній третині лівого стегна набряк, крововилив, патологічна рухливість. Вкажіть абсолютну ознаку перелома:

*** А) Крепітація**

- В) Біль
- С) Гіперемія
- Д) Пружисті рухи
- Е) Вимушене положення кінцівки.

246. Хворий С. отримав закритий перелом обох кісток правої гомілки. Вкажіть абсолютну ознаку перелому:

*** А) Кісткова крепітація**

- В) Гематома
- С) Зміщення суглобових поверхонь
- Д) Порушення функції
- Е) Набряк кінцівки

247. Постраждалий В, 24 р., отримав електротравму на виробництві. З чого необхідно розпочати першу невідкладну допомогу?

*** А) Звільнити потерпілого від дії електричного струму**

- В) ШВЛ
- С) Непрямого масажу серця
- Д) Надання оксигенотерапії
- Е) Накладання асептичної пов'язки

248. У стаціонар доставлений потерпілий К., 57 років із переломом ребер. Яке положення слід надати потерпілому?

*** А) Напівсидяче**

В) Лежаче

С) Сидяче

Д) На боці

Е) На животі

249. В стаціонарі хворий Н, 36 р., готується до операції з приводу гострого перитоніту. Який симптом характерний при цьому захворюванні?

*** А) Щоткіна-Блюмберга**

В) Роздольського

С) Щоткіна-Гіппократа

Д) Ортнера-Грекова

Е) Мейо-Робсона

250. В урологічне відділення доставлений потерпілий з діагнозом: розрив сечового міхура. Яке спеціальне дослідження потрібно провести для уточнення діагнозу?

*** А) Цистографія**

В) Хромоцистоскопія

С) Катетеризація сечоводів

Д) Висхідна пієлографія

Е) Внутрішньовенна урографія

251. У постраждалого діагностована травма шийного відділу хребта. Яку транспортну іммобілізацію доцільно використати в цьому випадку?

*** А) Комірець Шанца**

- В) Шину Крамера
- С) Шину Дітерікса
- Д) Шину Виноградова
- Е) Шину Белера

252. При визначенні групи крові за допомогою цоліклонів реакція аглютинації відбулася з цоліклонами анти-А та анти-В. Яка група крові буде в цьому випадку?

*** А) Попередньо АВ(IV)**

- В) В(III)
- С) А(II)
- Д) 0(I)
- Е) Остаточнo АВ(IV)

253. Хвора Н, 48 років, страждає хронічним бешиховим запаленням правої гомілки. До якого ускладнення призводять повторні бешихові запалення?

*** А) Слоновості**

- В) Трофічних виразок
- С) Еризепилоїду
- Д) Артрити
- Е) Сказу

254. У постраждалого Л, 34 р., діагностовано правосторонній гемоторакс. До якої пункції потрібно готувати цього хворого?

*** А) Плевральної**

В) Перикардальної

С) Стернальної

Д) Абдомінальної

Е) Люмбальної

255. Медичному персоналу необхідно обробити руки за методом Бруна. Який антисептик необхідно приготувати та протягом якого часу виконувати обробку?

*** А) 96% етиловий спирт, протягом 10 хв.**

В) 96% етиловий спирт, протягом 3 хв.

С) 70% етиловий спирт, протягом 5 хв.

Д) 70% етиловий спирт, протягом 15 хв.

Е) 96% етиловий спирт, протягом 15 хв.

256. Операційна сестра готує первомур для обробки рук. Які головні антисептичні засоби необхідні для його приготування?

*** А) 171 мл - 30-33% перекису водню та 69 мл - 100% мурашиної кислоти**

В) 171 мл - 30-33% перекису водню та 69 мл - 100% сірчаної кислоти

С) 171 мл - 30-33% етилового спирту та 69 мл - 100% мурашиної кислоти

Д) 17 мл - 30-33% перекису водню та 69 мл - 50% мурашиної кислоти

Е) 100 мл - 6% перекисю водню та 70 мл - 30-33% мурашиної кислоти

257. У пацієнта раптовий гострий біль у поперековій ділянці з правого боку, іррадіює в стегно. Позитивний симптом Пастернацького. Для якої патології характерні дані ознаки?

- * А) Ниркова колька**
- В) Гострий холецистит
- С) Печінкова колька
- Д) Гострий панкреатит
- Е) Гострий апендицит

258. Постраждалий отримав травму грудної клітки. Накладений дренаж за Бюлау. При якій патології він використовується?

- * А) Клапанний пневмоторакс**
- В) Розрив печінки
- С) Защемлена грижа
- Д) Черепно-мозкова травма
- Е) Гострий апендицит

259. У хворої раптово виник біль в правій здухвинній ділянці, часте сечовипускання. При огляді - симптом Пастернацького позитивний справа. Який попередній діагноз?

- * А) Правобічна ниркова коліка**
- В) Гострий апендицит
- С) Гострий холецистит
- Д) Гостра непрохідність кишечника
- Е) Гострий панкреатит

260. Хвора госпіталізована в хірургічне відділення з діагнозом апендикулярний інфільтрат. Якою повинна бути подальша тактика?

*** А) Консервативне лікування**

- В) Апендектомія в ургентному порядку
- С) Вскриття гнояка
- Д) Дренування інфільтрату
- Е) Амбулаторне лікування

261. У хворої з'явився біль в епігастрії, який до ранку перемістився в праву здухвинну ділянку. При огляді - позитивний симптом Щоткіна-Блумберга. Встановіть попередній діагноз:

*** А) Гострий апендицит**

- В) Кишкова коліка
- С) Аднексит
- Д) Сальпінгіт
- Е) Ниркова коліка

262. Хворий скаржиться на оперізуючий біль в епігастрії, блювання. При пальпації - біль в лівому реберно-хребетному куті, пульсація черевного відділу аорти не визначається. Який стан розвинувся у хворого?

*** А) Гострий панкреатит**

- В) Гострий апендицит
- С) Проривна виразка
- Д) Гострий холецистит
- Е) Розрив аневризми аорти

263. Хворий скаржиться на біль в правому підребер'ї з іррадіацією в спину та праве плече, блювання. Позитивні симптоми Ортнера, Щьоткіна-Блюмберга. Яке подальше лікування повинно бути?

*** А) Оперативне лікування**

- В) Поперекова новокаїнова блокада
- С) Введення промедолу
- Д) Введення спазмалгону
- Е) Блокада круглої зв'язки печінки

264. У клініку доставлено пацієнта з гострим панкреатитом, зі скаргами на оперізуючий біль у верхній половині живота. Яке дослідження буде найбільш інформативним для постановки діагнозу?

*** А) Визначення амілази крові**

- В) Зняття ЕКГ
- С) Загальний аналіз крові
- Д) Оглядовий знімок грудної клітини
- Е) Оглядовий знімок черевної порожнини

265. У дитини при пальпації передньої черевної стінки визначається болісне пухлиноподібне утворення. Дитина неспокійна, постійно плаче. При пальцевому ректальному дослідженні на рукавичці - сліди крові з домішком слизу. Що має місце у дитини?

*** А) Інвагінація**

- В) Гострий апендицит
- С) Пухлина сигмоподібної кишки
- Д) Поліп прямої кишки
- Е) Синдром портальної гіпертензії

266. У хворої К, оперованої з приводу апендициту рік тому виникли біль у животі, блювання, затримка газів. При рентгенографії органів черевної порожнини - множинні “чаші Клойбера”. Встановіть попередній діагноз:

*** А) Спайкова хвороба**

- В) Пухлина товстої кишки
- С) Пухлина тонкої кишки
- Д) Защемлена грижа
- Е) Дивертикуліт товстої кишки

267. В приймальне відділення доставлено хворого з защемленою пупковою грижею. Під час огляду грижове випинання вправилось. Яка подальша тактика ведення хворого повинна бути?

*** А) Госпіталізувати для спостереження**

- В) Відпустити додому
- С) Лікувати консервативно
- Д) Госпіталізувати і екстрено оперувати
- Е) Рекомендувати носити бандаж

268. При огляді на дому пацієнта з жовчнокам'яною хворобою медична сестра звернула увагу на те, що у хворого з'явилися різкий біль в правому підребер'ї, пожовтіння склер і шкіри, ахолічний кал. Вкажіть тактику медсестри:

*** А) Термінова доставити пацієнта в лікарню**

- В) Призначення дієти №5 за Певзнером
- С) Проведення діагностичних заходів по уточненню діагнозу
- Д) Консервативна терапія в амбулаторних умовах
- Е) Спостереження за хворим в умовах поліклініки

269. У хворії з гострим панкреатитом у копрологічному дослідженні стеаторея за рахунок нейтрального жиру, креаторея. Призначення яких препаратів є найбільш раціональним?

*** А) Поліферментних препаратів**

- В) Холінолітиків
- С) Метронидазолу та лоперамиду
- Д) Антацидів та спазмолітинів
- Е) Холінолітиків та антибактеріальних препаратів

270. У хворії з виразковим анамнезом з'явилося блювання кавововою гущею, біль відсутній, слабкість, шкіра бліда, тахікардія, ниткоподібний пульс. Який стан має місце у хворії?

*** А) Шлункова кровотеча**

- В) Перфорація виразки шлунка
- С) Гостра кишкова непрохідність
- Д) Печінкова коліка
- Е) Гострий апендицит

271. Під час профілактичного огляду пацієнтки встановлено діагноз злоякісного новоутворення правої молочної залози. Які ознаки найбільш характерні для даної патології?

*** А) Утягнутість соска справа**

- В) Схуднення пацієнтки
- С) Збільшення правих пахових лімфовузлів
- Д) Порушення менструального циклу
- Е) Відсутність апетиту

272. Постраждалий на полі бою отримав проникаюче поранення грудної клітки. Яке положення на період транспортування слід надати пацієнту з пневмотораксом?

*** А) Напівсидяче**

- В) Горизонтальне на спині
- С) Горизонтальне на животі
- Д) З опущеною головою
- Е) З піднятими ногами

273. Медична сестра надає допомогу на полі бою пораненому. Які першочергові дії при відкритому переломі стегна з пошкодженням стегнової артерії?

*** А) Накладання артеріального джгута**

- В) Проведення іммобілізації кінцівки
- С) Проведення туалету рани стегна
- Д) Надання горизонтального положення
- Е) Інфузія кровозамінників

274. Медична сестра готує пацієнта до апендектомії. Що слід зробити перед операцією цьому пацієнту?

*** А) Премедикацію**

- В) Зондування шлунку
- С) Катетеризацію сечового міхура
- Д) Очисну клізму
- Е) Повну санітарну обробку

275. Для якої гострої хірургічної патології характерні: переймоподібний біль у животі, нудота, блювання, відсутність випорожнень та відходження газів?

*** А) Гостра кишкова непрохідність**

- В) Перфоративна виразка шлунку
- С) Гострий апендицит
- Д) Гострий панкреатит
- Е) Гострий холецистит

276. На стаціонарному лікуванні у відділенні судинної хірургії знаходиться пацієнтка Г., 57 р. з варикозним розширенням вен нижніх кінцівок. Яке ускладнення може виникнути у пацієнтки з даною патологією?

*** А) Гострий тромбофлебіт**

- В) Гангрена нижніх кінцівок
- С) Остеомієлії гомілки
- Д) Бешихове запалення
- Е) Артеріальна кровотеча

277. На стаціонарному лікуванні у відділенні гнійної хірургії перебуває пацієнт у важкому стані. Яка ускладнення можливе у пацієнта з постійним гумовим катетером у сечовому міхурі?

*** А) Інфікування сечового міхура**

- В) Перфорація сечового міхура
- С) Аденома передміхурової залози
- Д) Сечокам'яна хвороба
- Е) Напад ниркової кольки

278. Пацієнт з черепно-мозковою травмою повторно втратив свідомість через 2 години після травми. Під час огляду визначається анізокорія. Який ймовірний діагноз в даному випадку?

*** А) Здавлення головного мозку**

В) Струс головного мозку

С) Забій головного мозку

Д) Непритомність

Е) Колапс

279. Пацієнтка після черепно-мозкової травми скаржиться на головний біль, нудоту, блювання. Відмічає короткочасну (протягом 2-3 хвилин) втрату свідомості. З чим пов'язані проблеми пацієнтки?

*** А) Струсом головного мозку**

В) Забоєм головного мозку

С) Здавленням головного мозку

Д) Колапсом

Е) Непритомністю

280. У пацієнта з термічним опіком в ділянці тильної поверхні правої кисті відзначаються гіперемія шкіри та пухирі, заповнені прозорою рідиною. Який ступінь опіку?

*** А) II**

В) I

С) III-A

Д) IV

Е) III-Б

281. До медичного пункту хімічного комбінату доставлено потерпілого В., 34 р. З опіком каустичною содою. Що слід використати після промивання проточною водою?

*** А) 2% розчин борної кислоти**

- В) 2% розчин натрію гідрокарбонату
- С) 3% розчин пероксиду водню
- Д) 0,9% фізіологічний розчин
- Е) 0,02% розчин фурациліну

282. В травматологічний пункт звернувся пацієнт з укушеною раною правого передпліччя. Що Ви використаєте в першу чергу з метою неспецифічної профілактики сказу при укусах вуличною собакою?

*** А) Промити рану розчином господарського мила**

- В) Промити рану 6% розчином перекису водню
- С) Промити рану 0,02% розчином фурациліну
- Д) Промити рану 70% розчином спирту
- Е) Промити рану 2% розчином натрію гідрокарбонату

283. В проктологічному відділенні знаходиться пацієнт К., 45 р. Яке обстеження використовується з метою уточнення діагнозу “поліп прямої кишки”?

*** А) Ректороманоскопія**

- В) Рентгенологічне
- С) Колоноскопія
- Д) Пальцьове
- Е) Ультразвукове

284. Пацієнт з виразковою хворобою шлунку скаржиться на різке схуднення, погіршення стану і відразу до м'ясної їжі. Який стан розвинувся у пацієнта?

*** А) Рак шлунку**

- В) Коліт
- С) Ожиріння
- Д) Пневмонія
- Е) Ентероколіт

285. У пацієнта С. 47 років, який страждає 18 років на виразкову хворобу шлунку, розвинулась шлункова кровотеча. Яку невідкладну допомогу повинна надати хворому медична сестра?

*** А) Покласти міхур із льодом**

- В) Накласти зігрівальний компрес
- С) Провести загальний масаж
- Д) Покласти теплу грілку
- Е) Поставити гірчичники

286. У пацієнта Ф., 54 років, страждає на сечокам'яну хворобу, ввечері, після фізичного навантаження, виник переймоподібний біль у поперековій ділянці, який віддає у зовнішні статеві органи. З чого почати надання невідкладної допомоги пацієнтові медсестрою-бакалавром?

*** А) Покласти гарячу грілку на поперекову ділянку**

- В) Покласти міхур із льодом на поперекову ділянку
- С) Ввести внутрішньо-м'язево розчин папаверину
- Д) Ввести підшкірно розчин промедолу
- Е) Провести гарячу ніжну ванну

287. У хворої М., 68 р., яка протягом 16 років страждає варикозним розширенням поверхневих вен обох нижніх кінцівок, раптово виникла кровотеча з варикозного вузла в нижній третині правої гомілки. У чому полягає перша допомога хворій?

*** А) Накладання тиснучої пов'язки**

- В) Накладання джгута-закрутки
- С) Максимальне підняття кінцівки
- Д) Максимальне згинання кінцівки
- Е) Провести ПХО рани

288. Хворий К., 29 років, скаржиться на помірний біль у лівому підребер'ї, запаморочення. Біля 14 год. тому впав на лівий бік. Блідість, пульс - 118/хв., АТ- 90/50 мм рт.ст. Незначне напруження м'язів передньої черевної стінки, притуплення перкуторного звуку у відлогих місцях. Що у хворого?

*** А) Гемоперитонеум**

- В) Перелом ребер зліва
- С) Забій грудної клітини
- Д) Гемоторакс
- Е) Перитоніт

289. Хворий, 30 років, біля 1 год. тому впав з висоти - 1,5 метра на правий бік. Скаржиться на сильний біль у правому підребер'ї, запаморочення. Положення вимушене на правому боці. Блідість, пульс - 120/хв., АТ- 100/50 мм рт.ст. Живіт при пальпації болючий, незначне напруження м'язів передньої черевної стінки, більше зправа, притуплення перкуторного звуку по правому фланку. Що у хворого?

*** А) Гемоперитонеум**

- В) Пневмоторакс
- С) Гемоторакс
- Д) Перфорація виразки
- Е) Гнійний перитоніт

290. Хворий 25 р., хворіє з дитинства на гемофілію А. Об'єктивно: гемартроз колінного суглоба. На тілі виявлені численні синці. Пульс - 80/хв., ритмічний, задовільного наповнення. АТ- 110/70 мм рт.ст. Який препарат крові показаний для зупинки кровотечі у даного пацієнта?

*** А) Кріопреципітат**

- В) Тромбомаса
- С) Лейкомаса
- Д) Еритромага
- Е) Альбумін

291. Що повинна зробити чергова медсестра тяжко хворому у післяопераційному періоді з метою профілактики розходження країв операційної рани та евентерації?

*** А) Застосувати бандаж**

- В) Покласти мішечок з піском
- С) Лікувальні фізичні вправи
- Д) Активне положення хворого в ліжку
- Е) Покласти міхур з льодом

292. Ви працюєте перев'язувальною сестрою у хірургічному відділенні. Ввечері, перев'язуючи хворого 40 р. з ампутованою кінцівкою, ви помітили значний набряк кукси, при пальпації відчули підшкірну емфізему. Назвіть першочергові дії медичної сестри при даному ускладненні:

*** А) Негайно ізолювати хворого і викликати лікаря**

- В) Здійснити перев'язку й викликати чергового хірурга
- С) Викликати по телефону з дому родичів хворого
- Д) Викликати по телефону з дому чергового лікаря
- Е) Здійснити перев'язку й ізолювати хворого

293. До Вас звернулась сусідка - 1,5 хвилини тому отримала різану рану плеча. При огляді виявлено кровотечу пульсуючою струминою в середній третині плеча. Вкажіть найефективніший метод тимчасової зупинки кровотечі:

*** А) Накладання джгута-закрутки**

- В) Підвищене положення кінцівки
- С) Максимальне згинання кінцівки в суглобі
- Д) Туга тампонада рани
- Е) Холод на рану

294. Ви працюєте в урологічному відділенні, куди щойно поступив хворий з аденомою передміхурової залози, який скаржиться на біль внизу живота, неможливість сечовипускання. Вкажіть дію медичної сестри при наданні невідкладної допомоги:

*** А) Катетеризація сечового міхура**

- В) Дати сечогінні препарати
- С) Покласти міхур з льодом на живіт
- Д) Дати спазмолітичні препарати
- Е) Дати знеболюючі препарати

295. У хворого на виразкову хворобу виникло блювання у вигляді кавової гущі і чорні рідкі випорожнення. Яку невідкладну допомогу повинна надати медсестра до приходу лікаря?

*** А) Покласти міхур з льодом на живіт**

- В) Промити шлунок холодною водою
- С) Промити шлунок розчином перманганату калію
- Д) Дати ковтати хворому шматочки льоду
- Е) Ввести розчин церукалу внутрішньом'язево

296. Під час клінічного обстеження пацієнта К., 33 років. Ви виявили скарги на біль, набряк і почервоніння шкіри. Об'єктивно: на внутрішній поверхні стегна визначається округлий інфільтрат, який дещо виступає над її поверхнею. В центрі інфільтрату є білуватий стрижень. Який діагноз можна поставити?

*** А) Фурункул**

- В) Абсцес
- С) Флегмона
- Д) Гідраденіт
- Е) Бешиха

297. Ви працюєте в перев'язувальному кабінеті хірургічного відділення. Лікар призначив пацієнту з гнійною раною застосувати протеолітичні ферменти під час наступної перев'язки. Назвіть мету їх застосування:

*** А) Лізис некротичних тканин**

- В) Знеболення
- С) Поліпшення кровообігу тканин
- Д) Утворення лінійного рубця
- Е) Зменшення температури тіла

298. Під час проведення проби на резус - сумісність крові донора та реципієнта в пробірці відбулась реакція аглютинації. Вкажіть, який висновок зробить медична сестра з записом в медичну документацію?

*** А) Не сумісна по Rh фактору**

- В) Резус - позитивна
- С) Сумісна по Rh фактору
- Д) Резус - негативна
- Е) Пробу треба переробити

299. До Вас звернулася сусідка, яка тиждень тому наколола ногу на городі. До лікаря не зверталась, лікувалась вдома. Скарги на сіпаючий біль у рані, напруження жувальних м'язів. Обличчя має страждальний вираз. Вкажіть, що з хворою:

*** А) Правець**

В) Гнійна рана

С) Остеомієліт

Д) Неврит лицьового нерва

Е) Бешиха

300. Хірург планує провести пацієнту з пневмотораксом плевральну пункцію. Вкажіть місце оброблення операційного поля для майбутньої пункції:

*** А) II міжребіря по середньо-ключичній лінії**

В) VII міжребіря по задньо-пахвинній лінії

С) VI міжребіря по парагрудинній лінії

Д) VII міжребіря по лопатковій лінії

Е) IV міжребіря по середньо-пахвинній лінії