

ЗАВАНТАЖЕНО З САЙТУ ТЕСТУВАННЯ.УКР

Сестринська справа - Клінічне медсестринство в педіатрії - база тестів 2017 року

Категорія: **Бази тестів українською мовою 2017 року**

Кількість запитань: **278**

1. У дівчинки 5 років встановлено діагноз гостра ниркова недостатність. Які препарати призначають для профілактики ДВЗ синдрому дітям з такою патологією:

*** А) Гепарин**

В) Лазикс

С) 10% розчин глюкози

Д) 10% розчин кальцію глюконату

Е) Бісептол

2. Ви медсестра пологового будинку проводите санітарно-освітню роботу серед вагітних. Який термін гестації визначає доношену вагітність?

А) 37-42 тижнів

В) 34-36 тижнів

С) 32-34 тижнів

Д) 38-42 тижнів

Е) 37-40 тижнів

3. У дитини 10 місяців відбулася короткочасна зупинка дихання, яке відновилося з “півнячим” криком. Які препарати треба негайно ввести дитині?

*** А) Сібазон, кальцію глюконат**

В) Фенкарол, кальцію глюконат

С) Лазикс, ізотонічний р-н натрію хлориду

Д) Магнію сульфат, глюкозу

Е) Фенобарбітал, піпольфен

4. Для нормалізації рівня глюкози в крові і покращення її метаболізму при гіпоглікемічній комі дітям вводять:

- A) 40% р-н глюкози, кокарбоксилазу
- B) 5% р-н глюкози, аскорбінову кислоту
- C) 10% р-н глюкози, панангін
- D) Ізотонічний р-н натрію хлориду, інсулін
- E) 4% р-н бікарбонату натрію

5. При якому захворюванні збудник повітряно-краплинної інфекції передається через плаценту:

*** A) Краснуха**

- B) Кір
- C) Скарлатина
- D) Коклюш
- E) Дифтерія

6. Для встановлення остаточного діагнозу при кишкових інфекціях у дітей використовують дослідження:

*** A) Бактеріологічне дослідження випорожнень**

- B) Загальний аналіз крові
- C) Визначення вмісту білірубіну в крові
- D) Визначення жовчних пігментів в сечі
- E) Кал на яйця глистів

7. Вкажіть захворювання, після якого найчастіше виникає гостра ревматична лихоманка (ревматизм) у дітей:

*** А) Ангіна**

- В) Гострий бронхіт
- С) Пневмонія
- Д) Гострий холецистит
- Е) Вітряна віспа

8. Назвіть захворювання, яке проявляється полідипсією, поліфагією, поліурією:

*** А) Цукровий діабет**

- В) Гострий бронхіт
- С) Пневмонія
- Д) Гострий холецистит
- Е) Гіпотиреоз

9. Лікування цукрового діабету I типу у дітей проводять таким препаратом:

*** А) Інсулін**

- В) Панкреатин
- С) Супрастин
- Д) Преднізолон
- Е) Фуросемід

10. У дитини 5-ти місяців, хворої на рахіт, під час крику з'являється короткочасна зупинка дихання. Про який стан можна думати?

*** А) Ларингоспазм**

- В) Еклампсія
- С) Пневмонія
- Д) Карпопедальний спазм
- Е) Кашлюк

11. Медична сестра у 12-ти річної дівчинки виявила такі симптоми: полідипсію, поліфагію, поліурію, втрату ваги тіла. Ці симптоми вказують на таке захворювання:

*** А) Цукровий діабет**

- В) Анемію
- С) Ревматизм
- Д) Пієлонефрит
- Е) Цистит

12. У новонародженої дитини частота скорочень серця - 92/хв., дихання нерегулярне, м'язовий тонус знижений, кінцівки ціанотичні, на подразнення катетера - гримаса. Дайте оцінку цієї дитині за шкалою Апгар:

*** А) 5-6 балів**

- В) 7-8 балів
- С) 9-10 балів
- Д) 3-4 бали
- Е) 1-2 бали

13. Ви дільнична медсестра, на патронажі у здорової дитини 3-х місяців. Для розрахунку добового об'єму їжі ви використовуєте об'ємний метод. Який добовий об'єм їжі потрібен цій дитині?

*** А) 1/6 маси тіла**

- В) 1/5 маси тіла
- С) 1/7 маси тіла
- Д) 1/8 маси тіла
- Е) 1/4 маси тіла

14. У дитини 7-ми місяців визначаються блідість шкіри та слизових. У крові: ер. - 2,8 Т/л, Нб- 95 г/л. В анамнезі нераціональне вигодовування, порушення режиму. На яку патологію вказують дані проблеми?

*** А) Залізодефіцитну анемію**

- В) Тромбоцитопенічну пурпуру
- С) Геморагічний васкуліт
- Д) Лейкоз
- Е) Гемофілію

15. У дитини хвороба почала проявлятися на другому році життя, коли мати помітила появу великих синців після незначних травм. В стаціонар дитина поступила з крововиливом у колінний суглоб. Про яке захворювання треба думати?

*** А) Гемофілія**

- В) Ревматичний артрит
- С) Ревматоїдний артрит
- Д) Тромбоцитопенічна пурпура
- Е) Геморагічний васкуліт

16. Медична сестра обстежила здорову дитину віком 1 рік та підрахувала частоту серцевих скорочень. Вона має бути приблизно:

*** А) 120/хв.**

- В) 100/хв.
- С) 85/хв.
- Д) 70/хв.
- Е) 140/хв.

17. У 6 місячної дитини з явними проявами рахіту, під час крику раптово сталася зупинка дихання. Лікарський діагноз: спазмофілія. Ларингоспазм. Найбільш вірогідним медсестринським діагнозом буде:

*** А) Зупинка дихання**

- В) Стенозуючий ларинготрахеїт
- С) Еклампсія
- Д) Гіпервітаміноз Д
- Е) Карпопедальний спазм

18. Дитині 2 роки. Скарги на підвищення t° до 38°C , кашель, нежить, кон'юнктивіт, гіперемію зіва. Який діагноз найбільш вірогідний?

*** А) Аденовірусна інфекція**

- В) Кір
- С) Коклюш
- Д) Пневмонія
- Е) Трахеобронхіт

19. Дитина 9-ти років скаржиться на слабкість, головний біль, біль за грудиною, сухий кашель. Об'єктивно: шкіра бліда, t° - $38,6^{\circ}\text{C}$. При аускультатії легень вислуховується жорстке дихання, з обох боків сухі та різнокаліберні вологі хрипи, кількість яких після кашлю зменшується. Перкуторно: над легеньми ясний легеневий звук. Рентгенологічно: симетричне посилення легеневого малюнка, розширення коренів легень. Вкажіть наймовірніше захворювання:

*** А) Гострий бронхіт**

- В) Бронхіальна астма
- С) Гостра пневмонія
- Д) Гострий бронхіоліт
- Е) Гострий ларинготрахеїт

20. При обстеженні семирічної дитини виявлено укорочення перкуторного звуку над легеньми - нижче кута лопатки, при аускультатії - там же вислуховується жорстке дихання і дрібно-пухирчасті хрипи. Про яке захворювання може думати медсестра?

*** А) Про вогнищеву пневмонію**

- В) Про гостру вірусну інфекцію
- С) Про гострий ларинготрахеїт
- Д) Про гострий назофарингіт
- Е) Про гострий бронхіт

21. У дитини 4-х місяців медична сестра визначила дефіцит ваги тіла - 26% у порівнянні з вагою, що повинна бути. Надайте характеристику цьому хронічному розладу живлення:

*** А) Гіпотрофія II ступеня**

- В) Гіпотрофія I ступеня
- С) Гіпотрофія III ступеня
- Д) Паратрофія II ступеня
- Е) Паратрофія III ступеня

22. Хлопчик 9-ти років скаржиться на частий сечопуск, болі в животі, нудоту, одноразове блювання, підвищення t° тіла до $37,7^{\circ}\text{C}$. Хворіє 3 дні. При огляді шкірні покриви бліді, АТ- 105/60 мм рт.ст. Тони серця звучні, діяльність ритмічна, Рс- 100/хв., ЧД- 26/хв. Симптом Пастернацького позитивний зліва. Загальний аналіз сечі: питома вага - 1012, білок - 0,16 г/л, лейкоцити - 30-50 в полі зору, еритроцити - 3-4 в полі зору, бактерії - велика кількість. Вкажіть ймовірний діагноз:

*** А) Пієлонефрит**

- В) Цистит
- С) Сечо-кам'яна хвороба
- Д) Гломерулонефрит
- Е) Сечокислий інфаркт нирок

23. Через 2 тижні після перенесеної ангіни у хлопчика 10-ти років з'явився головний біль, набряки в області повік, макрогематурія. Для якого захворювання характерні ці симптоми:

*** А) Гломерулонефриту**

- В) Ревматизму
- С) Пієлонефриту
- Д) Пневмонії
- Е) Холециститу

24. У дівчини віком 9 років через 2 тижні після перенесеної ангіни з'явилась ангулярна еритема, ознаки поліартриту. Об'єктивно: блідість шкіри, задишка, тахікардія, розширення меж серця. Яке захворювання виникло у дівчини?

*** А) Гостра ревматична лихоманка**

- В) Пневмонія
- С) Вегетососудиста дистонія
- Д) Анемія
- Е) Системний червоний вовчак

25. Дитині 3 місяці. На грудному вигодовуванні. Під час обстеження медична сестра виявила у дитини підвищену пітливість, особливо в ділянці потилиці, симптом "облисіння потилиці", підвищену подразливість, неспокій, податливість країв великого тім'ячка, помірний краніотабес. Про яке захворювання можна думати?

*** А) Про рахіт**

- В) Про пневмонію
- С) Про гідроцефалію
- Д) Про гостре респіраторне захворювання
- Е) Про аномалію розвитку кісток

26. При огляді 5-ти місячної дитини виявлено: різке відставання в психомоторному розвитку, набрякле обличчя з товстими губами та товстим язиком, непропорційно великою головою, на оточення не реагує. Про яке захворювання можна подумати?

*** А) Гіпотиреоз**

В) Гіпертиреоз

С) Акромегалію

Д) Вроджену ваду серця

Е) Рахіт

27. Дитині 7 років була проведена проба Манту. Через 72 години проведені заміри, та виявлено інфільтрат у діаметрі 18 мм. Про що це свідчить?

*** А) Гіперергічна реакція**

В) Негативна реакція

С) Сумнівна реакція

Д) Позитивна реакція

Е) -

28. При відвідуванні хворої дитини 3-х років медична сестра виявила, що температура тіла - 39,3°C, “зірковий” геморагічний висип на тілі, блювота, ригідність м’язів потилиці. Яке захворювання повинна запідозрити медична сестра?

*** А) Менінгококцемію**

В) Малу хорею

С) Туберкульозний менінгіт

Д) Геморагічний васкуліт

Е) Еклампсію

29. Дитина 6 років хворіє на грип. Серед перерахованих виберіть препарат, який має протівірусну дію:

*** А) Анаферон**

- В) Глюканат кальцію
- С) Ампіокс
- Д) Тавегіл
- Е) Парацетамол

30. Дитині 7 років. Скаржиться на переймоподібний біль у животі, часті випорожнення, блювання, підвищення t° тіла до $38,5^{\circ}\text{C}$. Живіт здутий, болючий при пальпації, в лівій здухвинній ділянці. Випорожнення до 10 раз на добу з домішками слизу та крові. Для якого захворювання це характерно?

*** А) Дизентерія**

- В) Сальмонельоз
- С) Холера
- Д) Ешерихіоз
- Е) Харчова токсикоінфекція

31. Під час Вашого чергування в алергологічному відділенні стан дівчинки 10 років, яка лікується з приводу бронхіальної астми, погіршився. На підставі чого медична сестра це запідозрила?

*** А) Експіраторна задишка**

- В) Брадипное
- С) Інспіраторна задишка
- Д) Біль в горлі при ковтанні
- Е) Переймоподібний біль в животі

32. Дитина 8 років поступає на обстеження та лікування в ендокринологічне відділення з підозрою на цукровий діабет. Здійснюючи I етап мед сестринського процесу медична сестра повинна звернути увагу на:

- * А) Наявність захворювання у обох батьків**
- В) Підвищений АТ у дитини
- С) Надмірну вагу тіла
- Д) Початок захворювання після перенесеної пневмонії
- Е) Стать дитини

33. У дитини 6 років скарги на підвищену втомлюваність, пітливість, зниження апетиту, тривалий субфебрилитет, кашель. При обстеженні виявлено блідість шкірних покривів, незначне збільшення лімфовузлів в усіх групах. Реакція Манту - 12 мм. При плануванні мед сестринських втручань найбільш доцільним в обстежені пацієнта буде:

- * А) 3-х разове дослідження харкотиння на наявність МБТ**
- В) Загальний аналіз крові
- С) Аналіз крові на біохімічне дослідження
- Д) Флюорографія
- Е) Бактеріологічне дослідження сечі

34. Ви старша медсестра дитячого дошкільного закладу, в якому стався випадок захворювання дитини на кір. Після госпіталізації дитини в стаціонар в план профілактичних заходів ви включите:

- * А) Карантин на контактних дітей на 21 день з медсестринським спостереженням**
- В) Поточну дезінфекцію, режим провітрювання
- С) Введення контактним дітям імуноглобуліну
- Д) Заключну дезінфекцію
- Е) Проведення лікування антибіотиками

35. Ви старша медсестра дитячої поліклініки. З якого віку в свій план роботи по профілактиці рахіту у недоношених дітей ви включите контроль за своєчасним проведенням специфічної профілактики рахіту?

*** А) 10 доби життя**

В) 1 місячного віку

С) 1 тижня життя

Д) 1,5 місяців

Е) На 2 місяці життя дитини

36. Ви старша медсестра ДДЗ. Хвору дитину ясельної групи госпіталізовано до інфекційного відділення зі скаргами на гарячку, загальну слабкість, багаторазове блювання, часті випорожнення. В чому полягає контролююча роль старшої медсестри щодо дотримання санітарно-протиепідемічного режиму?

*** А) Призначення карантину на 7 днів, заключна дезінфекція**

В) На 21 день поточна дезінфекція

С) На 2 тижні, фізична дезінфекція

Д) На 5 днів хімічна дезінфекція

Е) На 10 днів, заключна дезінфекція

37. Дитині 10 років, скарги на слабкість, біль у горлі при ковтанні, підвищення t° тіла до 39°C . При огляді: шкіра звичайного кольору, в зіві - гіперемія, набряк мигдаликів, гнійні плівки. При реалізації плану мед сестринських втручань ви проконтролюєте обов'язкове обстеження:

*** А) Мазок із зіву та носа на ВЛ**

В) Забір слизу із носоглотки на віруси

С) Взяття крові на біохімічне дослідження

Д) Рентгенологічне

Е) Серологічне

38. Дитині 12 місяців, госпіталізована в педіатричне відділення з приводу сухого кашлю підвищення t° тіла до $38,7^{\circ}\text{C}$. Об'єктивно: стан дитини важкий, дитина млява, виражена блідість слизових оболонок, шкіри, навколо носа і рота - ціаноз. Під час дихання спостерігається втягіння міжреберних проміжків, роздування крил носа. ЧД- 56/хв., ЧСС- 150/хв. Здійснюючи III етап мед сестринського процесу, медична сестра запланує обстеження пацієнта:

*** А) Рентгенологічне**

В) УЗД

С) ЕКГ

Д) Біохімічне дослідження крові

Е) Аналіз сечі по Зимницькому

39. Мати дитини 1-го місяця звернулася зі скаргами на появу у дитини під час годування груддю ціанозу носо-губного трикутника. При огляді виявлено: ціаноз шкіри під час плачу дитини, ЧСС- 170/хв., частота дихання - 60/хв., задишка. Якого обстеження потребує ця дитина?

*** А) Ехокардіографія**

В) Загальний аналіз крові

С) Загальний аналіз сечі

Д) Кров на біохімічне дослідження

Е) Кров на ревмокомплекс

40. Дитині 15 років. Останнім часом батьки відзначають субфебрильну температуру тіла, переважно ввечері, втому, зниження апетиту, пітливість. Під час флюорографічного дослідження виявлено інтенсивну тінь у ділянці кореня легень з нечіткими розпливчатими межами. На результати яких обстежень повинна звернути увагу медична сестра?

*** А) Результати проби Манту**

- В) Загальний аналіз сечі
- С) Загальний аналіз крові
- Д) Біохімічне дослідження крові
- Е) УЗД

41. Етапність плямисто-папульозної висипки, енантеми, плями Філатова-Копліка-Бельського - це симптоми, які вказують на:

*** А) Кір**

- В) Краснуху
- С) Скарлатину
- Д) Вітряну віспу
- Е) Менінгококову інфекцію

42. У новонародженого під час повторного огляду через 1 годину звернули увагу на підвищене збудження і руховий неспокій. Дитина безпричинно кричить, стогне, дихання поверхневе, м'язовий тонус знижений. Виражений периоральний ціаноз. Очі відкриті, спрямовані в одну точку, періодично з'являється збіжна косоокість. Про яку патологію йде мова?

*** А) Внутрішньочерепна пологова травма**

- В) Пневмонія новонародженого
- С) Асфіксія новонародженого
- Д) Кефалогематома
- Е) Синдром дихальних розладів

43. Наявність якого діагностичного синдрому повинна виявити медична сестра при проведенні обстеження пацієнта з захворюваннями нирок:

*** А) Сечового**

- В) Геморагічного
- С) Гіпертермічного
- Д) Зневоднення
- Е) Судомного

44. Хлопчику 10 років призначили з'явитися в процедурний кабінет вранці натще для взяття крові з вени для дослідження. В ході виконання маніпуляції хлопчик зблід і втратив свідомість. Пріоритетна мета сестринських втручань при цьому стані:

*** А) Відновлення свідомості**

- В) Нормалізація пульсу
- С) Підвищення артеріального тиску
- Д) Підвищення діурезу
- Е) Зменшення задишки

45. В гематологічному відділенні перебуває на лікуванні дівчинка 14 років з загостренням тромбоцитопенічної пурпури. Раптово серед ночі виникла кровотеча з лівої половини носа. Яке незалежне сестринське втручання може виконати медична сестра?

*** А) Пальцеве притиснення крила носа до носової перетинки**

- В) Провести передню тампонаду відповідного носового ходу ватним тампоном, змоченим розчином адреналіну
- С) Провести задню тампонаду носа
- Д) Ввести внутрішньом'язово вікасол
- Е) Ввести внутрішньовенно глюконат кальцію

46. При огляді новонародженого медсестра зауважила, що у дитини світла шкіра, голубі очі, риже волосся, відчутний затхлий “мишачий” запах тіла. Такі ознаки характерні для:

A) Гемофілії

*** B) Фенілкетонурії**

C) Вродженого гіпотиреозу

D) Хвороби Дауна

E) Целіакії

47. Ви працюєте дільничною медичною сестрою. При відвідуванні дитини 8 місяців, у якої виражені симптоми рахіту, раптово при плачі виникла зупинка дихання. Дихання відновилося через кілька секунд, спостерігався шумний вдих - “півнячий крик”. Введення якого препарату патогенетично обґрунтоване при цьому стані?

A) 10% р-ну глюконату кальцію

B) 0,01% р-ну адреналіну

C) 20% р-ну глюкози

D) 2,5% р-ну піпольфену

E) 50% р-ну анальгін

48. Дитині 7 місяців. Страждає алергічним діатезом. Знаходиться на штучному вигодовуванні. Хлопчик підвищеного харчування, на щоках яскравий висип, видно сліди розчухів. На волосяній частині голови гнейс. Язик “географічний”. Яке незалежне сестринське втручання можливе при цій аномалії конституції?

*** A) Рекомендувати гіпоалергенну дієту**

B) Призначити лікувальні мазі

C) Призначити антигістамінні препарати

D) Призначити антибіотики

E) Промити шлунок

49. Ви працюєте дільничною медичною сестрою. До Вас звернулась мати хлопчика 4-х років, у якого діагностовано ентеробіоз, з проханням дати їй поради по організації догляду за дитиною. Вкажіть пріоритетну мету сестринських втручань:

*** А) Виключення самозараження**

- В) Підвищення імунітету
- С) Обмеження фізичних навантажень
- Д) Покращення апетиту
- Е) Створення гіпоалергенного середовища

50. Дівчинці 5 років поставлений діагноз вітряна віспа. При патронажі дільнична медична сестра відзначила, що сьогодні дитина млява, турбує свербіж шкіри, з'явилися нові везикули на тулубі, слизових оболонках ротової порожнини, статевих органів. Сформулюйте потенційну проблему пацієнта:

*** А) Можливість інфікування везикул**

- В) Поліморфізм висипу
- С) Зниження апетиту
- Д) Свербіж шкіри
- Е) Висип на шкірі і слизових

51. Ви працюєте медичною сестрою відділення новонароджених пологового будинку. У дитини діагностовано гемолітичну хворобу новонародженого. При огляді немовля мляве, іктеричність шкіри і слизових оболонок. Сформулюйте потенційну проблему пацієнта:

*** А) Погіршення стану при наростанні білірубіну**

- В) Сухість шкіри
- С) Виділення з пупкової ранки
- Д) Гіперемія в природних складках
- Е) Висип на шкірі

52. Ви здійснюєте патронаж до дитини 14 днів. Мати скаржиться на виділення з пупкової ранки у дитини. При огляді Ви відмітили серозно-кров'янисті виділення з пупкової ранки, шкіра навколо пупка не змінена. Загальний стан дитини не порушений, температура тіла - 36,6°C. Сформулюйте потенційну проблему пацієнта:

*** А) Інфікування пупкової ранки**

- В) Лякливість немовляти
- С) Підвищена пітливість
- Д) Гіперемія в природних складках
- Е) Сухість шкіри

53. Дитині 9 місяців. На протязі 3 днів лікується з приводу грипу. Сьогодні стан раптово погіршився, дитина стала неспокійною, з'явилося шумне дихання, "гавкаючий" кашель, ознаки дихальної недостатності. З розвитком якого невідкладного стану пов'язане погіршення стану дитини?

*** А) Стенозуючого ларингіту**

- В) Гострого бронхіту
- С) Пневмонії
- Д) Ангіни
- Е) Нападу бронхіальної астми

54. Дитині 5,5 місяців. Перебуває на нераціональному штучному вигодовуванні (коров'ячим молоком). При введенні жовтка у дитини з'вилася плямисто-попульозна висипка по всьому тілу, на щоках яскрава гіперемія, злущення шкіри, мокнучі ділянки, екскоріація. Про який стан необхідно думати в даній ситуації?

*** А) Алергічний діатез**

- В) Нервово-артритичний діатез
- С) Лімфатико-гіпопластичний діатез
- Д) Кропив'янка
- Е) Геморагічний діатез

55. Хворий віком 13 років звернувся до невропатолога на дратівливість, швидку стомлюваність, мимовільне скорочення м'язів обличчя, зміну почерку. За місяць до того перехворів на ангіну. Яке захворювання має подібний перебіг?

*** А) Гостра ревматична лихоманка, мала хорея**

- В) Спазмофілія, карпопедальний спазм
- С) Менінгококова інфекція, менінгококцемія
- Д) Поліомієліт. Спінальна форма
- Е) Нервово-артритичний діатез

56. До медичної сестри звернулась мама доношеної дитини 1 місяць, якій лікар призначив вітамін Д для профілактики рахіту. Якою повинна бути щоденна доза цього препарату?

*** А) 500 МО один раз на добу**

- В) 500 МО два рази на добу
- С) 500 МО через день
- Д) Вітамін D можна не давати, оскільки дитина на грудному вигодовуванні
- Е) 1000 МО один раз на добу

57. До медичної сестри звернулась мама з дитиною 2-х місяців зі скаргами на появу лимонно-жовтуватих лусочок на волосяній частині голови. Яку проблему пацієнта має вирішити медсестра?

*** А) Гнейс**

- В) Дитяча екзема
- С) Псевдофурункульоз
- Д) Педикульоз
- Е) Строфулюс

58. Медсестра відвідала дитину 4-х місяців через добу після введення АКДП-вакцини. Мама повідомила, що дитина погано спить, вередлива, мляво смокче, спостерігалось підвищення температури тіла до 37,4°C. Місцево: в ділянці ін'єкції інфільтрат - 1,8 см в діаметрі. Оцініть стан дитини:

*** А) Поствакцинальна реакція**

- В) ГРВІ
- С) Рахіт
- Д) Діарея
- Е) Анемія

59. Дитині 7 днів, народилась масою - 4200, довжина тіла - 59 см. Пологи стрімкі, в потиличному передлежанні. В ділянці потиличної кістки пальпується пухлина м'якої консистенції, обмежена цією кісткою. Загальний стан не порушений. Про яку пологову травму свідчать дані симптоми?

*** А) Кефалогематома**

- В) Пологова пухлина
- С) Підшкірний крововилив
- Д) Водянка головного мозку
- Е) Запалення головного мозку

60. У дитини 6 місяців, яка перебуває на штучному вигодовуванні при обстеженні виявлено: виражені лобні і тім'яні горби, велике тім'ячко має розміри 3х4 см, край його потовщений, на ребрах чотки. Яке захворювання у дитини?

*** А) Рахіт, період розпалу, підгострий перебіг**

- В) Рахіт, початковий період, гострий перебіг
- С) Рахіт, період залишкових явищ
- Д) Рахіт, період розпалу, гострий перебіг
- Е) Спазмофілія, карпопедальний спазм

61. Мама дитини, у якої діагностовано вроджену ваду серця звернулась до медичної сестри з питанням: “Чому у її дитини спостерігається ціаноз губ та кінцівок?”

*** А) Через змішування артеріальної та венозної крові**

- В) Внаслідок слабкості лівого шлуночка
- С) Паралічу дихального центру
- Д) Звуження повітроносних шляхів
- Е) Як результат анемії

62. Ви проводите медсестринське обстеження дитини у віці 3 місяці. Народилася з масою - 3300 г, довжиною - 53 см. При визначенні маси тіла Ви отримали результат - 4500 г. Який дефіцит маси тіла?

*** А) 1000 г**

- В) 900 г
- С) 800 г
- Д) 700 г
- Е) 600 г

63. Ви - медична сестра-бакалавр, прийшли на перший патронаж до дитини 5 днів. Після огляду новонародженої дитини встановлено діагноз: “Здоровий”. В яку медичну документацію потрібно внести відомості про дитину?

*** А) Історія розвитку дитини (ф112)**

- В) Історія розвитку новонародженого (ф097)
- С) Карта профілактичних щеплень (ф063)
- Д) Медична карта стаціонарного хворого (ф003)
- Е) Екстренне повідомлення в СЕС (ф058)

64. Ви - медична сестра дитячого відділення пологового будинку. Народилася дівчинка на 40 тижні вагітності з масою тіла - 3200 г, ростом - 50 см. Оцінка стану новонародженої за шкалою Апгар - 9 балів. На який день життя дитини проводять вакцинацію проти туберкульозу?

*** А) 3-5 день життя**

В) 1 день життя

С) 6 день життя

Д) 7 день життя

Е) 8 день життя

65. Ви - медична сестра дитячої поліклініки. Дитині 7 місяців, народилася недоношеною, перебувала на ранньому штучному вигодовуванні, знаходиться на диспансерному обліку з приводу рахіту. 20 квітня була госпіталізована до дитячої лікарні після нападу ларингоспазму. Які показники крові необхідно враховувати для надання невідкладної допомоги дитині та подальшого лікування?

*** А) Гіпокальцемія**

В) Тромбоцитопенія

С) Лейкоцитоз

Д) Гіпоглікемія

Е) Гіпербілірубпенія

66. Ви - патронажна медична сестра. При огляді 9-ти місячної дитини Ви виявили зупинку дихання, тривалістю до 30 с, ціаноз шкіри обличчя та гучний вдих, що нагадує "півнячий крик". Який із заходів долікарської допомоги слід застосувати?

*** А) Подразнювати корінь язика**

В) Покласти дитину на рівну, м'яку поверхню

С) Підготувати дитину до люмбальної пункції

Д) Вставити між корінними зубами шпатель, обгорнений бинтом

Е) Ввести протисудомні препарати

67. Ви - медична сестра, прийшли на патронаж до дитини 2-х років, яка хворіє ГРВІ. Вночі, на 3 день хвороби, раптово погіршився стан дитини, підвищилась t° до $37,6^{\circ}\text{C}$, дитина неспокійна, дихання шумне - чути на відстані, грубий гавкаючий кашель. Що передбачається у плані медсестринського втручання при даному стані?

*** А) Тепле лужне пиття, лужні інгаляції**

- В) Покласти дитину у ліжко
- С) Дати жарознижуючі препарати
- Д) Дати прохолодне пиття
- Е) Ввести глюконат кальцію

68. Ви - медична сестра дитячого відділу. Машиною швидкої допомоги доставлена п'ятирічна дитина. Зі слів матері захворювання почалося раптово вночі із значного погіршення загального стану. Дитина стала неспокійна, плаче, температура тіла підвищилась до $38,0^{\circ}\text{C}$, з'явився гавкаючий кашель, дихання стало глибоким і частим, його чути на відстані. Про який невідкладний стан можна подумати?

*** А) Гострий стенозуючий ларинготрахеїт**

- В) Астматичний стан
- С) Гострий бронхіт
- Д) Пневмонія
- Е) Ангіна

69. Ви - медична сестра дитячої поліклініки. При проведенні патронажу Ви виявили наступні проблеми у дитини 5 місяців: кволість, t° - $38,5^{\circ}\text{C}$, часте блювання, випорожнення понад 15 разів на добу, знижений діурез, шкіра суха, тім'ячко запале. Для якого стану характерні дані симптоми?

*** А) Синдром токсикозу з ексикозом**

В) Функціональний розлад травлення

С) Пілоростеноз

Д) Ентеробіоз

Е) Гіперглікемічна кома

70. Ви - медична сестра кабінету профілактичних щеплень. Після введення вакцини АКДП у хлопчика віком 1р. 6 міс. з'явилися ознаки анафілактичного шоку. Дитині надано невідкладну допомогу. Який показник буде свідчити про покращення загального стану при оцінці результатів медсестринських втручань?

*** А) Нормалізація АТ**

В) Нормалізація температури тіла

С) Покращення апетиту

Д) Нормалізація випорожнень

Е) Нормалізація сну

71. Ви - медична сестра дитячого відділу. Дитина 2-х років госпіталізована з приводу кашлю та підвищення t° тіла до 39°C . Проводячи медсестринське обстеження Ви відмітили: стан дитини важкий, млява, адинамічна, бліда, кашель сухий, нечастий, має місце задишка змішаного типу, з вираженим ціанозом носогубного трикутника. ЧД- 56/хв, ЧСС- 140/хв. Які проблеми, характерні для дихальної недостатності, Ви виявите при обстеженні пацієнта?

*** А) Участь допоміжних м'язів в акті дихання**

- В) Біль та гіперемію в ділянці грудної клітки
- С) Метеоризм
- Д) Тахікардію, підвищення АТ
- Е) Відсутність апетиту, блювання

72. Ви - медична сестра інфекційного відділу. Дитина 8 років знаходиться на лікуванні з діагнозом: дифтерія зів. Ви, здійснюючи медсестринське обстеження, виявили проблеми, які характерні для даної патології:

*** А) Білувато-сірий наліт на мигдаликах, який важко знімається**

- В) Часті випорожнення
- С) Сильний головний біль
- Д) Підвищення пітливості
- Е) Сухий кашель

73. Ви - медична сестра ендокринологічного відділення. У семирічної дитини, хворої цукровим діабетом, свідомість відсутня, шкіра блідо-рожева, волога, відмічається тризм щелеп, посмикування м'язів кінцівок. Який стан можна запідозрити?

*** А) Гіпоглікемічну кому**

- В) Гіперглікемічну кому
- С) Ниркову кому
- Д) Печінкову кому
- Е) Церебральну кому

74. Ви - медична сестра палати новонароджених пологового будинку. У новонародженої дитини з гемолітичною хворобою після проведення операції замінного переливання крові, медична сестра проводить оцінку результатів медсестринських втручань:

*** А) Зникнення жовтяниці шкірних покривів**

- В) Сухий пупок, блідорожева шкіра навколо пупка
- С) Покращання апетиту і сну
- Д) Нормалізація діяльності серцево-судинної системи
- Е) Нормалізація діяльності дихальної системи

75. Ви - медична сестра інфекційного відділу. При проведенні медсестринського обстеження трьохрічної дівчинки з діагнозом: вітряна віспа, Ви виявили поліморфні висипання на волосяній частині голови, тулубі, кінцівках, свербіж шкіри, температуру тіла - 38,5°C. Що Ви застосуєте для обробки елементів висипки?

*** А) Розчин діамантового зеленого**

- В) Розчин 50% спирту
- С) Стерильну олію
- Д) Розчин риванолу
- Е) Мазь синафлану

76. При обстеженні дитини 10 років, Ви виявили наступні проблеми: біль в горлі, загальну слабкість, зниження апетиту. При об'єктивному обстеженні - температура тіла - 39,0°C, мигдалики збільшені, покриті білим блискучим нальотом, що має чіткі межі, погано знімається тампоном та кровоточить при знятті. Яке дослідження Ви включите в план медсестринських втручань?

*** А) Мазок із зіву і носа на BL**

- В) Змиви з носоглотки на віруси
- С) Сечу на загальний аналіз
- Д) Біохімічний аналіз крові
- Е) Загальний аналіз крові

77. Ви - медична сестра інфекційного відділу. При проведенні медсестринського обстеження новонародженої дитини, Ви запідозрили менінгіт. Здійснюючи IV етап медсестринського процесу, до якого обстеження Ви повинні підготувати дитину?

*** А) До спинномозкової пункції**

- В) До рентгенографії черепа
- С) До енцефалографії
- Д) До ехоенцефалографії
- Е) До ангіографії

78. Згідно плану медсестринських втручань, Ви запросили матір 6-ти місячної дитини в дитячу поліклініку на вакцинацію проти вірусного гепатиту В. При реалізації плану медсестринських втручань вкажіть дозу та метод введення вакцини?

*** А) 0,5 мл в/м в зовнішню поверхню стегна**

- В) 0,5 мл п/ш в плече
- С) 0,1 мл в/ш в передпліччя
- Д) 0,1 мл п/ш в плече
- Е) 1,0 мл в/м в сідницю

79. При проведенні патронажу до дитини 5 років, Ви виявили наступні проблеми: млявість, незначний нежить та кашель. Під час огляду звертає на себе увагу дрібноплямиста висипка на незміненому фоні шкіри, переважно на розгинальних поверхнях кінцівок, на спині, сідницях, збільшення потиличних, задньошийних лімфовузлів, які ущільнені та болючі при пальпації. Яке захворювання можна запідозрити?

*** А) Краснуха**

- В) Кір
- С) Скарлатина
- Д) Геморагічний васкуліт
- Е) Атопічний дерматит

80. Під час ендоскопічного обстеження хлопчика 13 років виявлені зміни слизової оболонки шлунка на тлі яких визначається дефект в кардіальному відділі з фіброзним нальотом. Яке захворювання можна встановити?

*** А) Виразкова хвороба шлунку**

- В) Хронічний гастрит
- С) Хронічний дуоденіт
- Д) Панкреатит
- Е) Дискінезія жовчних шляхів

81. При проведенні патронажу до дитини 4 років, Ви виявили наступні проблеми: біль у горлі, зниження апетиту, порушення сну. Хворіє другий день. Захворювання почалась гостро з підвищення температури тіла до 38°C. Об'єктивно: гіперемія мигдаликів, гній в лакунах, язик з сіруватим нальотом. На помірно гіперемованій шкірі дрібнокрапкова яскравочервона висипка, яка згущується в природніх складках, носогубний трикутник блідий. Яке захворювання можна запідозрити?

*** А) Скарлатина**

- В) Вітряна віспа
- С) Краснуха
- Д) Кір
- Е) Менінгококова інфекція

82. При проведенні патронажу до дитини 4 місяців, Ви виявили наступні проблеми: відмову від їжі, t° тіла 39°C, неспокій дитини, блювання, закрепи. Зі слів матері вказані симптоми з'явилися у дитини після тривалого прийому вітаміну D з метою лікування рахіту. Про яке захворювання можна думати?

*** А) Гіпервітаміноз Д**

- В) Нейротоксикоз
- С) Спазмофілія
- Д) Гостра кишкова інфекція
- Е) Гострий гастрит

83. Ви - медична сестра дитячого відділення. Поступила дитина 20-ти днів. При проведенні медсестринської оцінки стану пацієнта, Ви виявили проблеми: повторне блювання, частий рідкий стілець, підвищення температури тіла до 39,3°C. Стан дитини важкий, вона млява, шкірні покриви бліді з сіруватим відтінком, еластичність шкіри знижена, слизові оболонки сухі, велике тім'ячко запале. З очей та правого слухового ходу відмічаються гнійні виділення, з пупкової ранки - серозно-геморагічні виділення. Про що можна подумати?

*** А) Сепсис новонародженого**

- В) Омфаліт
- С) Ентероколіт
- Д) Отит
- Е) Кон'юнктивіт

84. В інфекційну лікарню поступила десятимісячна дитина з явищами кишкового токсикозу з ексикозом. Реалізуючи IV етап медсестринського процесу, Вам необхідно:

*** А) Призначити оральну регідrataцію**

- В) Нагодувати дитину
- С) Провести гігієнічну ванну
- Д) Взяти кал на копрологічне дослідження
- Е) Провести туалет шкіри і видимих слизових

85. Сімейна медсестра спостерігає за дитиною з гіпотрофією I ступеня в домашніх умовах. На який показник повинна звернути увагу медсестра першочергово?

*** А) Маса тіла дитини**

- В) Форму грудної клітки
- С) Шкірні покриви
- Д) Форму голови
- Е) Зріст дитини

86. У хлопчика 3 місяців під час огляду виявлено асиметрію голови, плоску потилицю, велике тім'ячко - 3,5х3,5 см. На яке захворювання вказують дані симптоми?

*** А) Рахіт**

- В) Ексудативно-катаральний діатез
- С) Спазмофілію
- Д) Нервово-артритичний діатез
- Е) Гіпервітаміноз Д

87. У дитини віком 1,5 року збудження, спостерігається гавкаючий кашель, сиплий голос, інспіраторна задишка, температура тіла - 37,5°C. Який діагноз можна встановити?

*** А) Гострий стенозуючий ларингіт**

- В) Гострий назофарингіт
- С) Гостра поза лікарняна пневмонія
- Д) Гострий бронхіт
- Е) Бронхіальна астма

88. У дитини 3 років, яка хворіє на вогнищеву пневмонію, температура тіла - 39,0°C, шкіра гіперемійована. Яке незалежне медсестринське втручання слід здійснити?

*** А) Прикласти холод на магістральні судини, підвісити міхур з льодом над головою**

- В) Содово-трав'яні інгаляції
- С) Аскорбінова кислота в віковій дозі
- Д) Хлористий кальцій в віковій дозі
- Е) Ввести літичну суміш

89. Хвора дитина 10 років скаржиться на підвищення t° тіла до 38°C , біль в колінних суглобах та в ділянці серця. В анамнезі часті ангіни. Об'єктивно виявлено припухлість і різку болючість, гіперемію шкіри колінних та гомінково-ступневих суглобів. При здійсненні другого етапу медсестринського процесу медсестра виявила, що дані проблеми у пацієнта пов'язані з захворюванням на:

*** А) Гостру ревматичну лихоманку**

- В) Скарлатину
- С) Лейкоз
- Д) Гломерулонефрит
- Е) Геморагічний васкуліт

90. Дитина 4 років захворіла гостро через 7 днів після ГРВІ. На шкірі нижніх кінцівок з'явилася поліморфна, симетрично розташована геморагічно-папульозна висипка, скупчена навколо гомілково-ступневих суглобів. Визначте вірогідне захворювання:

*** А) Геморагічний васкуліт, шкірна форма**

- В) Геморагічний васкуліт, абдомінальна форма
- С) Гемофілія
- Д) Тромбоцитопенічна пурпура
- Е) Хвороба Верльгофа

91. У дитини 5 років важкий стан, шкіра бліда, на ній крововиливи, системне ураження лімфатичних вузлів, збільшення печінки, селезінки, біль у кістках і суглобах. В аналізі крові - різна кількість незрілих клітин, бластні клітини у лейкоцитарній формулі, гемоглобін - 80 г/л , еритроцити - $2,5 \cdot 10^{12}/\text{л}$. Визначте захворювання:

*** А) Лейкоз**

- В) Гемофілія
- С) Геморагічний васкуліт
- Д) Тромбоцитопенія
- Е) Хвороба Верльгофа

92. Дитина 5 років має поганий сон, апетит, стала дратівливою, погано спить вночі, з'явився свербіж у ділянці перианальних складок. Яке захворювання можна запідозрити?

*** А) Ентеробіоз**

- В) Трихоцефальоз
- С) Лямбліоз
- Д) Гемінолєпідоз
- Е) Аскаридоз

93. У хлопчика 10 років на тлі цукрового діабету розвинулася кома з глюкєзурією. Який симптом відповідає цьому стану?

*** А) Запах ацетону з рота**

- В) Клонічні судоми
- С) Слабкість тонів серця
- Д) Олігурія
- Е) Біль в шлунку

94. У хлопчика 13 років, який отримує інсулін, погіршився стан через порушення дієти. Під час об'єктивного обстеження відмічається блідість шкіри, гіпотонус м'язів, запах ацетону з рота, посилення діурезу. На що це вказує?

*** А) Гіперглікемічна кома**

- В) Печінкова кома
- С) Гіпоглікемічна кома
- Д) Уремічна кома
- Е) Колапс

95. Хлопчик 13 років страждає на цукровий діабет, отримує інсулін. Дайте рекомендації щодо часу прийому їжі після введення інсуліну:

*** А) Через 15-20 хвилин після ін'єкції**

В) Через 1 годину після ін'єкції

С) Через 2 години після ін'єкції

Д) Через 3 години після ін'єкції

Е) За 30 хвилин до ін'єкції

96. Хлопчик 14 років страждає на цукровий діабет. Після ін'єкції інсуліну в нього різко погіршився стан. Шкіра бліда, пітливість, мідріаз, підвищення м'язового тону, підвищення сухожильних рефлексів, загальний тремор, судоми, зниження артеріального тиску, тахікардія, розлад психіки, рівень глюкози в крові - 1,4 ммоль/л. Визначте захворювання:

*** А) Гіпоглікемічна кома**

В) Гіперглікемічна кома

С) Печінкова кома

Д) Уремична кома

Е) Колапс

97. У хлопчика, хворого на гемофілію, почалася носова кровотеча. Які засоби треба використати для надання невідкладної допомоги?

*** А) Передню тампонаду носа гемостатичною губкою**

В) Дегідратаційну терапію

С) Серцеві глікозиди

Д) Загальне переливання крові

Е) Їнфузійну терапію

98. Дитина 4-х місяців заходиться на виключно грудному вигодовуванні, нервово-психічний та фізичний розвиток відповідає вікові. Мати цікавиться, з якого віку слід ввести дитині перший прикорм?

*** А) 3 6 місяців**

В) 3 5 місяців

С) 3 4 місяців

Д) 3 7 місяців

Е) 3 8 місяців

99. Вкажіть термін першого прикладання новонародженої здорової дитини до грудей матері в пологовому будинку:

*** А) В перші 30 хв., після народження**

В) Через 2 години після народження

С) Через 3 години після народження

Д) Через 6 годин після народження

Е) Через 1 добу після народження

100. У дитини кашлюк. Для полегшення і усунення кашлю призначено мікстуру, що містить протикашльовий засіб центральної наркотичної дії. Назвіть препарат:

*** А) Кодеїну фосфат**

В) Настій трави термопсису

С) Бронхолітин

Д) Ефедрин гідрохлорид

Е) Тусупрекс

101. Вимірювання артеріального тиску засвідчує: систолічний тиск підвищений, діастолічний - нормальний. У другій половині дня у дитини часто буває головний біль, втома. Визначте діагноз:

*** А) Вегето-судинна дистонія за гіпертонічним типом**

- В) Вегето-судинна дистонія за гіпотонічним типом
- С) Вегето-судинна дистонія змішаного типу
- Д) Анемія
- Е) Міокардит

102. У дитини відмічається зникнення підшкірно-жирової основи на животі та кінцівках, відставання в масі 23%. Цей стан відповідає:

*** А) Гіпотрофії II ступеня**

- В) Гіпотрофії I ступеня
- С) Гіпотрофії III ступеня
- Д) Паратрофії
- Е) Нормотрофії

103. Дитині три місяці. При огляді виявлено наявність на тім'яній ділянці голови себорейні лусочки, попрілості в ділянці сідниць. На яке захворювання вказують перераховані симптоми?

*** А) Ексудативно-катаральний діатез**

- В) Рахіт
- С) Нервово-артритичний діатез
- Д) Паратрофію
- Е) Спазмофілію

104. Дитині два роки. При огляді мають місце температура - 38°C, млявість, розлад сну, тахікардія, вологий кашель, задишка змішаного типу, блідість шкіри, періоральний ціаноз. При аускультції - ослаблене дихання. Такі симптоми визначають при:

*** А) Гострій пневмонії**

- В) Назофарингіті
- С) Гострому стенозуючому ларинготрахеїті
- Д) Бронхіальній астмі
- Е) Гострому бронхіті

105. З перших днів захворювання на тлі загальної слабкості у дитини виникли гіперкінези: гримаси, мимовільні рухи кінцівками. Стан такий відповідає:

*** А) Малій хореї**

- В) Ревматичному міокардиту
- С) Ревматичному поліартриту
- Д) Ревматичному перикардиту
- Е) Вегето-судинній дистонії

106. Блідість шкіри, збільшення лімфатичних вузлів, печінки та селезінки, біль у кістках та суглобах, в крові значна кількість незрілих клітин у лейкоцитарній формулі. Яке захворювання має такий симптомокомплекс:

*** А) Лейкемія**

- В) Гіпопластична анемія
- С) Тромбоцитопенія
- Д) Капіляротоксикоз
- Е) Гемофілія

107. Симптомокомплекс якого захворювання у новонародженої дитини приведено нижче: жовтяниця, що з'явилась в першу добу життя, арефлексія, збільшені печінка та селезінка, збільшений непрямий білірубін в пуповинній крові, погодинний приріст пуповинної крові більший ніж 5,1 ммоль/л:

*** А) Гемолітична хвороба новонародженого**

- В) Пухирчатка новонародженого
- С) Сепсис новонародженого
- Д) Асфіксія новонародженого
- Е) Внутрішньо-черепна травма

108. У дитини 4-річного віку, яка відвідує дитячий дошкільний заклад, діагностовано кір. Яку тривалість карантину Ви встановите в дитячому садочку?

*** А) 21 день**

- В) 14 днів
- С) 10 днів
- Д) 7 днів
- Е) 30 днів

109. У дитини 2-річного віку, яка другу добу хворіє на ГРВІ вночі погіршився стан, голос став охриплим, з'явився гавкаючий кашель, дихання утрудненим (важкий вдих). Вкажіть яке найбільш імовірне ускладнення розвинулося у дитини?

*** А) Гострий стенозуючий ларінготрахеїт**

- В) Напад бронхіальної астми
- С) Пневмонія
- Д) Бронхіт
- Е) Трахеїт

110. Дитині 7 років, скарги на загальну слабкість, підвищення температури до 38,2°C. При огляді виявлено на шкірі дрібно-крапковий висип на гіперемійованому фоні, крім носо-губного трикутника, язик яскраво малинового кольору, прояви катаральної ангіни. Про яке захворювання можна думати в першу чергу?

*** А) Скарлатина**

В) Кір

С) Червона висипка

Д) Кропивниця

Е) Алергічний дерматит

111. Дитина 10 років скаржиться на болі в животі, слабкість. Об'єктивно: температура тіла - 37,9°C, помірна пастозність повік, в загальному аналізі сечі: білок - 0,36 г/л, лейкоцити на все поле зору, еритроцити - 3-4 в п/з. Про яке захворювання можна думати?

*** А) Пієлонефрит**

В) Гломерулонефрит

С) Ниркова коліка

Д) Дисметаболічна нефропатія

Е) Ниркова недостатність

112. Через 3 тижні після перенесеної ангіни у 11-річного хлопчика з'явилися набряки на обличчі, ногах, став турбувати головний біль, сеча стала червоною. Об'єктивно: температура тіла - 37,8°C, набряки повік, АТ- 140/90 мм рт.ст. В аналізі сечі: протеїнурія, гематурія. Для якого захворювання характерні ці симптоми?

*** А) Гострий гломерулонефрит**

В) Хронічний пієлонефрит

С) Гострий пієлонефрит

Д) Ревматизм

Е) Ниркова недостатність

113. Дитина 12 років захворіла раптово, підвищилась температура тіла до 38°C, з'явилися болі у животі, часті випорожнення, тенезми, випорожнення рідкі, з домішками слизу та крові. Об'єктивно: при пальпації живота спостерігається біль у лівій клубовій ділянці. Сигмовидна кишка пальпується у вигляді щільного, болючого тяжу, бурчить. Яке захворювання можна запідозрити?

*** А) Дизентерія**

- В) Сальмонельоз
- С) Аскаридоз
- Д) Вірусна інфекція
- Е) Холера

114. Дитина 7 років захворіла раптово (напередодні вживала тістечка), підвищилась температура тіла до 38°C, турбують болі в животі, часті, рідкі випорожнення, з домішками слизу та крові. Об'єктивно: при пальпації живота визначається болючість в лівій половині живота. Запідозрено дизентерію. Яке дослідження необхідно провести для підтвердження діагнозу?

*** А) Бактеріологічне дослідження калу**

- В) Копрологічне дослідження
- С) Загальний аналіз крові
- Д) Змив із носоглотки на віруси
- Е) Серологічні дослідження

115. У дитини, яка лікується з приводу рахіту, з'явився неспокій, адинамія, анорексія, зригування. Спостерігається раннє закриття швів і тім'ячок. Якому стану відповідають такі симптоми?

*** А) Гіпервітамінозу віт. D**

- В) Гострому перебігу рахіту
- С) Підгострому перебігу рахіту
- Д) Спазмофілії
- Е) Диспепсії

116. У доношеного хлопчика на початку третьої доби життя з'явилась жовтушність шкіри і слизових. Загальний стан задовільний. Печінка і селезінка не збільшені. Сеча і випорожнення мають звичайний колір. У мами і дитини група крові перша, резус-позитивна. Вміст непрямого білірубіну в сироватці крові - 108 мкмоль/л. В сечі відсутні уробілін і жовчні пігменти. Якому стану відповідають наведені ознаки?

*** А) Фізіологічна жовтяниця**

- В) Гемолітична хвороба новонародженого
- С) Гепатит А
- Д) Гепатит В
- Е) Сепсис

117. Здорова дитина віком 20 днів знаходиться на грудному вигодовуванні. Який режим годування доцільно порекомендувати?

*** А) Вільний режим годування**

- В) Через кожні 3 години
- С) Через кожні 3 години з 6-годинною нічною перервою
- Д) Через кожні 4 години
- Е) Через кожні 2,5 години

118. Мати 4-річного хлопчика скаржиться на появу у дитини рожевої дрібно папульозної висипки по всьому тілу. Елементи висипки не зливаються. При об'єктивному обстеженні у хлопчика виявлені збільшені підщелепні, задньошийні і потиличні лімфовузли, які при пальпації щільні, рухомі, дещо болючі, шкіра над ними не змінена. На яке захворювання вказують наведені симптоми?

*** А) Краснуха**

- В) Кіп
- С) Вітряна віспа
- Д) Алергічний дерматит
- Е) Скарлатина

119. Мати дитини 10 днів запитує: "Чи треба давати дитині кип'ячену воду і в якій кількості?" Дитина народилася доношеною з масою тіла - 3400 г, в даний час здорова, температура - 36,3°C, знаходиться на природному вигодуванні, смокче активно, молока достатньо. Яку рекомендацію необхідно дати?

*** А) Годувати грудним молоком, без додаткової рідини**

- В) Давати до 200 мл води на добу
- С) Давати до 100 мл води на добу
- Д) Давати до 50 мл води на добу
- Е) Давати 20 мл води на добу

120. У дитини 7 років підвищений апетит, надлишок маси тіла - 45%, жирова складка на животі - 8 см, під лопаткою - 5 см, задишка при підйомі по сходах. Як Ви оцінюєте стан живлення дитини?

*** А) Ожиріння**

- В) Цукровий діабет
- С) Гіпотрофія III ст.
- Д) Серцева недостатність
- Е) Гіпотрофія I ст.

121. У хлопчика 13-ти років з'явилися спрага, підвищений апетит, рум'янець на щоках, слабкість, добовий діурез збільшився до 6 л. Про яке захворювання можна думати ?

*** А) Цукровий діабет**

- В) Харчове отруєння
- С) Гострий гломерулонефрит
- Д) Гострий пієлонефрит
- Е) Ниркова недостатність

122. У дитини 7 років після переохолодження з'явився кашель, задишка, слабкість, температура тіла підвищилася до 39°C, аускультативно - над лівою легенею ослаблене дихання, крепітуючі хрипи. Про яке захворювання можна думати ?

*** А) Пневмонія**

- В) Бронхіт
- С) Бронхіальна астма
- Д) Кашлюк
- Е) ГРВІ

123. Дитина 5 років хвора на дифтерію ротогорла. Яке специфічне лікування показане в даному випадку?

*** А) Введення протидифтерійної сироватки**

- В) Введення антибіотиків
- С) Введення вакцини АКДП
- Д) Введення вакцини БЦЖ
- Е) Введення жарознижуючих препаратів

124. У дитини 5 років після переохолодження з'явився сухий кашель, температура тіла підвищилася до 38°C, аускультативно - жорстке дихання над усією поверхнею легень. Про яке захворювання можна думати?

*** А) Бронхіт**

- В) Пневмонія
- С) Кашлюк
- Д) Бронхіальна астма
- Е) Грип

125. У дитини 11 років, яка проживає в ендемічному за нестачею йоду регіоні, виявлено збільшення щитоподібної залози. Загальний стан не порушений. Яке захворювання може виникнути у дитини?

*** А) Ендемічний зоб**

- В) Пухлина щитоподібної залози
- С) Токсичний зоб
- Д) Гіпотиреоз
- Е) Гіпоплазія щитоподібної залози

126. Дитину 13 років турбують нудота, блювота, інтенсивний “голодний” біль у животі, при пальпації - виражена болючість в епігастральній ділянці та місці проекції 12-палої кишки. Про яке захворювання можна думати?

*** А) Виразкова хвороба шлунку та 12-палої кишки**

- В) Хронічний гастрит
- С) Дискінезія жовчовивідних шляхів
- Д) Гепатит
- Е) Панкреатит

127. Ви - медична сестра ендокринологічного відділення. У дитини 7 років, що хворіє на цукровий діабет I типу виявлено рівень глюкози - 17 ммоль/л. Яке м/с втручання планується?

*** А) Підшкірне введення інсуліну**

- В) Внутрішньом'язове введення інсуліну
- С) Внутрішньовенне введення інсуліну
- Д) Внутрішньовенне введення глюкози
- Е) Антибіотикотерапія

128. У дитини 7 років після споживання чіпсів з'явилися нудота, блювота, біль у животі. Ацетон сечі (++) . Про який стан можна думати?

*** А) Ацетонемічний синдром**

- В) Хронічний розлад живлення
- С) Гастрит
- Д) Дуоденіт
- Е) Виразкова хвороба шлунку

129. У 4-річної дитини на шкірі обличчя, волосистій частині голови виявлено плями, дрібні папули та везикули (пухирці). Везикули мають овальну форму, різну величину, розташовані на незмінній шкірі. Вміст везикул прозорий. На яке захворювання вказують наведені симптоми?

*** А) Вітряна віспа**

- В) Скарлатина
- С) Кір
- Д) Краснуха
- Е) Ексудативно-катаральний діатез

130. У дитини 13 років скарги на виражену загальну слабкість, високу температуру, біль у горлі. При огляді: ознаки загальної інтоксикації, температура тіла - 38,7°C, мигдалики збільшені, покриті сірим нальотом, який поширюється на м'яке піднебіння і важко знімається шпателем. Дані симптоми вказують на:

*** А) Дифтерія**

- В) Фолікулярна ангіна
- С) Лакунарна ангіна
- Д) Герметичний стоматит
- Е) Скарлатина

131. У дівчинки, що народилася від II вагітності через 3 години після пологів спостерігається жовтяниця. В матері дитини група крові A(II) резус-негативна. Підготовку до яких досліджень повинна проконтролювати старша медична сестра?

*** А) Рівня білірубіну в крові**

- В) Електроліти крові
- С) Клінічний аналіз крові
- Д) Протеїнограми
- Е) Клінічного аналізу сечі

132. Дитина 8 років знаходиться у дитячому гастроентерологічному відділенні з приводу виразкової хвороби шлунка. Медична сестра відділення запідозрила шлунково-кишкову кровотечу. Вкажіть правильні дії медичної сестри до приходу лікаря:

*** А) Заборонити прийом рідини та їжі**

- В) Дати випити холодний рисовий відвар
- С) Покласти теплу грілку на епігастральну ділянку
- Д) Поставити очисну клізму
- Е) Поставити зонд у шлунок

133. Ви медсестра неонатологічного відділення. Які ознаки враховуються при оцінці стану новонародженої дитини за шкалою Апгар?

*** А) ЧСС, ЧД, колір шкіри, рефлекс, м'язовий тонус**

- В) ЧСС, ЧД, АТ
- С) Тонус м'язів, рефлекс, АТ
- Д) ЧСС, колір шкіри, АТ
- Е) ЧД, реакція зіниць на світло, тонус очних яблук

134. Для якого синдрому характерні такі показники аналізу сечі: білок - 1,1‰, еритроцити вкривають все поле зору, циліндри - до 20 у полі зору:

*** А) Гематуричного**

В) Нефритичного

С) Нефротичного

Д) Гіпертонічного

Е) Мозкового

135. У дівчинки 10 років скарги на стійку нудоту, відригування, печію, нічний біль, який спостерігається на протязі: 4 місяців. Спостерігається дратівливість, розлади сну. Під час огляду - біль у пілородуоденальній зоні з позитивним молоточковим симптомом. Аналіз калу на приховану кров позитивний. Яке обстеження слід провести хворій для постановки діагнозу?

*** А) Фіброгастроуденоскопію**

В) УЗД органів черевної порожнини

С) Ірігоскопію

Д) Ректороманоскопію

Е) Колоноскопію

136. Дитині 9 місяців. Вигодовується переважно коров'ячим молоком та кашами. В клінічному аналізі крові: гемоглобін - 80 г/л, еритроцити - $2,7 \cdot 10^{12}/л$, кольоровий показник - 0,6. Які дослідження слід ще провести хворій для постановки діагнозу?

*** А) Визначення сироваткового заліза**

В) Протеїнограму

С) Функціональні проби печінки

Д) Визначення сечовини крові

Е) Гострофазові показники

137. Дитина 4 років страждає на гострий лейкоз, отримує поліхіміотерапію в гематологічному відділенні. На фоні лікування діагностована мієлосупресія з рівнем лейкоцитів - $1,3 \cdot 10^9/\text{л}$. Які вимоги до дієтичного харчування повинна контролювати медична сестра?

*** А) Заборона сирих овочів та фруктів, всі продукти вживаються тільки після термічної обробки**

- В) Введення в раціон свіжих сирих фруктів та овочів
- С) Введення в раціон жирних сортів твердого сиру
- Д) Обмеження білків тваринного походження
- Е) Немає обмежень

138. У дитини 6 місяців через 2 тижня після вакцинації АКДС з'явилася геморагічна висипка у вигляді петехій та екхімозів на верхніх та нижніх кінцівках та обличчі. В крові: Нb- 115 г/л, лейкоц. - $6,5 \cdot 10^9/\text{л}$, тромбоц. - $15 \cdot 10^9/\text{л}$. Яке захворювання має місце у хворого?

*** А) Тромбоцитопенічна пурпура**

- В) Геморагічний васкуліт
- С) Гострий лейкоз
- Д) Системний червоний вовчак
- Е) Апластична анемія

139. Дівчинка 8 років скаржиться на часті болісні сечовипускання, біль в надлобковій ділянці. В клінічному аналізі сечі - лейкоцитурія. Яке дослідження треба провести для підтвердження бактеріального генезу захворювання?

*** А) Бактеріологічне дослідження сечі**

- В) Аналіз сечі за Нечипоренком
- С) Аналіз сечі за Амбурже
- Д) Аналіз сечі за Аддіс-Каковським
- Е) Аналіз сечі за Зимницьким

140. Хлопчик 10 років скаржиться на головний біль, нудоту, набряки повік, гомілок, бурий колір сечі, зменшення об'єму сечовипускань, які з'явилися через 3 тижні після ангіни. Про яке захворювання можна подумати?

*** А) Гострий гломерулонефрит**

В) Гострий пієлонефрит

С) Гострий цистит

Д) Гострий алергоз

Е) Сечокам'яна хвороба

141. Дитині 8 років з носовою кровотечею на фоні тромбоцитопенічної пурпури потрібно проведення трансфузії свіжозамороженої плазми. В яких умовах потрібно зберігати цей препарат?

*** А) В морозильній камері**

В) В сухому місці

С) В прохолодному місці

Д) В темному місці

Е) При кімнатній температурі

142. Хлопчик 4-х років захворів на пневмонію та був госпіталізований до пульмонологічного відділення дитячої лікарні. Що може сприяти розповсюдженню нозокоміальних (госпітальних) інфекцій у пульмонологічному відділенні?

*** А) Порушення правил асептики та антисептики у відділенні**

В) Порушення режиму дня

С) Виявлення у відділенні хворих з гнійничковими захворюваннями шкіри

Д) Виявлення у відділенні хворих на педікульоз

Е) Поява у відділенні тарганів

143. До пульмонологічного відділення госпіталізований хлопчик 10 років з діагнозом бронхіальна астма, загострення. Який тип задишки буде спостерігатися у хворого?

*** А) Експіраторний**

В) Інспіраторний

С) Змішаний

Д) Дихання Куссмауля

Е) Задишка не спостерігається

144. У дитини 9 років спостерігаються напади задухи переважно у нічний час, які супроводжуються здуттям грудної клітки, шумним диханням, частим нестерпним сухим кашлем. При обстеженні звуження меж серцевої тупості, велика кількість розсіяних сухих хрипів в легенях. Яке захворювання має місце у хворої?

*** А) Бронхіальна астма**

В) Пневмонія

С) Застійна серцева недостатність

Д) Гострий бронхіт

Е) Стороннє тіло бронхів

145. Дівчина 12 років, на протязі 2 років відзначає приступоподібний біль в надчеревній ділянці натще ("олодний біль" з періодами загострення навесні і восени, а також відріжка кислим, печію, іноді блювання. Язик обкладений. Спостерігається симптоми інтоксикації. Діагноз якого захворювання найбільш вірогідний?

*** А) Виразкова хвороба дванадцятипалої кишки**

В) Хронічний коліт

С) Хронічний холецистит

Д) Хронічний гастрит

Е) Хронічний ентерит

146. У дитини 6 місяців відзначається майже повне зникнення підшкірної основи на животі і кінцівках, зменшення її на обличчі і відставання в масі тіла на 20-30%. Шкіра бліда, суха, в'яла. Слизові оболонки суховаті. Тургор тканин значно знижений. М'язова гіпотонія. Апетиту немає, можуть спостерігатися зригування і блювання при примусовому годуванні. Випорожнення з малою кількістю калових мас. Поставте діагноз:

*** А) Гіпотрофія другого ступеня**

- В) Гіпотрофія третього ступеня
- С) Рахіт
- Д) Ексудативно-катаральний діатез
- Е) Диспепсія

147. Дитині 8 місяців. Хворіє 5 днів. Відмічається кволість, підвищення температури тіла - 37,8-38,8°C, задишка - 60/хв., в легенях з обох сторін у нижніх ділянках вислуховуються крепітація, послаблене дихання, пригнічення перкуторного тону. Яке обстеження найвагоміше для встановлення діагнозу?

*** А) Рентгенографія органів грудної клітки**

- В) Клінічний аналіз крові
- С) Імунограма
- Д) Кислотно-лужний стан крові
- Е) Спірометрія

148. Дівчинка 10 років, госпіталізована в нефрологічне відділення зі скаргами на болючі та часті сечовипускання, малими порціями, підвищення температури тіла - 39,3°C болі в попереку. Сеча мутна. Яка технологія збору сечі для дослідження бактеріурії?

*** А) Вранці, після гігієни статевих органів, беруть середню порцію сечі у одноразовий стерильний посуд з герметичною кришкою**

- В) Увечері, після гігієни статевих органів, беруть всю порцію сечі у посуд з кришкою
- С) Після першого сечовипускання збирають наступну порцію сечі у чашку Петрі
- Д) Збирають ранкову сечу, у 3 різні ємкості
- Е) Збирають сечу впродовж доби через кожні 3 години в різні ємкості

149. Дівчинка 14 років, госпіталізована в нефрологічне відділення зі скаргами на болючі та часті сечовипускання, малими порціями, підвищення температури тіла - 39,3°C болі в попереку. Сеча каламутна. Які дослідження найбільш інформативні для діагностики інфекції сечовивідної системи?

*** А) Загальний аналіз сечі**

- В) Аналіз сечі за Зимницьким та проба Реберга
- С) Клінічний аналіз крові та протеїнограма
- Д) УЗД нирок та урографія
- Е) Визначення добової екскреції уратів та оксалатів

150. При проведенні лікування пневмонії дітям для зниження гіпертензії в малому колі кровообігу та поліпшення дихання використовують препарат:

*** А) Еуфілін**

- В) Корглікон
- С) Токоферол
- Д) Панангін
- Е) Папаверін

151. У 7 річної дитини через 2 тижня після ангіни розвинулися гіперкінези. З'явився розлад координації рухів і гіпотонія м'язів. Для якого захворювання характерні такі симптоми?

*** А) Ревматичної гарячки, малої хореї**

В) Ревматичної гарячки, ревмокардиту

С) Анемії

Д) Міокардиту

Е) Енцефаліту

152. Дитина народилася 5 квітня, доношена, з масою - 3200 г. Не хворіє. У якому віці їй слід починати профілактику рахіту?

*** А) В 5 місяців**

В) В 2 місяця

С) В 1 місяць

Д) В 7 місяців

Е) В 4 місяця

153. Які препарати призначають для лікування ДВЗ синдрому у разі менінгококцемії?

*** А) Гепарин**

В) Корглікон

С) Лазикс

Д) Еуфілін

Е) Антибіотики

154. У дитини, хворої на кір, з'явився гавкаючий кашель, задишка, голос втратив звучність. Для якого ускладнення кору характерні такі симптоми?

*** А) Стенозуючого ларингіту**

- В) Пневмонії
- С) Бронхіту
- Д) Отиту
- Е) Риніту

155. Ви медсестра дитячого інфекційного відділення. Які характерні гематологічні зміни спостерігають у разі кашлюку?

*** А) Лімфоцитоз**

- В) Анемію
- С) Нейтрофіліоз
- Д) Еозинофілію
- Е) Тромбоцитопенію

156. Визначте симптом, який характеризує зневоднення у дітей грудного віку в разі кишкових інфекцій:

*** А) Переднє тім'ячко западає**

- В) Переднє тім'ячко пульсує
- С) Судоми
- Д) Гіпертермія
- Е) Гіпотермія

157. Дівчинка 12 років скаржиться на нудоту, гіркоту в роті, відсутність апетиту, закреп. Діагностуються симптоми Ортнера, Кера. Постійний субфебрилітет. Для якого захворювання характерні такі симптоми?

*** А) Хронічного холецистохолангіту**

- В) Дискенеії жовчних шляхів
- С) Хронічного дуоденіту
- Д) Хронічного гастриту
- Е) Виразкової хвороби

158. Дитина народилася доношеною. Оцінка стану за шкалою Апгар - 8-10 балів. Коли дитину прикласти до груді?

*** А) Протягом перших 30 хвилин**

- В) Через 2 години
- С) Через 6-8 годин
- Д) Через 10-12 годин
- Е) Через добу

159. Визначте інфекцію, для якої характерним є лише повітряно-крапельний шлях передачі:

*** А) Кір**

- В) Скарлатина
- С) Менінгококова інфекція
- Д) Дифтерія
- Е) Епідемічний паротит

160. Хлопчик 12 років у стаціонарі скаржиться на біль в епігастрії зранку натще, нудоту. Два роки тому отримувал лікування з приводу виразкової хвороби дванадцятипалої кишки. Який етіологічний фактор найбільш імовірний?

*** А) Хелікобактер пілорі**

- В) Стресові ситуації
- С) Харчова алергія
- Д) Аліментарні фактори
- Е) Глистна інвазія

161. У дитини віком 10 місяців після першої прогулянки ранньою весною протягом 2 годин, раптово з'явилися судоми. Який найбільш імовірний попередній діагноз?

*** А) Спазмофілія**

- В) Епілепсія
- С) Залишкові явища черепної травми
- Д) Пухлина мозку
- Е) Менінгоенцефаліт

162. Ви медсестра кардіологічного центру, де знаходиться на лікуванні дитина з комбінованою вадою серця - тетрадою Фалло. Який невідкладний стан характерний для цієї вади у дітей раннього віку?

*** А) Гіпоксемічні напади**

- В) Непритомність
- С) Колапс
- Д) Апноє
- Е) Судоми

163. У дитини 4 років, що страждає на гемофілію, після травми розвинулась кровотеча, що не зупиняється. При огляді шкіра бліда, акроціаноз, кінцівки холодні. Пульс - 160/хв., АТ- 60/30 мм рт.ст., олігурія. Який невідкладний стан найбільш вірогідно розвинувся у дитини?

*** А) Геморагічний шок**

- В) Гостра ниркова недостатність
- С) Гостра серцево-судинна недостатність
- Д) Травматичний шок
- Е) Гостра надниркова недостатність

164. Дівчинка 14 років доставлена в лікарню без свідомості, хворіє на цукровий діабет. Отримує вранці 20 ОД інсуліну короткої дії та 15 ОД пролонгованої. В 13:00 раптово втратила свідомість, шкіра волога, бліда, судоми. Пульс - 86/хв., АТ- 100/60 мм рт.ст. З якого препарату доцільно розпочати допомоги хворому?

- А) 40% розчин глюкози
- В) Преднізолону
- С) 5% розчину глюкози
- Д) Інсуліну тривалої дії
- Е) Інсуліну короткої дії

165. Дитина 7 місяців захворіла гостро з підвищенням температури до 38,6°C. З'явилися блювання, рідкі випорожнення, неспокій, стан тяжкий. Шкіра та слизові оболонки сухі, тургор тканин знижений, втрата маси тіла. Який стартовий метод лікування хворого?

*** А) Регідратаційна терапія**

- В) Призначення ферментів
- С) Призначення пробіотиків
- Д) Антибактеріальна терапія
- Е) Дієтотерапія

166. Назвіть симптом, який характерний для латентної форми спазмофілії і проявляється короткочасною зупинкою дихання внаслідок больового подразнення голкою:

*** А) Симптом Маслова**

- В) Симптом Пастернацького
- С) Симптом Щоткіна-Блюмберга
- Д) Симптом Керніга
- Е) Симптом Філатова

167. У 2-річному віці закінчується процес прорізування молочних зубів. Вкажіть скільки молочних зубів мають діти на цей час:

*** А) 20**

- В) 25
- С) 15
- Д) 10
- Е) 6

168. Який рівень гемоглобіну характерний для залізодефіцитної анемії середньої важкості (II ступеня)?

- А) 70-90 г/л
- В) 20-30 г/л
- С) 90-110 г/л
- Д) Менше 70 г/л
- Е) 30-50 г/л

169. Вкажіть термін I ревакцинації проти туберкульозу вакциною БЦЖ:

*** А) 7 років**

В) 2 роки

С) 9 років

Д) 1 рік

Е) 12 років

170. Які мікроорганізми заселяють кишки новонародженої дитини при грудному вигодовуванні?

*** А) Біфідобактерії, лактобактерії**

В) Ешерихії

С) Шигелли

Д) Сальмонели

Е) Паличка Коха

171. Яка нормальна частота дихання в новонародженої дитини за 1 хвилину?

*** А) 40-60**

В) 16-18

С) 110-120

Д) 140-160

Е) 80-90

172. Мати 5-річної дівчинки стурбована тим, що її дитина стала дратівливою, погано спить, вночі виникає свербіж в ділянці періанальних складок. Вкажіть яке захворювання у дитини Ви запідозрили:

*** А) Ентеробіоз**

В) Аскаридоз

С) Трихоцефальоз

Д) Фасціольоз

Е) Токсокароз

173. У крові дитини виявлено бластні клітини. Вкажіть діагноз:

*** А) Лейкоз**

В) Анемія

С) Гемофілія

Д) Тромбоцитопенічна пурпура

Е) Геморагічний васкуліт

174. У 12-річного хлопчика встановлено хронічний антральний гастрит. Вкажіть основну причину виникнення даного захворювання у дитини:

*** А) Гелікобактер пілорі**

В) Бета-гемолітичний стрептокок

С) Стафілокок

Д) Ешерихії

Е) Сальмонели

175. Дитині, яка хворіє на цукровий діабет, необхідно ввести 16 ОД інсуліну (1 мл - 40 ОД). Вкажіть дозу данного препарату в мілілітрах:

*** А) 0,4 мл**

В) 0,2 мл

С) 0,8 мл

Д) 1,0 мл

Е) 0,1 мл

176. У доношеної дитини з групою крові A(II) Rh(+), яка народилася від матері з групою крові O(I) Rh(-), жовтяниця з'явилася на 1-у добу життя, рівень білірубіну становить 150 мкмоль/л. Вкажіть імовірне захворювання новонародженого:

*** А) Гемолітична хвороба новонародженого**

- В) Фізіологічна жовтяниця
- С) Пологова травма
- Д) Пухирчатка новонародженого
- Е) Везикулопустульоз

177. Дитина 3 дні хворіє на ГРВІ. Раптово вночі з'явився сухий кашель, затруднений вдих, шкіра бліда. Який алгоритм надання невідкладної допомоги на догоспітальному етапі (що робити в першу чергу)?

*** А) Заспокоїти, відволікаюча терапія**

- В) Ввести інтерферон
- С) Ввести преднізолон в/в
- Д) Антигістамінні препарати
- Е) Інгаляція з протинабряковою сумішшю

178. Які протівірусні препарати, призначають у разі захворювання на грип?

*** А) Анаферон**

- В) Оксацилін
- С) Амоксил
- Д) Парацетамол
- Е) Аспірин

179. Дитині 5 місяців. Скарги на утруднене носове дихання, нежить. Які Ваші дії будуть першочерговими?

*** А) Відсмоктування слизу з носових ходів**

- В) Закапування 0,05% розчину нафтизину в ніс
- С) Закапування грудного молока в ніс
- Д) УФО на ніс
- Е) Жарознижуюча терапія

180. Вкажіть етіотропний препарат для лікування дитини 12 років хворої на грип:

*** А) Амантадин**

- В) Корглікон
- С) Дроперидол
- Д) Левоміцетин
- Е) Бісептол

181. Виклик до дитини 6 років. Скарги на підвищення t° тіла до 39°C , головний біль, млявість, біль у м'язах, попереку, суглобах. Хворіє другий день. Ніс закладений, першіння у горлі, гіперемія зіву. Ці симптоми характерні для:

*** А) Грипу**

- В) Аденовірусної інфекції
- С) Пневмонії
- Д) Трахеобронхіту
- Е) Ларингіту

182. При профілактичному огляді лікар дав дозвіл на проведення щеплення проти дифтерії. Вкажіть вік дитини, коли потрібно розпочати вакцинацію:

*** А) 3 місяці**

В) 6 місяців

С) 8 місяців

Д) 7 місяців

Е) 9 місяців

183. Що включить медична сестра в план незалежних медсестринських втручань у випадку гострого гастриту?

*** А) Щадна дієта**

В) Оксигенотерапія

С) Ферментотерапія

Д) Вітамінотерапія

Е) Антигелікобактерна терапія

184. Яке положення надасть медична сестра дитині в разі колапсу?

*** А) Горизонтальне, з піднятими ногами**

В) Напівсидяче

С) Зручне горизонтальне, піднявши головний кінець тіла

Д) Сидяче

Е) На лівому боці

185. До медичної сестри, яка працює в пологовому будинку, звернулась мати дитини віком 2 дні від І вагітності з питанням: “Коли почне активно прибувати грудне молоко?”

*** А) На 3-4 добу після пологів**

В) На 10 добу після пологів

С) Через 2 тижні після пологів

Д) Через 4-6 тижнів після пологів

Е) Через 2 місяці після пологів

186. Медична сестра пологового будинку проводить обстеження новонародженої дитини віком 4 дні. Чим можна пояснити появу на кінчику і крилах носа жовтувато-білих висипань?

*** А) Нагромадженням секрету у вивідних протоках сальних залоз**

В) Посиленим розпадом еритроцитів

С) Підвищена функції потових залоз

Д) Недостатня секреція молока у матері

Е) Недостатній розвиток підшкірно-жирової клітковини

187. Медична сестра здійснює патронаж дівчинки 1 року. Мати цікавиться, які щеплення необхідно провести її дитині в даному віці?

*** А) Проти кору, краснухи, паротиту**

В) Проти туберкульозу

С) Проти поліомієліту

Д) Проти дифтерії, коклюшу, правця

Е) Проти гепатиту В

188. Дитина віком 9 років скаржиться на часті болючі сечовипускання, підвищення температури тіла, явища інтоксикації. В загальному аналізі сечі - лейкоцитурія, бактеріурія. Для якого захворювання це характерно?

*** А) Пієлонефрит**

- В) Ниркова недостатність
- С) Гломерулонефрит
- Д) Пневмонія
- Е) Сечокам'яна хвороба

189. При проведенні IV етапу медсестринського процесу у відділенні гематології яке обстеження слід провести дитині хворій на гострий лейкоз для підтвердження діагнозу?

*** А) Стернальна пункція**

- В) Загальний аналіз крові
- С) Аналіз сечі за Зимницьким
- Д) Цистографія
- Е) Біохімічний аналіз крові

190. Медична сестра проводить підрахунок частоти дихання у дитини віком 2 місяці, яка перебуває в відділенні з приводу гострої пневмонії. Який метод використати найдоцільніше?

*** А) Приставити фонендоскоп до носа дитини під час сну**

- В) Покласти руку на живіт
- С) Покласти руку на грудну клітку
- Д) Прикласти фонендоскоп на ділянку серця
- Е) Спостерігаючи за екскурсією черевної стінки

191. Які наявні проблеми пацієнта виявить медична сестра при стенозуючому ларинготрахеїті?

*** А) Інспіраторна задишка**

- В) Експіраторна задишка
- С) Гіперемія слизової оболонки рота
- Д) Гіперемія та набряк мигдаликів
- Е) Блідість шкіри і слизових оболонок

192. Медична сестра проводить бесіду з вагітними. Які принципи успішного грудного вигодовування вона включить в план бесіди?

*** А) Інформувати всіх вагітних про переваги грудного вигодовування**

- В) Інформувати рідних про штучні молочні суміші
- С) Інформувати батьків про харчові добавки
- Д) Інформувати батьків про прикорм
- Е) Інформувати вагітних про режим дня

193. Виберіть препарат який повинна підготувати медична сестра для надання невідкладної допомоги в разі судом при явній спазмофілії:

*** А) 0,5% розчин седуксену**

- В) 50% розчин анальгіну
- С) 2,4% розчин еуфіліну
- Д) 2,5% розчин піпольфену
- Е) 1% розчин димедролу

194. Медична сестра виявила у дитини 4-х років дрібний плямисто-папульозний висип на шкірі, збільшення потиличних лімфоузлів. Про яке захворювання можна думати?

- * А) Краснуха**
- В) Вітряна віспа
- С) Скарлатина
- Д) Менінгококцемія
- Е) Епідемічний паротит

195. У дитини, яка хворіє на цукровий діабет з'явилися виражена слабкість, запах ацетону з рота. Що включити медична сестра в план втручань на догоспітальному етапі?

- * А) Постановка очисної клізми з 4% розчином натрію бікарбонату**
- В) Постановка газовідвідної трубки
- С) Промивання шлунка розчином перманганату калію
- Д) Постановка лікувальної клізми
- Е) Проведення лужних інгаляцій

196. Які проблеми виявить медична сестра при обстеженні у дитини з природженими вадами серця?

- * А) Ціаноз шкіри, задишка, тахікардія**
- В) Блювання, часті рідкі випорожнення
- С) Підвищення м'язового тону
- Д) Метеоризм
- Е) Випинання великого тім'ячка

197. Під час спілкування з мамою дівчинки віком 4 дні медична сестра виявила, що у дитини почастишали випорожнення до 5-7 разів на добу. Що може бути причиною?

*** А) Транзиторний катар кишок**

- В) Ентероколіт
- С) Статевий криз
- Д) Метеоризм
- Е) Фізіологічна втрата маси тіла

198. Виявіть першочергові дії медичної сестри на догоспітальному етапі в разі анафілактичного шоку:

*** А) Забезпечити прохідність дихальних шляхів**

- В) Ввести 2,4% р-н еуфіліну
- С) Прикласти холод до голови
- Д) Застосувати ШВЛ
- Е) Ввести аналгін

199. Ви медична сестра дитячого дошкільного закладу. У дитини t° - 38°C , біль в горлі, дрібно-крапковий висип, блідий носо-губний трикутник, “малиновий язик”. Вкажіть термін ізоляції хворого:

*** А) 22 дні**

- В) 17 днів
- С) 9 днів
- Д) 5 днів
- Е) 25 днів

200. До якого обстеження повинна підготувати медична сестра дитину з підозрою на виразкову хворобу шлунка?

- * А) Фіброгастроудоденоскопія**
- В) УЗО дослідження органів черевної порожнини
- С) Рентгенологічне дослідження шлунка
- Д) Фракційне зондування шлунка
- Е) Дуоденальне зондування

201. Який препарат повинна підготувати медична сестра, за призначенням лікаря, для специфічної терапії дифтерії ротогорла?

- * А) Антитоксичну протидифтерійну сироватку**
- В) АКДП
- С) Імуноглобулін
- Д) АДП анатоксин
- Е) Антибіотик

202. Медична сестра здійснює догляд за дитиною з гіпотрофією. Що включить вона в план незалежних медсестринських втручань при догляді за такою дитиною?

- * А) Постійний контроль маси тіла**
- В) Проведення очисної клізми
- С) Вимірювання артеріального тиску
- Д) Введення еубіотиків
- Е) Введення антибіотиків

203. Медична сестра здійснює догляд за дитиною, яка народилась недоношеною з терміном гестації 29 тижнів. Який метод вигодовування вона вибере?

*** А) Через зонд**

- В) Груддю
- С) З пляшечки
- Д) З ложечки
- Е) З чашечки

204. У дитини 6 місяців раптово виникла зупинка дихання, шкіра вкрита холодним липким потом, чути гучний вдих - “півнячий крик”. З яких незалежних медсестринських втручань необхідно почати невідкладну допомогу?

*** А) Натискання на корінь язика**

- В) Введення 50% розчину анальгін
- С) Ввести 0,5% седуксен
- Д) Введення 1% розчин нікотинової кислоти
- Е) Проведення штучної вентиляції легень

205. У дитини 5 р. після вживання полуниць розвинулась кропив'янка. Який із ентеросорбентів потрібно застосувати в даному випадку?

*** А) Ентеросгель**

- В) Кларитин
- С) Фенкарол
- Д) Тавегіл
- Е) Цетрин

206. Хлопчик 2 р. хворіє третій день. Має хрипкий голос, “гавкаючий кашель”. Вночі з’явилась задишка. Шкіра ціанотична, в акті дихання приймає участь допоміжна мускулатура. Якому невідкладному стану відповідають ці симптоми?

*** А) Стенозуючий ларинготрахеїт**

- В) Приступ бронхіальної астми
- С) Дифтерійний круп
- Д) Пневмонія
- Е) Стороннє тіло верхніх дихальних шляхів

207. Дитина віком 1 день від другої доношеної вагітності тяжких пологів. Поставлений діагноз: внутрішньочерепна травма. Яке незалежне медсестринське втручання потрібно провести?

*** А) Надати дитині підвищене положення та спокій**

- В) Холод до голови
- С) Ввести 25% розчин сульфату магнію
- Д) Ввести антибіотики
- Е) Дати кровоспинні препарати

208. У новонародженої дитини на 5-й день з пупочної ранки почалися гнійні виділення, пупочне кільце гіперемоване. Поставлений діагноз гнійного омфаліту. Яке медсестринське втручання потрібно здійснити новонародженій дитині?

*** А) Посів виділень з пупкової ранки**

- В) R-графію органів грудної клітки
- С) Зробити енцефалограму
- Д) Ехо-графію серця
- Е) Електрокардіограму

209. Дитина 4 років стала дратівливою, погано спить, скаржиться на біль в животі, сильний свербіж у ділянці періанальних складок. Яке захворювання можна запідозрити?

*** А) Ентеробіоз**

В) Трихоцефальоз

С) Коліт

Д) Аскаридоз

Е) Ентерит

210. Медичній сестрі потрібно нагодувати недоношену новонароджену дитину. Відсутні смоктальний і ковтальний рефлекс. Вкажіть найдоцільніший метод годування дитини:

*** А) Через зонд**

В) Парентеральний

С) Із ложечки

Д) Із пляшечки

Е) Прикладання до грудей

211. На прийомі мати з дитиною 3 місяців. Дитина народилась доношеною, пологи фізіологічні, довжина тіла - 50 см, вага - 3100 г. Зріст при огляді - 59 см. Яку щомісячну прибавку довжини тіла необхідно взяти за основу при підрахунку динаміки росту?

*** А) 3 см**

В) 4 см

С) 5 см

Д) 6 см

Е) 7 см

212. Дитина 5,5 міс., перебуває на штучному вигодовуванні. При введенні жовтка у дитини з'явився плямисто-папульозний висип на тілі і на лиці. Які рекомендації необхідні матері?

*** А) Відмінити прийом жовтка**

- В) Продовжувати давати жовток на тлі антигістамінних препаратів
- С) Зменшити дозу жовтка
- Д) Вражені ділянки змащувати лоратидиновою маззю
- Е) Вести харчовий щоденник

213. Дитина 3 місяців під час введення вакцини знепритомніла, шкіра стала бліда, покрилась холодним потом. Про яке ускладнення медична сестра повинна подумати в першу чергу?

*** А) Анафілактичний шок**

- В) Еклампсію
- С) Переляк
- Д) Епісиндром
- Е) Зомління

214. Ви медсестра соматичного відділення, де лікується дитина 8 місяців з пневмонією. Яка інформація буде найбільш корисна для матері стосовно догляду за дитиною?

*** А) Частіше брати на руки, змінювати положення в ліжку**

- В) Вимірювати температуру тіла через 2 години
- С) Поїти через кожні 30 хвилин
- Д) Стежити за кольором шкіри
- Е) Підраховувати через кожні 10 хвилин кількість дихань за 1 хвилину

215. Ви медсестра соматичного відділення. У стаціонар поступила дитина 5 років зі скаргами на носову кровотечу, крововиливи на шкірі - несиметричні петехії та екхімози. Які зміни у загальному аналізі крові підтвердять попередній діагноз захворювання?

*** А) Тромбоцитопенія**

- В) Анемія
- С) Лейкопенія
- Д) Наявність баластних клітин
- Е) Нейтрофілія

216. Дитині 6 місяців. Доставлена до стаціонару з діагнозом “пневмонія”. t° - $38,5^{\circ}\text{C}$. Під час огляду ознаки двобічної пневмонії, в III міжребір'ї зліва від грудини вислуховується грубий систолічний шум. Запідозрена вроджена вада серця. Коли можна провести ЕхоКГ?

*** А) Після нормалізації температури тіла**

- В) Після одужання від пневмонії
- С) Одразу
- Д) Немає обмежень в часі
- Е) Натщесерце

217. У хлопчика 12 років під час уроку фізкультури раптово виникло збудження, слабкість, тахікардія, шкіра бліда і дуже волога, судоми, втрата свідомості. Хворіє 5 років на цукровий діабет. Оцініть стан хворого:

*** А) Гіпоглікемічна кома**

- В) Діабетична кетоацидотична кома
- С) Діабетичний кетоацидоз
- Д) Епілептичний статус
- Е) Уремична кома

218. У дитини, 2 років, з перших днів життя визначається ціаноз шкіри та слизових оболонок, який посилюється під час фізичного навантаження. При аускультатії - грубий систолічний шум в ділянці серця. Дитина відстає у фізичному розвитку, має масу тіла 10 кг. Такі симптоми характерні для:

*** А) Вродженної вади серця**

- В) Бронхіальної астми
- С) Ревмокардиту
- Д) Міокардіопатії
- Е) Анемії

219. Дитина народилася доношеною, маса тіла при народженні - 3450 г. Після пологів у неї спостерігається крововилив, який визначається в межах однієї тім'яної кістки, не пульсує, не болючий. Такий стан відповідає:

*** А) Кефалогематомі**

- В) Епідуральному крововиливу
- С) Субдуральній гематомі
- Д) Родовій пухлині
- Е) Порушенню мозкового кровообігу

220. У дитини після виписування з пологового будинку раптово на шкірі з'явилися пухирі, які лопаються, оголюючи ерозивну поверхню. Стан дитини стає дедалі важчим, температура тіла - 39°C. Про яке захворювання може подумати медсестра?

*** А) Пухирчатка новонародженого**

- В) Псевдофурункульоз
- С) Пупковий сепсис
- Д) Везикулопустульоз
- Е) Токсична еритема новонародженого

221. У хлопчика 4 р., самопочуття погане, виражена слабкість, рухова активність знижена, шкірні покриви бліді. На шкірі і слизових оболонках наявні петехії та екхімози, крововиливи поодинокі, безболісні, розташовані асиметрично. АТ- 80/40 мм рт.ст., тахікардія. Вкажіть основну причину наявних проблем дитини:

*** А) Зниження рівня тромбоцитів**

- В) Зниження рівня гемоглобіну
- С) Запалення дрібних судин
- Д) Дефіцит ІХ фактора
- Е) Підвищена швидкість осідання еритроцитів

222. У дитини 6 р., спостерігається біль і бурчання у животі, нудота, блювання, свербіж у ділянці перианальних складок. При обстеженні знайдені яйця гостриків. Вкажіть препарат для лікування даної дитини:

*** А) Ворміл**

- В) Аскорутин
- С) Нафтамон
- Д) Цефазолін
- Е) Фестал

223. У дитини 5 р., спостерігається погіршення апетиту, млявість, блідість шкіри і слизових оболонок, шкіра суха, волосся ламке. В аналізі крові: Нb- 91 г/л, кольоровий показник - 0,7, ШОЕ- 8 мм/год. Вкажіть захворювання для якого найхарактерніші дані симптоми:

*** А) Анемія**

- В) Пневмонія
- С) Стomatит
- Д) Диспепсія
- Е) Рахіт

224. У дитини 3 р., спостерігається ціаноз шкіри, нігті мають форму годинникових скелець, кінцеві фаланги - барабанних паличок. Аускультативно: II тон над легеневою артерією різко послаблений, грубий систолічний шум. Характерними є гіпоксемічні напади: прискорене дихання, посилення ціанозу, збудження. Дитина відстає у фізичному розвитку. Вкажіть захворювання для якого найхарактерніші дані симптоми:

*** А) Вроджена вада серця**

- В) Ревматична гарячка
- С) Гострий міокардит
- Д) Бронхіальна астма
- Е) Ревматичний перикардит

225. Які стани рахуються протипоказанням до призначення специфічної профілактики рахіту?

*** А) Малі розміри великого тім'ячка**

- В) Гіпотрофія
- С) Анемія
- Д) Ексудативно-катаральний діатез
- Е) Гемолітична хвороба новонароджених

226. Яке обстеження необхідно призначити дитині після нападу ларингоспазму з метою підтвердження діагнозу спазмофілії?

*** А) Біохімічний аналіз крові на вміст кальцію**

- В) Загальний аналіз крові
- С) Загальний аналіз сечі
- Д) Біохімічний аналіз крові на С-реактивний білок
- Е) Аналіз крові на білірубін

227. Дитина захворіла на епідемічний паротит. Складаючи план сестринського догляду та лікування, медична сестра включить наступне незалежне втручання:

- * А) Сухе тепло на привушні слинні залози**
- В) Спиртово-водні компреси
- С) Зігріваючий компрес
- Д) Холод на уражені залози
- Е) Змащування шкіри над залозами камфорним маслом

228. Старша м/с дитячого садка, складаючи річний план профілактичних щеплень для дітей 6-ти років запланує наступні щеплення:

- * А) АДП, проти поліомієліту, краснухи, кору, паротиту**
- В) АКДП, проти поліомієліту та гемофільної інфекції
- С) АДП, проти поліомієліту, БЦЖ
- Д) АДП, проти гепатиту В, кору, паротиту
- Е) Проти поліомієліту, АДП

229. Дитина 10 місяців неспокійна, перелякана. Шкіра бліда, ціанотичні кінцівки, дихання шумне, часте з утрудненим вдихом. Кашель гавкаючий, нападоподібний, голос втратив гучність. Яке захворювання у дитини?

- * А) Гострий стенозуючий ларингіт**
- В) Гостра пневмонія
- С) Приступ бронхіальної астми
- Д) Гострий бронхіт
- Е) Гострий фарингіт

230. У хлопчика 5-ти років відзначається припухлість і болючість правого колінного суглоба. З анамнезу відомо, що раніше спостерігались періодичні кровотечі, які довго не припинялись, з'явилися масивні синці. У дідуся з боку матері теж були такі прояви. Яке найбільш ймовірне захворювання у хлопчика?

*** А) Гемофілія**

- В) Анемія
- С) Лейкоз
- Д) Геморагічний васкуліт
- Е) Тромбоцитопенічна пурпура

231. Дитина 5 років знаходиться на стаціонарному лікуванні з діагнозом ГРВІ. Під час спостереження за дитиною виявлено: t° - $38,8^{\circ}\text{C}$, шкіра рожева, гаряча на дотик. В чому полягає долікарська допомога в даному стані:

*** А) Роздягнути дитину, протерти шкіру спиртово-водним розчином**

- В) Зігріти дитину
- С) Поставити клізму з водою t° - $38-40^{\circ}\text{C}$
- Д) Дати дитині аспірин
- Е) Дати дитині парацетамол

232. Хлопчику 10 р., скаржиться на сухий кашель, задишку. Хворіє протягом 1 року. Напади задишки 1-2 на місяць. Лікар поставив діагноз бронхіальна астма. Які зміни дихальної системи можна виявити при об'єктивному обстеженні?

*** А) Сухі свистячі хрипи з обох боків, експіраторну задишку**

- В) Послаблене дихання, крипітуючі хрипи
- С) Жорстке дихання, вологі різнокаліберні хрипи
- Д) Інспіраторну задишку з утягненням податливих місць грудної клітки
- Е) Послаблене дихання, вологі різнокаліберні хрипи

233. У перші місяці життя малюк, народжений ВІЛ-інфікованою матір'ю, буде мати позитивний аналіз крові на ВІЛ. До якого терміну життя встановлюється статус ВІЛ-інфікованості?

*** А) До 18 місяців**

В) До 12 місяців

С) До 6 місяців

Д) До 3 місяців

Е) До 24 місяців

234. Дитині 3 місяці. При об'єктивному обстеженні виражена блідість слизових оболонок, шкірних покривів, підвищена пітливість, особливо голови, неспокій, "облисіння" потилиці. Вигодовування штучне. Про яке захворювання свідчить даний стан дитини?

*** А) Рахіт, початковий період**

В) Рахіт, період розпалу

С) Анемія

Д) Рахіт, період реконвалесценції

Е) Рахіт, період залишкових явищ

235. Хлопчика 7 років госпіталізовано в приймальне відділення дитячої лікарні. Скарги на біль та набряк в колінному суглобі, які виникли під час гри в м'яча на спортивному полі. Із анамнезу встановлено, що у старшого брата, дідуса з боку матері підвищена кровоточивість. Які лабораторні дослідження потрібні для уточнення діагнозу?

*** А) Аналіз крові на визначення часу кровотечі**

В) Загальний аналіз крові

С) Біохімічне дослідження крові

Д) Загальний аналіз сечі

Е) Серологічні дослідження РНПГ в динаміці

236. Дівчинці 8 років. Скарги матері на появу у дитини набряків, пониження апетиту, підвищення температури тіла. Три тижні тому дитина перехворіла на ангіну. При огляді: шкіра і слизові оболонки бліді, обличчя набрякле, тони серця ослаблені, ритмічні, АТ- 140/80 мм рт.ст. Запідозрено гломерулонефрит. При реалізації плану медсестринських втручань в період розпалу, медична сестра повинна забезпечити:

*** А) Ліжковий режим до зникнення набряків**

В) Введення антигістамінних препаратів

С) Напівліжковий режим

Д) Палатний режим

Е) Введення антибіотиків

237. Дев'ятимісячній дитині лікар педіатр проводить лікування рахіту. Яка з перерахованих нижче доз вітаміну D є лікувальною?

*** А) 2000-5000 МО**

В) 500-1000 МО

С) 250-500 МО

Д) 1000-2000 МО

Е) 5000-10000 МО

238. Дитині 2 роки. Мати скаржиться на погіршене самопочуття дитини, млявість, вередливість, зниження апетиту, рідкі випорожнення інколи зеленуватого кольору. В даних лабораторних досліджень відмічається значне зниження біфідум та лактобактерій, а також розмноження умовно-патогенної мікрофлори. Про який стан можна думати на основі перерахованого?

*** А) Дисбактеріоз**

В) Токсикоз з ексикозом

С) Функціональну диспепсію

Д) Харчове отруєння

Е) Рота вірусну інфекцію

239. До лікаря звернулася мати з 2 річною дитиною. Скарги на головний біль, підвищення температури тіла до 39,9°C, двохразове блювання, геморагічні висипання у вигляді зірок, на сідницях. Який діагноз можна запідозрити?

*** А) Менінгококцемію**

- В) Геморагічний васкуліт
- С) Алергію
- Д) Кір
- Е) Вузлового еритему

240. У 5 річної дитини діагностовано дифтерію ротоглотки, яка підтверджена клінічно та лабораторно. Який препарат потрібно ввести дитині першочергово?

*** А) Протидифтерійну сироватку**

- В) Антибіотики
- С) Гормони
- Д) Десенсибілізуючі
- Е) Вітаміни

241. Ви - медсестра дитячого дошкільного закладу, де був виявлений випадок дизентерії. Які заходи Ви будете проводити в ДДЗ з метою попередження розповсюдження інфекції?

*** А) Карантинні**

- В) Хіміопрофілактика
- С) Введення імуноглобуліну
- Д) Введення антибіотиків
- Е) Посів на кишкову флору

242. Ви - медсестра нефрологічного відділення, де лікується пацієнт 6 років із скаргами на загальну слабкість, t° до 38°C , болі в попереку, нудоту. У загальному аналізі сечі лейкоцитів - 30-40 у полі зору, бактеріурія. Які допоміжні методи дослідження Ви внесете в свій план обстеження?

*** А) Проба Нечипоренко**

- В) Проба Реберга
- С) Проба Сулковича
- Д) Проба Манту
- Е) Проба Шика

243. У стаціонар доставлена дитина 2-х років, у якої 3 години тому під час гри з мозаїкою почався напад непродуктивного кашлю. Об'єктивно: дитина збуджена, температура тіла - норма. Яка можлива причина викликала такий стан?

*** А) Стороннє тіло у дихальних шляхах**

- В) Бронхіальна астма
- С) Бронхіт
- Д) ГРВІ
- Е) Пневмонія

244. Пацієнту 3 роки. Відвідує ДДЗ. Скарги на кашель, нежить, світлобоязнь, слинотечу, підвищення температури тіла до 38°C , кволість. Хворіє третю добу. При огляді: на слизовій щік проти малих кутніх зубів дрібні плями розміром з макове зерно, оточені червоним вінчиком. Дитині був встановлений діагноз: "Кір". Визначте, в якому періоді хвороби перебуває дитина на підставі перерахованих проблем?

*** А) Катаральному періоді**

- В) Інкубаційному періоді
- С) Періоді висипу
- Д) Періоді пігментації
- Е) Періоді видужування

245. Дитина віком 3 місяці знаходиться на природному вигодовуванні, добре набирає масу тіла. Фізичний розвиток відповідає віковій нормі. Мати цікавиться, до чого може привести раннє (до 6 місяців) введення в раціон дитини соків?

*** А) До появи розладів травлення та алергічних реакцій**

- В) До порушень фізичного розвитку
- С) До порушень нервово-психічного розвитку
- Д) До раннього статевого дозрівання
- Е) До порушень ендокринної системи

246. Новонароджений дівчинка народилася від других пологів при терміні гестації 22 тижні, з масою тіла - 1000 г, довжиною тіла - 40 см. Згідно листка лікарських призначень з метою профілактики рахіту Ви запланували введення якого наступного препарату?

*** А) Відехолу**

- В) Супрастину
- С) Феррокалю
- Д) Афлубіну
- Е) Софрадексу

247. Ви - медсестра інфекційної лікарні, приготували все необхідне для взяття мазку із ротоглотки на паличку Борде-Жангу. Для підтвердження якого захворювання Ви проводите дану процедуру?

*** А) Кашлюка**

- В) Дифтерії
- С) Скарлатини
- Д) Кору
- Е) Червоної висипки

248. У дівчинки 4 років, t° - $37,4^{\circ}\text{C}$, утруднене носове дихання, слизово-серозні відділення з носу, осиплість голосу, грубий кашель. Для якого захворювання на тлі ГРВІ характерні ці зміни?

*** А) Гострого ларингіту**

- В) Гострого фарингіту
- С) Гострого трахеїту
- Д) Гострого бронхіту
- Е) Обструктивного бронхіту

249. У хлопчика 9 місяців життя - надмірний вологий кашель, задишка з утрудненим видихом - 52/хв., t° - $36,9^{\circ}\text{C}$, Рс- 110/хв., дистанційні хрипи. На що треба звернути увагу в першу чергу при плануванні сестринського обстеження?

*** А) Частоту дихання за 1 хвилину**

- В) Частоту серцевих скорочень за 1 хвилину
- С) Рівень температури тіла
- Д) Аускультацию легень
- Е) Характер харкотиння

250. Ви проводити догляд за дитиною 11 років, хворої на геморагічний васкуліт. Які зміни є характерними при шкірній формі захворювання?

*** А) Симетричний геморагічний висип на шкірі**

- В) Несиметричний висип на шкірі
- С) Плямисто-папульозний висип на шкірі
- Д) Масивні крововиливи на шкірі
- Е) Поліморфний висип на шкірі

251. Ви проводите догляд за дитиною 10 років з гострим гломерулонефритом. Які зміни у сечі є характерними?

*** А) Еритроцитурія, цилиндрурія**

- В) Лейкоцитурія, бактеріурія
- С) Підвищення цукру, цилиндрурія
- Д) Лейкоцитурія, еритроцитурія
- Е) Еритроцитурія, бактеріурія

252. У дитини, 5 років, через 3 тижні після ангіни з'явилися ознаки ураження колінних та ліктьових суглобів симетрично. Під час пальпації виявляється набряк та болючість суглобів, шкіра червона, гаряча на дотик. Для якого захворювання ці симптоми характерні?

*** А) Ревматична гарячка, поліартрит**

- В) Ревматична гарячка, ревмокардит
- С) Ревматоїдний артрит
- Д) Деформуючий остеоартроз
- Е) Ревматична гарячка, мала хорея

253. У новонародженої дитини на шкірі тулуба, голови, у природніх складках шкіри з'явилися пухирі розміром з просяне зерно з серозно-гнійним вмістом. Для якого захворювання це характерно?

*** А) Везикулопустульоз**

- В) Пухирчатка новонароджених
- С) Псевдофурункульоз
- Д) Фурункульоз
- Е) Герпес-інфекція

254. У новонародженої доношеної дитини виражена інтоксикація, на шкірі з'явилися великі пухирі (2-3 см у діаметрі), які швидко збільшуються. Пухирі з каламутним вмістом, деякі лупають залишаючи ерозивну поверхню. Для якого захворювання характерні такі симптоми?

*** А) Пухирчатка новонароджених**

- В) Везикулопустульоз
- С) Псевдофурункульоз
- Д) Фурункульоз
- Е) Герпес-інфекція

255. У новонародженої дитини ознаки інтоксикації, визначається асиметричне збільшення та інфільтрація однієї грудної залози. Шкіра над залозою червона, гаряча, гнійні виділення з проток залоз. Установіть діагноз:

*** А) Гнійний мастит новонародженого**

- В) Абсцес
- С) Фізіологічне нагрубання грудних залоз
- Д) Флегмона
- Е) Токсична еритема новонародженого

256. Дитині, 11 міс., вранці мати дала незбиране коров'яче молоко. Ввечері дитина стала млявою, температура тіла підвищилася до 38°C, з'явилося багаторазове блювання, випорожнення 8 разів за добу, рідкі, з великою кількістю слизу та прожилками крові. Такий стан трактують як:

*** А) Гострий гастроентероколіт**

- В) Гострий гастрит
- С) Гострий гастроентерит
- Д) Виразковий коліт
- Е) Гострий ентерит

257. У дитини, 5 років, наявні ознаки інтоксикації, кашель. Під час перкусії у дитини визначається притуплення перкуторного звуку у ділянці під правою лопаткою. При аускультатії в цьому місці - ослаблення дихання, крепітуючі хрипи. Для якого захворювання властиві такі симптоми?

*** А) Вогнищева пневмонія**

- В) Бронхіальна астма
- С) Трахеїт
- Д) Гострий стенозуючий ларингіт
- Е) Бронхіт

258. У дитини, 8 років, з'явився висип на тулубі, обличчі, волосяній частині голови у вигляді папул, плям, пухирців з каламутним вмістом. Такий стан відповідає наступному захворюванню:

*** А) Вітряній віспі**

- В) Кору
- С) Краснусі
- Д) Епідемічному паротиту
- Е) Алергічному дерматиту

259. Дитині, 9 років, хворій на гостру ревматичну лихоманку , поліартрит,призначені нестероїдні протизапальні препарати, а саме:

*** А) Індометацин, бутадіон**

- В) Фенкарол, діазолін
- С) Делагіл, плаквініл
- Д) Дібазол, папаверин
- Е) Анальгін, дімедрол

260. Дитині, 5 років, хворій на пієлонефрит, призначено нітрофуранові препарати. Які препарати слід підготувати?

*** А) Фурагін, фурадонін**

- В) Бісептол, етазол
- С) Неграм, невіграмон
- Д) Вольтарен, ортофен
- Е) Левамизол, тимоген

261. Дітям з гіпотрофією для нормалізації мікрофлори кишечника та боротьби з дисбактеріозом застосовують еубіотики, а саме:

*** А) Біфіформ, лінекс, йогурт**

- В) Полісорб, карболен
- С) Фестал, ензистал
- Д) Альбумін, плазма
- Е) Тавегіл, супрастин

262. Вкажіть вік, з якого недоношеним дітям починають проводити профілактику рахіту:

*** А) З 10-20-го дня життя**

- В) З 2-го місяця життя
- С) З 5-го дня життя
- Д) З 3-го місяця життя
- Е) Відразу після народження

263. В дитячий стаціонар поступила дитина 1 рік 2 міс., з генералізованими судомами та ознаками рахіту. Після надання допомоги було проведено дослідження на вміст кальцію у крові. Показник кальцію - 1,7 ммоль/л. Додаткове обстеження вказує на діагноз:

*** А) Спазмофілія. Судоми**

- В) Спазмофілія, ларингоспазм
- С) Рахіт, гострий період. Судоми
- Д) Гіпервітаміноз Д. Судоми
- Е) Рахіт залишкових явищ

264. У дитини 10 міс., з масою тіла 8 кг, декілька разів повторювався карпопедальний спазм, раптово відбувся напад загальних судом. Необхідно ввести протисудомний препарат у дозі:

*** А) 0,5% сібазон 0,8 мл**

- В) 0,5% сібазон 0,5 мл
- С) 0,5% седуксен 0,5 мл
- Д) 0,5% діазепам 2 мл
- Е) 0,5% діазепам 0,2 мл

265. У дитини 4 місяців спостерігається зригування, часте рідке випорожнення зі слизом. Живіт здутий, гази відходять погано. Температура тіла - 35,8°C, АТ - знижений. Втрата маси - 500 г. Важкий стан дитини свідчить про:

*** А) Кишковий токсикоз з ексикозом**

- В) Сепсис, септицемію
- С) Сепсис, септикопіємію
- Д) Адреногенітальний синдром, сільвтрачаючу форму
- Е) Білково-енергетичну недостатність

266. Оральна регідратація проводиться дитині з кишковим токсикозом та вододєфіцитним ексікозом. Рідину у вигляді 5% розчину глюкози, регідрону, ораліту дають дитині пити:

*** А) По 10 мл кожні 10-15 хвилин**

В) По 20 мл кожну годину

С) По 10 мл через 30 хвилин

Д) По 50 мл кожну годину

Е) По 50 мл через 2 години

267. У дитини діагностовано природжену ваду серця. На першому році життя наростала задишка, ціаноз проявлявся під час плачу і годування. Після року у дитини визначається задишка у стані спокою, характерними стали часті напади ціанозу зі втратою свідомості і судомами. Такий розвиток клінічних проявів вказує на:

*** А) Тетраду Фалло**

В) Дефект міжпередсердної перетинки

С) Відкрити аортальну протоку

Д) Фіброеластоз міокарда

Е) Дефект міжшлуночкової перетинки

268. Дитині 7-м років. Скарги на біль під час ковтання, високу температуру тіла. Загальний стан порушений. У зіві - на почервонілій слизовій оболонці інфільтрованих мигдаликів у ділянці лакун жовто-білого кольору обмежені нашарування. Перераховані симптоми вказують на:

*** А) Лакунарна ангіна**

В) Фолікулярна ангіна

С) Катаральна ангіна

Д) Гостра респіраторна вірусна інфекція

Е) Дифтерія зівя

269. На прийомі мати 5-ти місячної дитини скаржиться на те, що маля неспокійне, погано спить, пітніє, з'явилося облісіння потилиці. При обстеженні: краї переднього тім'ячка розм'якшені, краніотабес. Який діагноз найбільш імовірний?

*** А) Рахіт**

- В) Кефалогематома
- С) Астено-невротичний синдром
- Д) Алергічний діатез
- Е) Нервово-артритичний діатез

270. Вас викликали до дитини 10 років, мати якої скаржиться на появу ціанозу, задишку. Напередодні під час їжі, дитина голосно сміялась. На момент огляду дихання затруднене, кашель, ціаноз шкіри. Якої допомоги потребує дитина?

*** А) Прийом Геймліха**

- В) Прийом Леопольда
- С) Відсмоктування слизу з рота та носа
- Д) Термінова інкубація трахеї
- Е) Протишокові міроприємства

271. Дівчинка народилася з масою тіла - 3400 г, довжиною тіла - 52 см. Вагітність і пологи фізіологічні. В перший і другий день сечопуск був 5-6 разів на добу. На 3-й день після сечопуску на пелюшці помітна жовто-червона пляма, місцями червоно-жовті кристалики. Який найбільш ймовірний діагноз?

*** А) Сечокислий інфаркт нирок**

- В) Статевий криз
- С) Пієлонефрит
- Д) Гломерулонефрит
- Е) Вульвовагініт

272. У дитини 4 років із сім'ї хворих на туберкульоз декілька днів тому з'явився головний біль, блювання, підвищення температури тіла, погіршення апетиту. Об'єктивно: дитина млява, апатична, температура тіла - 38,6°C, ЧСС- 100/хв., АТ- 120/75 мм рт.ст., мова тиха, невиразна, виражена ригідність м'язів потилиці, позитивні симптоми Керніга, Брудзінського. Вкажіть найбільш імовірний діагноз:

*** А) Туберкульозний менінгіт**

- В) Менінгококовий менінгіт
- С) Гостра респіраторна вірусна інфекція
- Д) Вірусний енцефаліт
- Е) Епідемічний паротит

273. Дівчинки 5 років скаржиться на підвищення температури тіла до 37,9°C, розлад випорожнень. Об'єктивно: шкіра бліда, живіт запалий, сигмовидна кишка спазмована, пальпується у вигляді тяжа, болюча. Випорожнення скудні зі слизом, зеленню, прожилками крові до 10-15 разів на добу, періодичні тенезми. Яке захворювання найбільш імовірне?

*** А) Шигельоз**

- В) Сальмонельоз
- С) Іерсиніоз
- Д) Ешеріхіоз
- Е) Ротавірусна інфекція

274. Дівчинки, яка хворіє на епідемічний паротит, скаржиться на головний біль, шум та біль у вухах, при відкриванні рота, припухлість привушної залози. Який симптом виявиться у ротовій порожнині?

*** А) Симптом Мурсона**

- В) Плями Філатова-Коплика-Бельського
- С) Енантема на твердому піднебінні
- Д) "Географічний язик"
- Е) "Малиновий язик"

275. У здорової новонародженої дитини виявлені наступні показники периферичної крові: еритроцити - 6,0 Т/л, гемоглобін - 150 г/л, лейкоцити - 15 Г/л, нейтрофіли - 45%, лімфоцити - 43%. Для якого віку характерні такі показники периферичної крові?

*** А) П'ятий день життя**

- В) Перший день життя
- С) Десятий день життя
- Д) Двадцятий день життя
- Е) Тридцятий день життя

276. Дитина 5 років хворіє близько двох тижнів, скаржиться на гнійно-кров'янисті виділення з носа, мацерації крил носа та верхньої губи. При риноскопії на носовій перетинці білісувато-сірі островці. Слизова ротоглотки не змінена. Клінічна картина дозволяє запідозрити:

*** А) Дифтерію носа**

- В) Алергічний риніт
- С) Риновірусну інфекцію
- Д) Аденовірусну інфекцію
- Е) Фарингіт

277. Дитині 6 місяців, знаходиться на штучному вигодовуванні коров'ячим молоком. Під час огляду медична сестра-бакалавр виявила у дитини гіпотрофію І ступеню. Який перший прикорм найбільш бажаний для цієї дитини?

*** А) Молочні каші**

- В) Овочеві пюре
- С) Фруктові пюре
- Д) М'ясне пюре
- Е) Кисло-молочний сир

278. Медична сестра-бакалавр прийшла на патронаж до дитини першого року життя. При огяді - дитина добре утримує голівку у вертикальному положенні, доторкається до предметів, посміхається, спостерігається позитивна емоційна реакція на матір. Якому віку відповідає психомоторний розвиток дитини?

*** А) 3 місяці**

В) 1 місяць

С) 2 місяці

Д) 2 тижні

Е) 3 тижні