

ЗАВАНТАЖЕНО З САЙТУ ТЕСТУВАННЯ.УКР

Зразки тестових завдань Клінічна фармація 2019 року.

Категорія: **Буклети**

Кількість запитань: **49**

1. Підкажіть лікарю, при яких станах НЕ ПОКАЗАНО призначення в-адреноблокаторів:

*** А) Гіпотиреоз**

- В) Артеріальна гіпертензія
- С) Стенокардія напруження
- Д) Серцева недостатність
- Е) Порушення серцевого ритму

2. Вкажіть види побічної дії, які не залежать від дози препарату:

*** А) Алергічні**

- В) Фармакодинамічні
- С) Токсичні
- Д) Лікарська залежність
- Е) Тератогенні

3. У хворого первинна відкритокутова форма глаукоми. Який з агоністів альфа-2-адренорецепторів та імідазолінових рецепторів у вигляді очних крапель показаний для зниження внутрішньоочного тиску?

*** А) Клонідин**

- В) Магнія сульфат
- С) Дротаверин
- Д) Фуросемід
- Е) Лабеталол

4. У хворого розвинулась гостра серцева недостатність за лівошлуночковим типом (набряк легенів). Яка група препаратів по-казана для надання невідкладної допомоги?

*** А) Нітрати**

- В) в-блокатори
- С) Антагоністи кальцію
- Д) іАПФ
- Е) Діуретики

5. Мінералокортикоїдні ефекти найбільш виражені у:

*** А) Гідрокортизону**

- В) Дексаметазону
- С) Триамцинолону
- Д) Бетаметазону
- Е) Метилпреднізолону

6. Для профілактики остеопорозу на тлі тривалої терапії глюкокортикоїдами рекомендується використовувати наступні препарати:

*** А) Бісфосфонати**

- В) Препарати калію
- С) Петльові діуретики
- Д) Калійзберігаючі діуретики
- Е) Препарати магнію

7. Назвіть найбільш безпечний та ефективний глюкокортикоїд для лікування хвороби Крона:

- * А) Будесонід**
- В) Гідрокортизон
- С) Тріамцинолон
- Д) Преднізолон
- Е) Флутіказон

8. До додаткових ефектів макролідів належить:

- * А) Імуномодулюючий**
- В) Знеболюючий
- С) Жарознижувальний
- Д) Антиатерогенний
- Е) Діуретичний

9. До якої групи препаратів належить Сальбутамол?

- * А) в-2-агоністів короткої дії**
- В) в-2-агоністів пролонгованої дії
- С) Селективних α -адреноблокаторів
- Д) Неселективних α -адреноблокаторів
- Е) Метилксантинів

10. Хворий на гіпертонічну хворобу тривалий час приймав антигіпертензивний препарат, який раптово припинив вживати. Після цього стан хворого погіршився, розвинувся гіпертензивний криз. До якої категорії належить ця побічна дія?

*** А) Синдром відміни**

В) Толерантність

С) Залежність

Д) Кумуляція

Е) Сенсibiliзація

11. Під час приймання доксицикліну пацієнт застосовував молочні продукти. До яких наслідків це може призвести?

*** А) Сповільнення всмоктування антибіотика**

В) Зростання токсичності антибіотика

С) Збільшення ризику порушення кишкової мікрофлори

Д) Порушення процесу перетравлення їжі

Е) Порушення засвоєння молочних продуктів

12. Прийом деяких лікарських засобів під час вагітності збільшують ризик народження дитини з генетичними вадами. Назвіть цю небажану дію:

*** А) Мутагенний ефект**

В) Фетотоксичний ефект

С) Бластогенний ефект

Д) Тератогенний ефект

Е) Ембріотоксичний ефект

13. У хворого системне запальне ураження сполучної тканини. Який препарат викличе зменшення всіх фаз запалення?

*** А) Дексаметазон**

В) Ібупрофен

С) Контрікал

Д) Сульфасалазин

Е) Диклофенак-натрію

14. Хворий 65-ти років після перенесеної операції на черевній порожнині знаходиться на ліжковому режимі. Після терапії сенадексину впродовж 10 діб проносний ефект препарату зменшився. Яке явища обумовило цей процес?

*** А) Звикання**

В) Індивідуальна чутливість

С) Синдром відміни

Д) Сенсibiliзація

Е) Тахіфілаксія

15. Хвора 45-ти років має скарги на болі в суглобах, ранкову скутість та тривалий час застосовує нестероїдний протизапальний засіб піроксикам. Назвіть найбільш характерне побічне явище препарату:

*** А) Диспептичні розлади**

В) Явища пригнічення ЦНС

С) Метгемоглобінемія

Д) Гіпотермія

Е) Гіпотонія

16. З групи нестероїдних препаратів протизапальної дії при вагітності дозволено застосування:

*** А) Парацетамолу**

- В) Ацетилсаліцилова кислоти
- С) Індометацину
- Д) Анальгін
- Е) Ібупрофену

17. Після тривалого застосування диклофенаку натрію у пацієнта з'явилися болі в шлунку, нудота, диспептичні явища. Хворий звернувся з проханням порекомендувати йому препарат заміни. Який з наведених засобів проявляє мінімальний вплив на слизову оболонку травного каналу?

*** А) Мелоксикам**

- В) Індометацин
- С) Кислота ацетилсаліцилова
- Д) Піроксикам
- Е) Дифлунізал

18. Назвіть препарат вибору для лікування атипової пневмонії:

*** А) Азитроміцин**

- В) Ампіцилін
- С) Доксидиклін
- Д) Гентаміцин
- Е) Оксациллін

19. Фармакологічний ефект цефалоспори- нів:

*** А) Бактерицидний**

В) Бактеріостатичний

С) Інсектицидний

Д) Антисептичний

Е) Протівірусний

20. При підвищенні температури тіла у дитини віком 2 роки препаратом вибору є:

*** А) Парацетамол**

В) Індометацин

С) Ібупрофен

Д) Ацетилсаліцилова кислота

Е) Метамізол

21. Ангіопротекторна дія антиагрегантів зумовлена гальмуванням:

*** А) Адгезії та агрегації тромбоцитів**

В) Сорбції ліпопротеїдів стінки артерій

С) Біосинтезу фосфодіестерази

Д) Біосинтезу холестерину

Е) Абсорбції холестерину

22. Лікарські засоби, що зменшують проникність судин, нормалізують метаболічні процеси в судинній стінці та поліпшують в ній мікроциркуляцію, називаються:

*** А) Ангіопротектор**

В) Сечогінні

С) Спазмолітичні

Д) Гормональні

Е) Антимікробні

23. Який із перелічених антисептиків відноситься до окисників?

*** А) Перекис водню**

- В) Етоній
- С) Розчин Люголя
- Д) Протаргол
- Е) Кислота борна

24. Оберіть лікарський засіб, що використовується для лікування СНІДу:

*** А) Ритонавір**

- В) Пеніцилін
- С) Фуразолідон
- Д) Сульфадиметоксин
- Е) Тетрациклін

25. Який з перелічених противірусних засобів відноситься до похідних адамантана?

*** А) Ремантадин**

- В) Ацикловір
- С) Циклоферон
- Д) Зідовудин
- Е) Аміксин

26. Серед перелічених лікарських засобів у якості протиревматичних використовують:

*** А) Диклофенак натрію**

- В) Лоратадин
- С) Строфантін
- Д) Кокарбоксилазу
- Е) Рибоксин

27. Вкажіть, які переваги має мелоксикам порівняно з іншими нестероїдними протизапальними засобами:

- * А) Мінімальна побічна дія на травний канал**
- В) Зменшення ризику розвитку судом
- С) Максимальний спазмолітичний ефект
- Д) Наявність імуностимулюючої дії
- Е) Зменшення ризику розвитку гіпертонічного кризу

28. Для профілактики і лікування гастро- патій, спровокованих прийомом НПЗЗ, рекомендується профілактичний прийом препарату:

- * А) Омепразол**
- В) Димедрол
- С) Пірацетам
- Д) Ітраконазол
- Е) Оксиметазолін

29. Застосування парацетамолу одночасно з алкоголем супроводжується:

- * А) Підвищенням гепатотоксичної дії парацетамолу**
- В) Підвищенням апетиту
- С) Зниженням артеріального тиску
- Д) Підвищенням артеріального тиску
- Е) Зниженням апетиту

30. Першими симптомами передозування препаратів заліза є:

- * А) Біль у животі, діарея, блювання**
- В) Підвищення артеріального тиску
- С) Підвищення вмісту глюкози у крові
- Д) Зниження зору
- Е) Біль у суглобах

31. Оберіть із перелічених лікарських засобів препарат психотропної дії:

*** А) Фенібут**

- В) Магнію сульфат
- С) Екстракт піону
- Д) Цитрамон
- Е) Метоклопрамід

32. Відомо, що період напіввиведення теофіліну, який метаболізується у печінці, збільшується у 2,5-3 рази у хворих на:

*** А) Цироз печінки**

- В) Ішемічний інсульт
- С) Хронічний цистит
- Д) Хронічний аднексит
- Е) Виразкову хворобу шлунка

33. До небезпечних проявів побічної дії ліків належить канцерогенна дія (від лат. cancer - рак), тобто здатність викликати:

*** А) Злоякісні пухлини**

- В) Диспепсію
- С) Гіповітаміноз
- Д) Гіпербілірубінемію
- Е) Гіпокальціємію

34. Оберіть ефективний лікарський препарат із снодійною дією:

*** А) Фенобарбітал**

- В) Пеніцилін
- С) Бромокріптин
- Д) Сальбутамол
- Е) Глібенкламід

35. Флеботропні препарати стимулюють відтік крові від вен нижніх кінцівок та впливають на різноманітні ланки патогенезу венозної недостатності. До них відносять:

*** А) Венитан**

- В) Глюкокортикостероїди
- С) Засоби для місцевої анестезії
- Д) Антикоагулянти прямої дії
- Е) Фібринолітики

36. Оберіть протигрибковий засобів, що застосовується тільки місцево:

*** А) Клотримазол**

- В) Флуконазол
- С) Кетоконазол
- Д) Міконазол
- Е) Еконазол

37. Хворому на ревматоїдний поліартрит призначили нестероїдний протизапальний засіб диклофенак натрію, але через два тижні відмінили через загострення супутнього захворювання. Яке захворювання є протипоказом до призначення диклофенак натрію?

*** А) Виразкова хвороба шлунка**

- В) Гіпертонічна хвороба
- С) Стенокардія
- Д) Цукровий діабет
- Е) Бронхіт

38. Різка відміна препаратів, що містять кофеїн, призводить до розвитку таких клінічних проявів:

*** А) Гальмування ЦНС, сонливість, явища втоми**

- В) Різке підвищення активності ЦНС
- С) Розвиток диспепсичних явищ
- Д) Розвиток мігрені
- Е) Набряклість кистей та стоп, зменшення діурезу

39. Протикашльовий засіб, що стимулює утворення сурфактанту, це:

*** А) Амброксол**

- В) Амоксиклав
- С) Азитроміцин
- Д) Кодеїна фосфат
- Е) Папаверин

40. Пацієнт протягом останніх 3-х місяців отримує дигітоксин. В останні два тижні відбулось посилення ефекту аж до розвитку інтоксикації. З яким явищем це пов'язано?

*** А) Кумуляція**

- В) Звикання
- С) Тахіфілаксія
- Д) Сенсibiliзація
- Е) Ідіосинкразія

41. Хворому на атрофічний гастрит із зниженням секреторної функції шлунка був призначений препарат шлункового соку. Така терапія має назву:

*** А) Замісна**

- В) Паліативна
- С) Симптоматична
- Д) Етіотропна
- Е) Патогенетична

42. У пацієнта із сечокам'яною хворобою виник ланіркова коліка. З метою анальгезії був застосований кеторолак. Ефективність препарату у даній ситуації пов'язана із:

*** А) Спазмолітичною дією**

- В) Зменшенням синтезу колагену
- С) Їуносупресивним ефектом
- Д) Антиагрегаційною активністю
- Е) Зменшенням продукції АТФ

43. У хворої, яка страждає на гіпертонічну хворобу, було діагностовано синдром Рейно. Препарати якої групи антигіпер-тензивних засобів можуть ПОГІРШИТИ периферичний кровообіг?

*** А) Бета-адреноблокатори**

- В) Антагоністи кальцієвих каналів
- С) Діуретики
- Д) Блокатори ангітензинових рецепторів
- Е) Тнібнюри АПФ

44. Тривалість дії у антагоністів рецепторів до ангіотензину II при одноразовому прийомі складає до:

*** А) 24 год.**

В) 2 год.

С) 10 год.

Д) 36 год.

Е) 48 год.

45. Вкажіть, який лікарський засіб вважається засобом вибору для лікування артеріальної гіпертензії у хворих із супутнім цукровим діабетом:

*** А) Еналаприл**

В) Клофелін

С) Атенолол

Д) Ніфедіпін

Е) Фуросемід

46. Хворому, для лікування бронхіту призначено антибіотик. На фоні прийому антибіотика виникли наступні побічні дії: нудота, блювання, стоматит, дерматит на шкірі обличчя та рук (фотосенсибілізація), болі в правому підребер'ї.

Вкажіть, який ЛЗ вживав хворий:

*** А) Тетрациклін**

В) Ампіцилін

С) Еритроміцин

Д) Поліміксин

Е) Левоміцетин

47. У вагітної з терміном гестації 25 тижнів діагностовано артеріальну гіпертензію. Вкажіть, якій групі лікарських засобів слід надати перевагу в цій клінічній ситуації:

*** А) Альфаметилдопа**

- В) Інгібітори ангіотензинперетворюючого ферменту
- С) в-адреноблокатори
- Д) Блокатори кальцієвих каналів
- Е) Діуретики

48. Пацієнт 65-ти років 2 місяці тому переніс інфаркт міокарда. Для попередження тромбоутворення йому призначено ацетилсаліцилову кислоту. Визначте раціональну добову дозу:

*** А) 100 мг**

- В) 350 мг
- С) 500 мг
- Д) 1000 мг
- Е) 400 мг

49. У хворого 60-ти років після емоційного перенапруження з'явився стискаючий біль за грудиною з іррадіацією у ліву руку.

Оберіть доцільний для усунення нападу лікарський засіб:

*** А) Нітрогліцерин**

- В) Верапаміл
- С) Ніфедипін
- Д) Пропранолол
- Е) Каптоприл