

ЗАВАНТАЖЕНО З САЙТУ ТЕСТУВАННЯ.УКР

Загальна дерматологія

Категорія: **Дерматовенерологія**

Кількість запитань: **171**

1. На яку глибину уводиться зонд у цервікальний канал у жінок для узяття матеріалу на хламідії:

*** А) 1-1,5 см**

В) 4-5 см

2. Для інстиляцій використовують ляпіс:

*** А) 1%, 2%**

В) 20%

3. Для інстиляцій використовують протаргол:

*** А) 2% - 3%**

В) 20%

4. Для інстиляцій використовують сірчаноокислий цинк:

*** А) 1,0%**

В) 10,0%

5. Для жанетизації використовують розчин марганцево-кислого калію в розведенні:

*** А) 1:6000 - 1:8000**

В) 1:2000 - 1:3000

6. Для припікання літреєвих залоз застосовують ляпіс

А) 2,0%

*** В) 10,0% - 20,0%**

7. Для інстиляцій використовують розчин метиленової синьки:

*** А) 0,5,-1,0%**

В) 2,0%

8. Оповіщення на хворого з коростою здійснюється по формі:

А) 065/у

*** В) 058/у**

9. При виявленні хворого на лепру заповнюється оповіщення:

А) форма 089/у

*** В) форма 058/у**

10. З яких шарів складається стінка сім'явиносної протоки:

*** А) Адвентиція, гладком'язовий шар, епітелій**

В) Плоский епітелій

11. З якою протокою анастомозує дуктус деференс:

*** А) З протокою сім'яних міхурців**

В) З вивідною протокою Куперових залоз

12. Яка функція сім'явиносної протоки:

*** А) Протока для просування сперматозоїдів**

В) Місце дозрівання сперматозоїдів

13. Через який канал дуктус деференс проходить у малий таз:

*** А) Пахвинний канал**

В) Задню уретру

14. Яка довжина сім'яних міхурців:

А) 2 см

*** В) 4-5 см**

15. Який діаметр сім'яних міхурців:

*** А) 2 см**

В) 6-7 см

16. Як називається вивідна протока сім'яних міхурців:

*** А) Дуктус ексреторіус**

В) Дуктус деференс

17. Куди відкривається вивідна протока сім'яних міхурців:

А) Передня уретра

*** В) Задня уретра**

18. З якою протокою анастомозує вивідна протока сім'яних міхурців:

А) З дуктус ексреторіус

*** В) З дуктус деференс**

19. Облік захворюваності на піодерміти проводиться на підставі вивчення форми:

А) 089/у

*** В) 025/у**

20. Який принцип масажу сім'яних міхурців:

А) Від периферії до вивідної протоки

*** В) Від вивідної протоки до периферії**

21. Середні розміри передміхурової залози:

*** А) 3-4 см**

В) 4-6 см

22. Для вирощування грибкових культур користуються середовищами:

*** А) Середовище Сабуро**

В) М'ясний бульйон

23. Всі клітини крові утворюються:

*** А) З стовбурної клітини кісткового мозку**

В) Полінуклеари з гемоцитобластів

24. Ураження печінки, викликане застосуванням метотрексату протікає у вигляді:

*** А) Стеатозу з переходом у фіброз, але з нормальними печінковими пробами**

В) Стеатозу з мінімальним ризиком фіброзу

25. Який з перерахованих препаратів викликає апластичну анемію:

*** А) ДДС /авлосульфон, дапсон/**

В) Похідні золота

26. Чи є передміхурова залоза внутрішнім сфінктером сечового міхура:

*** А) Так**

В) Ні

27. Скільки часточок у передміхуровій залозі:

А) 10-20

*** В) 30-50**

28. Для примочок можуть бути використані розчини:

*** А) Таніну 1%**

*** В) Сульфату цинку 0,25%**

*** С) Свинцева вода 1:3**

Д) йоду 2%

29. Скільки часток у передміхуровій залозі:

А) 3

*** В) 2**

30. Скільки вивідних проток у передміхуровій залозі:

A) 20-30

*** В) У два рази менше, ніж часточок**

31. Межа між передньою і задньою уретрою:

A) Парс пендуля

*** В) Парс мембранацеа**

32. Відділи передньої уретри:

A) Парс мембранацеа

*** В) Парс бульбаріс, парс пендуля, парс гляндіс**

33. Для примочок можуть бути використані відвари:

*** А) Подорожника**

*** В) Звіробою**

*** С) Валеріани**

D) Білої лілії

34. Для примочок можуть бути використані:

A) Настойка календули

*** В) Відвар календули**

35. До складу збовтуваних сумішів можуть входити:

*** А) Окис цинку**

*** В) Тальк**

*** С) Вода**

*** D) Олія**

E) Ланолін

36. До складу збовтуваних сумішів можуть входити:

- * **A) Сірка**
- * **B) іхтіол**
- * **C) Дьоготь**
- D) Крохмаль

37. До мазьових основ можуть входити речовини:

- * **A) Мінеральні**
- * **B) Рослинні**
- * **C) Тваринні**
- * **D) Рослинні і тваринні**
- * **E) Мінеральні, рослинні**
- * **F) Мінеральні, тваринні**
- G) Тільки мінеральні

38. До мазьової основи можуть входити:

- * **A) Вазелін**
- B) Вугілля
- * **C) Спермацет**

39. До мазьової основи можуть входити:

- * **A) Вазелін**
- * **B) Автол**
- * **C) Масло какао**
- * **D) Свиняче сало**
- E) Гліцерин

40. До основи мазів можуть входити:

- * **A) Вазелінове масло**
- * **B) Олія**
- * **C) Риб'ячий жир**
- D) Гліцерин

41. У мазьових основах можуть поєднуватися речовини:

- * **A) Мінеральні і тваринні**
- * **B) Тваринні і рослинні**
- * **C) М'які і рідкі**
- D) Мінеральні і рідкі

42. Мазі можуть бути:

- * **A) індиферентні**
- * **B) Кератопластичні**
- * **C) Протипаразитарні**
- * **D) Кератолітичні**
- E) Дезодоруючі

43. Паста від мазів відрізняються:

- A) Характером діючої речовини
- * **B) Проникністю**

44. До медичних лаків відносяться:

- * **A) Травміцидін**
- * **B) Колодій**
- C) Лише клеол
- * **D) Колодій та клеол**

45. Лаки можуть містити:

- * **A) Хлороформ**
- * **B) Ефір**
- * **C) Каніфоль**
- * **D) Олію**
- E) Молочну кислоту

46. Медичний клей, який застосовується у дерматології, містить:

- * **A) Окис цинку**
- * **B) Желатину**
- * **C) Гліцерин**
- * **D) Воду**
- E) Етиловий спирт

47. Пластирі можуть містити:

- * **A) Каучук**
- * **B) Каніфоль**
- * **C) Окис цинку**
- * **D) Віск**
- E) Гліцерин

48. Пластирі можуть містити:

- * **A) Сечовину**
- * **B) Саліцилову кислоту**
- * **C) Свинець**
- D) Мідь

49. Гормони кіркового шару наднирників:

*** А) Дезоксикортикостерон**

*** В) Кортизол**

С) Норадреналін

50. Гормони мозкової речовини наднирників:

*** А) Адреналін**

*** В) Норадреналін**

С) АКТГ

51. Заслінка Герена знаходиться у:

А) Парс бульбаріс

*** В) Парс гляндіс**

52. Тізонови залози розташовані:

*** А) З боків від вуздечки**

В) Парс пендуля

53. Епітелій у парс гляндіс:

А) Циліндричний

*** В) Плоский**

54. Епітелій задньої уретри:

А) Циліндричний

*** В) Перехідний**

55. На яку глибину в чоловіків вводиться інструмент для зішкрябку:

А) 1-2 см

*** В) 4-5 см**

56. Коли починаються порушення, викликані застосуванням метотрексату або ДДС /авлосульфона, дапсона/:

*** А) У перші 3 місяці лікування**

В) Через 2 і більш років після закінчення лікування

57. Такі твердження хибні:

А) Випадання 80 волосин на день вважається нормою

*** В) З віком збільшується кількість меланоцитів у епідермісі**

58. Скільки часточок у чоловічому яєчку:

А) 50-70

*** В) 100-250**

59. Де розташовані сім'яні звивисті канальці:

А) У придатку яєчка

*** В) У яєчку**

60. Яку функцію виконують клітини Лейдіга:

А) Трансформуються в сперматозоїди

*** В) Продукують чоловічі статеві гормони**

61. Яку функцію виконують сперматогонії:

*** А) Трансформуються в сперматозоїди**

В) Виділяють чоловічі статеві гормони

62. Яку функцію виконують клітини Сертолі:

А) Продукують чоловічі статеві гормони

*** В) Є місцем розвитку сперматозоїдів**

63. Куди відкриваються сім'яні звивисті канальці:

*** А) У прямі сім'яні канальці**

В) У передню уретру

64. Куди відкриваються прямі сім'яні канальці:

А) Задню уретру

*** В) У мережу яєчка**

65. Скільки в яєчку d. eferentes testis:

А) 2-5

*** В) 17-18**

66. Куди відкриваються сім'явиносні протоки:

*** А) У задню уретру**

В) У передню уретру

67. Які структурні одиниці складають придаток яєчка:

А) Голівка

*** В) Голівка, тіло і хвіст**

68. Де прикріплюється придаток яєчка до яєчка:

А) Справа

*** В) На полюсах**

69. Функція придатка яєчка:

А) Вироблення сперматозоїдів

*** В) Диференціювання сперматозоїдів**

70. Функція яєчка:

А) Вироблення сперміну

*** В) Вироблення андрогенів і сперматозоїдів**

71. Яка довжина вивідної протоки придатка яєчка:

А) 3-5 см

*** В) Дорівнює довжині придатка**

72. Де знаходиться синус придатка яєчка:

*** А) Між голівкою і хвостом**

В) У голівці яєчка

73. Які анатомічні структури складають сім'явиносну протоку:

*** А) Дуктус епідидиміс, дуктус деференс, ампула дуктус деференс**

В) Ампула дуктус деференс

74. Яка довжина сім'явиносної протоки:

А) 5-10 см

*** В) 17-18 см**

75. Де відкривається сім'явиносна протока:

А) Передня уретра

*** В) Задня уретра**

76. Який діаметр просвіту сім'явиносної протоки:

А) 0,8 см

*** В) 0,3 см**

77. Яким епітелієм вистелений дуктус деференс:

А) Перехідний

*** В) Циліндричний із віями**

78. До демографічних показників відносяться:

- * **A) Народжуваність**
- В) Летальність
- * **С) Природній приріст населення**
- * **D) Смертність**

79. Методика визначення демографічних показників:

- * **A) Народжуваність (загальна) = (число тих, що народилися живими за рік · 1000)/(середньорічна кількість населення)**
- В) Народжуваність (загальна) = (число померлих дітей у віці до 1 року в поточному році · 1000)/(число тих, що народилися в поточному році)

80. Методика визначення демографічних показників:

- * **A) Смертність (загальна) = (число померлих за рік · 1000)/(середньорічна кількість населення)**
- В) Смертність (загальна) = (число померлих за рік · 100)/(число хворих)

81. Методика визначення демографічних показників:

- * **A) Природній приріст населення = показнику народжуваності мінус показник смертності**
- В) Природній приріст населення = показнику народжуваності мінус показник летальності

82. Обчислювання показника дитячої смертності:

- * **A) Показник дитячої смертності = (число померлих дітей у віці до 1 року в поточному році · 1000)/(2/3 тих, що народилися в поточному році + 1/3 тих, що народилися в попередньому році)**
- В) Показник дитячої смертності = (число померлих дітей)/(загальне число дітей) · 1000

83. Показник летальності вираховується:

- * **A) (Число померлих в стаціонарі)/(число хворих) · 100**
- В) (Число померлих в стаціонарі)/(кількість населення) · 100

84. Показники захворюваності с тимчасовою утратою працездатності:

- * А) Число випадків непрацездатності на 100 працюючих = (число випадків) / (число працюючих) · 100**
- * В) Число днів непрацездатності на 100 працюючих = (число днів) / (число працюючих) · 100**
- * С) Середня тривалість одного випадку непрацездатності = (число днів) / (число працюючих) · 100**
- Д) Тривалість лікування в стаціонарі = (число хворих, що лікувалися в стаціонарі) / (число всіх хворих) · 100

85. Поняття "хворобливість" - це розповсюдженість захворювань:

- А) Всі захворювання, що були зареєстровані в попередньому році, та перереєстровані в поточному році
- * В) Всі захворювання, що були виявлені наново в поточному році, і перейшли з попереднього року**

86. Захворюваність - це:

- А) Сума всіх захворювань, зареєстрованих на протязі останніх трьох років
- * В) Захворювання, що наново виникли в поточному році**

87. Основними дерматовенерологічними закладами є:

- * А) Шкірно-венерологічна лікарня**
- * В) Обласний шкірно-венерологічний диспансер**
- * С) Міський шкірно-венерологічний диспансер**
- * Д) Районний шкірно-венерологічний диспансер**
- Е) Поліклініка (відділення) профмедоглядів

88. Захворюваність на сифіліс серед осіб соціально-негативної поведінки перевищує захворюваність на сифіліс серед іншого населення:

- А) У 40-50 разів
- * В) У 100-150 разів**

89. Гарним показником роботи жіночої консультації є активне виявлення гонореї у жінок, що страждають на запальні захворювання сечостатевих органів, у процентах:

A) 4-5%

*** B) 6% і більше**

90. Гарним показником роботи жіночої консультації є профілактичне лікування жінок із запальними захворюваннями сечостатевих органів за схемами лікування хронічної гонореї у відношенні на одну виявлену хвору з гонореєю:

A) 1:10

*** B) 1:4**

91. Задовільним показником роботи жіночої консультації є виявлення хворих на гонорею жінок у процентах до всієї кількості хворих на гонорею жінок, зареєстрованих у районі (місті, області):

A) 21-25%

*** B) 26-30%**

92. Гарним реальним якісним показником роботи шкірно-венерологічного закладу є виявлення джерел зараження на сифіліс у процентах:

*** A) 80%**

B) 100%

93. Задовільним реальним показником роботи кабінету профоглядів можна вважати виявлення венхворих серед декретованих груп населення у відношенні до всіх венхворих серед цієї групи населення у процентах:

*** A) 30%**

B) 50%

94. Гарним якісним показником роботи шкірно-венерологічного закладу є правильне лікування хворих на піодерміти, що дозволяє в середньому видавати лікарняні листи не більше, ніж на:

A) 3 дні

*** B) 5 днів**

*** C) 10 днів**

95. Назвіть гарний реальний показник якості роботи жіночої консультації по профілактиці вродженого сифілісу (вассерманізація вагітних жінок у процентах відповідно у першу і другу половину вагітності):

A) 60%-80%

*** B) 95%-98%**

96. Причинами росту захворюваності на сифіліс серед населення є:

*** A) Неповне охоплення вассерманізацією хворих терапевтичних і неврологічних стаціонарів**

*** B) Недостатнє виявлення джерел зараження**

*** C) Неповне обстеження статевих і побутових контактів**

D) Погана серодіагностика первинного серонегативного сифілісу

97. Хворі на заразні форми сифілісу повинні бути госпіталізовані протягом:

*** A) 24 годин**

B) 48 годин

98. На диспансерному обліку повинно перебувати на одного лікаря-дерматолога хворих на хронічні рецидивуючі дерматози:

A) 20-40

*** B) 140-160**

*** C) 100-120**

99. Облік хворих на сифіліс ведеться за формою:

A) 058/y

*** B) 089/y**

100. Облік хворих на гонорею ведеться за формою:

A) 003/y

*** B) 089/y**

101. Облік хворих на трихофітію, мікроспорію та парші ведеться за формою:

A) 065/y

*** B) 089/y**

102. Абсолютним показником захворюваності є:

A) Вираження захворюваності в процентах

*** B) Вираження захворюваності в абсолютних цифрах**

103. інтенсивним показником захворюваності вважається:

A) Вираження захворюваності в абсолютних цифрах

*** B) Вираження захворюваності на 100 і 10 тис. населення**

104. Екстенсивним показником захворюваності вважається:

A) Показник захворюваності на 100 тис. населення

*** B) Показник захворюваності в процентах**

105. На хворих з дерматозами в стаціонарі ведеться медична картка стаціонарного хворого - форма №:

A) 065/y

*** B) 003/y**

106. На хворих з дерматозами в поліклініці заповнюється медична картка амбулаторного хворого - форма №:

A) 003/у

*** B) 025/у**

107. На хворого з венеричним захворюванням заповнюється медична картка хворого на венеричне захворювання - форма №:

A) 058/у

*** B) 065/у**

108. Річний звіт про діяльність диспансеру по лікуванню хворих на венеричні, грибкові, шкірні хвороби і трихомоніаз подається по формі №:

*** A) 34-здоров**

B) 039/у

109. Річний звіт про захворювання, що передаються переважно статевим шляхом, грибкові шкірні захворювання та коросту подається по формі №:

*** A) 9**

B) 065/у

110. Лікар на амбулаторному прийомі веде щоденник роботи лікаря поліклініки, диспансеру, консультації - форма №:

*** A) 039/у**

B) 089/у

111. Показником діяльності стаціонару є:

*** A) Кількість днів роботи ліжка на протязі року**

B) Показники тимчасової непрацездатності

112. Середніми показниками діяльності дерматовенерологічних стаціонарів є:

- * А) Робота ліжка 340 днів на рік**
- В) Оборот ліжка - 13-14
- * С) Середня тривалість перебування хворого на ліжку 20-23 дні**
- * D) Летальність на 10 тис. таких, що вибули 0 - 1,5**

113. Нормативний показник середньої забезпеченості населення лікарями-дерматовенерологами складає:

- * А) 0,55 на 10 тис. населення**
- В) 0,75 на 10 тис. населення

114. Захворюваність населення на венеричні хвороби, що вираховується в інтенсивних показниках, розраховується по країні:

- А) На 100 осіб населення
- * В) На 100 тис. осіб населення**

115. За свідоме зараження венеричною хворобою або поставлення в умови можливого зараження здорових осіб, винні притягаються до кримінальної відповідальності по ст. 108, 108.1. В яких випадках винний підлягає кримінальній відповідальності:

- А) Був на прийомі у лікаря, встановлений діагноз гострокінцеві кондиломи, розпочав лікування, вступив у статевий зв'язок, заразив партнера
- * В) Був на прийомі у лікаря, встановлений діагноз гонорея, підписав попередження про те, що знає про своє захворювання, вступив у статевий контакт, заразив партнера гонореєю**

116. Хворого на сифіліс можна притягти до кримінальної відповідальності по ст.108, 108.1. КК України, якщо він:

- А) Самовільно припинив лікування
- * В) Ухиляється від контролю у встановлені строки**
- * С) У день початку лікування самовільно покинув стаціонар і припинив лікування**
- * D) При госпіталізації мав статевий контакт у стаціонарі зі шкірним хворим і заразив його сифілісом**

117. Сфера деонтології включає:

- * А) Відношення лікаря до хворого**
- В) Відношення хворого до лікаря
- * С) Правові питання (лікарська таємниця, кримінальна відповідальність за її розголошення, колегіальність)**
- * D) Дотримання морально-етичних правил**

118. Деонтологія і етика у практичній діяльності лікаря з достатньою повнотою виражена у:

- * А) Клятві Гіппократа (V-IV вв. до н.е.)**
- В) Факультетському обіцянні російських лікарів (XIX -XX вв.)

119. До особливостей деонтології у діяльності лікаря дерматовенеролога відносяться:

- * А) Необхідність з'ясування деталей статевого анамнезу**
- * В) Необхідність встановлення джерела зараження вен захворюванням**
- * С) Необхідність встановлення контактів хворого на вен хворобу**
- D) Необхідність роз'яснення хворим правового боку питання при встановленні діагнозу венеричного захворювання

120. Засновником французької дерматологічної школи вважають:

- * А) Алібера**
- В) Жибера

121. Засновником Віденської дерматологічної школи вважають:

*** А) Гебру**

В) Унна

122. Засновником Петербурзької дерматологічної школи вважають:

А) А.і.Поспелова

*** В) А.Г.Полотебнова**

123. Засновником Московської дерматологічної школи вважають:

А) і.Ф.Зеленева

*** В) А.і.Поспелова**

124. Засновником Київської дерматологічної школи вважають:

*** А) М.І.Стуковенкова**

В) Л.К.Горецького

125. Засновником Харківської дерматологічної школи вважають:

А) і.С.Попова

*** В) і.Ф.Зеленева**

126. Первинними безпорожнинними елементами висипу є:

*** А) Папула**

*** В) Горбик**

С) Міхур

*** D) Вузол**

127. Первинними порожнинними елементами висипу є:

А) Горбик

*** В) Міхурець**

*** С) Пустула**

128. Вторинними морфологічними елементами висипу є:

- * А) Ерозія**
- * В) Тріщина**
- * С) Садно**
- D) Пустула

129. До вторинних елементів висипу відносяться:

- * А) Лусочка**
- * В) Атрофія**
- * С) Рубець**
- D) Вузол

130. Плями змінюють у шкірі:

- * А) Колір**
- В) Рельєф

131. Плями запального характеру:

- * А) Розеола**
- В) Петехія
- * С) Еритема**

132. Папула може формуватися:

- * А) У епідермісі**
- * В) У сосочковому шарі дерми**
- С) У гіподермі

133. Після розв'язання папул можуть виникнути:

- * А) Плями вторинні**
- В) Рубці

134. Горбик походить з:

A) Епідермісу

*** В) Сітчастого шару шкіри**

135. Папула може формуватися за рахунок:

*** А) Гіперкератозу**

*** В) Гранульозу**

C) Акантолізу

136. Міхурець може формуватися у:

*** А) Епідермісі**

В) У сосочковому шарі дерми

137. Які пустули пов'язані з придатками шкіри:

A) Ектима

*** В) Фолікуліт**

*** С) Акне**

138. Які з нижчеперелічених елементів висипки можуть призводити до рубців:

A) Папула

*** В) Горбик**

*** С) Вузол**

139. Для яких захворювань є характерними істинно мономорфні висипи:

A) Екзема

*** В) Псоріаз**

*** С) Пухирчатка вульгарна**

140. Для яких захворювань характерні поліморфні висипи:

- * А) Екзема**
- В) Псоріаз
- * С) Вторинний сифіліс**
- * D) Дерматит Дюринга**

141. Водорозчинні вітаміни:

- * А) В**
- В) К

142. Жиророзчинні вітаміни:

- * А) А**
- * В) Е**
- * С) К**
- * D) Д**
- Е) РР

143. При шкірних захворюваннях використовуються методи лікування:

- А) Лише етіологічні
- * В) Патогенетичі**
- * С) Симптоматичні**
- * D) Комбіноване**

144. У загальній терапії хворих на шкірні захворювання використовуються:

- * А) Вітаміни**
- * В) Ферменти**
- С) лише гормони

145. В лікуванні шкірних захворювань використовуються засоби:

- * А) Антимікробні**
- В) Лише фотосенсибілізуючі
- * С) Цитостатичні**

146. Для зовнішнього лікування шкірних захворювань використовуються:

- * А) Присипки**
- * В) Збовтувані суміші**
- * С) Креми, лініменти, емульсії**
- * D) Мазі, пасти**
- Е) Розчин Люголя

147. Застосовуються для зовнішнього лікування шкірних захворювань:

- А) Клеї
- * В) Пластирі**
- * С) Парафін, озокерит**

148. Для присипок (пудр) можуть бути використані:

- * А) Біла глина**
- * В) Окис цинку**
- * С) Стрептоцид**
- D) Дьоготь

149. Для присипок (пудр) можуть бути використані:

- * А) Дерматол**
- * В) Ксероформ**
- * С) Резорцин**
- D) Нафталан

150. Присипки на шкіру показані при:

А) Сухості

*** В) Запаленні без мокнуття**

151. У дерматологічній практиці використовується дьоготь:

*** А) Березовий**

В) Лише буковий

*** С) Сосновий**

152. До складу рідини Кастеляні входить:

*** А) Фуксин**

*** В) Карболова кислота**

*** С) Борна кислота**

*** D) Ацетон**

*** Е) Резорцин**

*** F) Вода**

*** G) Спирт**

Н) Йод

153. Примочки на шкіру показані при:

А) Сухості

*** В) Мокнутті**

154. Для примочок можуть бути використані:

*** А) Розчин нітрату срібла 0,25%**

В) Розчин нітрату срібла 2%

155. Чи є вірним пропис: Rp:Sol.Ascorbinici 5% - 1,0 in ampull. D.t.d. №10. D.S. Для парентерального уведення:

*** А) Так**

В) Ні

156. Чи є вірним пропис: Rp:Sol.Thyamini bromidi 20%-1,0 in ampull. D.t.d. №20. D.S. Для ін(єкцій:

А) Так

*** В) Ні**

157. Чи є вірним пропис: Rp:Prednisoloni 0,005 in tab. D.t.d. №100. D.S.За призначенням лікаря:

*** А) Так**

В) Ні

158. Чи є вірним пропис: Rp:Sol.Prednisoloni 3% - 1,0 in ampull. D.t.d. №6. D.S. Для парентерального уведення:

*** А) Так**

В) Ні

159. Чи є вірним пропис: Rp:Triamcinoloni 0,04 in tab. D.t.d. №100. D.S. За призначенням лікаря:

А) Так

*** В) Ні**

160. Чи можна уводити кортикостероїдні препарати:

*** А) Через шкіру**

*** В) Внутрішньом(язово**

*** С) Внутрішньовенно**

*** D) Ентерально**

Е) Лише ентерально

161. Чи є вірним пропис: Rp:Sol.Acidi borici 5% - 500 ml D.S.Для примочок:

A) Так

*** B) Ні**

162. Чи є вірним пропис: Rp:Acidi Salicylici 1,0 Sulfati praecipitati 3,0 Vaselinei Aq.destill. ana 15,0 M.D.S. Мазь:

A) Так

*** B) Ні**

163. Чи є вірним пропис: Rp: Zinci oxydi 20,0 Talci 20,0 Amyli tritici 20,0 Glycerini 40,0 Vaselinei 40,0 Aq.destillatal ad 240,0 M.D.S. Збовтувана суміш:

A) Так

*** B) Ні**

164. Чи є вірним пропис: Rp: Acidi lactici 6,0 Acidi Salicylici 12,0 Vaselinei ad 100,0 M.D.S. Зовнішнє:

*** A) Так**

B) Ні

165. При тривалому застосуванні кортикостероїдних препаратів може спостерігатися:

*** A) підсилене виведення з організму кальцію та його солей**

*** B) підвищене виведення з організму калію та його солей**

C) підсилене виведення з організму хлориду натрію

166. Утворення рубців відбувається при:

A) Розсмоктуванні горбика

*** B) Розпаді гуми**

167. До біогенних стимуляторів, що застосовуються у дерматології, належать:

- * А) Алое**
- В) Препарати цинку
- * С) Екстракт плаценти**

168. При узятті матеріалу для дослідження на грибки беруть:

- * А) Волосся, лусочки з вогнищ ураження, шматочки нігтьових пластинок**
- В) Піт, шкірне сало

169. Створюють такі умови при узятті матеріалу для мікологічного дослідження:

- * А) При узятті ураженого волосся саджають хворого перед гарним джерелом світла**
- В) Для кращого розрізнення світлих муфт навколо ураженого волосся розглядають їх на білому фоні

170. Мікроскопічне дослідження грибкового матеріалу роблять із додаванням:

- * А) 10 - 20% розчину їдкого лугу**
- В) Фізіологічного розчину

171. Грибковий матеріал краще виявляти:

- * А) У нативних препаратах**
- В) Препаратах, пофарбованих метиленовим синім