

ЗАВАНТАЖЕНО З САЙТУ ТЕСТУВАННЯ.УКР

Гістологія

Категорія: **Дерматовенерологія**

Кількість запитань: **75**

1. Сальні залози в плода на обличчі та волосистій частині голови починають функціонувати на:

А) 9 місяці

*** В) 7 місяці**

*** С) 8 місяці**

2. Колагенові, еластичні та аргірофільні волокна починають виявлятися в плода на:

*** А) 5 місяці**

В) 8 місяці

3. Товщина власне шкіри /дерми/ на різних ділянках шкіри коливається в межах:

А) 6,0 - 10,0 мм

*** В) 0,5 - 2,5 мм**

*** С) 2,5 - 5,0 мм**

4. Закладання волосся у плода відбувається на різних ділянках неодноразово з:

*** А) 2,5 до 3,5 міс**

*** В) 3,5 до 5,0 міс**

С) 7,0 до 9,0 міс

5. Сальні залози вперше з'являються в плода на:

*** А) 4 місяці**

В) 8 місяці

6. З яких зародкових листків розвивається шкіра:

*** А) Ектодермального**

*** В) Мезодермального**

С) Ентодермального

7. Маса шкіри без підшкірної основи складає:

А) 10% маси тіла

*** В) 5% маси тіла**

8. У епідермісі є:

А) Кровоносні судини

*** В) Нерви**

9. Придатками шкіри є:

*** А) Волосся**

В) Аргірофільні волокна

*** С) Сальні залози**

*** D) Нігті**

*** Е) Потові залози**

10. Довге волосся є на:

*** А) Волосистій ділянці голови**

*** В) Бороді та вусах**

С) Надбрівних дугах

11. Щетинисте волосся є:

А) В ділянці бороди та вусів у чоловіків

*** В) В ділянці надбрівних дуг**

*** С) По краю повік**

12. За типом секреції потові залози є:

А) Голокриновими

*** В) Еккриновими і апокриновими**

13. Пушкове волосся є:

А) На кінцевих фалангах пальців

*** В) На гомілках**

14. За типом секреції сальні залози є:

*** А) Голокриновими**

В) Голокриновими і апокриновими

15. З потом потовими залозами виділяються:

*** А) Вода**

*** В) Солі**

С) Азотисті сполуки

16. із секретом сальних залоз виділяються:

*** А) Жир**

*** В) Вітаміни**

С) Лише гормони

17. Підсилюють захисні (від мікроорганізмів) властивості шкіри:

А) Підвищене потовиділення

*** В) Постійне злущування епітелію**

*** С) Кисла реакція середовища на поверхні**

18. Шари епідермісу:

*** А) Роговий**

*** В) Блискучий**

*** С) Зернистий**

*** D) Шиповидний**

Е) Сітчастий

19. Шари дерми:

- A) Зернистий
- * B) Сосочковий**
- * C) Сітчастий**

20. Будова пушкового волоса:

- * A) Стрижень**
- * B) Корінь**
- C) Мозковий шар
- * D) Кірковий шар**

21. У дермі є:

- * A) Колагенові волокна**
- * B) Фібробласти**
- C) Адіпоцити
- * D) Еластичні волокна**
- * E) Аргірофільні волокна**

22. Кількість поту, що виділяється за добу (середнє без навантаження):

- * A) 500 мл - 600 мл**
- B) Понад 1000 мл

23. Чи може шкіра бути органом імунної системи:

- * A) Так**
- B) Ні

24. У імунній відповіді шкіри можуть брати участь:

- * A) імунні лімфоцити**
- B) Базальні клітини
- * C) Макрофаги**

25. Шкіра депонує:

- * **A) Воду**
- * **B) Цукор**
- * **C) Солі**
- D) лише вітаміни

26. Шкіра бере участь в обміні:

- * **A) Білків**
- * **B) Жирів**
- * **C) Вуглеводів**
- * **D) Солей**
- E) Лише вітамінів

27. Шкіра виконує функції:

- * **A) Терморегуляції**
- * **B) Органу чуттів**
- C) Лише вироблення біологічних медіаторів
- * **D) Вироблення пігменту**

28. Шкіра може виділяти з організму:

- A) Лише воду
- * **B) Жири**
- * **C) Солі**

29. Шкіра може всмоктувати:

- A) Лише гази
- * **B) Воду**
- * **C) Ртуть, дьоготь, саліцилову кислоту, димексид**

30. Формування рисунка трикутних і ромбічних полей у плода відбувається на:

А) 7 місяці

*** В) 6 місяці**

31. Потові залози починають розвиватися у плода на долонях і підшвах у:

*** А) 3-4 місяці**

В) 7-8 місяців

32. Потові залози на всіх ділянках тіла, крім долоней і підшов, починають розвиватися у плода в:

А) 6 місяців

*** В) 5 місяців**

33. Секреторна трубка потової залози на долонях і підшвах починає формуватися у плода з:

*** А) 5 місяців**

В) 8 місяців

34. Секреторна трубка потових залоз, крім долоней і підшов, на всіх ділянках тіла починає формуватися у плода з:

*** А) 6 місяця**

В) 9 місяця

35. Підшкірний жировий шар ділиться на часточки у плода на:

*** А) 5 місяці**

В) 9 місяці

36. Кровоносні судини глибокої судинної мережі шкіри починають формуватися у плода на:

*** А) 2 місяці**

В) 6 місяці

37. Глибока і поверхнева судинна мережа шкіри вже сформована у плода:

*** А) 5-місячного**

В) 8-місячного

38. Товщина епідермісу на різних ділянках шкіри коливається у межах:

А) 2,0 - 5,0 мм

*** В) 0,035 - 0,98 мм**

39. В період ембріонального розвитку епідерміс на всій поверхні складається із базального, шиповидного, зернистого та рогового шару на:

А) 8 місяці

*** В) 6 місяці**

40. При псоріазі спостерігаються такі патогістологічні процеси:

А) Різке вкорочення дермальних сосочків

*** В) Подовження епідермальних виростів**

41. Гістопатологічна картина пустульозного псоріазу:

*** А) Наявність внутрішньоепідермальних однокамерних пустул**

*** В) Паракератоз**

С) Дискератоз

*** D) Виражений інфільтрат у дермі**

42. Гістологічно доброякісні пухлини представлені:

*** А) Фібробластами**

В) Епітеліальними клітинами

43. Гістопатологічно спиноцелюлярний рак характеризується:

*** А) Пухлинним розростанням епідермальних клітин шиповидного шару**

В) Розростанням клітин базального шару

44. Про ступінь злоякісності раку шкіри судять по:

- * А) Проникненню пухлинних мас за межі дерми**
- * В) Проникненню атипових клітин за межі гіподерми**
- * С) Ушкодженню базального шару епідермісу по периферії пухлини**
- D) Зміни кольору вогнища ураження

45. Гістопатологія хвороби Боуена:

- * А) У мальпігієвому шарі - атипів клітин і кератинізація клітин**
- В) Гранульоз

46. Рак сальних залоз (гістопатологічні зміни) характеризується:

- A) Клітини диференційовані
- * В) Ліпоїдний матеріал у всіх клітинах пухлини, численні мітози**

47. Слизова оболонка порожнини рота вистелена:

- A) Багатошаровим плоским епітелієм, що складається з зернистого і шипуватого шарів
- * В) Багатошаровим плоским епітелієм, що складається з базального і шипуватого шарів**

48. Слизова язика вкрита сосочками:

- * А) Ниткоподібними**
- * В) Грибоподібними**
- * С) Валикоподібними**
- D) Кратероподібними

49. Гістологічно: наявність у клітинах рогового шару ядер характерна для:

- A) Екземи істинної
- * В) Псоріазу**

50. Гістологічно: гіперплазія кератогіалінового шару, акантоз, вакуольна дегенерація базальних клітин характерна для:

А) Псоріазу

*** В) Червоного плоского лишая**

51. Гістологічно: у епідермісі спонгіоз, акантоз, незначний паракератоз характерний для:

*** А) Хронічної екземи**

В) Парапсоріазу

52. Гістологічно: у епідермісі незначний гіперкератоз, паракератоз і акантоз, внутрішньоклітинний набряк клітин шиповидного шару характерні для:

*** А) Нейродерміту**

В) Парапсоріазу

53. Гістологічно: у епідермісі пухир, дно його утворено базальними клітинами в порожнині пухиря округлі клітини з базофільною протоплазмою (клітини Тцанка). Це характерно для:

А) Дерматиту Дюринга

*** В) Вульгарної пухирчатки**

54. Гістологічно: у сітчастому шарі дерми інфільтрат з епітеліоїдних клітин, великі клітини з великою кількістю ядер по периферії, ближче до периферії є лімфоцити. Це характерно для:

*** А) Туберкульозного вовчака**

В) Актиномікозу

55. Гістологічно: великі скупчення базальних клітин у епідермісі у вигляді тяжів, по периферії клітини розподілені радіально або у вигляді частоколу, є чисельні мітози. Це характерно для:

А) Фібросаркоми

*** В) Базаліоми**

56. У дермі значна кількість "часточкових" вогнищ з епітеліоїдних клітин і поодиноких гігантських клітин типу сторонніх тіл. Це характерно для:

*** А) Саркоїду Бека**

В) Лепри

57. Гістологічно: роговий шар стовщений, зернистий шар ледь виражений, шиповидний шар стовщений, сосочки дерми сплюснені. Встановите діагноз:

А) Парапсоріаз

*** В) іхтіоз**

58. Гістологічно: рогові "пробки" у розширених волосяних фолікулах, виражений гіперкератоз в іншій частині препарату. Це характерно для:

*** А) Волосяного лишаю**

В) Парпсоріазу

59. Гістологічно: гіперкератоз устя волосяного фолікула пушкового волосся, у сосочках шкіри гіперемія, навколо судин значний круглоклітинний інфільтрат. Встановіть діагноз:

А) Парапсоріаз

*** В) Червоний волосяний лишай Девержі**

60. Гістологічно: у епідермісі гіпертрофія рогового і зернистого шарів, у базальному і шиповидному шарах - дискератоз у вигляді круглих тілець та зернин. Це характерно для:

А) іхтіозу

*** В) Хвороби Дар'є /фолікулярний дискератоз/**

61. Гіст.:значн.поліморф.клітинн.інфіл-т у дермі,у верх.відділах підшкірн.шару навколо судин клітинні скупч-я,великі клітини з гіперхромн.,церебриформн.ядрами,у шиповидному шарі епідермісу мікроскоп-і абсцеси,що містять лімф-ти.Встан.д-з:

А) Пустульозний псоріаз

*** В) Бляшково-інфільтративна стадія грибовидного мікозу**

62. Гістолог.:інфільтрат у дермі і верх.відділах підшкірн.шару з гістіоцитів, лімфоцитів, плазматич.клітин, фібробластів і великих клітин із великими неправ.ядрами; епідерміс місцями стоншений, у шиповидному шарі мікроскоп-і.абсцеси. Діагноз:

А) Ексудативна форма псоріазу

*** В) Пухлиноподібна стадія грибовидного мікозу**

63. Гіст.:підсосочк.інфіл-т дерми,проникає до епідерм.,епідерміс стоншен.,місцями зруйн.:у інф-ті гістіоцити різн.розмір.,лімф-ти,еозиноф.,плазм.клітини і фібробласти,зустріч.великі клітини з сегм.численн.ядрами /кл.Рід-Штернберга/.Д-з:

*** А) Лімфома Ходжкіна /лімфогранульоматоз/**

В) Лімфосаркома

64. Гістолог.:у епідермісі-гіперкератоз,особливо в устях волосяних фолікулів,гідропічна дистрофія базального шару,у верхніх відділах дерми інфільтрат навколо судин із лімфоцитів,дистрофія сполучної тканини /еластоз/.Встановіть д-з:

*** А) Дисковидний червоний вовчак**

В) Склероедема

65. Гістологічно:епідерміс дещо стоншений, сосочки дерми трохи сплюснені, атрофія придатків шкіри, колагенові волокна склерозовані, блідо пофарбовані. Встановіть діагноз:

*** А) Склеродермія**

В) ідіопатична атрофія

66. Гістологічно:епідерміс стоншений,його вирости згладжені,дерма стоншена,придатки шкіри відсутні,колагенові волокна значно стоншені,еластичні відсутні.Встановіть діагноз:

А) Дисковидний червоний вовчак

*** В) ідіопатична атрофія шкіри**

67. Гістол.:епідерміс помір.атрофічний,у дермі місцями вогнища муцинозної дистрофії,у мязов.волок.немає попереч.смугастості,гіаліноз саркоплазми і проліферація ядер,навколо м`язов.волокон периваскулярний інфільт.з лімфоц.,гістіоцитів.Встановіть д-з:

А) Склероедема

*** В) Дерматоміозит**

68. Для атрофодермії Нонне-Мільроя-Мейжа характерно:

*** А) Наявність щільного набряку в ділянці гомілок**

В) Значні загальні розлади /слабкість, головний біль, субфебрильна температура тіла/

69. Гістологічно: у нижніх шарах епідермісу великі, різко пігментовані гнізда невисних клітин, у частині їх видно мітози. У сосочковому шарі шкіри - щільний смугоподібний інфільтрат і окремі атипові невисні клітини. Це характерно для:

*** А) Злоякісної меланоми**

В) Фібросаркоми

70. Гістолог.: у дермі круглоклітинний інфільтрат, розташ. навколо судин і нервів, склад. з гістіоцитів і великих пінистих клітин, у яких при фарбуванні по Циль-Нільсену виявл. чисельні палички, розташовані у вигляді сигар у пачці. Це характерно для:

*** А) Лепроматозної лепри**

В) Скрофулодерми

71. Гістологічно: у дермі і підшкірному шарі круглоклітинний інфільтрат переважно з плазматичних клітин, а також із лімфоцитів і епітеліоїдних клітин. Це характерно для:

А) Туберкульозного вовчака

*** В) Сифілітичної гуми**

С) Скрофулодерми

72. Гістологічно: дерма стовщена, у колагенових волокнах ознаки дегенерації, між ними ніжні блакитнуваті нитки і зерна муцину. Це характерно для:

*** А) Генералізованої мікседеми**

В) Склеродермії

73. Характерні для сифілітичної розеоли патогістологічні зміни:

*** А) Розширення кровоносних судин**

*** В) Набрякання і проліферація ендотелію судин**

*** С) Клітинний інфільтрат навколо судин із великою кількістю плазматичних клітин**

Д) Звуження кровоносних судин

74. Патогістологічні зміни шкіри в сифілітичних папулах:

- * А) Набряк**
- * В) Папіломатоз**
- * С) Панваскуліт,**
D) Відсутність блідих трепонем
- * Е) Навколосудинний плазмоцитарний інфільтрат**

75. Яким епітелієм вистелена уретра жінки:

- * А) Циліндричним**
- В) Багатошаровим плоским