

ЗАВАНТАЖЕНО З САЙТУ ТЕСТУВАННЯ.УКР

Невідкладні стани.

Категорія: **Дерматовенерологія**

Кількість запитань: **13**

1. Які судинні колагенози можуть викликати невідкладні стани:

- * А) Гострий шкірний та бульозний системний червоний вовчак**
- * В) Дерматоміозит**
- * С) Лейкокластичний васкуліт**
- * D) Юнацький ревматоїдний артрит**
- Е) Дискоїдний червоний вовчак

2. Назвіть клінічні ознаки синдрому Стівенса -Джонсона:

- * А) Максимум проявів на 7-15 добу**
- * В) Незначна болючість**
- * С) Значне ураження слизових**
- * D) Папульозні еритематозні ураження**
- Е) Дифузна еритема

3. Назвіть клінічні ознаки синдрому токсичного епідермального некролізу:

- * А) Максимум проявів на 1-3 добу**
- * В) Значна болючість**
- * С) Помірне ураження слизових**
- * D) Дифузна еритема та десквамація**
- Е) Уртикарні ураження

4. Для синдрому Лайєла характерно:

- * А) Підвищення температури тіла, загальний важкий стан**
- * В) Висипи на шкірі у вигляді еритеми, пухирів, петехій і великих пухирів, великі ерозії**
- * С) Легеневі і ниркові порушення**
- D) Серцевосудинні порушення

5. Для синдрому Стівенса-Джонсона характерно:

- А) Поява великої кількості еритематозних плям в ділянці тулубу
- * В) Поява на шкірі обличчя безлічі різноманітних елементів висипки, подібних із поліморфною ексудативною еритемою
- * С) Поява на шкірі обличчя, кистях і стопах еритематозних плям, папул із геморагічним компонентом, ураження кон'юнктиви, і слизових порожнини рота, носа, геніталій, підйом температури тіла

6. У дівчинки рясні гнійні виділення з піхви. Назвіть основні причини:

- * А) гонорея
- * В) трихомоніаз
- * С) кандидоз
- * D) стороннє тіло
- * Е) хламідіоз
- Ф) сифіліс

7. У молодой жінки численні виразки на статевих органах, підвищена температура тіла до 38 град.С. Що необхідно зробити для постановки діагнозу:

- * А) Виключити гонорею
- * В) Виключити трихомоніаз
- * С) Виключити сифіліс
- * D) Виключити гострі виразки вульви
- Е) Гарднерельоз

8. 100% госпіталізація хворих на гонорею необхідна:

- * А) Для дітей будь-якого віку
- В) Жінкам без джерела зараження
- * С) Жінкам, що ведуть аморальний спосіб життя і без місця проживання

9. Особиста профілактика жінок після випадкового статевго зв'язку:

*** А) Помочитися і вимити руки з милом, зовнішні геніталії старанно вимити водою з милом**

В) Старанно висушити рушником зовнішні геніталії і нічим не обробляти, спринцювання піхви не робити

10. У хворої рясні гнійні виділення. Які дослідження слід зробити:

*** А) Мазки на гонокок та дослідження на мікоплазмоз**

В) Бак. посів на гонокок

11. У хворої численні виразки статевих органів і гнійні виділення з уретри.

З'явилися на третій день після випадкового статевго зв'язку. Які дослідження слід зробити:

*** А) Мазки на трихомоніаз, гонокок**

*** В) Мазки на м'який шанкр**

С) Зішкрябок на хламідії

12. У хворої численні ерозії в ділянці статевих органів із рясними гній.вид., зб. пахвинні лімфовузли, спаяні між собою з різкою болючістю. З'яв. ерозії ч/з 10 днів після випадкового статев. зв'язку. Які дослідження слід зробити:

А) Кров на РВ

*** В) Дослідження на збудника сифілісу**

*** С) Дослідження на м'який шанкр**

*** D) Мазки на трихомоніаз, гонокок**

13. У хворої на великих статевих губах пухлиноподібні розростання у вигляді цвітної капусти. Які дослідження необхідно зробити:

*** А) Кров на РВ**

*** В) Дослідження на збудника сифілісу**

*** С) Мазки на гонорею**

D) Зішкрябок на хламідії