

ЗАВАНТАЖЕНО З САЙТУ ТЕСТУВАННЯ.УКР

Принципи діагностики алергічних захворювань

Категорія: **Алергологія**

Кількість запитань: **59**

1. При оцінці скарифікаційних проб із побутовими, епідермальними і пилковими алергенами враховується:

*** А) Розмір пухиря**

В) Тільки розмір псевдоподій

С) Тільки розмір еритеми

2. При оцінці скарифікаційних проб із побутовими, епідермальними і пилковими алергенами реакція:

*** А) Негативна, (-) при діаметрі пухиря до 2 мм**

В) Негативна при діаметрі пухиря 20-25 мм

С) Пухир не є критерієм оцінки

3. При оцінці скарифікаційних проб із побутовими, епідермальними і пилковими алергенами реакція:

*** А) Слабопозитивна, (+) пухир 3-6 мм**

В) Слабопозитивна, (+) пухир 20 мм

С) Пухир не є критерієм оцінки

4. При оцінці скарифікаційних проб із побутовими, епідермальними і пилковими алергенами реакція:

*** А) Позитивна, (++), пухир 6-11 мм**

В) Позитивна, (++), пухир 20 мм

С) Пухир не є критерієм оцінки

5. При оцінці скарифікаційних проб із побутовими, епідермальними і пилковими алергенами реакція:

*** А) Різко позитивна, (+++), при наявності пухиря діаметром 11-15 мм**

В) Пухир не є критерієм оцінки

6. Елімінаційні тести необхідно враховувати максимум через:

- A) 20 хвилин
- B) 4-6 годин
- C) 12-24 години
- * D) 24-48 годин**
- * E) 2-3 тижні**

7. Лабораторні методи специфічної алергологічної діагностики:

- A) Небезпечні для пацієнта
- * B) Безпечні для пацієнта**
- C) До пацієнта не мають ніякого відношення

8. Лабораторні методи несуть інформацію:

- * A) Про наявність або відсутність сенсibilізації**
- B) Про те, якої сили алергічна реакція розвинеться на даний алерген

9. При проведенні лабораторного обстеження необхідно:

- A) Застосовувати один універсальний метод
- * B) Застосовувати декілька методів**
- C) Звернутися до екстрасенса

10. По техніці виконання шкіряні проби діляться на:

- * A) Скарифікаційні**
- * B) Аплікаційні**
- * C) Внутрішньошкіряні**
- * D) Прік-тест**
- E) Провокаційні

11. Провокаційні тести це:

- A) Спосіб патохімічної діагностики
- B) Спосіб патофізіологічної діагностики
- * C) Спосіб етіологічної діагностики**

12. Провокаційні тести діляться за:

- * A) Способом нанесення алергену**
- * B) Місцем нанесення алергену**
- C) Кількістю нанесеного алергену
- D) Часу нанесення алергену

13. Виділяють такі види провокаційних тестів

- * A) Під'язичні**
- * B) Кон'юнктивальні**
- * C) Назальні**
- * D) Інгаляційні**
- E) Уретральні

14. Провокаційні тести можуть бути:

- * A) Холодові**
- * B) Теплові**
- * C) Проби з навантаженням**
- * D) Механічного подразнення**
- * E) Експозиційні**
- F) Гепатотоксичні

15. Елімінаційні тести - це:

- A) Засіб патогенетичної діагностики
- * B) Засіб етіологічної діагностики**
- C) Засіб біохімічної діагностики
- D) Засіб патохімічної діагностики

16. Які основні розділи включає в себе діагностика алергічних захворювань?

- * A) Семіотика і методи діагностичного обстеження хворого**
- * B) Методологічні основи діагностики**
- * C) Методи діагностичного обстеження**
- D) Тільки методи специфічної діагностики

17. Зазначте методи клінічного обстеження хворих алергічними захворюваннями?

- * A) Збір анамнезу**
- * B) Збір анамнезу, пальпація й аускультация**
- C) Дослідження сітківки ока
- * D) Огляд, перкусія й аускультация**
- * E) Аналіз сечі, харкотиння**

18. Які основні задачі діагностики алергічних захворювань?

- A) Лікування супутніх захворювань
- * B) Встановлення етіології захворювань**
- * C) Встановлення патогенезу захворювань**
- * D) Диференціальна діагностика з псевдоалергічними захворюваннями**

19. Які дані містить у собі алергологічний анамнез?

- А) Огляд хворого, перкуторне дослідження, аускультация
- * В) З'ясування скарг, типових для алергічних захворювань**
- * С) З'ясування спадкової схильності до алергічних захворювань**
- * D) Дані про реакцію хворого на медикаменти, сироватки і вакцини**

20. Ефективність яких методів терапії з'ясовують при зборі алергологічного анамнезу?

- * А) Гіпосенсибілізації**
- * В) Антибактеріальної терапії**
- * С) Імуномодуючої терапії**
- * D) Глюкокортикоїдної терапії**
- Е) Ефективність лікувальної фізкультури

21. Яким чином вводиться алерген при постановці аплікаційних алергічних проб?

- * А) На шкіру**
- В) Підшкірно
- С) Внутрішньошкірно
- Д) Внутрішньом'язово
- Е) Парентерально

22. Зазначте, яким чином виконуються пасивні шкіряні алергологічні проби?

- * А) Сироватка хворого вводиться здоровій людині, потім ставлять шкіряні проби з алергеном**
- В) Сироватка здорового вводиться хворому, потім ставлять шкіряні проби з алергеном
- С) Ставлять шкіряну пробу з алергеном без попереднього введення сироватки

23. У якій фазі захворювання можна проводити алергологічні шкіряні проби?

- A) Значного загострення
- B) Нестійкої ремісії
- * C) Стійкої ремісії**
- D) Згасаючого загострення
- E) В жодній із фаз перебігу захворювання

24. За який час до проведення шкіряних алергологічних проб необхідно скасувати антигістамінні препарати?

- A) За 2 години
- B) За 6 годин
- C) За 12 годин
- * D) За 24 години**

25. При яких алергічних захворюваннях частіше використовують аплікаційні шкіряні проби?

- A) Антигеннезалежній бронхіальній астмі
- * B) Алергічному контактному дерматиті**
- C) Полінозі
- D) Харчовій алергії

26. Через який час оцінюються результати аплікаційних шкіряних проб?

- A) Через 20 хвилин
- B) Через 5-6 годин
- * C) Через 2 доби**
- * D) Через 72-96 годин**

27. Зазначте, який клас антитіл можна виявити при проведенні реакції Праустніца-Кюстнера?

- A) Імуноглобулін класу А
- * В) Імуноглобулін класу Е**
- * С) Імуноглобулін класу G4**
- D) Імуноглобулін класу М
- E) Імуноглобулін класу D

28. Для діагностики яких алергічних захворювань застосовують реакцію Праустніца-Кюстнера?

- * А) Реагінового типу**
- B) Уповільненого типу
- C) Захворювання обох типів
- D) Ні для якого захворювання

29. Зазначте час, через який враховуються скарифікаційні шкіряні проби при полінозі?

- * А) Через 15-20 хвилин**
- B) Через 12 годин
- C) Через 24 години
- D) Через 48 годин

30. Зазначте, який тип алергічної реакції можна виявити при проведенні скарифікаційних шкіряних проб при полінозі?

- A) Клітинний
- B) Імунокомплексний
- C) Цитотоксичний
- * D) Реагіновий**

31. Зазначте, для визначення сенсibilізації до яких алергенів можна проводити внутрішньошкіряні проби?

- * А) Побутових**
- В) Промислових
- * С) Бактеріальних**
- * D) Харчових**
- * Е) Пилкових**

32. Зазначте основну ознаку, по якій оцінюють внутрішньошкіряні проби з бактеріальними алергенами?

- А) Розмір пухиря
- * В) Розмір папули**
- С) Наявність гіперемії
- D) Наявність інфільтрату
- Е) Біль у місці ін'єкції

33. З якими алергенами проводяться кон'юнктивальні провокаційні алергічні тести?

- * А) З алергенами, що викликають гіперчутливість негайного типу**
- В) З алергенами, що викликають гіперчутливість уповільненого типу
- С) З тими й іншими алергенами
- D) З жодним із перерахованих алергенів

34. З якими алергенами проводять назальні провокаційні алергічні проби?

- А) Бактеріальними
- В) Грибковими
- * С) Пилковими**
- D) Харчовими

35. Які проби використовуються для визначення гіперчутливості до фізичних чинників?

*** А) Теплові і холодові аплікаційні**

- В) Підшкірні
- С) Внутрішньошкіряні
- Д) Інгаляційні

36. У якому періоді захворювання проводяться елімінаційні алергічні проби?

*** А) У фазі загострення**

- В) У фазі ремісії
- С) В обох фазах
- Д) В жодній із перерахованих фаз

37. Зазначте частоту виявлення при диференціальній діагностиці atopічних захворювань псевдопозитивної алергічної реакції:

А) Часто

*** В) Рідко**

С) Не зустрічається

38. Яка кількість алергену викликає псевдоалергічну реакцію?

А) Мінімальна

*** В) Відносно велика**

С) І те й інше

39. Чи існує залежність між дозою алергену і виразністю псевдопозитивної алергічної реакції?

*** А) Так**

В) Ні

40. Вміст загального імуноглобуліну Е в сироватці крові при псевдопозитивних алергічних реакціях:

А) Підвищений

В) Знижений

*** С) У межах норми**

41. Зазначте, чи виявляється специфічний імуноглобулін Е при псевдопозитивних реакціях:

А) Так

*** В) Ні**

42. Яка вираженість реакції Праустніца-Кюстнера при псевдопозитивних реакціях?

*** А) Негативна**

В) Позитивна

43. Яким методом можна визначити антитіла, що відносяться до імуноглобуліну Е?

*** А) РАСТ (радіоалергосорбентний тест)**

В) РБТЛ

С) Е-РУК

Д) ЕАС-РУК

Е) НСТ-тест

44. Який метод застосовується для виявлення сенсibilізованих клітин при алергічній діагностиці "in vitro"?

*** А) РБТЛ**

В) РАСТ

С) Е-РУК

Д) ЕАС-РУК

Е) НСТ-тест

45. Задачами специфічної алергологічної діагностики є:

- * А) Встановлення природи захворювання**
- * В) Виявлення причини захворювання**
- * С) Виявлення патогенезу захворювання**
- D) Прогнозування алергічних ускладнень

46. Основними етапами специфічної алергологічної діагностики є:

- * А) Алергологічний анамнез**
- * В) Специфічна алергологічна діагностика in vivo (шкірні провокаційні проби)**
- * С) Інгаляційні провокаційні тести**
- * D) Лабораторні тести**
- * Е) Елімінаційні тести**
- F) Фіброгастродуоденоскопія
- G) Ультразвукове дослідження органів черевної порожнини

47. Специфічна алергологічна діагностика складається з:

- A) Дослідження коагулограми
- * В) Алергологічного анамнезу**
- * С) Специфічної алергологічної діагностики in vivo (шкірні провокаційні проби)**
- * D) Інгаляційних провокаційних тестів**
- * Е) Елімінаційних тестів**

48. Метою алергологічного анамнезу є:

- * А) Встановити спадкову схильність**
- * В) Виявити зв'язок між навколишнім середовищем і розвитком захворювання**
- * С) Визначити групи алергенів, що можуть обумовити захворювання**
- D) Виявити здатність алергічних захворювань передаватися оточуючим

49. Шкіряні проби при специфічній алергологічній діагностиці можуть бути:

- * А) Якісні**
- * В) Кількісні**
- * С) Прямі**
- * D) Пасивні**
- Е) Провокаційні

50. Якісна проба дозволяє відповісти на запитання:

- * А) Є сенсibilізація**
- * В) Немає сенсibilізації**
- С) Ступінь сенсibilізації
- * D) Чим сенсibilізована людина**

51. Кількісна алергічна проба дозволяє відповісти на запитання:

- * А) У якій мірі виражена сенсibilізація**
- В) Які генетичні порушення в людини
- С) У якій мірі порушена функція ампліфієрів

52. При прямих шкіряних алергічних пробах:

- А) Алерген не вводять хворому
- В) Попередньо вводять сироватку здоровій людині
- С) Алерген вводять здоровій людині після введення досліджуваної сироватки
- * D) Алерген вводять хворому**

53. При пасивних шкіряних алергічних пробах:

- А) Алерген не вводять хворому
- * В) Попередньо вводять сироватку крові здоровій людині**
- * С) Алерген вводять здоровій людині після введення досліджуваної сироватки крові**
- Д) Алерген вводять хворому

54. Для проведення специфічної алергологічної діагностики використовуються:

A) Толерогени

B) Алергоїди

*** C) Алергени**

55. Алергени - це тільки:

A) Жири

B) Вуглеводи

*** C) Білки**

D) Метали

*** E) Різноманітні речовини, спроможні сенсibilізувати організм**

56. Час прояву шкіряних реакцій при специфічній алергологічній діагностиці залежить від:

*** A) Типу алергічних реакцій**

*** B) Кількості алергену**

*** C) Місця введення алергену**

*** D) Засобу введення алергену**

E) Статті пацієнта

57. При реагіновому типі алергічні реакції виявляються через:

A) 48 годин

B) 12годин

*** C) 10-30 хвилин**

D) 2 доби

58. При імунокомплексному типі алергічні реакції виявляються через:

- A) 2 доби
- B) 48 годин
- C) 20 хвилин
- D) 1-2 хвилини

*** E) 4-6 годин**

59. При клітинному типі алергічні реакції виявляються через:

*** A) 2 доби**

*** B) 24-72 години**

- C) 5-8 доби
- D) 1-2 хвилини
- E) 4-6 годин