

ЗАВАНТАЖЕНО З САЙТУ ТЕСТУВАННЯ.УКР

Принципи лікування алергічних захворювань

Категорія: **Алергологія**

Кількість запитань: **29**

1. Лікування хворих з алергічними захворюваннями повинно бути:

- * А) Етіотропним**
- * В) Патогенетичним**
- * С) Симптоматичним**
- * D) Комплексним**
- * Е) Поетапним**
- * F) Індивідуалізованим**
- G) Економічно обгрунтованим
- H) Поліпрагматичним

2. Спектр лікувальних і профілактичних заходів при алергічних захворюваннях повинен формуватися з урахуванням:

- * А) Періоду захворювання (гострий період і період ремісії)**
- * В) Вираженості клінічних проявів захворювання**
- * С) Наявності ускладнень**
- D) Матеріально - побутових умов
- E) Без урахування перерахованих чинників

3. Відзначте класичний для алергології засіб терапії і профілактики:

- * А) Антигістамінна терапія**
- * В) Специфічна імунотерапія**
- C) Пасивна імунотерапія
- * D) Неспецифічна імунотерапія**

4. Етіотропна терапія алергічних захворювань передбачає:

- * А) Попередження контакту з алергеном**
- * В) Припинення контакту з алергеном**
- * С) Елімінацію алергену**
- D) Лікування супутніх захворювань

5. Патогенетична терапія алергічних захворювань передбачає:

- * **A) Лікувальні заходи в імунологічній стадії розвитку захворювання**
- * **B) Лікувальні заходи в патохімічній стадії розвитку захворювання**
- * **C) Лікувальні заходи в патофізіологічній стадії розвитку захворювання**
- D) Не передбачає лікувальних заходів на зазначених стадіях розвитку алергічних захворювань

6. Особливе значення при проведенні патогенетичної терапії в імунологічній стадії розвитку алергічного захворювання має:

- * **A) Активна неспецифічна імунотерапія**
- * **B) Пасивна неспецифічна імунотерапія**
- * **C) Активна специфічна імунотерапія**
- * **D) Пасивна специфічна імунотерапія**
- E) Призначення деконгестантів

7. Імунотерапія алергічних захворювань може бути:

- * **A) Системною**
- * **B) Регіонарною**
- * **C) Стимулюючою**
- * **D) Імунодепресивною**
- E) Імунотерапія при алергічних захворюваннях не застосовується
- * **F) Немедикаментозною**

8. Специфічна гіпосенсибілізація вперше була запропонована:

- * **A) NOON**
- B) Freeman
- C) Feinberg
- D) Sheppegrell
- E) Blamoutier

9. Специфічна гіпосенсибілізація містить у собі варіанти:

- * А) Класичний, передсезонний (Noon,1911)**
- * В) Круглорічний, безупинний (Feinberg,1946)**
- * С) Прискорений (Sheppegrell,1964)**
- * D) Сезонний, "шкіряних квадратів "(Blamoutier,1959)**
- * Е) Блискавичний (Freeman,1930)**
- * F) SСOСK-метод (Bray,1958)**

G) Зазначені варіанти не мають відношення до специфічної гіпосенсибілізації

10. Найбільш ефективними засобами специфічного лікування алергічних захворювань є:

- * А) Специфічна гіпосенсибілізація**
 - В) Неспецифічна імунотерапія
- * С) Глюкокортикостероїдна терапія**
 - D) Застосування антигістамінних препаратів
- * Е) Елімінація алергену**

11. Механізм гіпосенсибілізації обумовлений /згідно основних гіпотез/:

- * А) Інгібіцією продукції Ig E - антитіл**
- * В) Активацією утворення антиідиотипічних антитіл**
- * С) Активацією синтезу гомоцитотропних блокуючих антитіл**
 - D) Підвищенням синтезу лейкотриєнів

12. Найбільш ефективна специфічна гіпосенсибілізація при лікуванні:

- * А) Пилковими алергенами**
- * В) Побутовими алергенами**
- * С) Епідермальними алергенами**
 - D) Бактеріальними алергенами
- * Е) Харчовими алергенами**

13. Існуючі схеми специфічної гіпосенсибілізації суворо забороняють застосування інших методів лікування алергічних захворювань:

A) Так

*** B) Ні**

14. Специфічна гіпосенсибілізація показана в тих випадках:

*** A) Коли доведена алергічна природа захворювання**

*** B) Коли виявлений "винний" алерген**

*** C) Коли відсутні протипоказання до специфічній гіпосенсибілізації**

D) У гострому періоді захворювання

15. Специфічна гіпосенсибілізація протипоказана при:

*** A) Вагітності**

*** B) Загостренні вогнищевих інфекцій**

*** C) Загостренні ревматизму**

*** D) Важких захворюваннях нервової та ендокринної систем**

*** E) Тривалому попередньому застосуванні глюкокортикоїдів**

F) Протипоказань для специфічної гіпосенсибілізації немає

16. При полівалентній алергізації специфічну гіпосенсибілізацію проводять:

A) Сумішшю усіх видів алергенів

*** B) Сумішшю "винних" видів алергенів**

*** C) Окремо кожним алергеном**

17. При полівалентній алергії до пилових алергенів, що включає амброзію і полин, гіпосенсибілізацію проводять:

A) Сумішшю всіх алергенів

*** B) Пилком амброзії окремо від інших алергенів**

C) Сумішшю обох алергенів

18. При проведенні класичної специфічної гіпосенсибілізації алергени вводять:

- A) Внутрішньовенно
- B) Внутрішньом'язово
- C) Усередину суглобів

*** D) Підшкірно**

- E) Per rectum

19. Розроблені засоби гіпосенсибілізації шляхом введення алергену:

*** A) Аплікаційно на мигдалики**

*** B) Інгаляційно в дихальні шляхи**

- C) Аплікаційно на підгрудинну залозу
- D) Внутрішньоартеріально

*** E) Аплікаційно, інгаляційно, per os**

20. Специфічну гіпосенсибілізацію починають проводити використовуючи:

- A) Суцільний алерген

*** B) Розведення алергену 1:1000 000 000**

- C) Розведення алергену 1:10

*** D) Розведення, визначеного алергометричним титруванням**

21. Алергометричне титрування проводять для:

*** A) Визначення мінімальної концентрації алергену, що викликає алергічну реакцію in vivo**

- B) Визначення місця введення алергену
- C) Визначення засобу введення алергену

22. Специфічну гіпосенсибілізацію можна проводити:

- A) У будь-якому помешканні
- B) У будь-якому маніпуляційному кабінеті

*** C) У спеціально обладнаному кабінеті**

23. Специфічну гіпосенсибілізацію можуть проводити:

- A) Будь-яка людина
- B) Будь-який медичний працівник
- C) Лікар
- * D) Лікар-алерголог**
- * E) Спеціально підготовлена медсестра**

24. Для проведення специфічної гіпосенсибілізації використовуються:

- * A) Толерогени**
- * B) Алергоїди**
- C) Індиферентні речовини
- D) Імуномодулятори
- * E) Різноманітні модифікації алергенів**

25. Час прояву шкіряних реакцій при специфічній гіпосенсибілізації залежить від:

- * A) Типу алергічної реакції, що переважає у пацієнта**
- * B) Кількості алергену**
- * C) Місця введення алергену**
- * D) Засобу введення алергену**
- E) Психоемоціональної поведінки пацієнта

26. При реагіновому типі алергічні реакції виявляються через:

- A) 48 годин
- * B) 12 годин**
- * C) 5-30 хвилин**
- D) 2 доби

27. При імунотоксичному типі алергічної реакції виявляються через:

- A) 2 доби
- B) 48 годин
- C) 20 хвилин
- D) 1 - 2 хвилини

*** E) 4 - 6 годин**

28. При клітинному типі алергічної реакції виявляються через:

- A) 12 діб
- * B) 24 - 72 години**
- C) 1 - 2 хвилини
- D) 4 - 6 годин

29. Елімінаційна терапія це:

- * A) Засіб патогенетичної терапії**
- * B) Засіб етіотропної терапії**
- C) Засіб біохімічної терапії
- D) Засіб патохімічної терапії