

ЗАВАНТАЖЕНО З САЙТУ ТЕСТУВАННЯ.УКР

# Неврологія та нейрохірургія.

---

Категорія: **Невідкладна допомога**

Кількість запитань: **260**

**1. На догоспітальному етапі у хворих з тяжкою черепно-мозковою травмою проводяться основні заходи:**

**\* А) Корекція дихання та серцевої діяльності**

В) Введення морфіну

С) Введення дібазолу

**2. Ознаками ураження пірамідних шляхів в гострому періоді являється:**

А) Гіперрефлексія

В) Відсутність патологічних рефлексів

**\* С) Наявність патологічних рефлексів**

Д) Підвищення м'язового тону

**3. Псевдобульбарний параліч виникає при:**

**\* А) Двосторонньому частковому або повному ураженні кортико-бульбарного шляху**

В) Ураженні корінців і ядер каудальної групи черепних нервів

С) Односторонньому ураженні кортико-бульбарного шляху

Д) Ураженні кінського хвоста

Е) Ніщо з перерахованого

**4. Найбільш характерні ознаки підгострої травматичної внутрішньочерепної гематоми:**

**\* А) Світлий проміжок**

В) Пошкодження окорухового і блокувидного нервів

С) Перелом кісток черепа

Д) Свідомість ясна

**5. Транспортувати хворих з черепно-мозковою травмою (струс головного мозку) доцільно:**

**\* А) У лежачому положенні**

В) З опущеним головним кінцем

С) На щиті

**6. Про які захворювання можна думати, якщо судомний припадок виник на фоні втраченої свідомості?**

А) Пухлини головного мозку

**\* В) Закрита черепно-мозкова травма**

С) Пневмонія

**7. Про які захворювання можна думати, якщо судомний припадок виник вдень, протікає без втрати свідомості?**

**\* А) Пухлина головного мозку**

В) Алкоголізм

С) Епілесія

**8. До генералізованих епілептичних припадків відносяться всі нижче означені, крім:**

А) Тоніко-клонічних

В) Тонічних

**\* С) Джексоновських**

Д) Абсансів

**9. До фокальних епілептичних випадків відносяться всі нижче перераховані, крім:**

- A) Джексонівські чутливі
- B) Джексонівські рухові
- C) Вторинно-генералізовані судомні з аурою
- D) Кожевніковська епілепсія

**\* E) Абсанси**

**10. Різновидностями епілептичного статусу є нижче означені, крім:**

- A) Епілептичний статус складних парціальних випадків при скроневій епілепсії
- B) Епілептичний статус джексоновських випадків

**\* C) Кожевніковська епілепсія**

- D) Епілептичний статус генералізованих випадків

**11. Які симптоми не відносяться до ознак емболії судин головного мозку у хворого з вадою серця:**

- A) Миттєвий початок інсульту
- B) Короткочасне порушення свідомості
- C) Порушення серцевого ритму

**\* D) Наявність крові в лікворі**

**12. Які симптоми не відносяться до поліневриту:**

- A) Периферичний парез м'язів кінцівок
- B) Розлади чутливості по поліневритичному типу

**\* C) Геміпарез з гемігіпестезією**

- D) Вазомоторні розлади

**13. Які симптоми не відносяться до гіпертензивного синдрому:**

A) Головний біль

B) Блювота

**\* C) Атетоз**

D) Головокружіння

**14. Кількість балів по шкалі ком Глазго, які свідчать про повну свідомість:**

A) 3

B) 7

C) 10

**\* D) 15**

**15. Кількість балів по шкалі ком Глазго, які свідчать про коматозний стан:**

A) 3

**\* B) 7**

C) 15

D) 20

**16. Кількість балів по шкалі ком Глазго, які свідчать про смерть мозку:**

**\* A) 3**

B) 7

C) 10

D) 15

**17. Для мігрені не характерні слідуючі симптоми:**

A) Одностороння локалізація цефалгії

B) Пароксизмальний перебіг

**\* C) Порушення сечовиділення**

D) Блювання, світобоязнь

**18. Невідкладна допомога при міастенічному кризі:**

A) Введення седуксена

**\* B) Введення прозеріна**

C) Введення дібазолу

**19. При невідкладній допомозі при синдромі Мен"єра не застосовується :**

A) Дімедрол

B) Бетасерк

C) Атропін

**\* D) Допмін**

**20. Які види артеріальної гіпертензії не відносяться до симптоматичних ?**

A) Ниркові

B) Ендокринні

**\* C) Есенціальна гіпертензія**

D) Гемодинамічні

**21. Які стани не відносяться до ускладнених гіпертензивних кризів ?**

A) Інфаркт міокарда

B) Інсульт

C) Гостра недостатність лівого шлуночка

**\* D) Мігрень**

**22. Які стани не відносяться до ускладнених гіпертензивних кризів ?**

A) Інфаркт міокарда

B) Нестабільна стенокардія

C) Аритмія

**\* D) Ваго-інсулярний криз**

**23. Які симптоми не відносяться до неускладнених гіпертензивних кризів?:**

А) Церебральний або кардіальний неускладнений криз

**\* В) Еклампсія**

С) Підвищення систолічного артеріального тиску до 240 мм.рт.ст. або діастолічного до 140 мм.рт.ст

**24. Який препарат надається для парентерального лікування ускладнених гіпертензивних кризів ?**

А) контрикал

В) Піроксан в/м

**\* С) Лакардія в/в крапельно**

**25. Який препарат надається для парентерального лікування неускладнених гіпертензивних кризів ?**

А) Нітропрусид натрію в/в крапельно

**\* В) Клонідін в/м**

С) Пропранолол в/в крапельно

**26. Який симптом не є характерним для симпато-адреналового кризу?**

А) Дифузний головний біль

В) Серцебиття

С) Різка слабкість

**\* D) Кашель**

**27. Який симптом не є характерним для симпато-адреналового кризу ?**

А) Артеріальна гіпертензія

В) Симетричний мідріаз

**\* С) Підсилення перистальтики кишок**

D) Тахікардія

**28. Який симптом не є характерним для вагоінсулярного кризу ?**

- A) Головокружіння
- B) Позиви до дефекації

**\* C) Артеріальна гіпертензія**

- D) Брадикардія

**29. Який симптом не є характерним для невралгії трійчастого нерва ?**

- A) Біль в зоні інервації однієї з гілок та наявність „куркових” зон

**\* B) Асиметрія обличчя**

- C) Вегетативні симптоми

**30. Які симптоми не відносяться до ураження корінців спинного мозку?**

- A) Ласега
- B) Васермана

**\* C) Керніга**

- D) Сколіоз

**31. Які побічні ефекти клонідину?**

- A) Головний біль
- B) Тахікардія

**\* C) Сонливість, сухість в роті**

- D) Почервоніння обличчя

**32. Якій групі хворих не показаний клонідін при гіпертензивних кризах?**

**\* A) З А-V блокадою, брадикардією**

- B) З гіперкатехоламінемією

**33. Які побічні ефекти ніфедипіну?**

- A) Бронхоконстрикція
- \* В) Головний біль, почервоніння обличчя, набряки**
- C) Сонливість
- D) Сухість в роті

**34. Порушення свідомості - це:**

- A) Збудження
- \* В) Приглушення, сопор, кома**
- C) Амнезія

**35. Продуктивні форми порушення свідомості - це:**

- \* А) Онейроїд, делірій, аменція**
- B) Сопор
- C) Кома

**36. Продуктивні форми порушення свідомості :**

- A) Приглушення
- \* В) Делірій**
- C) Сопор
- D) Кома

**37. Вкажіть, в якій ділянці кори представлена проекція рухів ноги:**

- \* А) У верхніх відділах перецентральної звивини**
- B) У задніх відділах верхньої скроневої звивини
- C) У верхніх відділах зацентральної звивини

**38. Тривалість ліжкового режиму при струсі головного мозку:**

**\* А) До 7 днів**

В) До 2-3 тижнів

С) До 4-6 тижнів

**39. Спинний мозок безпосередньо вкритий:**

А) М'якою мозковою оболонкою

**\* В) Павутинною мозковою оболонкою**

С) Твердою мозковою оболонкою

Д) Ніщо з перерахованого

**40. Після травми 5 - денної давності на протязі декількох годин або днів поволі нарастають загально мозкові та локальні симптоми. Ваше заключення:**

А) Струс мозку

В) Забій головного мозку

С) Субарахноїдальний крововилив

**\* Д) Внутрішньочерепний крововилив**

**41. Пошкодження слухового, лицьового, окорухових нервів, лікворея з вух і носу при черепно-мозковій травмі вказують на:**

А) Струс головного мозку

**\* В) Перелом основи черепа, забій головного мозку**

С) Перелом склепіння черепа

**42. До ознак бульбарного паралічу відносяться:**

**\* А) Дисфалгія, дисфонія, дизартрія, порушення дихання**

В) Патологічні рефлекс

С) Субкортикальні рефлекс

**43. Тип порушення сечовиділення при пошкодженні S3-S5:**

А) Затримка сечі (в гострому періоді)

**\* В) Справжнє нетримання сечі**

**44. Для невралгії трійчастого нерва характерно:**

А) Відсутність куркових зон

**\* В) Больові пароксизми**

С) Параліч обличчя на ураженій стороні

Д) Вегетативний супровід приступу

**45. Вкажіть, на якому рівні робить перехрест основний пірамідний шлях:**

А) На рівні середнього мозку

В) В мосту

**\* С) На межі довгастого і спинного мозку**

**46. Порушення сечовиділення при гострій компресії спинного мозку:**

**\* А) Гостра затримка сечовиділення**

В) Олігурія

С) Імперативні позиви

**47. Відмітьте, при якому менінгіті з нижче наведених спостерігається різке зниження цукру в лікворі:**

А) Герпетичний

В) Пневмококовий

**\* С) Туберкульозний**

**48. У хворого в ранкові години відзначається головний біль розпираючого характеру, що при підсиленні супроводжується нудотою і блюванням, "затуманюванням" зору. Генез головного болю в даному випадку:**

А) Внутрішньочерепна гіпотензія

**\* В) Внутрішньочерепна гіпертензія**

С) Вклинення стовбуру

**49. Симптоми поперечного пошкодження спинного мозку на рівні Д7 - Д8:**

А) Порушення рухів у верхніх кінцівках

**\* В) Порушення рухів у нижніх кінцівках**

**50. У хворого забій головного мозку середнього ступеня важкості, закритий перелом кісток правого стегна і гомілки. Ваш діагноз?**

**\* А) Поєднана краніо - скелетна травма**

В) Множинна краніо - скелетна травма

С) Комбінована краніо - скелетна травма

**51. До ознак центрального паралічу мімічних м'язів відносяться:**

А) Прозоплегія

**\* В) Парез нижнього відділу лицьової мускулатури**

С) Підвищення надбрівного рефлексу

Д) Відсутність реакції переродження

**52. У хворого перелом основи черепа з ліквореєю з вуха. Ваш діагноз?**

А) Струс головного мозку

В) Відкрита непроникаюча ЧМТ

**\* С) Відкрита проникаюча ЧМТ, забій головного мозку**

**53. До ознак ураження відвідного нерва відноситься:**

**\* А) Збіжна косоокість**

В) Птоз

С) Міоз

**54. У хворого забій головного мозку середнього ступеню важкості, перелом кісток тазу, перелом правої стегнової кістки. Лікувальна тактика :**

А) Симптоматична терапія

В) Протишокова терапія

**\* С) Імобілізація, протишокова терапія, профілактика набряку мозку**

**55. Симптомами ураження мозочка є:**

А) Центральний парез кінцівок

**\* В) Інтенційний тремор в кінцівках, скандована мова, дізартрія**

С) Порушення сечовиділення

Д) Блювота

**56. Який препарат є препаратом вибору при епілептичному статусі?**

**\* А) Седуксен**

В) Морфін

С) Аміназин

**57. Які джерела кровопостачання головного мозку?**

А) Хребтові артерії

В) Підключична артерія

**\* С) Вілізіве коло**

**58. Мовне порушення, при якому хворий "не вміє" говорити:**

A) Сенсорна афазія

**\* В) Моторная афазія**

C) Амнестична афазія

**59. У хворого вдавлений перелом тім'яної кістки праворуч, забійна рана лобної області. Діагноз :**

A) Відкрита проникаюча ЧМТ

B) Закрита ЧМТ

**\* C) Закрита ЧМТ, забій головного мозку із стисненням**

D) Забій головного мозку

**60. У хворого вдавлений перелом тім'яної кістки, перелом ребер і клапанний пневмоторакс. Лікувальна тактика:**

A) Дегідратаційна терапія

B) Седативна терапія

C) Застосування серцево - судинних препаратів

D) ШВЛ з інтубацією

**\* E) Герметична пов'язка на грудну клітку, симптоматична терапія**

**61. Хворий не розуміє зверненої до нього мови, не впізнає свого дефекту, при розмові змінює літери у словах, слова у реченнях, не може читати. Яке порушення мови?**

**\* A) Сенсорная афазія**

B) Амнестична афазія

C) Моторна афазія

**62. Пароксизмальним вегетативним порушенням властиво:**

**\* А) Короткочасність вегетативних симптомів**

В) Стереотипність

С) Розширення або звуження зіниць

Д) Частий пульс

**63. Для ваго-інсулярних пароксизмів характерно:**

А) Тахікардія, підвищення артеріального тиску, мідріаз

**\* В) Брадикардія, зниження артеріального тиску, міоз**

**64. Найчастіші клінічні прояви мігрені:**

А) Приступоподібний однобічний головний біль, наявність симптомів органічного ураження нервової системи, погане самопочуття в міжприступному періоді

**\* В) Приступоподібний однобічний головний біль, відсутність симптомів органічного ураження нервової системи, гарне самопочуття в міжприступний період**

**65. При холінергічному кризі специфічна терапія полягає у введенні:**

**\* А) Атропіна**

В) Прозеріна

С) Седуксена

Д) Дексаметазона

**66. Для епілептичного припадку характерні:**

А) Розмашисті рухи з масою виразних жестів

В) Ситуаційна зумовленість

**\* С) Тілесні ушкодження, прикуси язика, судоми, самовільне сечовипускання**

Д) Збереження зіничних реакцій

**67. Які осередкові симптоми свідчать про стовбурову локалізацію інфаркту мозку?**

- A) порушення зору
- \* B) Птоз**
- C) Системне запаморочення
- D) Ністагм

**68. У хворої ураження 12 пари черепно-мозкових нервів за периферійним типом праворуч, геміпарез за центральним типом ліворуч. Що страждає?**

- A) Лобні доли
- B) Вароліїв міст
- C) Мосто-мозочковий кут
- \* D) Довгастий мозок**

**69. Яка осередкова симптоматика характерна для півкульової локалізації інфаркту мозку?**

- \* A) Геміпарез**
- B) Координаторні порушення
- C) Діплопія

**70. Гостра дихальна недостатність розвивається у хворих, що знаходяться:**

- \* A) В коматозному стані**
- B) При синдромі Бродн-Секера
- C) При інфаркті кіркової локалізації

**71. Які нейропротектори необхідно застосувати при інсульті?**

- \* A) Сірчанокисла магнезія, цитоколін**
- \* B) Вітамін С**
- C) Мілдронат

**72. У хворого звисає кисть. Який нерв уражений?**

**\* А) Променевий**

В) Серединний

С) Ліктьовий

**73. У хворого "когтиста" кисть. Який нерв уражений?**

А) Променевий

В) Серединний

**\* С) Ліктьовий**

**74. Показання до застосування антикоагулянтів при ішемічному інсульті:**

**\* А) Кардіоемболічний інсульт з високим ризиком повторної емболії**

В) Геморагічний інсульт

С) Гемодинамічний інсульт

**75. Вторинна профілактика інсульту включає наступну терапію:**

**\* А) Антиагрегантну**

В) Протинабрякову

С) Гіпотензивну

**76. Адекватна доза аспірину для вторинної профілактики інсульт:**

**\* А) 50-325 мг/добу**

В) 500-600 мг/добу

С) 25-30 мг/добу

**77. Кількість балів за шкалою ком Глазго 8. Оцініть рівень порушення свідомості**

**\* А) Кома**

В) Сопор

С) Оглушення

**78. Коматозний стан розвинувся у хворого 48 років на фоні 3-денної багаторазової блювоти після їжі. Страждає виразковою хворобою шлунку. Об'єктивно: виражена дегідратація, АТ=80/50 мм рт.ст глюкоза крові 4,2 ммоль/л. В неврологічному статусі: без осередкової симптоматики, менінгеальні симптоми негативні. Характер коми :**

**\* А) Хлоргідропенічна**

В) Гіпоглікемічна

С) Апоплектична

**79. Через 6-10 годин після травми у хворого виявляються нестійкі окорухові порушення, ністагм, вегетативні порушення. Менінгеальні симптоми негативні. Що у хворого?**

А) Струс головного мозку

**\* В) Забій головного мозку легкого ступеню**

С) Субарахноїдальний крововилив

Д) Порушення кровообігу у вертебро-базиллярному судинному басейні

**80. Після ЧМТ у хворого порушення свідомості на 30 хвилин, дезорієнтація, наявні вегетативні порушення, слабовиражений менінгеальний синдром. Діагноз :**

А) Струс головного мозку

**\* В) Забій головного мозку легкого ступеню**

С) Забій головного мозку важкого ступеню

**81. Після ЧМТ у хворого порушення свідомості протягом доби, вітальні порушення, груба неврологічна симптоматика. Діагноз :**

А) Струс головного мозку

В) Забій головного мозку середнього ступеню важкості

**\* С) Забій головного мозку важкого ступеню, стиснення головного мозку**

**82. Після ЧМТ у хворого валкоподібна набряклість в області скроні праворуч, мідріаз і птоз праворуч, геміпарез ліворуч. Діагноз :**

A) Струс головного мозку

B) Забій головного мозку

**\* C) внутрічерепна гематома**

**83. У хворого наявність втрати спогадів на період порушення свідомості, Назвіть вид амнезії:**

A) Антероградна

**\* B) Конградна**

C) Ретроградна

**84. У хворого втрата спогадів про події, що були після періоду порушеної свідомості. Назвіть вид амнезії:**

**\* A) Антероградна**

B) Конградна

C) Ретроградна

**85. У хворого втрата спогадів про події, що передували стану порушеної свідомості. Назвіть вид амнезії:**

A) Конградна

B) Антероградна

**\* C) Ретроградна**

**86. Вкажіть ознаки, характерні для туберкульозного менінгіту:**

**\* A) Підгострий перебіг**

B) Лімфоцитарний плеоцитоз

C) Кров в лікворі

**87. Після травми у хворого короткочасне порушення свідомості, головний біль, амнезія, нудота, одноразове блювання, ністагм, нестійка неврологічна вогнищева симптоматика. Діагноз:**

A) Струс головного мозку

**\* B) Забій головного мозку легкого ступеню**

C) Внутрішньо-черепна гематома

**88. У хворого 48 років на фоні фізичної напруги виник інтенсивний головний біль, психомоторне збудження. Менінгеальні симптоми позитивні. АТ=150/90 мм рт.ст. Діагноз:**

**\* A) Субарахноїдальний крововилив**

**\* B) Гіпертонічний криз**

C) ТЕЛА

**89. Після різкого гальмування автомобіля у пасажирів з'явилася слабкість в верхніх і нижніх кінцівках, гостра затримка сечі. Що відбулося?**

A) Переломи-вивихи в поперековому відділі хребта

**\* B) Переломи-вивихи в шийному відділі хребта з порушенням функції спинного мозку**

C) Перелом в верхньо-грудному відділі хребта з компресією спинного мозку

**90. Хворий 60-літнього віку знайдений в квартирі з помірним порушенням свідомості, правосторонньою геміплегією, моторною афазією. АТ 140/90 мм рт.с., миготлива аритмія. Діагноз :**

A) ЧМТ

B) Травматична внутрішньо-черепна гематома

**\* C) ГПМК по типу ішемії**

D) ГПМК по типу геморагії

**91. Після ЧМТ у хворого сопор, набряклість в тім'яно-потиличній ділянці, анізокорія і птоз праворуч, легкий парез китиці ліворуч, забій м'яких тканин. Що у хворого?**

- A) Струс головного мозку
- B) Забій спинного мозку

**\* C) Внутрічерепна гематома, можливо субдуральна**

**92. Імовірність локалізації осередків забою і гематоми після важкої ЧМТ, викликаній ударом в лобну ділянку голови?**

**\* A) Лобна частка**

- B) Сконева частка
- C) Потилічна частка

**93. Імовірність локалізації осередків забою і гематоми після важкої ЧМТ, викликаній ударом в скроневу ділянку голови?**

- A) Лобна частка

**\* B) Сконева частка по типу удару і протиудару**

- C) Потилічна частка
- D) Основа мозку

**94. Можливість формування гематом при травмі прискорення з місцем прикладання травмуючого агента в тім'яно-потиличній області?**

**\* A) Часто, в лобно-базальних відділах**

- B) Рідко, на протилежній стороні
- C) Неможливо

**95. Вірогідність локалізації гематоми при травмі прискорення з місцем прикладання травмуючого агента в тім'яно-потиличній області?**

**\* A) Лобна доля**

- B) Стовбур
- C) Потилічна доля

**96. Спинний мозок безпосередньо вкритий :**

- \* А) М'якою мозковою оболонкою**
- В) Павутинною мозковою оболонкою
- С) Твердою мозковою оболонкою

**97. Назвіть препарати, що використовуються під час приступу мігрені:**

- \* А) Ерготамін, суматриптан, антимигрень, номігрень**
- В) Релаксанти
- С) Антикоагулянти

**98. Спинний мозок закінчується сегментами:**

- \* А) S5-C1**
- В) S3-S5
- С) Co3-Co4

**99. Бульбарний синдром виникає при:**

- \* А) Двосторонньому повному або частковому ураженні ядер каудальної групи нервів (стовбура головного мозку)**
- В) Двосторонньому ураженні корінців каудальної групи нервів
- С) Односторонньому ураженні ядер або корінців каудальної групи нервів

**100. Перерахуйте основні форми асоційованої мігрені:**

- А) Латентна, ригідна
- \* В) Офтальмічна, офтальмоплегічна, афатична**

**101. Назвіть основні клінічні форми нейроінтоксикації:**

- А) Пульмоніт
- \* В) Енцефалопатія, полінейропатія**
- С) Міопатія Дюшена

**102. Перерахуйте основні клічні форми мігрені:**

A) Початкова

B) Субкомпенсована

**\* C) Без аури, з аурою**

D) Латентна

**103. Вкажіть основні заходи, що використовуються при епілептичному статусі::**

A) ШВЛ

B) Гіпервентиляція

C) Монобромиста камфора

**\* D) Повторне введення седуксену, при неефективності - введення тіопенталу, або гексеналу**

**104. Вкажіть, де локалізується джерело епілептичного збудження, якщо приступу передуює зорова аура :**

A) Лобна доля

B) Сконева доля

**\* C) Потилична доля**

D) Тім"яна доля

**105. Вкажіть, який з нищевказаних збудників викликає гострий поліомієліт:**

A) Стафілокок

B) Вірус герпесу простого

C) Арбовірус

**\* D) Фільтруючий вірус з групи ентеровірусів**

**106. Вкажіть, наявність якого синдрому має вирішальне значення в постановці діагнозу менінгіту:**

- A) Менінгеальний синдром
- B) Наявність загально мозкових симптомів

**\* C) Синдром запальних змін в лікворі**

**107. У хворого звуження очної щілини, міоз, енофтальм. Вкажіть назву синдрому:**

- A) Бенедикта
- B) Вебера

**\* C) Клода Бернара - Горнера**

- D) Броун-Секара

**108. До якої системи відноситься мозочок ?**

- A) До пірамідної системи
- B) До вегетативної системи

**\* C) До екстрапірамідної системи**

**109. У хворого дисфагія, дизартрія, дисфонія, викликаються субкортикальні рефлексії, немотивований плач. Вкажіть локалізацію патологічного вогнища:**

**\* A) Кірково-ядерні шляхи з обох боків, псевдобульбарний синдром**

- B) Ніжка мозку
- C) Міст
- D) Кірково-ядерні шляхи на одному боці

**110. У хворого дисфагія, дизартрія, атрофія і фібрилярні посмикування м'язів язика. Вкажіть локалізацію патологічного вогнища:**

A) Ніжка мозку

B) Міст

**\* C) Довгастий мозок**

D) Внутрішня капсула

E) Кірково-ядерні шляхи

**111. Вкажіть, де локалізується джерело епілептичного збудження, якщо приступу передуює слухова аура:**

A) Зацентральна звивина

**\* B) Сконева доля**

C) Тім'яна доля

D) Лобна доля

**112. Після автомобільної аварії хворий в комі. При огляді: розбіжна косоокість, кровотеча і лікворея з вуха. Поставте діагноз:**

A) Субдуральна гематома

B) Струс головного мозку

**\* C) Перелом основи черепа, забій головного мозку**

D) Епідуральна гематома

**113. У хворого розлад психіки, астетія, абазія, центральний геміпарез, моторна афазія, аграфія, напади Джексоновської епілепсії, неохайність з втратою сечі та кала. Вкажіть локалізацію патологічного вогнища :**

A) Сконева доля

B) Тім'яна доля

**\* C) Лобна доля**

**114. Який блокатор кальцієвих каналів доказово ефективний в найгострішому періоді субарахноїдального крововиливу?**

**\* А) Німодипін (німотоп)**

**\* В) Ніфікард**

С) Циннарізин

**115. Вкажіть ознаки центрального парезу м'язів:**

А) Згладжені лобні складки

В) Лагофтальм

С) Відсутній надбрівний рефлекс

Д) Симптом "вій"

**\* Е) Згладжена носогубна складка, опущений кут рота**

**116. Відмітьте, які з нижчевказаних симптомів не є спільними для бульбарного та псевдобульбарного синдромів:**

А) Дисфагія

В) Парез м'язів язика

**\* С) Насильні плач, або сміх**

Д) Дизартрія

Е) Дисфонія

**117. Основні клінічні прояви транзиторних і ішемічних атак в каротидній системі є наступні, крім :**

**\* А) Моно, або геміпарез**

**\* В) Порушення чутливості в паретичних кінцівках**

**\* С) Моторна, або сенсорна афазія**

**\* Д) Альтернуючі синдроми**

Е) Судомний синдром

**118. Назвіть інфекційне захворювання, при якому коматозний стан розвивається з ураженням стовбура мозку :**

**\* А) Ботулізм**

В) Грип

С) Черевний тиф

**119. Найбільш характерні клінічні прояви транзиторних і ішемічних атак в вертебро-базиллярній системі є слідуючі, крім:**

**\* А) Моторна афазія**

В) Системне головокружіння

С) Ністагм, диплопія

Д) Альтернуючий синдром

**120. Видами ішемічного інсульту є нижче перераховані, крім :**

**\* А) Дисциркуляторна енцефалопатія**

В) Атеротромботичний

С) Кардіоемболічний

Д) Гемодинамічний

**121. Видами геморагічного порушення мозкового кровообігу є слідуючі, крім:**

**\* А) Дисциркуляторна мієлопатія**

В) Субарахноїдальний крововилив

С) Паренхіматозний крововилив

Д) Паренхіматозно-субарахноїдальний крововилив

**122. Основними симптомами початкових проявів недостатності кровопостачання мозку є слідуючі, крім :**

- A) Головний біль, запаморочення
- B) Шум в голові
- C) Погіршення пам'яті

**\* D) Монопарез**

**123. Основними ознаками субарахноїдального крововиливу є слідуючі, крім :**

- A) Загальномозкові симптоми і психомоторне збудження
- B) Кров'яниста спинно-мозкова рідина

**\* C) Горметонія**

- D) Симптом Керніга, ригідність потиличних м'язів

**124. При різкому пасивному згинанні голови рефлекторно згинаються нижні кінцівки в колінних суглобах. Назвіть симптом:**

- A) Ригідність потиличних м'язів
- B) Нері

**\* C) Верхній симптом Брудзинського**

**125. До типових клінічних форм менінгококового менінгіту відносяться наступні:**

**\* A) Блискавична**

- B) Бульбарна
- C) Затяжна кахектична
- D) Абортивна

**126. Вкажіть симптом, що не відноситься до менінгеального синдрому:**

- A) Загальна гіперестезія
- B) Симптом Лесажа
- C) Ригідність потиличних м'язів

**\* D) Симптом Горнера**

**127. В яке відділення повинен госпіталізуватися хворий з гострим інсультом?**

**\* А) Нейросудинне, інсультне**

В) Травматологічне

С) Хірургічне

**128. До клінічних форм менінгіта по локалізації відносяться наступні, крім:**

**\* А) Підкірковий**

В) Базальний

С) Тотальний

Д) Конвекситальний

**129. Симптомами конвекситального процесу є наступні, крім:**

А) Вогнищеві судомні випадки

В) Анізорефлексія

**\* С) Бульбарні розлади, якщо відсутнє вклинення**

**130. Вкажіть, при якому процесі різко знижується зір:**

А) При синдромі ураження мосто-мозочкового кута

**\* В) Оптико-хіазмальному, уражені потиличної області**

С) Шийного відділу спинного мозку

**131. Вкажіть, при якому процесі виникають приступи вогнищевої Джексоновської епілепсії:**

**\* А) Конвекситальному (лобно-тім'яна частка)**

В) Задньої черепної ямки

С) Уражені стовбура головного мозку

**132. Ознаками менінгізму є наступні, крім:**

- A) Наявність менінгіального синдрому
- B) Склад ліквору без патологічних змін

**\* C) Наявність вогнищевих неврологічних симптомів**

**133. Вкажіть, при якому процесі швидко розвивається гіпертензійний синдром:**

- A) Конвексимальному

**\* B) Задньої черепної ямки**

**134. Переважна локалізація патологічного вогнища при поліомієліті наступна:**

**\* A) Рухові ядра черепних нервів**

**\* B) Мотонейрони передніх рогів спинного мозку**

- C) Базальні ядра

**135. Особливостями рухових розладів паралітичної форми поліомієліту є наступні, крім:**

- A) Периферичні паралічі

- B) "Ранкові" паралічі у проксимальних відділах кінцівок

**\* C) Центральні паралічі**

**136. При бульбарній формі поліомієліту виникають симптоми:**

- A) Порушення дихання периферичного характеру

**\* B) Дисфагія, дизартрія, дисфонія**

- C) Периферичний парез м'язів

**137. Характерними симптомами подразнення потиличної долі є :**

- A) Зниження інтелекту

**\* B) Зорові галюцинації**

- C) Лобна атаксія

- D) Хапальний рефлекс

**138. Скорочення м'язів підборіддя при штриховому подразненні шкіри в області підвищення I /великого/ пальця китиці. Назвіть симптом:**

A) Носогубний рефлекс Аствацатурова

**\* B) Марінеску-Радовичі**

C) Рефлекс Россалімо

**139. Симптомами холінергічного кризу є наступні, крім:**

**\* A) Порушення чутливості**

B) Міоз

C) Гіперсалівація

D) Діарея, болі в животі

E) Фасцикулярні посмикування

**140. При холінергічному кризі використовуються засоби:**

**\* A) Атропінізація до появи сухості в роті**

B) Гіпотензивні заходи

C) Введення допаміну

**141. Вкажіть засоби для лікування міастенічного кризу:**

A) Аміназин

**\* B) Введення прозерину**

C) Введення дібазолу

**142. Ознаками міастенічного кризу є наступні:**

**\* A) Генералізована м'язова слабкість**

B) Судоми

C) Порушення чутливості

**143. В якій дозі церебролізін найбільш ефективний при гострому інсульті?**

**\* А) 50 мл**

В) 5 мл

С) 3 мл

**144. Вкажіть, що таке геміплегія:**

А) Параліч однієї кінцівки

В) Параліч нижніх кінцівок

**\* С) Параліч кінцівок з одного боку**

**145. Вкажіть, що таке параплегія:**

А) Параліч руки

В) Параліч ноги

С) Параліч кінцівок з одного боку

Д) Параліч трьох кінцівок

**\* Е) Параліч верхніх, або нижніх кінцівок з двох сторін**

**146. Вкажіть, що таке моноплегія:**

**\* А) Параліч однієї кінцівки**

В) Параліч верхніх кінцівок

С) Параліч кінцівок з одного боку

**147. Вкажіть, в якій ділянці кори представлена проекція рухів руки:**

А) В середньому відділі зацентральної звивини

**\* В) В середньому відділі передцентральної звивини**

**148. Назвіть ознаки ураження передцентральної звивини:**

**\* А) Геміпарез з протилежного боку**

В) Геміпарез на боці вогнища

**149. Вкажіть, анестезія яких видів чутливості спостерігається при повному ураженні периферичного нерва:**

**\* А) Всіх видів**

В) Лише больової і температурної

С) Лише тактильної

**150. У хворого на дисциркуляторну гіпертензивну енцефалопатію не можна:**

**\* А) Допускати розвиток артеріальної гіпотензії**

В) Вводити велику кількість рідини

С) Вводити 5% розчин глюкози

**151. При дисциркуляторній гіпертензивній енцефалопатії при інсульті АТ не знижують, якщо він:**

**\* А) 200/110-120 мм рт.ст. і нижче**

В) 180/100 мм рт.ст

С) 250/140 мм рт.ст

**152. Який розлад мови виникає при ураженні мозочка::**

А) Тиха монотонна

**\* В) Скандована**

С) Афазія моторна

Д) Афазія сенсорна

Е) Гугнява

**153. Люмбальна пункція при інсульті на ранньому госпітальному етапі проводиться:**

**\* А) Якщо КТ і МРТ неінформативні**

В) При менінгеальному синдромі

С) При явищах дислокації

**154. У хворого периферичний параліч м'язів на стороні вогнища, а на протилежній стороні - геміплегія. Назвіть альтернуючий синдром:**

A) Вебера

**\* B) Мійяра-Гюблера**

C) Джексона

D) Авелліса

E) Фовілля

**155. Патологічні рефлекси є характерною ознакою параліча:**

**\* A) Центрального**

B) Периферичного

**156. Симптомом натягу периферичних нервів є :**

A) Брудзинського

**\* B) Ласега**

C) Керніга

**157. Вкажіть можливі ускладнення субарахноїдального крововиливу:**

A) Рецидив крововиливу

B) Інфаркт мозку за механізмом рефлексорного ангіоспазму

C) Гостре збудження

**\* D) Гемодинамічний**

**158. Структурно-функціональна одиниця нервової системи:**

**\* A) Нейрон**

B) Дендрит

C) Аксон

D) Нейроглія

**159. Нервова система працює:**

**\* А) По типу рефлексу**

В) Автономно

**160. При падінні гемодинаміки у хворих з інсультом для підвищення ОЦК необхідно вводити:**

**\* А) Декстрини**

В) Реамберін

С) 5% розчин глюкози

**161. Синдром ураження конуса:**

А) Порушення чутливості спинного мозку з рівня Th-5

**\* В) Порушення Сечопускання по периферійному типу /істине/**

С) Нижній центральний параліч

**162. Для швидкого зниження ВЧТ в передопераційному періоді при внутрішньомозковому крововиливі (ВМК) показано:**

**\* А) ШВЛ в режимі гіпервентиляції**

В) Введення ізотонічного розчину NaCl

С) Кортикостероїди

**163. Озноб і ознобоподібні тремтіння характерні для:**

**\* А) Симпатоадреналових кризів**

В) Гематурії

С) Гострому животі

Д) Бронхіту

**164. Для профілактики рефлекторного вазоспазму при субарахноїдальному крововиливі (САК) німодипин (німотоп) вводиться в дозі:**

**\* А) 25 мг/добу в/в краплинно**

В) 5 мг/добу в/в краплинно

С) 2 мг/добу в/в краплинно

**165. При подразненні симпатичних волокон, що іннервують очне яблуко спостерігаються:**

А) Синдром Слудера

В) Синдром Вебера

**\* С) Клода-Бернара-Горнера**

**166. Характерним симптомом синдрому Клода-Бернара-Горнера є:**

**\* А) Енофтальм, птоз, міоз**

В) Звуження очної щілини

С) Звуження зіниці

Д) Зміна кольору радужної оболонки

Е) Екзофтальм

**167. Новим методом лікування ВМК є:**

А) Тромболізис

**\* В) Видалення гематоми**

С) Консервативне лікування

**168. Відмінності істеричних порушень чутливості від органічних:**

**\* А) Відсутня зона перекриття**

В) Присутня зона перекриття

С) Випадає тільки глибока чутливість

Д) Випадає тільки больова чутливість

**169. Після перелому плечевої кістки у хворого відзначаються параліч м'язів, розгинаючих передпліччя, кисть і пальці, анестезія шкіри в ділянці передпліччя і кисті (відповідно I і II пальцям). Що уражене:**

**\* А) Променевий нерв**

В) Ліктьовий нерв

С) Серединний нерв

Д) Плечове сплетіння

**170. Хворий при ході високо піднімає ногу, бо у нього звисає стопа ("степаж"). Спостерігається гіпалгезія шкіри в ділянці задньозовнішньої поверхні гомілки і тила стопи. Що уражене:**

**\* А) Малогомілковий нерв**

В) Великогомілковий нерв

С) Сідничний нерв

Д) Стегновий нерв

**171. До непродуктивних форм порушення свідомості відносяться:**

А) Аменція

В) Делірій

**\* С) Приглушення, сопор, кома**

**172. Ознаки ураження потиличної частки головного мозку:**

**\* А) Зорова агнозія (сліпота), фотопсія, метаморфопсія**

В) Паралічі

**173. Найбільш характерні симптоми ТІА з нижченаведених:**

А) Порушення смаку

В) Менінгеальні симптоми

**\* С) Порушення свідомості (хвилин, годин, до 24 годин)**

Д) Порушення серцевої діяльності

**174. Поява патологічних рефлексів (наприклад, Бабінського), свідчить про:**

**\* А) Ураження пірамідних шляхів**

В) Наближення приступу мігрені

С) Ураження сідничного нерва

**175. Назвіть основну ознаку, яка відрізняє струс головного мозку від забою:**

А) Втрата свідомості

В) Асиметрія розладів

**\* С) Наявність крові в лікворі**

**176. Поза хворого із закинутою головою і вигнутою спиною може бути при наступних захворюваннях:**

**\* А) Субарахноїдальному крововиливові**

В) Сірінгомієлія

С) Пневмонії

Д) Апендициті

**177. Ригідність потиличних м'язів може бути при слідуючих захворюваннях, крім:**

А) Субарахноїдального крововиливу

В) Менінгоенцефаліта

С) Менінгіта

Д) Паренхіматозного геморагічного інсульта

**\* Е) Поліневрита**

**178. Симптом Керніга може бути при слідуючих симптомах, крім:**

- A) Субарахноїдального крововиливу
- B) Менінгоенцефаліта
- C) Менінгіта
- D) Паренхіматозного геморагічного інсульту

**\* E) Поліневропатії**

**179. Стереотипне посмикування м'язів без помітних рухів у вагітних жінок характерне для:**

- A) Субарахноїдального крововиливу
- B) Менінгоенцефаліту
- C) Травми, пухлини головного мозку
- D) Паренхіматозного геморагічного інсульту

**\* E) Екламптичної коми**

**180. Який сучасний нейропротектор є проміжним продуктом в мембранному біосинтезі фосфоліпідів?**

**\* A) Цитіколін**

- B) Кетамін
- C) Гліцин

**181. Велике шумне дихання Куссмауля характерне для:**

- A) Субарахноїдального крововиливу
- B) Менінгоенцефаліта

**\* C) Діабетичної коми**

- D) Отруєння барбітуратами

**182. Рідке рівне дихання, що нагадує дихання людини, яка глибоко спить, характерне для:**

- A) Субарахноїдального крововиливу
- B) Менінгоенцефаліта
- C) Діабетичної коми

**\* D) Отруєння барбітуратами**

**183. Гіперемія шкіри обличчя на тлі високого АТ характерна для:**

- A) Невриту лицевого нерва
- B) Менінгоенцефаліта
- C) набряку Квінке

**\* D) Паренхіматозного геморагічного інсульту**

**184. Жовтянична шкіра характерна для:**

- A) Уремичної коми

**\* B) Печінкової коми**

- C) Діабетичної коми
- D) Отруєння барбітуратами

**185. Суха шкіра із слідами роздряпин характерна для:**

- A) Субарахноїдального крововиливу

**\* B) Уремичної коми**

- C) Печінкової коми
- D) Гіпоксичної коми

**186. Якщо у хворого без свідомості патологічні стопні рефлекси визначаються з одного боку, то це говорить про:**

**\* A) Цереброгенну кому**

- B) Соматогенну кому

**187. Якщо у хворого з гіпертонічною хворобою після підвищення АТ з'явився різкий головний біль, нудота, блювання, ригідність м'язів потилиці, треба думати про:**

- A) Порушення кровообігу в вертебробазиллярному басейні
- B) Пневмонію

**\* C) Гостру гіпертонічну енцефалопатію**

**188. Якщо у хворого на фоні нормального або незначно підвищення АТ спостерігається головокружіння, розлад координації, перехідна геміанопсія, шум у вухах, мовні розлади, треба думати про:**

**\* A) Порушення кровобігу в вертебро-базиллярному басейні**

- B) Гіпертонічний криз I типу
- C) Гостру гіпертонічну енцефалопатію

**189. Неможливість розігнути ногу хворого в колінному суглобі, якщо вона зігнута в кульшовому, це:**

**\* A) Симптом Керніга**

- B) Верхній симптом Брудзинського
- C) Середній симптом Брудзинського
- D) Нижній симптом Брудзинського
- E) Симптом Бабінського

**190. Якщо при пасивному згинанні голови хворого, що лежить на спині, ноги згинаються в колінних та кульшових суглобах, це:**

- A) Симптом Керніга

**\* B) Верхній симптом Брудзинського**

- C) Середній симптом Брудзинського
- D) Нижній симптом Брудзинського
- E) Симптом Бабінського

**191. Якщо при штриховому подразненні підшви відбувається розгинання I пальця, інші нерідко розводяться, це:**

- A) Симптом Керніга
- B) Верхній симптом Брудзинського
- C) Середній симптом Брудзинського
- D) Нижній симптом Брудзинського

**\* E) Симптом Бабінського**

**192. Якщо при надавлюванні на лобкову ділянку відбувається згинання ніг в колінних і кульшових суглобах, це:**

- A) Симптом Керніга
- B) Верхній симптом Брудзинського

**\* C) Середній симптом Брудзинського**

- D) Нижній симптом Брудзинського
- E) Симптом Бабінського

**193. Якщо при дослідженні симптому Керніга з одної сторони у хворого згинається протилежна нижня кінцівка, це:**

- A) Симптом Лесажа
- B) Верхній симптом Брудзинського
- C) Середній симптом Брудзинського

**\* D) Нижній симптом Брудзинського**

- E) Симптом Бабінського

**194. Визначення перехідних порушень мозкового кровобігу (TIA):**

- A) Розлади функцій мозку, що зберігаються тривало

**\* B) Розлади функцій мозку, що зберігаються не більше однієї доби (24 годин)**

**195. Клінічні ознаки гіпертонічного церебрального кризу:**

- A) Підвищення t тіла
- B) Діарея
- \* C) Дифузний головний біль, головокружіння, нудота, блювання, підвищений АТ**
- D) Задишка

**196. Центральна нервова система - це:**

- \* A) Головний і спинний мозок**
- B) Головний мозок
- C) Кора головного мозку

**197. Арахноїдит - це:**

- \* A) Продуктивне запалення м'якої і павутинної оболонок мозку**
- B) Запалення сірої речовини мозку

**198. Енцефаліт - це:**

- A) Запалення м'якої і паутинної оболонок мозку
- \* B) Ураження головного мозку інфекційно-алергічного характеру**
- C) Запалення твердої мозкової оболонки

**199. У хворого 78 років на фоні нормоглікемії розвинувся правосторонній геміпарез, у минулому був лівопівкульовий інсульт. Діагноз :**

- \* A) Повторний ішемічний інсульт**
- B) Гіпертонічний криз
- C) Геморагічний інсульт

**200. Який менінгіт відноситься до вторинного з нижчеперерахованих, крім:**

- A) Стафілококовий
- \* B) Менінгококовий**
- C) Отогенний
- D) Одонтогенний

**201. У хворого на протязі доби виникає 1-2 судомних напади. Що це?**

- \* A) Поодинокі припадки епілепсії**
- B) Серійні припадки
- C) Епілептичний статус

**202. У хворого на протязі доби виникає декілька припадків зі зворотнім розвитком порушень свідомості, дихання, АТ, пульсу. Що це?**

- A) Поодинокі припадки епілепсії
- \* B) Серійні припадки**
- C) Епілептичний статус

**203. У хворого судомні припадки із коротким інтервалом з прогресивним погіршенням свідомості, появою респіраторних, циркуляторних, метаболічних розладів. Що це?**

- A) Поодинокі припадки
- B) Серійні припадки
- \* C) Епілептичний статус**

**204. Звичайна тривалість судомного припадка при епілепсії:**

- \* A) До 2-х хвилин**
- B) До 5 хвилин
- C) До 10 хвилин

**205. Вогнищева неврологічна симптоматика при епістатусі :**

A) Виявляється

**\* В) Не виявляється**

**206. При якій судинній патології мозку найчастіше в гострому періоді бувають судомні припадки?**

A) Перехідне порушення мозкового кровообігу (ТІА)

B) Ішемічний інсульт

**\* С) Геморагічний інсульт**

**207. Про які захворювання можна думати, якщо судомний припадок виник на фоні підвищення температури тіла?**

A) Епілепсія

**\* В) Гострі запальні захворювання головного мозку**

C) Алкоголізм

**208. Про які захворювання можна думати, якщо судомний припадок виник на фоні дрібновогнищевої стійкої неврологічної симптоматики?**

A) Епілепсія

**\* В) Гострі запальні захворювання головного мозку**

C) Алкоголізм

**209. Про які захворювання можна думати, якщо перший судомний припадок виник при збереженні свідомості?**

**\* А) Пухлини головного мозку**

B) Закрита черепно-мозкова травма

C) Епілепсія

**210. У хворого 75 років після сну розвинулася сенсомоторна афазія, провідникових рухових і чуттєвих порушень не виявлено. Вкажіть уражений судинний басейн**

**\* А) Кіркові гілки лівої середньої мозкової артерії, у правшив**

В) Права середня мозкова артерія

**211. Вкажіть ознаки, що характерні для істеричного випадку:**

А) Наявність передвісників

В) Прикус язика

**\* С) Вічурні пози, стресова ситуація**

Д) Холодний піт

Е) Зіничні реакції відсутні

**212. У хворого 50 років протягом півроку періодично виникає короткочасна лівобічна амбліопія, іноді при цьому німіє права рука. Діагноз?**

**\* А) Атеросклеротичний стеноз лівої внутрішньої сонної артерії**

В) Глаукома

С) Хоріоретиніт

**213. Який препарат відносяться до дихальних аналептиків?**

А) Хлористий кальцій

В) Фенкарол

**\* С) БемеGRID**

Д) Сульфокамфокаїн

**214. Якому стану відповідають: гомолатеральна анізокорія, контрлатеральний геміпарез, асиметрія глибоких рефлексів, брадикардія, епіприпадки у хворого після ДТП?**

А) Струс головного мозку

В) Забій головного мозку

**\* С) Стиснення головного мозку**

**215. Нейротоксичне ураження ЦНС, що це?**

А) Ураження імунної системи

**\* В) Поєднання інфекційно-токсичного шоку і токсичного ураження ЦНС**

С) Ушкодження слизової оболонки кишечника

**216. Дитина неспокійна,  $t$  більше  $38^{\circ}\text{C}$ , загальна гіперестезія, тремор кінцівок, стереотипні рухи кінцівок; в легенях жорстке дихання, тахікардія. Якому ступеню нейротоксикозу відповідає даний статус?**

**\* А) I ступеню**

В) II ступеню

С) III ступеню

**217. Дитина в'яла, сонлива, судорожний синдром, вибухання великого тім'ячка, позитивні с-ми Керніга, Брудзинського, "мраморність шкіри", брадикардія. Якому ступеню нейротоксикозу відповідає даний статус?**

А) I ступеню

**\* В) II ступеню**

**218. Найчастіша локалізація патологічного процесу при дифтерії :**

А) Очі

**\* В) Носоглотка**

С) Вуха

Д) Шкіра

**219. Вживання психоактивних речовин без формування психічної і фізичної залежності - це:**

А) Наркоманія

В) Токсикоманія

**\* С) Психічна залежність**

**220. Усвідомлена чи несвідома потреба у вживанні психоактивних речовин для зняття напруги і досягнення стану комфорту - це:**

А) Абстинентний синдром

В) Толерантність

**\* С) Психічна залежність**

**221. Комплекс психопатологічних, вегетативних, неврологічних і соматичних розладів, що з'являються слідом за припиненням систематичного вживання психоактивної речовини - це:**

**\* А) Абстинентний синдром**

В) Толерантність

С) Психічна залежність

**222. Спроможність переносити токсичні дози психоактивної речовини (наркотика) - це:**

А) Абстинентний синдром

**\* В) Толерантність**

С) Психічна залежність

**223. Що розуміють під терміном "зловживання алкоголем" при запису в карту виклику або історію хвороби?**

**\* А) Всякий прийом алкогольних напоїв, який призводить до порушення правових і етичних норм**

В) Надмірне споживання алкогольних напоїв

С) Будь-яке вживання спиртного в загальних місцях і на робочому місці

**224. Судомні випадки у хворих алкоголізмом в стані абстиненції, сп'яніння це:**

**\* А) Алкогольний епілептичний синдром**

В) Метаболічна епілепсія

**225. Судомні випадки у хворих алкоголізмом і без прийому алкоголя, специфічні зміни психіки - це:**

**\* А) Алкогольна епілепсія**

В) Алкогольний епілептичний синдром

**226. Зловживання алкоголем з втратою контролю за кількістю, наростаюча толерантність до алкоголю, регулярні однократні випивки, рідкі періоди щоденного п'янства. Абстиненції немає. Ваш діагноз?**

**\* А) Хронічний алкоголізм, I стадія**

В) Хронічний алкоголізм, II стадія

С) Хронічний алкоголізм, III стадія

**227. Зловживання алкоголем з абстинентними станами, наростаюча толерантність до алкоголю. Соматовегетативні розлади, багатоденні вживання алкоголю або постійне п'янство. Ваш діагноз :**

А) Хронічний алкоголізм, I стадія

**\* В) Хронічний алкоголізм, II стадія**

С) Хронічний алкоголізм, III стадія

**228. Зловживання алкоголем з абстинентними станами, соматоневрологічні і психічні розлади. Циклічні запої з непереносимістю алкоголя до кінця запою. Постійне п'янство дробними дозами зі зниженою толерантністю. Ваш діагноз :**

А) Хронічний алкоголізм, I стадія

В) Хронічний алкоголізм, II стадія

**\* С) Хронічний алкоголізм, III стадія**

**229. Що не входить до Корсаківського синдрому:**

**\* А) Недоумство**

В) Гіперкінези

С) Ністагм

Д) Патологічні рефлекси

**230. Основна патогенетична ознака у розвитку гострих алкогольних психозів:**

**\* А) Підвищення вмісту катехоламінів після довгих та важких алкогольних ексцесів**

В) Пониження вмісту катехоламінів після довгих та важких алкогольних ексцесів

**231. Захворювання внутрішніх органів, нервової системи на фоні тривалого зловживання алкоголем - це:**

**\* А) Хронічний алкоголізм**

В) Хронічний тиреоїдит

**232. Захворювання, що визначається психічною і фізичною залежністю від алкоголю, непереборним тяжінням до нього:**

**\* А) Хронічний алкоголізм**

В) Хронічна інтоксикація алкоголем

**233. Важкий делірій, судомні припадки з клонічною і тонічною фазами. Диспептичні розлади, гіперкінези, анізокорія, ністагм, патологічні рефлексії. Гіпотензія, порушення ритму дихання - це:**

**\* А) Гостра алкогольна енцефалопатія типу Гайє-Верніке**

В) Корсаківський психоз

С) Психастенія

**234. При проясненні свідомості після важкого делірія - дезорієнтація, неправдиві спомины, неможливість запам'ятовувати. Ваш діагноз :**

А) Гостра алкогольна енцефалопатія типу Гайє-Верніке

**\* В) Корсаківський психоз**

С) Епілептичний синдром

**235. Вживання від 1 разу в 2-3 місяці до 1-2 рази на місяць 100-150 мл міцних напоїв, або 300-500 мл вина - це:**

- A) Ситуаційне п'янство
- B) Звичне п'янство

**\* C) Епізодичне вживання алкоголя**

**236. Вживання 1-4 рази в місяць до 300 мл міцних напоїв, кількісний контроль збережений - це:**

**\* A) Ситуаційне п'янство**

- B) Звичне п'янство
- C) Епізодичне вживання алкоголю

**237. Вживання 1-2 рази в тиждень 200-300 мл міцних напоїв - це:**

- A) Ситуаційне п'янство

**\* B) Звичне п'янство**

- C) Епізодичне вживання алкоголя

**238. Які захворювання входять в поняття "психопатія"?**

**\* A) Патологія характеру і темпераменту, які проявляються дисгармонією особи**

- B) Шизофренія
- C) Епілепсія

**239. Чи підлягають обов'язковій госпіталізації хворі з суїцидальними спробами?**

**\* A) Підлягають**

- B) Не підлягають
- C) При бажанні хворого

**240. Аміназин - це препарат з групи:**

- A) Транквілізаторів
- B) Снодійних
- C) Аналептиків

**\* D) Нейролептиків**

**241. Амітриптилін відноситься до групи:**

- A) Нейролептиків
- B) Транквілізаторів

**\* C) Антидепресантів**

**242. Діазепам відноситься до групи:**

**\* A) Транквілізаторів**

- B) Снотворних
- C) Наркотиків
- D) Нейролептиків

**243. Синдром ураження мозкового стовбура це синдром :**

- A) Броун-Секара

**\* B) Альтернуючий, бульбарний**

- C) Бернара-Горнера
- D) Псевдобульбарний, гіпоталамічний

**244. Ознаки синдрому ураження мозкового стовбура:**

- A) Акінетичного мутизму
- B) Акінетико - ригідний

**\* C) Бульбарні розлади**

- D) Псевдобульбарний

**245. Наявність больових пароксизмів, що локалізуються в зоні інервації нижньої щелепи, свідчить про:**

A) Невралгію потиличних нервів

**\* B) Невралгію трійчастого нерва**

C) Неврит лицевого нерва

**246. Які симптоми не відносяться до менінгеальних:**

A) Загальна гіперестезія

B) Симптоми подразнення кори і мозкових оболонок

**\* C) Симптом Броун-Секара**

**247. Тривалість дії нітрогліцерину введенного в/в при ускладненому гіпертензивному кризі, особливо при гострій серцевій недостатності та інфаркті міокарду:**

A) 1-2 хвилин

**\* B) 3-5 хвилин**

C) 10-3- хвилин

**248. Початок дії нітропрусиду натрію для парентеральної терапії при ускладнених гіпертензивних кризах:**

A) Через 2-5 хвилин

B) Через 10-20 хвилин

**\* C) негайно**

D) Через 5-10 хвилин

**249. До якої групи препаратів належать пропранолол та атенолол ?**

**\* A) в-адреноблокатори**

B) а-адреноблокатори

C) антагоністи кальцію

D) діуретики

**250. Який препарат відноситься до засобів, які покращують реологічні властивості крові при ішемічному інсульті?**

A) Фуросемід

B) Урегіт

**\* C) Пентоксифілін**

D) Ніфедипін

**251. Вкажіть на дослідження реакції на конвергенцію:**

**\* A) Б**

B) А

C) С

**252. Вкажіть на дослідження корнеального рефлекса:**

A) А

**\* B) Б**

C) С

**253. Вкажіть на периферичний параліч лицевого нерва:**

**\* A) А**

B) Б

C) С

**254. Вкажіть на дослідження рефлекса Бабінського:**

A) А

B) Б

**\* C) С**

**255. Вкажіть на дослідження рефлекса Россолімо:**

A) А

**\* В) Б**

C) С

**256. Вкажіть на дослідження проби Барре:**

**\* А) А**

B) Б

C) С

**257. Вкажіть на симптом Белла:**

**\* А) А**

B) Б

**\* С) С**

**258. Вкажіть на симптом Брудзинського:**

**\* А) А**

B) Б

C) С

**259. Вкажіть на симптом Кернига:**

**\* А) А**

B) Б

**260. Вкажіть на дослідження симптома натягу Ласега:**

**\* А) А**

B) Б

C) С