

ЗАВАНТАЖЕНО З САЙТУ ТЕСТУВАННЯ.УКР

Токсикологія.

Категорія: **Невідкладна допомога**

Кількість запитань: **260**

1. При проведенні форсованого діурезу необхідно ввести рідину (в співвідношенні з добовою потребою):

- A) Стільки ж (рівне добовій потребі)
- B) В 1,5 разів менше
- * C) В 2-3 рази більше**
- D) В 10 разів більше

2. Введення натрію гідрокарбонату проводять під контролем:

- A) Калію плазми
- * B) рН крові**
- C) Діурезу
- D) Гематокриту
- E) Стану хворого

3. При потраплянні ФОС на шкіру її треба обробити:

- A) Рослинною олією
- B) 2% розчином нашатирного спирту
- C) 5% розчином солі
- * D) Мильною водою**
- E) Розчином перманганату калію

4. При отруєнні белоїдом необхідно вводити:

- A) Атропіну сульфат
- B) Норадреналін
- * C) Фізостигмін**
- D) 40% розчин глюкози
- E) Метацин

5. Гемодіаліз при гострих отруєннях водорозчинними отрутами найбільш ефективний:

- A) Перші 24 години
- B) Через 10-12 годин
- * C) Перші 4-6 годин**
- D) Через 24-36 годин

6. Промивання шлунку у хворого з порушенням свідомості проводиться:

- * A) Зондовим методом після інтубації трахеї**
- B) Зондовим методом в положенні на лівому боці

7. При отруєнні метацином необхідно вводити:

- A) Адреналін
- B) Норадреналін
- * C) Галантамін**
- D) Атропіну сульфат

8. Промивання шлунку, тільки в перші дві години, показане при отруєннях:

- A) Кислотами
- B) Чадним газом
- C) Медикаментами психотропної дії
- * D) Лугами**

9. Промивання шлунку показане при отруєннях:

- A) Інгаляційних отруєннях
- * B) Пероральних отруєннях**
- C) Контактних отруєннях

10. При отруєнні метанолом найбільш ефективним методом штучної детоксикації є:

*** А) Ранній гемодіаліз**

В) Ентеросорбція

С) Обмінне переливання крові

Д) Плазмаферез

11. Специфічним антидотом фосфорорганічних інсектицидів є:

А) Купреніл

В) глюкагон

С) Етанол

*** Д) Пралідоксим**

Е) Вітамін В1

12. При отруєнні ізоніазидом антидотом є:

А) Вітамін Е

В) Вітамін В1

*** С) Вітамін В6**

Д) Вітамін С

Е) Унітіол

13. Вазелінове масло призначається при отруєннях:

А) Кислотами

В) Лугами

*** С) Дихлоретаном**

Д) Хлораміном

14. При отруєннях парацетамолом антидотом є:

- A) Унітіол
- B) Купреніл
- * C) Ацетилцистеїн**
- D) Фізостигмін
- E) Вітамін B1

15. При отруєнні метамфетаміном виникає:

- A) Міоз
- B) Гіпотензія
- C) Брадикардія
- * D) Гіпертензія**

16. При отруєнні фенобарбіталом показане:

- A) Проведення кислотного форсованого діурезу
- * B) Проведення лужного форсованого діурезу**
- C) Проведення антидотної терапії

17. Антидотом токсинів блідої поганки є:

- A) Атропін
- * B) Сілібінін**
- C) Тіопентал натрію
- D) Етанол

18. Антидотом етиленгліколя є:

- A) Протаміну сульфат
- * B) Кальцію глюконат**
- C) Калію хлорид
- D) Атропіну сульфат

19. До галюциногенів належать:

A) Метадон

*** В) Мескалін**

C) Кокаїн

20. При отруєннях серцевими глікозидами показане введення:

A) Кальція глюконату

*** В) Дігосинспецифічних антитіл**

C) Кальція хлориду

D) Етилового спирту

E) Протаміна сульфату

21. Ентеросорбція показана при отруєнні:

A) Ацетоном

*** В) Безодіазпінами**

C) Важкими металами

22. Антидотом опіоїдів є:

A) Вітамін B1

B) Вітамін C

*** C) Налоксон**

D) Кальцію глюконат

23. При отруєннях оцтовою есенцією показано проведення:

A) Антидотної терапії унітіолом

*** В) Форсованого діурезу**

C) Стимуляції блювоти

24. До методів штучної детоксикації відносяться:

- A) Форсований діурез
- B) Промивання шлунку
- * C) Гемосорбція**
- D) Оксигенотерапія

25. При отруєннях чадним газом необхідно:

- A) Промити шлунок
- B) Ввести послаблюючі засоби
- * C) Проводити інгаляцію кисню**
- D) Ввести ентеросорбент

26. При виникненні гострої ниркової недостатності показано:

- A) Проведення форсованого діурезу
- B) Введення сечогінних
- * C) Проведення гемодіалізу**

27. Найбільш ефективний метод лікування отруєнь аміназином:

- A) Форсований діурез
- B) Гемодіаліз
- * C) Гемосорбція**

28. При передозуванні гепарину необхідне введення:

- A) Вітаміну К
- * B) Протамін сульфат**
- C) Унітіолу
- D) Амінокапронової кислоти

29. При отруєннях метгемоглобіноутворювачами найбільш ефективні:

A) Протамін-сульфат

B) Нітрит натрію

C) Етиловий спирт

*** D) Гіпербарична оксигенація**

E) Вітамін E

F) Вітамін B6

30. Етиловий спирт є антидотом:

A) Дихлоретана

*** B) Метанола**

C) Метопролола

31. При гострих отруєннях міддю як антидот застосовують:

A) Атропіну сульфат

B) Сілібінін

*** C) D-пеніциламін**

32. При гострих отруєннях препаратами, що містять залізо, як антидот застосовується:

A) Унітіол

B) D-пеніциламін

*** C) Десфераль**

33. При отруєннях перманганатом калію шлунок необхідно промити водою з:

A) Гідрокарбонатом натрію

*** B) Аскорбіновою кислотою**

C) Кальцію хлоридом

34. До органічних кислот відносяться:

- * А) Карболова кислота**
- В) Хлористоводнева кислота
- С) Сірчана кислота

35. При отруєнні синільною кислотою необхідно промити шлунок розчином:

- А) Кальцію
- * В) Тіосульфату натрію**
- С) Перманганату калію

36. При отруєнні щавлевою кислотою антидотом є:

- * А) Кальцію хлорид**
- В) Калію хлорид
- С) Натрію хлорид

37. Гемосорбція при гострих отруєннях найбільш ефективна:

- А) В перші 24 години
- * В) В перші 4-6 годин**
- С) Через 10-12 годин
- Д) Через 24-36 годин

38. При отруєнні опіюдами спостерігається:

- А) Розширення зіниць
- * В) Звуження зіниць**
- С) Діарея

39. При отруєнні саліцилатами необхідно призначити:

A) Перманганат калію для промивання шлунка

B) Вітамін C

*** C) Гідрокарбонат натрію**

D) Вітамін B6

E) Вітамін B1

40. При енцефалопатії Wernike призначається:

*** A) Тіамін (B1)**

B) Ретінол (A)

C) Токоферол (E)

D) Кальциферол (D)

E) Рибофлавін (B2)

41. При отруєнні важкими металами антидотом є:

A) Флумазеніл

*** B) Унітіол**

C) Налоксон

D) Нітрит натрію

E) Активоване вугілля

42. При отруєннях неорганічними сполуками ртуті в якості антидоту використовується:

*** A) Унітіол**

B) Налоксон

C) Галантамін

D) Ацетілцистеїн

E) Десферал

43. При отруєнні оцтовою кислотою слизові оболонки стають:

*** А) Сірого кольору**

- В) Темно-коричньового кольору
- С) Жовтого кольору
- Д) Червоного кольору
- Е) Білого кольору

44. Найбільш небезпечні отруєння корозивними отрутами виникають при:

*** А) Інгаляційному шляху надходження**

- В) При потраплянні на шкіру
- С) при потраплянні на слизові оболонки ока
- Д) При потраплянні на слизові ротової порожнини
- Е) При потраплянні на слизові оболонки

45. Для отруєння якою токсичною речовиною буде характерним міоз?

- А) Дімедрол
- В) Атропін
- С) Аміназин
- Д) Гашиш
- Е) Кокаїн

*** F) Героїн**

46. Для отруєння якою речовиною буде характерним рум'янець?

*** А) Окис вуглецю**

- В) Сульфід олова
- С) ФОІ

47. Назвіть ознаки, патогномонічні для отруєння барбітуратами у дітей:

*** А) Кома**

В) Ацидозне дихання

С) Брадикардія

Д) набряк легень

48. Назвіть ознаки, патогномонічні для отруєння салицілатами у дітей:

А) Глибокий і спокійний сон

*** В) Ацидозне дихання**

С) Приступи апное

Д) набряк легень

49. Назвіть ознаки, патогномонічні для отруєння опіоїдами у дітей:

А) Артеріальна гіпертензія

В) Ацидозне дихання

*** С) Приступи апное**

50. Назвіть ознаку, патогномонічну для отруєння фосфорорганічними сполуками у дітей:

А) Глибокий і спокійний сон

В) Ацидозне дихання

С) Приступи апное

*** Д) Міофібриляції**

51. Вкажіть тривалість латентного періоду при отруєнні гастроентеротропними отруйними грибами:

*** А) До двох годин**

В) 6-10 годин

52. Вкажіть тривалість латентного періоду при отруєнні гепатонекротропними отруйними грибами:

A) До двох годин

*** B) 6-10 годин**

53. Назвіть симптоми, що вказують на отруєння блідою поганкою:

A) Звуження зіниць

*** B) Жовтяниця**

C) Тахікардія

D) Брадикардія

54. Назвіть симптоми, що вказують на отруєння гастроентеротропними отруйними грибами:

*** A) Гастроентерит**

B) Розширення зіниць

C) Ністагм

D) Брадикардія

55. При важкому передозуванні сірої ртутної мазі показані:

*** A) Унітіол**

B) Форсований діурез

C) Ентеросорбція

D) Проносні

E) Налоксон

56. При отруєнні сірчаною кислотою найбільш ефективно промивання шлунку здійснюється:

*** А) Через зонд холодною водою**

- В) Блювотним способом
- С) Розчином слабкого лугу
- Д) Теплою водою
- Е) Розчином перманганату калія

57. При отруєнні якою речовиною призначається тільки етанол:

*** А) Метанолом**

- В) Етиленгліколем
- С) Ізопропіловим спиртом
- Д) Дихлоретаном

58. Ацетилцистеїн рекомендується в якості антидота при отруєнні:

*** А) Парацетамолом**

- В) Аспірином
- С) Бутадіоном
- Д) Фенобарбіталом

59. Реактиватор холінестерази пралідоксим застосовується при отруєннях:

*** А) Хлорофосом**

- В) Атропіном
- С) Тіурамом
- Д) Прозерином

60. Промивання шлунку через зонд при гострому отруєнні невідомою речовиною рекомендується здійснювати:

- A) Мінеральною водою
- B) Водою, підігрітою до 40 C
- * C) 0, 9% розчином хлориду натрію, підігрітим до 37C**
- D) Слабким розчином перманганату калію

61. Форсований діурез для лікування гострого отруєння проводиться при:

- A) Отруєннях кокаїном
- B) Анурії
- C) Симптомах набряку легень
- * D) Отруєнні фенobarбіталом**

62. Гемодіаліз найбільш ефективний при отруєнні:

- * A) Етиленгліколем**
- B) Метадоном
- C) Чадним газом
- D) Сибазоном

63. Лікування гострого отруєння важкого ступеня починають:

- A) Після якісної ідентифікації токсиканта
- B) Після збору анамнестичних даних
- * C) З негайного відновлення життєво важливих функцій організму**

64. При вдиханні продуктів горіння пластмас пошкоджуючими чинниками можуть бути:

- * A) Тепло**
- B) Метан
- C) Сірководень
- D) Вуглекислий газ

65. Початковими ознаками гострого отруєння дихлоретаном є:

*** А) Гастроентерит**

В) Гостра ниркова недостатність

С) Судомний синдром

66. Флумазеніл є антидотом:

А) Опіоїдів

В) Трициклічних антидепресантів

*** С) Бензодіазепінів**

Д) Фенотіазинів

Е) Барбітуратів

67. При інгаляційних отруєннях чотирехлористими вуглеводнями уражуються:

*** А) Нирки**

В) Наднирники

С) Підшлункова залоза

Д) Серцево-судинна система

68. Стимуляцію бета 2-адренорецепторів викликає:

А) Дроперідол

В) Гепарин

*** С) Сальбутамол**

Д) Анаприлін

69. Колікваційний некроз виникає при отруєнні:

А) Кислотами

*** В) Лугами**

С) Окислювачами

Д) Бензином

70. Зниження тонуся симпатичної нервової системи досягається застосуванням:

A) М-холіноблокаторів

*** В) Альфа-адреноблокаторів**

C) Реактиваторів холінестерази

71. Синільна кислота викликає гіпоксію:

A) Дихальну

B) Циркуляторну

C) Гемічну

*** D) Тканинну**

72. Наркотичні речовини (опіоїди) викликають гіпоксію:

*** A) Дихальну**

B) Циркуляторну

C) Гемічну

D) Тканинну

73. Чадний газ викликає гіпоксію:

A) Дихальну

B) Циркуляторну

*** C) Гемічну**

D) Тканинну

74. Гіпербарична оксигенація ефективна при отруєннях:

*** A) Чадним газом**

B) Оцтовою кислотою

C) Опіоїдами

D) Метиловим спиртом

75. Абсолютним показом для проведення гемодіаліза є:

*** А) Гиперкаліємія**

В) Гіпокаліємія

С) Гіпернатріємія

Д) Гіпомагніємія

76. Абсолютним показом для проведення гемосорбції є важке отруєння:

*** А) Дихлоретаном**

В) Щавлевою кислотою

С) Етанолом

77. Абсолютним протипоказом для проведення гемосорбції є:

А) Брадикардія

В) порушення свідомості

*** С) Наявність неконтролюємої внутрішньої кровотечі**

78. Гемосорбція доцільна при отруєннях:

*** А) ФОІ**

В) Чадним газом

С) Ціаністим калієм

79. Сибазон відноситься до:

А) Фенотіазинів

В) Циклічних антидепресантів

*** С) Бензодіазепінів**

Д) Барбітуратів

80. До бензодіазепінів відносяться:

*** А) Нітразепам**

В) Дроперидол

С) Аміназин

Д) Аспірин

81. До бензодіазепінів відносяться наступні препарати:

А) Амітриптилін

В) Клофелін

С) Фенобарбітал

*** Д) Феназепам**

82. Бензодіазепіни відносяться до:

А) Антидепресантів

В) Аналептиків

С) Нейролептиків

*** Д) Малих транквілізаторів**

Е) Аналептиків

83. Бензодіазепіни застосовуються для лікування з метою:

А) Отруєнь алкоголем

*** В) Неврозоподібних станів**

С) Гіпертонічної хвороби

Д) Стимуляції захисних сил організму

Е) Отруєнь клофеліном

84. Бензодіазепіни викликають:

- A) Анальгетичний ефект
- * B) Нейротоксичний ефект**
- C) Амнезію
- D) Гіперрефлексію
- E) Почуття страху

85. Бензодіазепіни:

- A) Підвищують тонус скелетних м'язів
- * B) Володіють центральною міорелаксуючою дією**
- C) Володіють гепатотоксичною дією
- D) Підвищують тонус гладких м'язів кишечника

86. Прийом етанолу, при передозуванні бензодіазепінів:

- A) Полегшує перебіг передозування
- * B) Посилює наслідки передозування**
- C) Не впливає на клініку інтоксикації
- D) Використовується для лікування інтоксикації бензодіазепінами

87. Комбіноване отруєння бензодіазепінами та фенотіазинами:

- * A) Призводить до виникнення артеріальної гіпотензії**
- B) Супроводжується підвищенням артеріального тиску
- C) Скорочує тривалість коми

88. Комбіноване отруєння бензодіазепінами та фенотіазинами:

- A) Сприяє більш швидкому розвитку коматозного стану
- * B) Посилює пригнічення дихання**
- C) Супроводжується поглибленням та зростання частоти дихання
- D) Скорочує тривалість коматозного стану

89. При отруєнні вератрином виникає:

- A) Порушення свідомості
- B) Тахікардія та гіпертензія
- C) Психомоторне збудження

*** D) Брадикардія та гіпотензія**

90. При отруєнні вератрином призначають:

- A) Клофелін
- B) Унітіол

*** C) Атропін**

91. Протипоказами до призначення форсованого діурезу є:

- A) Гемоліз еритроцитів
- B) Коматозний стан
- C) Психомоторне збудження
- D) Тахікардія

*** E) Гостра ниркова недостатність**

92. Комбіноване отруєння бензодіазепінами та барбітуратами:

*** A) Призводить до зростання артеріальної гіпотензії**

- B) Супроводжується підвищенням артеріального тиску
- C) Скорочує тривалість коми

93. Комбіноване отруєння бензодіазепінами та барбітуратами:

- A) Сприяє більш швидкому виходу з коматозного стану

*** B) Посилює пригнічення дихання**

- C) Супроводжується поглибленням та зростанням частоти дихання
- D) Скорочує тривалість коматозного стану

94. Клофелін належить до:

*** А) Центральних альфа-2-адреностимуляторів**

В) Альфа-2-адреноблокаторів

С) Бета-1-адреноблокаторів

Д) Бета-2-адреностимуляторів

95. Які ознаки метгемоглобінемії:

А) Шкірні покриви гіперемовані, сухі

В) Шкірні покриви бліді, сухі

С) Шкірні покриви бліді, вологі

*** Д) Шкірні покриви ціанотичні, вологі**

96. Клофелін застосовується:

А) Для лікування діабету

В) Для лікування артеріальної гіпотонії

С) Для лікування тиреотоксикозу

*** Д) Для лікування гіпертонічної хвороби**

97. Побічним ефектом клофеліна є:

А) Психомоторне збудження

*** В) Седативна дія**

С) Гіперсалівація

Д) Діарея

Е) Тахікардія

98. При отруєнні саліцилатами використовують:

А) Унітіол

В) Тіосульфат натрію

*** С) Гідрокарбонат натрію**

99. Гостре пероральное отруєння клофеліном зустрічається найчастіше:

А) Як кримінальне

*** В) Як суїцидальне**

С) Після вживання таблеток до їжі

100. Основні фармакологічні ефекти клофеліна:

А) тахікардія

В) Відчуття напруги

С) Гіпертензія

*** D) Гіпотензія**

Е) Підвищення тону м'язів

101. Інтоксикація клофеліном викликає:

*** А) Ортостатичні реакції**

В) Тахікардію

С) Галюцинації

Д) Психомоторне збудження

102. Передозування клофеліна призводить до:

А) Збудження

*** В) Порушення свідомості аж до розвитку коми**

С) Зростання частоти та глибини дихання

Д) Проносу

Е) Жовтяниці

103. Діагноз отруєння клофеліном підтверджується:

А) Мідріазом

В) Артеріальною гіпертензією в поєднанні з тахікардією

С) Психомоторним збудженням і артеріальною гіпертензією

*** D) Визначенням вмісту клофеліну в біосередовищах організму**

104. Лікарські засоби, що застосовуються при лікуванні гострого отруєння клофеліном це:

- * А) Атропін, допамін**
- В) Верапаміл, прозерін
- С) Анаприлін, атропін
- Д) Сибазон, преднізолон

105. Для лікування гострого отруєння клофеліном використовується:

- А) Перітонельний діаліз
- * В) Гемосорбція**
- С) Гемодіаліз
- Д) Лікувальна лімфорез

106. Мідріаз виникає при отруєннях:

- А) Холіноміметиками
- * В) Холінолітиками**
- С) Симпатолітиками

107. При отруєнні протитуберкульозними медикаментами (тубазид) виникають:

- А) Токсична коагулопатія
- В) Збудження
- * С) Судоми**

108. При отруєнні баклофеном виникає:

- * А) Пригнічення дихання**
- В) Артеріальна гіпертензія
- С) М'язевий гіпертонус

109. Гіпоглікемія виникає при отруєннях:

- A) Еуфіліном
- B) Кофеїном
- * C) Пропранолол**
- D) Амітриптиліном

110. До асфіктантів належать:

- A) Чадний газ
- * B) Метан**
- C) Сірководень
- D) Анілін

111. До речовин, що викликають тканинну гіпоксію, належать:

- A) Чадний газ
- B) Метан
- * C) Сірководень**
- D) Анілін

112. При отруєнні борною кислотою виникає:

- A) Гіпертензія
- B) Брадикардія
- C) Гіперволемія
- * D) Гастроентерит**

113. При отруєнні карбаматними пестицидами за антидот використовують :

- A) Реактиватори холінестерази
- B) Тіосульфат натрію
- * C) Атропін**

114. При отруєнні карбаматними пестицидами виникають:

- A) Сухість слизових оболонок
- B) Мідріаз
- C) Тахікардія

*** D) Брадикардія**

115. При отруєнні синтетичними піретроїдами пртипоказані:

- A) Атропін
- B) Вітамін E
- C) Вітамін B6

*** D) Адреналін**

116. При отруєнні хлорорганічними сполуками протипоказані:

- A) Кальцію глюконат
- B) Вітамін B1
- C) Вітамін E

*** D) Інгаляція кисню**

117. До синтетичних піретроїдів належать:

- A) Дихлофос

*** B) Деціс**

- C) Конфідор

118. Прямою нефротоксичною дією володіють:

*** A) Етиленгліколь**

- B) Кокаїн
- C) Морфін

119. До фосфорорганічних сполук належать:

- A) Дихлоретан
- B) Метанол
- * C) Зоман**
- D) Фенвалерат

120. Основний механізм дії фосфорорганічних речовин:

- A) Утворення метгемоглобіна
- B) Блокування цитохромоксидази
- C) Утворення карбоксигемоглобіна
- * D) Блокування ацетилхолінестерази**

121. До реактиваторів холінестерази відносяться

- * A) Алоксим**
- B) Флуназеніл
- C) Галантамін
- D) Фізостигмін

122. Локальнопошкоджуюча і загальнорезорбтивна дія характерна для отруень:

- A) Неорганічними лугами
- * B) Органічними кислотами**
- C) Неорганічними кислотами

123. Опіки тканин травного тракту в поєднанні з газовою емболією судин мозку, серця характерні для отруєння:

- A) Оцтовою кислотою
- B) Метиловим спиртом
- * C) Пероксидом водню**
- * D) Каустичною содою**

124. Ураження зорового нерву виникає при отруєнні:

A) Оцтовою кислотою

*** B) Метиловим спиртом**

C) Етиленгліколем

125. Колікваційний некроз утвориться при дії:

A) Оцтової кислоти

B) Ацетону

C) Метилового спирту

*** D) Нашатирного спирту**

126. Дихлоретан належить до групи:

*** A) Хлорованих вуглеводнів**

B) Фосфорорганічних речовин

C) Високомолекулярних спиртів

D) Неорганічних кислот

127. Антидот похідних кумарину:

A) Протаміну сульфат

*** B) Фітонадіон**

128. Кардіотоксичним ефектом володіють:

*** A) Циклічні антидепресанти**

B) Бензодіазепін

129. Антидот синкумара:

*** A) Фітонадіон**

B) Тіосульфат натрію

130. Глюкагон - це антидот:

- * А) Бета-блокаторів**
- В) Серцевих глікозидів

131. Промивати шлунок потрібно:

- А) Мінеральною водою
- * В) Ізотонічним розчином натрію хлориду**
- С) Гіпертонічним розчином натрію хлориду

132. При отруєнні етиленгліколем внутрішньовенно вводиться розчин:

- А) 30% розчин етанолу
- * В) 5% розчин етанолу**
- С) Сибазону
- Д) Вітаміну В6

133. При передозуванні блокаторів кальцієвих каналів необхідно вводити:

- А) Сульфати
- * В) Кальцію хлорид 10%**
- С) Кофеїн

134. Після отруєння міцними лугами рекомендується:

- А) Промивання шлунку розчином калія перманганату
- В) Промивання шлунку блювотним способом
- С) Промивання шлунку слабкою кислотою
- Д) Шлунок не промивати
- * Е) Промивання шлунку в перші дві години**

135. До опіоїдів належать:

*** А) Налоксон**

В) Сибазон

С) Нембутал

Д) Аміназин

Е) Етанол

136. При отруєнні щавлевою кислотою в перші години виникають:

*** А) Екзотоксичний шок**

В) Метаболічний алкалоз

С) Поліурія

Д) Гіперкаліємія

Е) Гіперкальціємія

137. Медикаменти психотропної дії здебільшого токсично впливають на:

А) Дихальну систему

В) Серцево-судинну систему

С) Печінку

*** Д) ЦНС**

Е) Нирки

138. При отруєнні атропіноподібними речовинами спостерігається:

*** А) Сухість шкіри та слизових оболонок**

В) Вологість шкірних покривів

С) Блідість шкірних покривів

Д) Брадикардія

139. Виникнення повної внутрішньошлуночкової блоди серця у вигляді основного прояву первинного кардіотоксичного ефекту на ЕКГ типово для отруєння:

- A) ФОІ
- B) Аконітіном
- * C) Амїтріптіліном**
- D) Пахікарпіном

140. Чадний газ токсично діє на:

- A) Нирки
- B) Печінку
- * C) ЦНС**
- D) Кишечник

141. Особливості розподілу отрути в організмі: об'єм рідини щодо маси тіла у дітей раннього віку:

- * A) Більш, ніж у дорослих**
- B) Менше, ніж у дорослих

142. При побутових отруєннях найбільш частим шляхом находження отрути є:

- * A) Інгаляційний**
- B) внутрішньовенний
- C) Пероральний

143. Вератрин діє на:

- A) ЦНС
- * B) Серце**
- C) Нирки
- D) Печінку
- E) Кишечник
- F) Щитовидну залозу

144. При отруєнні дихлоретаном спостерігається:

- A) Брадикардія
- B) Звуження зіниць
- C) Закреп
- * D) Шок**
- E) Підвищення АТ
- F) Гіперволемія

145. При отруєнні алкоголем спостерігається:

- A) Сухість слизових оболонок
- * B) Порушення свідомості**
- C) Зупинка серця
- D) Тахікардія

146. Інгаляційні отруєння бензином найчастіше ускладнюються:

- A) Порушенням ритму серця
- * B) токсичним Пульмонітом**
- C) Кровотечами
- D) Ушкодженням печінки

147. При отруєннях фіноптином найчастіше зустрічаються:

- A) Гостра ниркова недостатність
- B) Тахікардія
- * C) Порушення провідності серця**
- D) Кровотеча

148. До гепатотоксичних отрут відносяться:

- A) Сілібінін
- B) Серцеві глікозиди
- * C) Феноли**

149. До нефротоксичних отрут відносяться:

- A) Саліцилати
- B) Анальгін
- C) Хлористий барій
- * D) Важкі метали**
- E) Чадний газ

150. До кардіотоксичних отрут відносяться:

- A) Парацетамол
- * B) Амітриптілін**
- C) Реланіум
- D) Аспірин

151. Органічні сполуки ртуті викликають:

- A) Тахікардію
- * B) порушення слуху**
- C) Закреп
- D) Підвищення АТ
- E) Поліурію

152. При отруєнні оцтовою есенцією розвивається:

- A) Метаболічний алкалоз
- * B) Метаболічний ацидоз**
- C) Респіраторний ацидоз

153. Патогенез екзотоксичного шоку при отруєнні дихлоретаном обумовлений:

- A) Больовим чинником
- * B) Абсолютною гіповолемією**
- C) Метаболічним алкалоз
- D) Токсичною коагулопатією

154. Чи є протипокази до промивання шлунку зондовим методом при отруєнні середнього ступеню важкості:

- * A) Протипоказань немає**
- B) коматозний стан
- C) Опік травного тракту
- D) Похилий і старечий вік
- E) Відмова хворого від промивання шлунку

155. Токсини блідої поганки:

- A) Нейротоксичні
- * B) Гепатонекротоксичні**
- C) Ототоксичні

156. Отруєння мухомором характеризується:

- * A) Нейротропною дією**
- B) Гастроентеротропною дією

157. Атропін - це:

- A) Н - холіноблокатор
- * B) М - холіноблокатор**
- C) бета - адреноміметик

158. Для отруєння камфорою характерні:

- A) Поліурія
- B) Дерпесія
- C) Кровотеча
- * D) Судоми**

159. Отруєння аспірином призводять до виникнення:

- A) Ерозії шлунку
- B) Гіпервентиляції
- C) Гіповентиляції
- * D) Метаболічного ацидозу**

160. При отруєнні аніліном в крові утворюється:

- A) Карбоксігемоглобін
- * B) Метгемоглобін**
- C) Ціаногемоглобін

161. За механізмом "летального синтезу" відбувається отруєння:

- A) Барбітуратами
- * B) Метанолом**
- C) Аспірином

162. Швидкість всмоктування отрути з шлунку:

- * А) Вище при вживанні натщесерце**
- В) Вище при наповненому шлунку
- С) Не залежить від наповнення шлунку

163. Для нікотиноподібного ефекту ФОІ характерними є наступні симптоми:

- А) Мідріаз
- В) Зниження перистальтики кишечника
- С) Сухість слизових оболонок
- Д) Тахікардія
- * Е) Бронхорея**

164. Вкажіть медикаментозний препарат, який використовують для надання допомоги при отруєнні калію перманганатом:

- * А) Вітамін С**
- В) Атропін
- С) Діпіроксин

165. Вкажіть антидот для надання допомоги при отруєнні нейротропними грибами (наявність холінергічного синдрому):

- А) Морфін
- В) Галантамін
- * С) Атропін**

166. Яка доза бензину, прийнята всередину, може викликати важке отруєння у дорослих?

- А) 5-10 мл
- * В) 120-150 мл**
- С) 0, 1 мл\кг

167. Для якої отрути антидотом є налоксон?

- A) Барбітурати
- * B) Фентаніл**
- C) Важкі метали
- D) Атропін

168. Для якої отрути антидотом є унітіол?

- A) Барбітурати
- B) Метадон
- * C) Свинець**
- D) ФОІ
- E) Ізопропіловий спирт

169. Для якої отрути антидотом є дипіроксим?

- A) Барбітурати
- B) Опіюїди
- C) Талій
- * D) ФОІ**

170. Для якої отрути антидотом є фізостигмін?

- A) Барбітурати
- B) Етиленгліколь, метиловий спирт
- C) Гепарин
- * D) Атропін**

171. Для якої отрути антидотом є протаміну сульфат?

- A) ФОІ
- B) Метиловий спирт
- * C) Гепарин**
- D) Атропіна сульфат

172. Для якої отрути антидотом є етиловий спирт?

A) ФОІ

*** В) Етиленгліколь**

C) Гепарин

D) Пахікарпину гідройодид

173. При отруєнні якими речовинами відбувається гостре порушення зору?

A) Фтивазид

*** В) Метиловий спирт**

C) Ізопропіловий спирт

D) Барбітурати

E) Морфін

174. При отруєнні якою речовиною виникають судоми?

*** А) Гідразин**

B) Метиловий спирт

C) Саліцилати

175. Назвіть препарат, що використовуються при наданні допомоги при отруєнні серцевими глікозидами:

*** А) Атропін**

B) Нітросорбід

176. Назвіть антидот, що використовується при отруєнні трициклічними антидепресантами?

A) Флумазеніл

*** В) Гідрокарбонат натрію**

177. Яка кількість рідини вводиться одномоментно для промивання шлунку у дорослих?

- A) 1 мл/кг маси тіла
- * B) 5 мл/кг маси тіла**
- C) 15 мл/кг маси тіла

178. Яка кількість рідини вводиться одномоментно для промивання шлунку у дітей?

- * A) 0,1 мл/кг маси тіла**
- * B) 4 мл/кг маси тіла**
- C) 10 мл/кг маси тіла

179. Чим можна промивати шлунок при отруєнні міцними кислотами?

- * A) Холодною водою**
- B) Розчином калія перманганату
- C) Гідрокарбонатом натрію

180. Вкажіть середню дозу атропіну, що застосовується на догоспітальному етапі у хворих з важким отруєнням ФОІ (II стадія)?

- A) 1 мл
- * B) 2-4 мл**
- C) 10-12 мл

181. Назвіть антиидот, що використовується при отруєнні метопрололом:

- A) Дігоксинспецифічні Fab-антитіла
- * B) Глюкагон**
- C) Кальцію глюконат

182. Чи можна давати пити пацієнту молоко при отруєнні дихлоретаном?

A) Так

*** B) Ні**

C) Після промивання шлунка

183. При отруєнні грибами потрібно:

A) Випити вазелінове масло

B) Випити 30% розчин етилового спирту

C) Випити активоване вугілля

*** D) Промити шлунок з подальшим введенням активованого вугілля**

E) Призначити гепарин

184. При отруєнні ФОІ середньої важкості дипіроксим призначають:

*** A) 1 мл 3 рази на добу**

B) 5 мл 5 разів на добу

C) 5 мл 10 разів на добу

185. При отруєнні кислотами для промивання шлунку протипоказане застосування:

A) Молока

*** B) Лугів**

C) Води

186. При отруєнні амфетамінами виникає:

*** A) Збудження**

B) Гіпотонія

C) Гіпотермія

D) Брадикардія

187. У хворого набряк слизової ротової порожнини, порушення ковтання, осиплість голосу, блідість шкірних покривів, тахікардія, зниження АТ, відсутність сечі. Назвіть токсичну речовину, що призвела до отруєння:

A) Опіоїди

*** B) Кислота**

C) Амфетаміни

D) Парацетамол

188. У хворого відсутня свідомість, акроціаноз, міоз, брадикардія. Назвіть токсичну речовину, що призвела до отруєння:

A) Амфетаміни

B) Парацетамол

*** C) Опіоїди**

D) Гриби

189. Хворий після сварки з рідними знайдений без свідомості з генералізованими судомами. Раніше судом не було. Назвіть токсичну речовину, що призвела до отруєння:

A) Опіоїди

B) Амфетаміни

C) Барбітурати

*** D) Протитуберкульозні препарати**

190. У хворого з гострим отруєнням кокаїном виникає:

A) Депресія

B) Брадикардія

*** C) Гіпертензія**

191. Всмоктування токсичних речовин при пероральних отруєннях відбувається у:

- A) Ротовій порожнині
- * B) Тонкій кишці**
- C) Товстій кишці
- D) Прямій кишці

192. Ураження печінки та нирок при отруєнні блідою поганкою виникає внаслідок дії:

- A) Мускарину
- * B) Аманітотоксинів**
- C) Гірометрину
- D) Мускаридину

193. Мідріаз виникає при отруєнні:

- A) Клонідіном
- B) ФОІ
- * C) Атропіном**
- D) Барбітуратами

194. Під час вагітності токсичність отрути:

- * A) Підвищується**
- B) Знижується
- C) Не змінюється

195. Під час менструації токсичність отрути:

- * A) Підвищується**
- B) Знижується
- C) Не змінюється

196. До гіпоксичного впливу отрути більш чутливі:

A) Діти

B) Підлітки

*** C) Люди похилого віку**

197. Бронхоспазм виникає при отруєннях:

A) Чадним газом

B) Нітратами

*** C) Бета-адреноблокаторами**

198. Під впливом наркотичних речовин потреба мозку в кисні:

*** A) Знижується**

B) Підвищується

C) Не змінюється

199. В умовах гіпоксії в мозковій тканині переважає шлях метаболізму:

A) Аеробний

*** B) Анаеробний**

200. При гіпоксії в мозковій тканині розвивається:

*** A) Ацидоз**

B) Алкалоз

201. Отруєння хініном виявляється переважною дією отрути на:

A) Зір

B) Печінку

*** C) Серце**

D) Сечостатеву систему

202. Зі слів хворого, після прийому 30 таблеток фенобарбіталу минуло 4 години. Хворий знаходиться в повній свідомості. Чи можливий розвиток симптомів отруєння в наступному?

A) Можливий

*** B) Нemoжливий**

203. При отруєнні нітратами виникає:

*** A) Гемічна гіпоксія**

B) Гістотоксична гіпоксія

C) Циркуляторна гіпоксія

204. При отруєнні ФОІ виникає:

A) Гістотоксична гіпоксія

*** B) Змішана гіпоксія**

C) Гемічна гіпоксія

205. При отруєннях судомними отрутами (стрихнін, ізоніазид і ін.) введення аналептиків:

A) Показане

*** B) Протипоказане**

206. При розвитку антихолінергічного синдрому, при отруєнні атропіноподібними речовинами, найбільш показане введення:

A) Аміназину

*** B) Фізостигміну**

C) Атропіна сульфату

D) Дімедролу

207. Під час галюцинаторного періоду алкогольного делірія у хворих в крові значно підвищується рівень:

- A) Атропіну
- B) Холестерину
- C) Алкогольдегідрогенази

*** D) Дофаміну**

208. Лікування токсичного набряку мозку в першу чергу повинно бути спрямоване на:

- A) Підвищення АТ

*** B) Зниження внутрішньочерепного тиску**

- C) Зниження рівня глюкози крові
- D) Підвищення артеріального тиску

209. Час дії антидоту:

- A) Дорівнює часу дії отрути

*** B) Менше часу дії отрути**

- C) Перевищує час дії отрути
- D) Залежить від шляху надходження отрути

210. Специфічна дія отрути характерна для:

- A) Соматогенної фази отруєння

*** B) Токсикогенної фази отруєння**

211. Відносна гіповолемія як основний чинник розвитку екзотичного шоку виникає при отруєннях:

*** A) ФОІ**

- B) Окислювачами
- C) Кислотами
- D) Опіоїдами

212. Призначення сибазону протипоказано при отруєннях:

- A) Фосфорорганічними інсектицидами
- * B) Бензодіазепінами**
- C) Барбітуратами
- D) Парацетамолом

213. При гострому інгаляційному отруєнні хлорованими вуглеводнями перша допомога полягає в проведенні вищеперерахованих лікувальних заходів:

- A) Інгаляція кисню та промивання шлунку
- B) Призначення рослинної олії після промивання шлунку
- C) Інгаляція кисню та введення хромосмона
- * D) Інгаляція кисню та введення ацетилцистеїна**

214. При гострому отруєнні дихлоретаном в гострому періоді найбільш доцільно застосовувати наступні методи штучної детоксикації:

- A) Гемосорбцію
- * B) Поєднання гемосорбції з гемодіалізом**
- C) Гемодіаліз
- D) Перитонеальний діаліз

215. Найбільш характерні симптоми при отруєнні марихуаною:

- A) Затримка сечі
- B) Гіпотензія
- * C) галюцинації**
- D) Гіпертензія
- E) Порушення дихання

216. При значному передозуванні парацетамолу показане:

- * A) Пероральне призначення ацетилцистеїна**
- B) Пероральне призначення пеніциламіна

217. Після отруєння блідою поганкою хворому необхідно вводити:

*** А) Бензилляліцілін 1млн. ОД/кг на добу**

В) Етанол 1г/кг маси тіла

218. Для лікування отруєння блідою поганкою рекомендується:

*** А) Сілібінін**

В) Піридоксин

219. Антидот етанолу:

*** А) Не існує**

В) Тіосульфат натрію

220. Налоксон - це:

*** А) Специфічний антидот опіоїдів**

В) Неспецифічний антидот опіоїдів

221. Фізостигмін - це:

А) Специфічний антидот опіоїдів

*** В) Специфічний антидот атропіну**

222. Амлінітрит - це:

*** А) Специфічний антидот ціанідів**

В) Неспецифічний антидот опіоїдів

223. Тіосульфат натрію використовується як антидот при отруєнні:

А) Бензодіазепінами

*** В) Ціанідами**

С) Сульфаніламидами

Д) Чадним газом

224. Засобом вибору при лікуванні важкого отруєння чадним газом є:

*** А) Оксигенобаротерапія**

В) Піридоксин

225. До реактиваторів холинестерази відносяться:

А) Атропін

*** В) Діпироксим**

226. При отруєнні чадним газом виникає:

А) Гіпоксична гіпоксія

В) Гемодинамічна гіпоксія

*** С) Гемічна гіпоксія**

Д) Гістотоксична гіпоксія

227. При порушенні прохідності дихальних шляхів, а також низькому парціальному тиску кисня у вдихаємому повітрі розвивається:

*** А) Гіпоксична гіпоксія**

В) Гемодинамічна гіпоксія

С) Гемічна гіпоксія

Д) Гістотоксична гіпоксія

228. При отруєнні ціанідами розвивається:

А) Гемодинамічна гіпоксія

В) Гемічна гіпоксія

*** С) Гістотоксична гіпоксія (тканинна)**

229. При пероральному отруєнні метгемоглобіноутворювачами показані:

*** А) Промивання шлунку**

В) Пульсоксименрія

С) призначення манітолу

230. Для отруєння блідою поганкою характерні:

- A) Ураження серцево-судинної системи
- B) Латентний період до 2 годин
- C) Латентний період до 4 годин
- * D) Латентний період більше 6 годин**
- E) Ушкодження легень

231. Ушкодження печінки і нирок, при отруєнні блідою поганкою, відбувається за рахунок впливу на них:

- A) Ендорфінів
- * B) Аманітотоксинів**
- C) Псилоцибіну

232. Для лікування гострих отруєнь блідою поганкою показані наступні лікувальні заходи:

- A) Введення унітіолу
- * B) Введення антидотів**
- C) Введення гепарину
- D) Введення етилового спирту

233. При гострому отруєнні сурогатами алкоголю показано:

- A) Проведення регулярних біохімічних досліджень, що характеризують функцію печінки і нирок
- B) Введення 5% розчину глюкози
- * C) Забезпечення прохідності дихальних шляхів**
- D) Лікування атропіном

234. Після укусу гадюки найчастіше може виникнути:

- * А) Набряк, крововилив і запалення в місці укусу**
- В) Зупинка дихання
- С) Миготлива аритмія

235. Надання допомоги після укусу змії включає:

- А) Накладання джгута
- * В) Проведення заходів, що зменшують адсорбцію отрути**
- С) Введення діпіроксима

236. Після укусу змії хворому виконується:

- А) Накладання джгута вище місця укусу
- * В) Імобілізація кінцівки**
- С) Лампасні розрізи

237. Гостре отруєння сурогатами алкоголю включає отруєння перерахованими токсичними речовинами:

- * А) Денатуратом**
- В) Дихлоретаном
- С) Карбофосом

238. Хворий протягом 7 діб змащував поверхню шкіри з лікувальною метою сірою ртутною маззю. Витрачено її 200 г. Вкажіть, що з нижченаведених синдромів найбільш вірогідне при зверненні до лікаря:

- А) кардіоміопатія
- * В) Токсико-алергічний дерматит**
- С) Клоніко-тонічні судоми
- Д) Гостра дихальна недостатність

239. Антидотна терапія при отруєннях неорганічними сполуками ртуті здійснюється:

- A) Налоксоном
- * B) Унітіолом**
- C) Фомепізолом
- D) Десфералом

240. Сполуки важких металів при надходженні до організму людини призводять до:

- * A) Блокування сульфгідрильних тілових груп (SH) білків-ферментів**
- B) Блокування холінестерази
- C) Метгемоглобінемії

241. Гостре отруєння органічними сполуками свинця виявляється нижченаведеними ознаками:

- * A) Ураження шлунково-кишкового тракту**
- B) Ураження серцево-судинної системи
- C) Алопецією
- D) ураження наднирників

242. В ранньому періоді токсикогенної стадії гострого перорального отруєння сполуками важких металів найбільш показане наступне лікування:

- * A) Промивання шлунку з розчином унітіолу**
- B) Касторове або вазелінове масло після промивання шлунку
- C) Атропін
- D) Інгаляція 100% кисню

243. Клінічна картина гострого отруєння найбільш швидко розвивається при надходженні отрути до організму людини:

- A) Перорально
- B) Інгаляційно
- * C) Парентерально**
- D) Контактно

244. При отруєнні калію перманганатом рекомендується:

- A) Пити молоко
- B) Ввести анальгетики
- C) Ввести гепарин
- * D) Обробити уражені ділянки аскорбіною кислотою**

245. При отруєнні борною кислотою для лікування використовують:

- * A) Форсований діурез**
- B) Манітол
- C) Рибофлавін
- D) Метиленовій синій

246. Форсований діурез показаний при отруєнні:

- * A) Алкоголем**
- B) Лепонексом
- C) Лібриумом
- D) Дігосимом

247. При пероральному отруєнні кислотами уражується:

- * A) Шлунок**
- B) Печінка
- C) Наднирники
- D) Товстий кишечник

248. Промивання шлунку при гострому пероральному отруєнні стимулюванням блювання протипоказане :

- A) При отруєнні грибам гастро-ентеротропної дії
- B) При отруєнні барбітуратами легкого ступеня

*** C) При отруєнні сірчаною кислотою**

249. Промивання шлунку у хворого в свідомості, після перорального отруєння, стимулюванням блювання показане:

*** A) При отруєнні парацетамолом**

- B) Перекисом водню
- C) Сірчаною кислотою
- D) Бензином

250. Сибазон в великих дозах викликає:

*** A) Порушення дихання**

- B) Брадикардія
- C) Галюцинаторний синдром
- D) Збудження

251. При лікуванні отруєння етиленгліколем /антифризом/ внутрішньовенно вводиться:

*** A) 5% розчин етанолу**

- B) 30% розчин етанолу
- C) 10% розчин тетрацикла кальцію
- D) 40% розчин глюкози
- E) 25% розчин сірчанокислої магнезії

252. При гострому отруєнні важкого ступеня, на місці випадку, хворому необхідно:

*** А) Нормалізувати дихання і функцію серцево-судинної системи**

- В) Не починати лікування до ідентифікації токсиканта
- С) Внутрішньовенно ввести фуросемід
- Д) Ввести бемегрид
- Е) Промити шлунок за допомогою стимулювання блювання

253. Клінічна картина гострого перорального отруєння ФОІ зумовлена:

*** А) Блокування холінергаз**

- В) блокування ацетилхоліну
- С) Первинним пригніченням дихального центру

254. Токсична дія етиленгліколя зумовлена:

А) Ефектом самого етиленгліколя

*** В) Метаболітами етиленгліколя**

- С) Метаболічним алколомом
- Д) Гіпокаліємією
- Е) Гіпомагніємією

255. Пацієнт 19 років доставлений до приймального відділення лікарні в важкому стані. Свідомість порушена, ейфорія, гіпотензія, міадріаз, брадикардія. Яка токсична речовина викликала такий стан:

- А) Бензодіазепіни
- В) Алкоголь

*** С) Гама-гідроксибутірат**

Д) Опіоїди

256. Найбільш ефективні для лікування дихальних порушень при отруєнні барбітуратами:

- A) Кордіамін
- B) Коразол
- C) БемеGRID

*** D) Кисень**

257. При отруєнні алкоголем зіниці :

- A) Розширені

*** B) Звужені**

- C) Широкі, не реагуючі на світло

258. Найбільш частим ускладненням гострого отруєння барбітуратами є:

*** A) Гіпостатична пневмонія**

- B) Зупинка дихання
- C) набряк легень
- D) ГНН

259. Міокардіальні ефекти передозування дігіталіса усуваються застосуванням:

- A) Анаприліна

*** B) Хлориду калію**

- C) Клофеліна
- D) Хлорида кальцію

260. Жінка 34 років була доставлена в приймальне відділення через 2 години після прийому 3 г етамінала-натрію. Які клінічні прояви найбільш вірогідні у цьому випадку?

- A) Брадикардія

*** B) Порушення дихання**

- C) Гіпертермія