

ЗАВАНТАЖЕНО З САЙТУ ТЕСТУВАННЯ.УКР

Методи дослідження функцій органів травлення

Категорія: **Гастроентерологія**

Кількість запитань: **20**

1. Який з перерахованих методів визначення кислотності шлункового вмісту дозволяє судити не тільки про концентрацію іонів водню, а й про дебіт продукції хлористоводневої кислоти

- A) Аналіз сечі на ацидотест
- B) Аналіз сечі на уропепсин
- C) Внутрішньошлункова рН-метрія

*** D) Фракційне дослідження шлункового вмісту**

- E) Одномоментний забір шлункового вмісту товстим зондом

2. Визначення рН шлунка при проведенні традиційної внутрішньошлункової рН-метрії проводять:

*** A) В тілі шлунка**

- B) В кардіальному відділі шлунка

*** C) В антральному відділі шлунка**

3. До стимуляторів шлункової секреції відноситься:

*** A) Гістамін**

*** B) Еуфілін**

*** C) Пентагастрин**

*** D) М'ясний пептон**

- E) Вітамін E

4. Основним ферментом шлункового соку є:

- A) Внутрішній фактор Кастла

- B) Соляна кислота

- C) Молочна кислота

*** D) Пепсин**

5. Виявлення в шлунковому соці молочної кислоти має значення для діагностики:

- A) Хронічного гастриту зі збереженою секреторною функцією шлунка
- B) Хронічного гастриту з підвищеною кислотоутворюючою функцією шлунка
- * C) Раку шлунка**

6. Для виявлення H.pylori проводять:

- * A) Визначення уреазної активності біоптата слизової оболонки**
- * B) Гістоморфологічний контроль з використанням біоптатів слизової оболонки антрального відділу шлунка**
- * C) Визначення фекального антигена бактерії "H.pylori Stool antigen test"**
- D) Фракційне дослідження шлункового соку
- * E) Уреазний дихальний тест з ¹³C сечовиною**

7. До абсолютних протипоказів для проведення ФЕГДС відносяться:

- * A) Опіки стравоходу**
- * B) Інфаркт міокарда**
- * C) Інсульт**
- * D) Гострий вірусний гепатит**
- E) Кила стравохідного отвору діафрагми

8. Наявність жовчі в шлунку найбільш характерна для:

- A) Здорових людей
- * B) Дуодено-гастрального рефлюксу**
- C) Жовчокам"яної хвороби

9. Ексфоліативна цитологія застосовується при наступних станах:

- A) При підвищеній кислотності
- B) При нормальній кислотності
- C) У здорових людей
- D) При зниженій кислотності

*** E) При повній відсутності соляної кислоти в шлунку**

10. Ексфоліативна цитологія застосовується для виявлення:

- A) Початкових стадій виразкової хвороби
- B) Хронічного ахилічного гастриту

*** C) Початкових стадій раку шлунка**

- D) Рефлюкс-езофагиту
- E) Наявності гелікобактер пілорі

11. Для дослідження моторно-евакуаторної функції шлунка застосовують:

- A) Ультразвукове дослідження органів черевної порожнини

*** B) Балонну кімографію**

*** C) Електрогастрографію**

*** D) Рентгенологічне дослідження шлунка**

12. Рентгенологічний метод дослідження не дозволяє визначити:

- A) Форму і розміри шлунка

*** B) Ерозії шлунка**

- C) Виразку шлунка
- D) Пухлину шлунка
- E) Моторно-евакуаторну функцію шлунка

13. При гастроскопії нормальної слизової оболонки шлунка:

- * А) Задня стінка має великі складки і борозни**
- * В) Передня стінка блискуча, при роздуванні повітрям гладенька**
- * С) Антральний відділ перистальтує**
- Д) Фатерів пиптик закритий

14. Морфологічні дослідження слизової оболонки тіла шлунка застосовують для діагностики

- * А) Раку шлунка**
- * В) Хронічного атрофічного гастриту**
- * С) Поліпозу шлунка**
- * D) Хвороби Менетріє**
- Е) Кили стравохідного отвору діафрагми

15. Біоптат слизової оболонки шлунка може бути застосований для:

- * А) Гісто-морфологічного дослідження**
- * В) Гістоензимологічного дослідження**
- * С) Бактеріологічного дослідження**
- * D) Електронномікроскопічного дослідження**
- Е) Дослідження кислотопродукуючої функції шлунка

16. Діагностичний тест, що не відображує мезенхімально-запальний синдром:

- А) Визначення гамма-глобуліну сироватки крові
- В) Тимолова проба
- * С) Визначення активності лужної фосфатази**
- Д) Визначення імуноглобулінів сироватки крові

17. До індикаторів порто-кавальної енцефалопатії не відноситься:

- A) Аміак
- B) Феноли
- C) Ароматичні амінокислоти: тирозин, фенілаланін, триптофан

*** D) Лужна фосфатаза**

18. Індикатор регенерації та пухлинного росту печінки - це:

- A) Альбумін сироватки крові

*** B) Альфа-фетопротейн сироватки крові**

- C) Альфа-I-глобулін
- D) Бета-глобулін
- E) Гамма-глобулін

19. Після провокаційного тесту з навантаженням гліадином при глютенівій ентеропатії:

- A) Збільшується рівень глюкози в крові

*** B) Вміст глютаміна в крові підвищується більш, ніж на 50% по відношенню до початкового**

- C) Вміст глютаміна в крові падає
- D) Збільшується рівень холестерину крові
- E) Знижується рівень холестерину крові

20. Хвора Л. страждає на безпліддя. При більш детальному опитуванні вона поскаржилась на наявність діареї, поліфекалії, слабкості. Лікар запідозрив целіакію. Цей діагноз можуть підтвердити наступні обстеження:

*** A) Визначення антитіл до гліадину**

*** B) Визначення антитіл до тканинної трансглютамінази**

*** C) Визначення антиендомізіальних антитіл**

- D) Визначення антитіл до H.pylori

*** E) Морфологічне дослідження слизової оболонки позацибулинного відділу 12-палої кишки до та після прийому аглутенової дієти**