

ЗАВАНТАЖЕНО З САЙТУ ТЕСТУВАННЯ.УКР

Пухлинні захворювання органів травлення

Категорія: **Гастроентерологія**

Кількість запитань: **61**

1. Вкажіть правильне тлумачення I стадії онкологічного захворювання:

*** А) Пухлина, яка не розповсюджується за межі слизової оболонки**

В) Пухлина до 3 см у діаметрі, без метастазів

С) Рак "in situ"

Д) Пухлина будь-якого розміру без метастазів

Е) Передракове захворювання

2. Вкажіть правильне тлумачення II стадії онкологічного захворювання:

А) Пухлина до 3 см у діаметрі, без метастазів

*** В) Пухлина до 3 см у діаметрі, або яка проростає в підслизову оболонку**

С) Пухлина до 3 см у діаметрі із метастазами в регіонарні лімфатичні вузли

Д) Пухлина до 5 см у діаметрі без метастазів

Е) Пухлина до 5 см у діаметрі, або яка не проростає серозної оболонки

Ф) Пухлина до 5 см у діаметрі із метастазами в регіонарні лімфатичні вузли

3. Вкажіть правильне тлумачення III стадії онкологічного захворювання:

А) Пухлина до 5 см у діаметрі, яка не розповсюджується на навколишні тканини

*** В) Пухлина до 5 см у діаметрі із метастазами в регіонарні лімфатичні вузли**

С) Пухлина до 7 см у діаметрі, яка не розповсюджується на навколишні тканини

Д) Пухлина до 5 см у діаметрі, без метастазів

Е) Пухлина до 7 см у діаметрі, без метастазів

4. Вкажіть правильне тлумачення IV стадії онкологічного захворювання:

*** А) Пухлина, що має віддалені метастази або не може бути видалена шляхом операції**

В) Пухлина, що проростає в сусідні органи

С) Пухлина, що підлягає комбінованому лікуванню

Д) Пухлина, що підлягає симптоматичному лікуванню

5. Основні ендоскопічні ознаки поліповидної форми раку шлунка:

А) Пухлина з екзофітним ростом, розмірами 2-4 см біля основи, вкрита незміненою еластичною слизовою оболонкою, верхівка пухлини з виразками, вкрита некротичними тканинами

*** В) Пухлина з екзофітним ростом сірувато-жовтого кольору з широкою основою циліндричної або півкруглої форми, поверхня з виразками, вкрита брудно-сірими нашаруваннями**

6. Найхарактерніші ендоскопічні ознаки інфільтративно-виразкового раку шлунку:

*** А) Виразка на фоні ракової інфільтрації стінки шлунка, зі з'їденими нерівними краями і горбистим дном та відсутність перистальтики**

В) Виразка діаметром приблизно 4 см, з рівними чіткими краями, часто з наявністю тромбів у виразковому кратері

7. Ендоскопічна характеристика інфільтративного раку шлунка:

А) Наявність ділянки гіперемованої набряклої слизової з ерозуванням та поверхневими виразкуваннями

В) Наявність згрубілих шнуровидних складок з подушковидними потовщеннями

*** С) Шлунок з застиглим рельєфом, погано роздувається, перистальтика відсутня, при інструментальній пальпації стінки ригідні**

8. Малігнізовані поліпи відносять до:

*** А) Поверхневих раків**

В) Передракових станів

С) Неепітеліальних пухлин

9. Головні ендоскопічні ознаки поліпоїдного (0-I p,s тип) поверхневого раку шлунка:

А) Утвір у формі півкулі, що випинається над рівнем слизової з гладкою поверхнею

*** В) Поліповидний утвір на широкій основі або на короткій ніжці, здебільшого з виразкуванням і крововиливами на верхівці**

10. Не поліпоїдний тип поверхневого рака шлунку ділиться на:

A) Два підтипи

B) Три підтипи

*** C) Чотири підтипи**

11. До підтипу 0-IIa (припіднятого) поверхневого рака шлунку належить:

A) Утвір на рівні слизової, який має вигляд ущільненої ділянки слизової круглої форми з згладженим рельєфом, ригідний при інструментальній пальпації

*** B) Утвір, який має вигляд ділянки неправильної форми, яка дещо випнута над рівнем оточуючої слизової і має дрібнозернисту поверхню**

12. Злоякісні епітеліальні пухлини стравоходу:

A) Ангіосаркома

B) Лімфосаркома

*** C) Рак стравоходу**

13. Вкажіть правильне позначення за допомогою символів TNM пухлини стравоходу 1 см у діаметрі, яка проростає м'язову оболонку, без метастазів:

A) T0N1M0

B) T1N0M0

*** C) T2N0M0**

D) T3N0M0

E) T4N0M0

F) T1NXMX

14. Вкажіть правильне позначення за допомогою символів TNM пухлини стравоходу, яка викликає циркулярне його звуження на протязі 5 см, без метастазів:

A) T1N0M0

B) T2N0M0

*** C) T3N0M0**

D) T4N0M0

E) T1N1M0

F) T2N1M0

15. Вкажіть правильне позначення за допомогою символів TNM пухлини стравоходу, яка викликає його циркулярне звуження на протязі 5 см, із метастазами в регіонарні лімфатичні вузли:

A) T1N1M0

B) T2N1M0

C) T2N2M0

*** D) T3N1M0**

E) T3N2M1

F) T3NXMX

16. Вкажіть правильне позначення за допомогою символів TNM пухлини стравоходу, яка викликає його циркулярне звуження на протязі 5 см, і має віддалені метастази:

A) T2N0M0

B) T2N1M1

C) T3N1M1

*** D) T3NxM1**

E) T4N1M1

17. Вкажіть правильне позначення за допомогою символів TNM пухлини, яка вражає на протязі 5 см кардіальний відділ шлунка й абдомінальний відділ стравоходу, без метастазів:

- A) T2N0M0
- B) N2N1M0
- C) T2N1M1
- * D) T3N0M0**
- E) T3N1M0
- F) T3NxMx

18. Вкажіть правильне позначення за допомогою символів TNM пухлини кардіального відділу шлунка 5 см в діаметрі, яка переходить на стравохід із метастазами в регіонарні лімфатичні вузли:

- A) T2N1M1
- B) T2N2M0
- C) T2N2Mx
- * D) T3N1M0**
- E) T3N2M0
- F) T4N1M0

19. Вкажіть правильне позначення за допомогою символів TNM пухлини кардіального відділу шлунка, яка переходить на стравохід, проростає у ліву частку печінки, без метастазів:

- A) T3N0M0
- B) T3N1M0
- C) T3N0M1
- * D) T4N0M0**
- E) T4NxMx
- F) T4N1M1

20. Вкажіть правильне позначення за допомогою символів TNM пухлини шлунка діаметром менше 1 см, яка не проростає його серозної оболонки:

*** A) T1N0M0**

B) T1NxMx

C) T1N1M0

D) T2N0M0

E) T2N1M1

21. Вкажіть правильне позначення за допомогою символів TNM пухлини шлунка діаметром 6 см, яка проростає серозну оболонку, без метастазів:

A) T2N0M0

*** B) T3N0M0**

C) T4N0M0

D) T4NxMx

22. Вкажіть правильне позначення за допомогою символів TNM пухлини шлунка діаметром 6 см, яка проростає в підшлункову залозу, без метастазів:

A) T2N1M0

B) T3N0M0

C) T3NxMx

*** D) T4N0M0**

E) T4N0M0

23. Вкажіть правильне позначення за допомогою символів TNM пухлини шлунка діаметром 6 см із метастазами в лімфатичні вузли біля лівої шлункової артерії:

A) T2N1M0

*** B) T3N1M0**

C) T3N0M1

D) T3N1M1

24. При якому розмірі поліпа шлунка різко зростає ймовірність його малігнізації:

A) Понад 0,5 см

B) Понад 1 см

*** C) Понад 2 см**

*** D) Понад 5 см**

E) Кореляції з розміром немає

25. Злоякісна пухлина стравоходу за МКХ-10 позначається шифром:

A) 150

*** B) C-15**

26. Злоякісна пухлина шлунка за МКХ-10 позначається шифром:

A) 151

*** B) C-16**

27. Злоякісна пухлина тонкої кишки за МКХ-10 позначається шифром:

A) 170

*** B) C-17**

28. Злоякісна пухлина ободової кишки за МКХ-10 позначається шифром:

A) 180

*** B) C-18**

29. Рак якої локалізації займає в Україні серед усіх 1 місце?

A) Рак шлунка

B) Рак товстої кишки

*** C) Рак легенів**

30. Який рак означає символ г (мала літера) за міжнародною класифікацією?

- A) Резидуальний
- * В) Рецидивний**
- C) Розповсюджений

31. Який рак означає символ R (велика літера) за міжнародною класифікацією?

- * А) Резидуальний (пухлина, яка залишилась після лікування)**
- B) Рецидивний
- C) Розповсюджений

32. Термін облігатний передрак означає:

- * А) Хронічне захворювання, яке обов'язково у 100% перейде в рак, якщо не провести своєчасно спеціальне лікування**
- B) Хронічне захворювання, що може перейти в рак, якщо не провести протизапального лікування
- C) Хронічне захворювання, яке деколи трансформується в рак

33. Що означає символ G для ракових пухлин за міжнародною класифікацією TNM?

- A) Загальні зміни
- * В) Ступінь патоморфологічної диференціації пухлини**
- C) Генералізацію ракового процесу

34. Що означає символ G1 для ракових пухлин за міжнародною класифікацією TNM?

- * А) Високий ступінь диференціації**
- B) Середній ступінь диференціації
- C) Низький ступінь диференціації

35. Що означає символ G4 для ракових пухлин за міжнародною класифікацією TNM?

- A) Високий ступінь диференціації
- B) Середній ступінь диференціації
- * C) Низький ступінь диференціації**

36. Що означає символ G3 для ракових пухлин за міжнародною класифікацією TNM?

- A) Високу ступінь диференціації
- * B) Середню ступінь диференціації**
- C) Низький ступінь диференціації

37. Що означає символ N0 за міжнародною класифікацією TNM?

- A) Наявність незбільшених лімфатичних вузлів
- B) Нормальне клітинне структурне співвідношення окремих зон лімфатичних вузлів (кортикальної, паракортикальної, центральної) зон росту
- C) Наявність у лімфатичних вузлах вираженої гіперплазії
- * D) Відсутність метастазів в лімфатичних вузлах**

38. У випадку множинних синхронних злоякісних пухлин в одному органі класифікація за TNM базується на оцінці пухлини:

- * A) З найвищою категорією T**
- B) З найнижчою категорією T
- C) З середньою категорією T

39. Група Ia охоплює таких хворих:

- * A) В яких лікар запідозрив рак (ці хворі перебувають у цій групі короткочасно)**
- B) У цій групі хворі перебувають постійно
- C) Закінчується зняттям з обліку після смерті

40. Група Іб охоплює таких хворих:

*** А) 3 передраковим станом**

В) 3 раковим станом не підтвердженим гістологічно

С) 3 раковим станом без метастазів у регіональні лімфатичні лімфовузли

41. Вкажіть правильне тлумачення ІІ клінічної групи онкологічного захворювання:

А) Рак "in situ"

В) Пухлина не більше 3 см у діаметрі, без метастазів

С) Пухлина не більше 5 см у діаметрі, із метастазами в регіонарні лімфатичні вузли

Д) Пухлина, яка підлягає спеціальному лікуванню, із гарантією вилікування

*** Е) Пухлина, яка підлягає спеціальному лікуванню, без гарантії вилікування**

Ф) Пухлина, яка підлягає комбінованому лікуванню

42. Вкажіть правильне тлумачення ІІ-а клінічної групи онкологічного захворювання:

А) Пухлина до 5 см у діаметрі, із метастазами в регіонарні лімфатичні вузли

В) Пухлина до 7 см у діаметрі, яка може бути видалена за допомогою операції

С) Пухлина, яка підлягає комбінованому лікуванню

*** Д) Пухлина, яка підлягає спеціальному лікуванню, із гарантією вилікування**

Е) Пухлина, яка підлягає спеціальному лікуванню, без гарантії вилікування

Ф) Онкологічний хворий після радикальної операції

43. Вкажіть правильне тлумачення ІІІ клінічної групи онкологічного захворювання:

А) Пухлина до 7 см у діаметрі, із метастазами в регіонарні лімфатичні вузли

В) Пухлина до 7 см у діаметрі, яка може бути видалена за допомогою операції

С) Пухлина, що підлягає спеціальному лікуванню, із гарантією вилікування

Д) Пухлина, що підлягає спеціальному лікуванню, без гарантії вилікування

*** Е) Онкологічний хворий після радикального лікування**

44. Вкажіть правильне тлумачення IV клінічної групи онкологічного захворювання:

- A) Пухлина, що має віддалені метастази
- B) Пухлина, яка не може бути видалена через проростання у сусідні органи
- C) Пухлина, яка підлягає спеціальному лікуванню без гарантії вилікування
- * D) Пухлина, яка не підлягає спеціальному лікуванню**
- E) Пухлина, яка підлягає тільки променевої та хіміотерапії

45. Що означає поняття "онконастороженість"?

- * A) Знання симптомів ранніх форм злоякісних пухлин**
- * B) Обізнаність з передраковими захворюваннями та методами їх лікування**
- * C) Знання організації онкологічної допомоги та порядку скерування хворого**
- * D) Всебічне обстеження хворого, що звернувся до лікаря будь-якої спеціальності з метою виключення раку**
- * E) При атиповому перебігу пухлини хворого слід скерувати в онкологічний диспансер**
- F) Обстеження хворого у лікувальних закладах України згідно стандартів ЄС

46. Частота раку якої локалізації знизилась за останні 20 років?

- A) Раку товстої кишки
- * B) Раку шлунка**
- C) Раку легенів

47. Серед органів травного тракту рак найрідше уражує:

- A) Стравохід
- B) Шлунок
- * C) Тонку кишку**
- D) Товсту кишку

48. При підозрі на рак шлунка лікар-ендоскопіст повинен:

- A) Рекомендувати негайне хірургічне лікування
- B) Динамічний огляд
- C) Розповісти хворому відкрито про ракову хворобу в нього

*** D) Скерувати хворого в онкологічний заклад для уточнення діагнозу**

49. Найчастіша локалізація метастазів рака шлунку:

- A) У кістках

*** B) У легенях**

*** C) У печінці, надключичній ділянці, яйниках і Дугласовому просторі**

50. Основні клінічні симптоми саркоми шлунка:

- A) Масивна блювання відразу після прийому їжі
- B) Гикавка, печія, здуття живота

*** C) Пухлини, які пальпуються, але не мають клінічних проявів**

51. Ранній рак шлунку перебігає:

- A) З яскраво вираженими патогномонічними симптомами

*** B) Без характерних патогномонічних симптомів**

- C) З клінічними симптомами, характерними для хронічної виразки шлунка

52. Ранній рак шлунка, це:

- A) Пухлина, що уражає всю товщину стінки шлунку, але без метастазів у регіональні лімфовузли

- B) Пухлина, що уражає лише слизовий і підслизовий шари незалежно від її розмірів

*** C) Пухлина, яку можна радикально вилікувати шляхом резекції, тобто з низьким ризиком метастазів у лімфовузли**

53. Поверхневий рак шлунка, це:

А) Пухлина, що уражає всю товщину стінки шлунку, але без метастазів у регіональні лімфовузли

В) Пухлина, що уражає лише слизову оболонку і підслизовий шари незалежно від її розмірів

*** С) Пухлина, що уражає лише слизову оболонку незалежно від підтипу і метастазів у лімфовузли**

54. Найчастіші рентгенологічні симптоми раку шлунка:

*** А) Дефект наповнення, відсутність перистальтики, обрив складок слизової оболонки або злякисний її рельєф**

В) Гострокінцева ніша, що виходить за контур шлунка, вкорочення малої кривини

С) Ніша, що перебільшує розмір 3 см, гігантські складки, особливо на великій кривині проксимального відділу шлунку

55. Ендоскопічна характеристика підтипу 0-IIc (заглибленого, вдавненого) поверхневого раку шлунку:

А) Чашоподібна виразка з рівними краями і нашаруваннями фібрину

В) Ділянка слизової з горбистою щільною поверхнею, еластична при інструментальній пальпації

*** С) Ділянка слизової з поверхневим виразкуванням неправильної форми, яке має нечіткі з'їджені краї і нагадує ерозію, з помірною конвергенцією складок**

56. Ендоскопічна характеристика 0-III типу раннього раку (підритого) поверхневого раку шлунка:

*** А) Дефект слизової оболонки неправильної форми з підритими горбистими краями, нерівним горбистим дном, з конвергенцією складок, що обриваються недоходячи до виразки**

В) Глибока виразка з рівними краями і гладким дном

С) Дуплоподібної форми виразка з бруднонекротичними нашаруваннями

57. Для патоморфологічного підтвердження лімфосаркоми шлунка необхідний мінімальний кусочок тканини:

A) Діаметром 1 см

B) Діаметром 2 см

*** C) Діаметром 0,5 см**

58. При лімфосаркомах оптимальним видом біопсії є:

A) Щипцева біопсія

B) Пункційна біопсія

*** C) Петлева біопсія**

59. При біопсії з виразки шлунка треба брати:

A) Шматочки з дна і країв виразки

B) Шматочки з дна виразки

*** C) 5 і більше шматочків з країв виразки**

60. Негативний результат щипцевої біопсії при візуальній картині інфільтративного раку шлунка:

A) Виключає наявність раку

*** B) Не виключає наявності раку**

61. Які найхарактерніші ендоскопічні ознаки ракової виразки:

A) Виразка з рівними краями і гладким дном, вкритим фібрином

B) Поверхнева виразка на фоні щільної інфільтрованої слизової

*** C) Виразка з горбистими щільними краями і глибоким горбистим некротичним дном у вигляді чаші**