

ЗАВАНТАЖЕНО З САЙТУ ТЕСТУВАННЯ.УКР

Загальні питання

Категорія: **Внутрішні хвороби**

Кількість запитань: **267**

1. Найчастішими ознаками раку тіла та хвоста підшлункової залози є:

- A) Симптом Курвуаз'є
- * В) Значне схуднення**
- * С) Болювий синдром**
- * D) Розвиток цукрового діабету**
- * E) Розвиток портальної гіпертензії**

2. Клінічні симптоми раку легень:

- * A) Кашель, кровохаркання**
- * B) Біль у грудній клітці**
- * C) Задишка**
- * D) Синдром інтоксикації**
- E) Виділення харкотиння повним ротом

3. Показання до діагностичного пневмоперитонеуму:

- A) Підозра на емболію легеневої артерії
- B) Уточнення характеру плевриту
- * C) Підозра на діафрагмальну килу**
- D) Підозра на пневмоторакс
- E) Підозра на піддіафрагмальний абсцес

4. Для ехінококоза легень характерно:

- * A) Кругла однорідна тінь без зміни тканини навколо неї (рентгенологічно)**
- * B) Гіпереозинофілія**
- * C) Наявність кіст у печінці**
- * D) Двобічний характер ураження**
- * E) Ураження нижніх часток легень**
- F) Розвиток хронічного легеневого серця

5. Провідний симптом раку стравохода:

- * **A) Тупий біль у грудях**
- * **B) Дисфагія**
- * **C) Приступи кашлю**
- * **D) Осиплість голосу**
- E) Задишка

6. Які препарати мають низький ризик ускладнень при призначенні хворим на артеріальну гіпертензію із супутнім цукровим діабетом?

- * **A) Блокатори рецепторів ангіотензину II**
- * **B) Антагоністи кальцію**
- C) Бета-2-адrenoблокатори
- * **D) Інгібітори АПФ**
- E) Клонідін

7. До передракових станів відносять:

- * **A) Перніціозну анемію**
- * **B) Атрофічний гастрит**
- * **C) Аденоматозні поліпи шлунка > 2см в діаметрі**
- * **D) Інфікування Helicobacter pylori**
- E) Гіперпластичні поліпи шлунка

8. З якого препарату починають лікування гіпертонічного кризу у хворого на феохромоцитому?

- * **A) Альфа-адrenoблокатора (фентоламіну, тропafenу)**
- * **B) Бета-адrenoблокатора**
- C) Нітропрусиду натрію
- D) Ніфедіпіну
- E) Дібазолу

9. Патоморфологічні форми раку шлунка:

- * А) Аденокарцинома**
- * В) Плоскоклітинний**
- * С) Недиференційований**
- * D) Залозисто-плоскоклітинний**
- Е) Циліндроклітинний

10. Які поліпи шлунка можуть перероджуватись?

- * А) Множинні**
- В) Пілоричного відділу шлунка
- * С) Антрального відділу**
- * D) Верхніх відділів шлунка**
- * Е) Кардіального відділу**

11. Раннім симптомом раку шлунка є:

- * А) Диспепсичний синдром**
- В) Гематемезис
- С) Анорексія, прогресуюче зниження маси тіла
- * D) Біль у животі**
- Е) Поява "вірховської залози"

12. Рентгенологічні ознаки раку шлунка:

- * А) Зміни рельєфу слизової оболонки**
- * В) Відсутність хвилі перистальтики**
- * С) Наявність "дефекту наповнення"**
- * D) Деформація шлунка у вигляді "пісчаного" годинника**
- Е) Стеноз пілоричної частини

13. При якому захворюванні жовчного міхура показане санаторно-курортне лікування?

- A) Хронічному безкамінцевому холециститі з частими загостреннями
- * В) Хронічному латентному безкамінцевому холециститі**
- C) Паразитарному холециститі
- D) Камінцевому холециститі з частими приступами
- * Е) Жовчно-кам'яній хворобі без колік**

14. Найбільш виражену нефротоксичну дію мають:

- A) Ампіцилін
- * В) Гентаміцин, амікацин**
- * С) Тетрациклін, доксициклін**
- * D) Еритроміцин, спіраміцин, азитроміцин**
- * Е) Цефазолін, цефтріаксон**

15. Найбільш виражену гепатотоксичну дію мають:

- A) Ампіцилін
- * В) Гентаміцин, амікацин**
- * С) Тетрациклін, доксициклін**
- * D) Еритроміцин, спіраміцин, азитроміцин**
- * Е) Цефазолін, цефтріаксон**

16. Опортуністичними називають інфекції, що розвиваються на фоні:

- A) Напруженого імунітету і викликані високопатогенною флорою
- * В) Слабкого імунологічного захисту і викликані зазвичай непатогенною ендогенною мікрофлорою**
- * С) Довготривалого прийому антибіотиків**
- * D) Набутого вторинного імунодефіциту**
- * Е) Довготривалого прийому гормональних та цитостатичних препаратів**

17. При лікуванні приступів мігрені використовуються:

- * А) Ненаркотичні анальгетики**
- В) Антигістамінні II покоління (лоратадин)
- * С) Селективні агоністи серотоніну (суматриптан)**
- * D) Неселективні агоністи серотоніну (ерготамін)**
- * Е) Неселективні бета-адреноблокатори**

18. Який спосіб зараження токсоплазмозом найчастіший?

- * А) Вживання сирого, недостатньо обробленого м'яса**
- * В) При контакті з інфікованими кішками**
- С) Від хворої людини
- * D) Через заражену воду**

19. Маркери СНІДу:

- * А) Значне зменшення кількості Т-лімфоцитів-хелперів (CD4)**
- * В) Зменшення кількості Т-лімфоцитів-кілерів**
- * С) Виявлення вірусу в крові**
- D) Зменшення кількості еритроцитів

20. Групи ризику захворювання на СНІД:

- * А) Ін'єкційні наркомани**
- * В) Хворі на гемофілію**
- * С) Хворі, яким переливали донорську кров**
- * D) Повії**
- Е) Хворі на метаболічний синдром Х

21. Які препарати мають найбільший вплив на алергічні реакції уповільненого типу?

- * **A) Антигістамінні**
- * **B) Нестероїдні протизапальні**
- * **C) Глюкокортикостероїди**
- D) Амброксол
- * **E) Мембраностабілізуючі (кромони)**

22. Найчастішим клінічним маркером гельмінтозів є:

- * **A) Гіпереозинофілія**
- * **B) Біль у животі**
- * **C) Діарея**
- * **D) Схуднення**
- * **E) Алергічні прояви**
- F) Абсолютний лімфоцитоз у лейкоцитарній формулі крові

23. Злоякісні пухлини, які зустрічаються при СНІДі:

- * **A) Саркома Капоші**
- * **B) Лімфома мозку**
- * **C) Гепатома**
- D) Рак шлунка

24. Ульцерогенна дія характерна для:

- * **A) Нестероїдних протизапальних препаратів**
- * **B) Глюкокортикостероїдів**
- C) Інгібіторів АПФ
- * **D) Неселективних бета-адреноблокаторів**
- E) Антагоністів кальцію

25. Вірусні інфекції, характерні для СНІДу:

- * **A) Інфекції простого герпесу**
- * **B) Цитомегаловірусна інфекція в легенях, центральній нервовій системі, очні інфекції та інші**
- C) Вірус грипу
- * **D) Вірус гепатиту**
- * **E) Вірус Епштейна-Барра**

26. Найчастіше ускладнення жовчнокам'яної хвороби:

- * **A) Хронічний панкреатит**
- * **B) Печінкова коліка та механічна жовтяниця**
- * **C) Водянка жовчного міхура**
- * **D) Перфорація жовчного міхура**
- * **E) Холангіт**
- F) Інфаркт міокарда

27. Які клінічні прояви ймовірні при первинному інфікуванні вірусом імунодефіциту?

- * **A) Грипоподібний чи мононуклеозоподібний синдром**
- * **B) Генералізована лімфаденопатія**
- * **C) Артралгії, міалгії**
- * **D) Поліурія**
- E) Жовтяниця

28. Антигеном при гіперчутливості негайного типу частіше може бути:

- * **A) Вірус**
- B) Трансплантаційний антиген
- * **C) Пилок рослин**
- * **D) Бактерії**
- * **E) Грибки**

29. Недоліки H2-гістаміноблокаторів при лікуванні виразкової хвороби шлунку та дванадцятипалої кишки:

- * **A) Синдром відміни**
- * **B) Швидкий розвиток толерантності і зниження антисекреторного ефекту**
- * **C) Нечутливість хворого до H2-блокаторів**
- * **D) Відсутність антихелікобактерної дії при монотерапії**
- * **E) Побічні дії (брадикардія, діарея, сонливість, головний біль, ендокринні розклади, тощо)**
- F) Розвиток атрофічного гастриту

30. Які параметри характеризують вікові зміни імунної відповіді?

- A) Підвищення рівня імуноглобулінів класу G
- * **B) Зменшення антитілоутворення**
- C) Зменшення утворення аутоантитіл проти тканин мозку
- D) Збільшення здатності лімфоїдних клітин до проліферації
- E) Зменшення кількості анти-ДНК-антитіл

31. Найбільш достовірним методом діагностики раку жовчного міхура є:

- * **A) Холецистографія**
- * **B) Ультразвукове дослідження**
- C) Тепловізорне дослідження
- * **D) Комп'ютерна томографія**

32. Диференціально-діагностичні ознаки, що відрізняють рак головки підшлункової залози від жовчокам'яної хвороби:

- A) Гіпоглікемія
- * В) Симптом Курвуаз'є (збільшений неболючий жовчний міхур при наявності жовтяниці)**
- * С) Характер больового синдрому (відсутність гострого болю)**
- * D) Поступова поява жовтяниці**
- E) Зменшення печінки

33. Яка локалізація раку підшлункової залози найчастіша?

- * A) Рак головки**
- * В) Рак тіла**
- * С) Рак хвоста**
- D) Острівці Лангерганса

34. Диференціальну діагностику між раком головки підшлункової залози та раком дуоденального соска вирішує:

- A) Дуоденальне зондування
- * В) Ультразвукове дослідження підшлункової залози**
- * С) Характер жовтяниці**
- * D) Ретроградна холангіопанкреатографія**
- * E) Дуоденоскопія**

35. На який день захворювання лептоспірозом з'являються прояви ураження внутрішніх органів?

- A) З першого дня
- * В) Через тиждень**
- * С) На 3-5 день**
- * D) На 2-й день**
- * E) Через 2 тижні**

36. Виділіть клінічну ознаку, що найчастіша при лептоспірозі:

- * А) Біль у м'язах**
- * В) Лихоманка**
- * С) Жовтяниця**
- * D) Сечовий синдром**
- Е) Судоми

37. При наявності в молочній залозі м'якого вузла діагностичні проблеми вирішує:

- * А) Пункційна біопсія**
- * В) Контрастна мамографія**
- С) Безконтрастна мамографія
- * D) Секторальна резекція з гістологією**

38. При якій морфологічній формі раку легень треба віддати перевагу хірургічному лікуванню?

- А) Дрібноклітинному раку
- * В) Недрібноклітинному раку**
- С) Будь-якому

39. При якому захворюванні шлунка під час гастрофіброскопії виявляють виражену гіпертрофію слизової оболонки?

- А) Гастриті А
- В) Гастриті В
- * С) Хворобі Менетріє**
- Д) Раку шлунка

40. Найчастішим захворюванням травного тракту при алкоголізмі є:

- * А) Алкогольний гастрит**
- * В) Виразкова хвороба шлунка та дванадцятипалої кишки**
- С) Рак шлунка
- Д) Неспецифічний виразковий коліт
- * Е) Алкогольний ентероколіт**

41. Залежність від ліків найбільш виражена при застосуванні:

- * А) Дроперідолу**
- * В) Кодеїну**
- * С) Промедолу**
- * D) Морфіну**
- Е) Анальгіну

42. Який із перерахованих вітамінів не є жиророзчинним?

- А) Вітамін А
- * В) Вітамін С**
- С) Вітамін Д
- Д) Вітамін Е
- Е) Вітамін К

43. Найбільш часта локалізація раку шлунка:

- * А) Дно шлунка**
- В) Дванадцятипала кишка
- * С) Пілороантральний відділ шлунка**
- * D) Мала кривизна шлунка**
- * Е) Кардіальний відділ шлунка**

44. Для яких інфекційних захворювань характерний біль у м'язах?

- * А) Лептоспірозу**
- * В) Грипу**
- С) Бруцельозу
- * D) Ентеровірусної інфекції**
- * Е) Вірусного гепатиту**

45. Основним методом лікування жовчокам'яної хвороби є:

- * А) Хірургічний**
- * В) Хімічна холелітотерапія**
- * С) Санаторно-курортне**
- * D) Екстракорпоральна літотріпсія**
- * Е) Дієтотерапія**
- Г) Призначення холеретиків

46. Який клінічний симптом є патогномонічним для ботулізму?

- А) Гектична температура тіла
- * В) Диплопія**
- * С) Нудота**
- * D) Діарея**
- * Е) Афонія**

47. Назвіть методи діагностики раку молочної залози:

- * А) Ультразвукове дослідження молочної залози**
- * В) Мамографія**
- * С) Пальпація молочних залоз**
- Д) Рентгеноскопія ОГК
- * Е) Комп'ютерна томографія**

48. Які показання до застосування дієти №7 по Певзнеру?

- * **A) Гострий гломерулонефрит**
- * **B) Хронічна ниркова недостатність**
- * **C) Діабетичний нефросклероз**
- * **D) Загострення хронічного гломерулонефриту**
- E) Цистит

49. Який із препаратів відноситься до антагоністів алкоголю?

- A) Седуксен
- * **B) Апоморфін**
- C) Есенціале
- D) Гемодез
- E) 5% розчин глюкози

50. Якого клінічного синдрому не буває при ботулізмі?

- A) Диспепсичного
- B) Порушення зору
- * **C) Лихоманки**
- D) Паралічу м'якого піднебіння, м'язів гортані, інших паралічів
- E) Діареї

51. Найчастіша причина гематемезису :

- * **A) Виразкова хвороба шлунка і дванадцятипалої кишки**
- * **B) Пухлини, поліпоз шлунка**
- * **C) Цироз печінки**
- * **D) Геморагічні діатези**
- E) Хронічний гастрит А

52. Побічні дії глюкокортикоїдів посилюють:

- * А) Серцеві глікозиди**
- * В) Імунодепресанти**
- С) Антигістамінні препарати
- * D) Нестероїдні протизапальні препарати**
- * Е) Салуретики**

53. Яка група антибіотиків протипоказана при вагітності?

- А) Похідні пеніциліну
- * В) Похідні фторхінолону**
- * С) Цефалоспорини**
- D) Макроліди

54. Які антибактеріальні препарати можна призначати для лікування пієлонефриту у вагітних?

- * А) Амоксицилін**
- * В) Ампіцилін**
- * С) Фурадонін**
- * D) Цефалексин**
- Е) Доксидиклін

55. З якими антибіотиками похідні пеніциліну мають синергічну дію?

- * А) Цефалоспоринами**
- * В) Аміноглікозидами**
- С) Тетрациклінами
- D) Макролідами
- Е) Хлорамфеніколом

56. З якими антибіотиками цефалоспорини в антагонізмі?

- * А) Тетрациклінами**
- * В) Макролідами**
- * С) Левоміцетином**
- D) Аміноглікозидами
- E) Поліміксином В

57. Які групи антибіотиків застосовуються при хламідійній інфекції?

- * А) Тетрацикліни**
- * В) Фторхінолони**
- C) Пеніциліни
- D) Цефалоспорини
- E) Аміноглікозиди

58. До передраку прямої кишки відносять захворювання:

- * А) Поодинокі поліпи**
- * В) Виразковий проктит, хвороба Крона**
- * С) Множинні аденоматозні поліпи**
- D) Тріщини заднього проходу
- E) Геморой

59. Які раки дають метастази в головний мозок?

- * А) Дрібноклітинний рак легень**
- * В) Меланома**
- * С) Рак молочної залози**
- D) Рак шкіри
- * Е) Лімфома**

60. Найчастіше провокує рак легень:

- * А) Паління тютюну**
- * В) Виробничі шкідливості**
- * С) Туберкульоз легень**
- D) Синдром Аерза
- E) Фіброзуєчий альвеоліт

61. До клінічних ознак силікозу відносяться:

- * А) Задишка при фізичному навантаженні**
- * В) Відкашлювання сірого харкотиння**
- C) Легеневі кровотечі
- D) Кашель із великою кількістю зеленого харкотиння

62. Реакція на пробу Манту з 2ТО у дорослих вважається гіперергічною при утворенні папули:

- A) Діаметром 12 мм
- B) Діаметром 15 мм
- * С) Діаметром 21 мм та більше чи менших розмірів з везикулою**
- D) Діаметром 10 мм

63. Чим зумовлений розвиток туберкульозу легень?

- * А) Попаданням в організм мікобактерії туберкульозу (МБТ)**
- * В) Різким зниженням захисних сил організму**
- * С) Особливостями взаємовідносин стану макроорганізму, МБТ та навколишнього середовища**
- D) Статтю хворого

64. Найчастіший варіант розвитку інфільтративного туберкульозу легень:

- * **A) Формування інфільтрації в інтактній легені**
- * **B) Прогресування вогнищевого туберкульозу**
- * **C) Реактивація старих туберкульозних вогнищ**
- * **D) Гематогенне розповсюдження мікобактерії туберкульозу (МБТ)**
- E) Генетично зумовлений

65. Найбільш частою скаргою при туберкульозі бронхів є:

- * **A) Задишка**
- * **B) Біль у грудях**
- * **C) Кровохаркання**
- * **D) Малопродуктивний кашель**
- E) Підвищення температури тіла до 40°C

66. Залишкові зміни первинного туберкульозу:

- * **A) Кальцинати в коренях легень, вогнища Гона, цироз**
- * **B) Плевральні нашарування, фіброзні зміни в легеневій тканині**
- * **C) Бронхоектази, рубці**
- D) Вогнищеві зміни у верхніх долях

67. Який характер ексудату найбільш характерний для туберкульозного плевриту?

- A) Фібринозний
- B) Гнійний
- * **C) Серозно-геморагічний**
- * **D) Серозний**
- * **E) Серозно-гнійний**
- F) Геморагічний

68. Найбільш характерна зміна в аналізі крові при прогресуючому туберкульозному процесі:

- * А) Лімфоцитоз**
- * В) Моноцитоз**
- * С) Нейтрофіліоз**
- * D) Лімфопенія**
- Е) Базофілія
- Г) Лейкопенія

69. Найчастіше ускладнення легеневого туберкульозу:

- * А) Кровохаркання**
- * В) Спонтанний пневмоторакс**
- * С) Амліодоз внутрішніх органів**
- * D) Хронічне легеневе серце**
- Е) Тромбоемболія легеневої артерії

70. Який діаметр інфільтрату вказує на різко позитивну реакцію Манту?

- А) 10-15 мм
- В) 5-8 мм
- С) До 5 мм
- * D) Більше 20 мм**
- Е) 15-20 мм

71. Основним шляхом зараження туберкульозом є:

- А) Аліментарний
- * В) Повітряно-крапельний**
- С) Контактний
- Д) Статевий

72. Назвіть захворювання, при яких існує великий ризик захворіти на туберкульоз:

- * А) Цукровий діабет**
- * В) Бронхоектатична хвороба**
- * С) Алкоголізм**
- * D) СНІД**
- Е) Саркоїдоз

73. Які грибки найчастіше паразитують в санованих туберкульозних кавернах?

- * А) Кандиди**
- * В) Аспергіли**
- С) Актиноміцети

74. Двобічні численні симетричні вогнища в нижніх відділах легень найчастіше зустрічаються при:

- * А) Карциноматозі**
- * В) Пневмоконіозі**
- * С) Пневмонії**
- Д) Гематогенному дисемінованому туберкульозі
- * Е) Саркоїдозі легень**

75. Міліарний туберкульоз легень характеризується такими рентгенологічними ознаками :

- * А) Симетричним двобічним ураженням**
- * В) Наявністю вогнищ малої інтенсивності розміром до 5 мм**
- С) Наявністю вогнищ різної інтенсивності розміром більше 5 мм
- Д) Значним посиленням легеневого малюнка
- Е) Збільшенням внутрішньогрудних лімфатичних вузлів

76. Яка основна причина кровохаркання та кровотечі при туберкульозі легень?

- * А) Підвищення тиску в легеневій артерії**
- * В) Порушення цілісності судинної стінки у поєднанні з підвищенням тиску в легеневій артерії**
- * С) Підвищення проникливості капілярів легень**
- D) Гіпокоагуляція
- * Е) Підвищення фібринолізу**

77. Які побічні дії антибіотиків групи аміноглікозидів?

- * А) Ототоксична дія**
- * В) Нефротоксична дія**
- * С) Алергічні реакції**
- * D) Диспепсичний синдром**
- E) Артеріальна гіпертензія

78. Для ексудативного плевриту туберкульозної етіології найбільш характерно:

- * А) Зустрічається частіше у молодих**
- B) Швидке накопичення після евакуації ексудату
- * С) Серозний характер ексудату, за клітинним складом - лімфоцитарний**
- D) Геморагічний характер ексудату
- * Е) Зміщення органів середостіння у здоровий бік**

79. Назвіть основну причину смерті при туберкульозі легень:

- * А) Легенева кровотеча**
- * В) Легенево-серцева недостатність**
- * С) Амілоїдоз, уремія**
- * D) Гостра дихальна недостатність після спонтанного пневмотораксу**
- E) Тромбоемболія легеневої артерії

80. Найбільш інформативний метод діагностики туберкульозу легень:

- * А) Бронхоскопія**
- * В) Рентгенографія та томографія органів грудної клітки**
- * С) Мікробіологічне дослідження харкотиння**
- * D) Туберкулінові проби**
- Е) Загальний аналіз крові

81. Первинний туберкульозний комплекс - це:

- * А) Наявність на рентгенограмі вогнища в легені, доріжки, що відходить до кореня та локально збільшені лімфатичні вузли**
- В) Наявність на рентгенограмі кільцеподібної тіні
- С) Двобічні круглі тіні
- D) Збільшення лімфатичних вузлів кореня легені

82. Основна відміна силікотуберкульозу від силікозу:

- * А) Патологічні зміни в аналізі крові**
- * В) Наявність інтоксикації**
- * С) На рентгенограмі свіжі вогнищево-інфільтративні зміни у верхніх долях легенів**
- * D) Пневмоторакс є частим ускладненням**
- Е) Відсутність кровохаркання

83. Для туберкуломи характерні ознаки:

- * А) Кругла тінь діаметром більше 1 см з чітким контуром без регіонарного ураження лімфатичних вузлів**
- * В) Локалізація в 1-му, 2-му сегментах**
- * С) Наявність навколо туберкуломи пневмосклерозу, в коренях легень - кальцинатів**
- * D) Відсутність клінічних симптомів захворювання**
- Е) Хмароподібна м'яка тінь

84. Яке захворювання легень найчастіше уражає верхні відділи?

- * А) Туберкульоз**
- В) Саркоїдоз Бека
- * С) Рак**
- * D) Пневмонія**

85. Проведення вакцинації БЦЖ створює імунітет через:

- А) 1 місяць
- В) 1-2 тижні
- С) 6 місяців
- * D) 1,5-2 місяці**

86. Які рентгенологічні зміни при туберкульозі легень найчастіше зустрічаються?

- А) Емфізема легень
- * В) Плевроцироз**
- * С) Інфільтрати**
- * D) Каверни**
- * Е) Фіброз**

87. Який препарат призначають з метою профілактики туберкульозу дітям з Манту - позитивною реакцією?

- А) Стрептоміцин
- В) Ріфампіцин
- С) ПАСК
- * D) Ізоніазид**

88. Для якої хвороби найбільш характерно: двобічне збільшення внутрішньогрудних лімфовузлів, реакція Манту негативна, позитивна проба Квейна, моноцитоз у периферичній крові, відсутність скарг?

- A) Лімфогрануломатозу
- B) Туберкульозу
- * C) Саркоїдозу**
- D) Раку легень

89. Яке захворювання найчастіше ускладнюється аутоімунними кризами?

- * A) Системний червоний вовчак**
- * B) Хронічний гепатит**
- * C) Хронічний гломерулонефрит**
- * D) Хронічний лейкоз**
- E) Дольова пневмонія

90. Які пухлини супроводжуються шийною лімфаденопатією?

- * A) Рак легень**
- * B) Рак молочної залози**
- * C) Рак гортані**
- * D) Рак шлунка**
- E) Рак нирки
- * F) Рак щитовидної залози**

91. Хворому з генералізованою грибковою інфекцією слід призначити:

- * A) Флюконазол**
- B) Фторхінолони
- C) Іміпінем
- D) Метронідазол
- * E) Хілак, лінекс, лактобактерин**

92. Який клінічний симптом найбільш підозрілий на дифтерію?

- A) Гіпотермія
- * B) Охриплість голосу**
- * C) Наявність ангіни у поєднанні з стенозом гортані**
- * D) Біль у горлі на фоні незначних катаральних змін**

93. Найчастішим ускладненням при передозуванні гепарином є:

- * A) Макрогематурія**
- * B) Крововиливи під шкіру та слизові оболонки**
- * C) Кровотеча з носа**
- D) Гемартрози
- * E) Крововилив у сітківку**

94. Показаннями до призначення антикоагулянтів є:

- A) Хронічний пієлонефрит
- * B) Хронічний гломерулонефрит**
- * C) Тромбоз судин або тромбоемболія**
- D) Геморагічний інсульт
- * E) Синдром внутрішньосудинного згортання крові**

95. До антикоагулянтів належить:

- A) Аспірин
- B) Дипіридамол
- C) Тіклід
- D) Пентоксифілін
- * E) Фраксіпарин**

96. Яка добова доза аспірину при тривалому прийомі з метою антиагрегантної його дії?

- A) 0,5 г
- B) 1,0 г
- * C) 0,1-0,35 г**
- D) 0,05 г

97. Найчастіший побічний ефект при внутрішньовенному введенні еуфіліну:

- * A) Серцебиття**
- * B) Запаморочення, головний біль**
- * C) Гіпотонічний синдром**
- * D) Порушення ритму серця**
- E) Підвищення артеріального тиску

98. Який протигрибковий препарат відноситься до III покоління?

- A) Амфотерицин В
- B) Ністатін
- C) Леворин
- D) Нізорал
- * E) Флуконазол**

99. До ранніх симптомів ботулізму відносяться:

- * A) Диплопія**
- B) Лихоманка
- * C) Утруднене ковтання**
- * D) Сухість у роті**
- * E) Блювання**

100. Легенева кровотеча при туберкульозі найчастіше ускладнюється:

- * А) Гіпоксемічною комою**
- * В) Гіпохромною анемією**
- * С) Аспіраційною пневмонією**
- D) Набряком легень
- * Е) Гострою дихальною недостатністю**

101. До побічних дій глюкокортикостероїдів відносяться:

- * А) Артеріальна гіпертензія**
- * В) Негативний азотистий баланс**
- * С) Глюкозурія**
- * D) Гіпокаліємія**
- E) Гіперкаліємія

102. Для сульфаніламідних препаратів характерні такі побічні дії:

- * А) Некроз гепатоцитів**
- * В) Цитопенічний синдром**
- * С) Диспепсичний синдром**
- * D) Алергічні реакції**
- E) Гіпотонія

103. Клінічні ознаки шоку:

- * А) Блідість, вологість шкіри**
- * В) Олігурія, анурія**
- * С) Тахікардія**
- * D) Гіпотонія, низький пульсовий тиск**
- E) Артеріальна гіпертензія

104. Які показання до призначення D-пеніціламіну (купренілу)?

- * А) Гострі та хронічні отруєння іонами металів**
- * В) Хвороба Коновалова-Вільсона**
- * С) Системна склеродермія**
- D) Хронічна ниркова недостатність

105. Який найбільш характерний наслідок пошкоджуючої дії внутрішнього альфа-опромінення?

- A) Гостра променева хвороба
- B) Хронічна променева хвороба
- C) Променеві опіки шкіри
- * D) Пошкодження легеневих лімфатичних вузлів**
- E) Радіаційні остеопорози

106. Який найбільш характерний наслідок пошкоджуючої дії короткочасного зовнішнього бета-опромінення?

- * А) Променеві опіки шкіри**
- B) Гостра променева хвороба
- C) Хронічна променева хвороба
- D) Пошкодження легеневих лімфатичних вузлів
- E) Радіаційні остеопорози

107. Який найбільш характерний наслідок пошкоджуючої дії короткочасного зовнішнього гама-опромінення?

- A) Хронічна променева хвороба
- B) Пошкодження легеневих лімфатичних вузлів
- C) Променеві опіки шкіри
- * D) Гостра променева хвороба**
- E) Радіаційні остеопорози

108. Основні радіаційні пошкоджуючі фактори на організм людини при аварії на Чорнобильській АЕС:

- A) Нейтронне опромінення
- B) Рентгенівське опромінення

*** C) Бета-опромінення**

*** D) Гама-опромінення**

109. Яка кількість тромбоцитів у периферичній крові при гострій променевій хворобі визначається як критична (небезпечна) для розвитку геморагічних ускладнень?

- A) Менше $150 \times 10^9/\text{л}$
- B) Менше $100 \times 10^9/\text{л}$
- C) Менше $80 \times 10^9/\text{л}$

*** D) Менше $40 \times 10^9/\text{л}$**

- E) Менше $60 \times 10^9/\text{л}$

110. Які протибактеріальні засоби є найбільш ефективними при інфекційних ускладненнях періоду розпалу гострої променевої хвороби?

*** A) Аміноглікозиди**

*** B) Антибіотики групи пеніциліну**

*** C) Антибіотики групи цефалоспоринів**

*** D) Макроліди**

- E) Тетрацикліни

111. Згідно правила І.Бергоньє та Л.Трибондо радіочутливість тканини:

- A) Прямопропорційна до проліферативної активності та ступеня диференційованості
- B) Зворотньопропорційна до проліферативної активності та ступеня диференційованості
- C) Зворотньопропорційна до проліферативної активності та прямопропорційна до ступеня диференційованості
- * D) Прямопропорційна до проліферативної активності та зворотньопропорційна до ступеня диференційованості**
- E) Зворотньопропорційна до проліферативної активності

112. До групи методів біологічної дозиметрії, які використовуються в клінічній радіаційній медицині, відносяться:

- A) Методи, що використовують дані про реакцію (загибель) експериментальних тварин на опромінення
- B) Методи, що використовують дані про реакцію (загибель) мікроорганізмів на опромінення
- C) Аналіз клінічних проявів у період формування променевого пошкодження
- * D) Усі методи клінічної лабораторної діагностики, що дозволяють судити про розміри поглинутої дози тканинами організму**

113. Назвіть тип розподілу радіонукліду-цезію-137:

- A) Скелетний
- B) Ретикулоендотеліальний
- C) В шкірі та її похідних
- * D) Дифузний**
- E) Тільки в щитовидній залозі

114. Назвіть тип розподілу радіонукліду-стронцію-90:

- A) Ретикулоендотеліальний
- B) В шкірі та її похідних
- C) Дифузний
- * D) Скелетний**
- E) Тільки в щитовидній залозі

115. Гостра променева хвороба легкого ступеня розвивається при дозі загального опромінення:

- A) До 100 рад
- * B) 100 - 200 рад**
- C) 300 рад
- D) 400 рад
- E) 500 рад і більше

116. Які ознаки характерні для анкілостомідозу?

- * A) Нудота**
- * B) Порушення функції кишечника**
- * C) Слинотеча**
- * D) Свербіння шкіри, висипання, астмоїдні явища**
- E) Гіпохромна анемія

117. Який із гельмінтозів може викликати розвиток анемії, подібної до анемії Аддісона-Бірмера?

- A) Аскаридоз
- B) Опісторхоз
- * C) Дифілоботріоз**
- D) Стронгілоїдоз
- E) Трихоцефальоз

118. Який із діагностичних методів протипоказаний при підозрі на ехінококоз, альвеококоз?

- A) УЗД
- B) Сканування печінки
- C) Комп'ютерна томографія
- * D) Пункція печінки**
- E) Рентгеноскопія легень

119. Метод діагностики аскаридозу в легеневій стадії:

- A) Дослідження калу на яйця гельмінтів
- * B) Дослідження харкотиння на личинки нематод**
- C) Аналіз крові
- D) Дуоденальне дослідження
- E) Гастрофіброскопія

120. Яку групу захворювань частіше імітує опісторхоз?

- A) Гастрити (гострі, хронічні)
- * B) Ангіохоліти, дискінезії жовчовивідних шляхів, гепатити**
- C) Хворобу Крона, виразковий коліт
- D) Хронічні коліти
- E) Лейкози

121. Який орган частіше всього вражається при цистицеркозі?

- A) Шлунок
- * B) Головний мозок**
- * C) Очі**
- D) Печінка
- E) Кишечник

122. Серед перерахованих симптомів виділіть найбільш характерний симптомокомплекс для стронгілоїдозу:

- * А) Запаморочення голови та салівація**
- В) Кон'юнктивіт, лихоманка, болі у м'язах
- * С) Хронічна рецидивуюча кропив'янка, стійкий ентероколіт, еозинофілія**
- Д) Біль у м'язах, еозинофілія, біль у правому підребер'ї
- Е) Різке схуднення, анорексія, еозинофілія

123. При інгаляційному отруєнні випарами бензину спостерігаються:

- * А) Сльозотеча, збудження, ейфорія**
- * В) Запаморочення, головний біль**
- * С) Нудота, блювання**
- * Д) Атаксія, порушення мови та ковтання**
- Е) Шлунково-кишкові кровотечі

124. Для отруєння трициклічними антидепресантами характерні:

- * А) Тахікардія, тремор, безсоння**
- * В) Сухість у роті, почервоніння шкіри**
- * С) Мідріаз, атаксія**
- * Д) Галюцинації, епілептиформні судоми**
- Е) Брадикардія, міоз

125. Викликають підозру на наявність наркоманії:

- А) Часте блювання
- * В) Безпричинне різке схуднення**
- * С) Зниження інтелекту**
- * Д) Швидка зміна настрою**
- * Е) Повторні прохання призначити наркотики**

126. Симптомами абстинентного синдрому є:

- * А) Нудота, блювання, тремор**
- * В) Напади підвищеного потовиділення**
- * С) Збудження, сплутанність свідомості**
- * D) Тактильні, зорові та слухові порушення**
- Е) Плевральні болі

127. Для першої стадії алкоголізму характерні:

- * А) Значне підвищення переносимості алкогольних напоїв**
- * В) Відсутнє блювання**
- * С) Синдром психічної залежності**
- * D) Синдром наслідків інтоксикації (астенія, минучі соматоневрологічні порушення)**
- Е) Синдром фізичної залежності

128. Проблеми алкоголізму, наркоманії та токсикоманії віднесені до компетенції таких служб:

- А) Анестезіологічної
- * В) Токсикологічної**
- С) Радіологічної
- * D) Наркологічної**
- * Е) Психіатричної**

129. Неврастенічний симптомокомплекс формується на такій стадії алкоголізму:

- А) Побутового пияцтва
- В) Другій
- * С) Першій**
- Д) Хронічній
- Е) Третій

130. Для третьої стадії алкоголізму характерні:

- * **A) Синдром психічної залежності**
- * **B) Синдром фізичної залежності**
- * **C) Абстинентний синдром у формі вегетативних розладів**
- * **D) Синдром зниженої реактивності (зниженої переносимості спиртного)**
- E) Відсутність синдрому психічної залежності

131. Центральним органом імунної системи є:

- A) Мигдалики
- B) Пейєрові бляшки
- C) Печінка
- * **D) Вилочкова залоза**
- E) Селезінка

132. Які клітини імунної системи виконують імунорегуляторну функцію?

- A) Т-ефектори
- B) Т-кілери
- * **C) Т-хелпери**
- * **D) Т-супресори**
- E) Макрофаги

133. Які фактори імунної системи виконують імуносупресивну функцію?

- A) Т-кілери
- B) Т-ефектори
- * **C) Т-супресори**
- D) В-лімфоцити
- E) Т-хелпери

134. Особливості реакції гіперчутливості сповільненого типу:

- A) Розвивається за декілька хвилин
- B) Може бути перенесена іншій людині
- * C) Не зв'язана з циркулюючими в крові антитілами**
- D) Не характеризується специфічністю

135. Основною функцією Т-супресорів є:

- * A) Гальмування продукції антитіл**
- B) Забезпечення накопичення клона антитілопродуцентів
- C) Цитотоксична дія на клітини
- D) Регуляція секреції лімфокінів
- E) Збільшення протипухлинної активності макрофагів

136. Імуноглобуліни якого класу складають основну масу сироваткових імуноглобулінів (70-80%)?

- A) Імуноглобуліни M
- B) Імуноглобуліни A
- * C) Імуноглобуліни G**
- D) Імуноглобуліни E
- E) Імуноглобуліни D

137. До імунологічних реакцій III типу можна віднести:

- * A) Феномен Артюса**
- B) Імунологічну толерантність
- C) Клітинні
- D) Анафілактичні

138. Який із класів імуноглобулінів має виражену цитофільність?

A) Імуноглобуліни А

*** В) Імуноглобуліни Е**

C) Імуноглобуліни М

D) Імуноглобуліни G

E) Імуноглобуліни Д

139. До основної ознаки atopії відноситься:

A) Розвиток протягом багатьох діб

B) Нема зв'язку з циркулюючими в крові антитілами

C) Нема специфічності

*** D) Підвищений рівень Ig E**

140. Який пристосувальний механізм сприяє підтриманню працездатності у старечому віці?

A) Прискорення кровотоку

*** B) Зміна ритмів працездатності**

C) Зростання гіпоксичної гіпоксії

D) Тахікардія

E) Зростання тканинної гіпоксії

141. Яка особливість обміну білків характерна для людей похилого віку?

*** A) Уповільнення та зниження інтенсивності утворення білків**

B) Збільшення кількості метаболічно активних білків

C) Зменшення маси метаболічно інертних білків

D) Збільшення концентрації альбумінів у крові

E) Зниження концентрації глобулінів у крові

142. Який вік відносять до старечого?

- A) 50-55 років
- B) 61-74 років
- C) 56-60 років
- * D) 75-90 років**
- E) 95 років та більше

143. Характерні шкірні симптоми раку молочної залози:

- * A) Втягування шкіри над пухлиною (симптом умбілікації)**
- * B) Утворення площини при захваті шкіри над пухлиною двома пальцями**
- * C) Наявність пористої шкіри над пухлиною, що виявляється при пальпації (симптом лимонної шкірки)**
- * D) набряк шкіри над пухлиною**
- E) Місцевий гірсутизм

144. Назвіть основний метод лікування дифтерії?

- A) Внутрішньовенне введення плазми
- * B) Внутрішньом'язеве введення протидифтерійної сироватки**
- C) Внутрішньовенне введення гемодезу
- D) Внутрішньовенне введення преднізолону
- * E) Антибіотикотерапія**

145. Які системи вражаються при ботулізмі?

- * A) Серцево-судинна**
- * B) Дихальна**
- * C) Нервова**
- * D) Травлення**
- E) Сечостатева

146. Які добові дози пеніциліну застосовуються при пневмококовому або менінгококовому сепсисі?

- A) 8-10 млн.ОД
- B) 5-6 млн.ОД
- C) 12-15 млн.ОД
- * D) 18-30 млн.ОД**
- * E) Більше 40 млн.ОД**

147. Лікарські засоби з періодом напіввиведення менше за 4 години варто приймати:

- A) 8 разів на добу
- B) 4 рази на добу
- C) 5 разів на добу
- * D) 6 разів на добу**
- E) 3 рази на добу

148. Продовження лікарняного листка більше 10 днів у поліклініках проводиться лікуючим лікарем із затвердженням:

- A) Головного лікаря
- B) ЛКК
- * C) Завідуючого відділенням**
- D) МСЕК

149. Основною функцією МСЕК по експертизі тимчасової непрацездатності є:

- A) Визначення і встановлення групи інвалідності
- B) Визначення трудових рекомендацій
- C) Визначення права на одержання соціальної допомоги
- * D) Санкціонування доліковування**
- E) Аналіз захворюваності з тимчасовою непрацездатністю

150. Основним критерієм, який диференціює тимчасову втрату працездатності від стійкої, є:

- A) Тривалість перебування хворого на лікарняному листку
- B) Важкість перебігу захворювання
- C) Ступінь функціональних зрушень
- * D) Сприятливий клінічний прогноз**
- * E) Сприятливий трудовий прогноз**

151. Працездатним особам з явищами сп'яніння чи похмілля при їх зверненні в поліклініку видається документ:

- A) Лікарняний лист
- B) Довідка за формою N 054/у
- C) Довідка будь-якої форми
- D) Довідка за формою N 138/у
- * E) Документ не видається**

152. У структурі первинної інвалідності найбільшу питому вагу має така група:

- A) Всі групи інвалідності в рівній мірі
- B) Перша
- * C) Друга**
- D) Третя
- E) Перша група, встановлена за критерієм "а"

153. Першим завданням лікаря при експертизі тимчасової непрацездатності є:

- A) Своєчасне встановлення часу одужання
- B) Забезпечити лікуванням повернення працездатності в найкоротший термін
- C) Своєчасне встановлення часу повернення працездатності
- * D) Встановлення причини тимчасової непрацездатності**
- E) Проконсультувати хворого у завідуючого відділенням

154. Вкажіть найбільш частий вид інвалідності:

- A) Інвалідність внаслідок професійних захворювань
- B) Інвалідність з дитинства
- * C) Інвалідність внаслідок загального захворювання**
- D) Інвалідність до початку трудової діяльності

155. Найважливішим заходом організації роботи з довго- і частохворіючими (ДЧХ) є:

- * A) Виявлення і відбір ДЧХ**
- B) Диспансерний нагляд
- * C) Закріплення за ДЧХ лікарів-спеціалістів по данному захворюванню**
- * D) Уточнення діагнозу захворювання**
- * E) Проведення комплексного етіопатогенетичного лікування**

156. Інвалідність у першу чергу є поняттям:

- * A) Динамічним**
- * B) Юридичним**
- C) Статистичним
- * D) Медичним**
- * E) Соціальним**

157. Показником виведення лікарської речовини є:

- A) Біотрансформація лікарської речовини
- B) Об'єм розподілу лікарської речовини
- C) Біодоступність препарату
- * D) Період напіввиведення**

158. Які лікарські засоби називаються агоністами?

- A) Токсичні лікарські засоби
- * B) Підсилюючі дію інших лікарських засобів**
- C) Конкуруючі з іншими лікарськими засобами
- D) Ті, що знижують функцію рецепторів
- E) Ті, що збуджують рецептори

159. Назвіть один з основних проявів економізації фізіологічних функцій у спортсменів:

- * A) Брадикардія**
- B) Схильність до гіпертензії
- C) Збільшення частоти дихання
- D) Скорочення фаз діастолі та систолі
- E) Зменшення ударного об'єму серця

160. Яка з вправ відноситься до аеробних?

- * A) Пішохідні прогулянки**
- B) Біг з максимальною швидкістю
- C) Стрибки
- D) Метання
- E) Штанга

161. Яка з вправ відноситься до вправ з субмаксимальною аеробною напругою?

- A) 95-100% від максимальної потреби міокарда в кисні (МПК)
- * B) 80-90% від максимальної потреби міокарда в кисні (МПК)**
- C) 70-75% від максимальної потреби міокарда в кисні (МПК)
- D) 55-60% від максимальної потреби міокарда в кисні (МПК)
- E) Менше 50% від максимальної потреби міокарда в кисні (МПК)

162. Якою є пікова ЧСС для тих осіб, які починають оздоровче тренування?

- A) 200 - вік
- * B) 180 - вік**
- C) 220 - вік
- D) 170 - 0,5 віку
- E) 200 - 0,5 віку

163. Вкажіть клінічні ознаки пізнього токсикозу вагітних:

- * A) набряки**
- * B) Артеріальна гіпертензія**
- * C) Протеїнурія**
- D) Креатинінемія
- E) Гіперурікемія

164. Інтенсивний показник вказує на:

- A) Відношення частки до цілого
- * B) Частоту явища, що вивчається у середовищі**
- C) Відношення між двома самостійними сукупностями
- D) Ступінь зміни порівнюваних величин
- E) Ймовірність появи будь-якої події

165. При значенні $p < 0,001$ ймовірність відмінності є більшою за:

- A) 80%
- * B) 99,9%**
- C) 95%
- D) 99%
- E) 93%

166. Які з наведених шляхів передачі інфекції є характерними для вірусу імунодефіциту людини?

- * А) Статеві контакти**
- * В) Використання інфікованих голок для ін'єкцій, стоматологічних та гінекологічних інструментів**
- * С) Внутрішньоутробний, під час пологів, при годуванні грудним молоком**
- D) Повітряно-крапельний
- * Е) Донорські органи, тканини, кров**

167. Показання до призначення преднізолону при інфекційному мононуклеозі:

- A) Важка ангіна
- B) Астенічний синдром
- * С) Розвиток імунних ускладнень**
- * D) Важка кропив'янка**

168. Який з наведених розчинів найбільш доцільно використовувати для оральної регідrataції?

- A) 5% розчин глюкози
- B) Розчин Рінгера
- C) Розчин натрію гідрокарбонату
- * D) Регідрон**
- E) Альвезин

169. Хто є джерелом інфекції при лептоспірозі?

- A) Хвора людина
- B) Носій
- * С) Хворі тварини**

170. Клінічними ознаками лептоспірозу є:

- * А) Лихоманка**
- * В) Жовтяниця**
- * С) Біль у м'язах**
- D) Судоми
- * Е) Гематурія**

171. При якому захворюванні частіше виникає синдром крупа?

- A) Аденовірусній інфекції
- B) Герпесвірусній інфекції
- C) Риновірусній інфекції
- * D) Парагрипі**

172. Назвіть клінічні ознаки стенозу гортані II ступеня при несправжньому крупі:

- * А) Задуха у спокої**
- * В) Інспіраторна задуха**
- * С) Тахікардія**
- D) Лихоманка
- * Е) Акроціаноз**

173. Назвіть засоби догоспітальної допомоги при крупі:

- * А) Відволікаюча терапія**
- * В) Парові інгаляції**
- * С) Седативна терапія**
- D) Введення еуфіліну

174. До яких клітин крові вірус СНІДу має найбільшу селективну тропність:

- A) Т-супресорів
- B) Т-кілерів
- C) Тромбоцитів

*** D) Т-хелперів**

175. Назвіть СНІД-індіфікаційні хвороби:

*** A) Кандидоз дихальних шляхів**

*** B) Криптоспорідіоз**

*** C) Саркома Капоші**

D) Рак шлунка

E) Бронхіальна астма

176. Які з наведених середовищ організму є найбільш небезпечними при передачі ВІЛ-інфекції?

- A) Слина
- B) Сеча
- C) Піт

*** D) Кров, сперма, грудне молоко**

177. Яка опортуністична інфекція при ВІЛ-інфекції зустрічається найбільш часто?

*** A) Герпетична**

*** B) Цитомегаловірусна**

*** C) Кандидоз**

*** D) Пневмоцистоз**

E) Пневмококова

178. Зазначте основні причини росту алергічних захворювань?

- * А) Екологічні забруднення**
- * В) Нераціональне харчування**
- * С) Поліпрагмазія**
- * D) Застосування вакцин і сироваток**
- Е) Похилий вік

179. Зазначте основні властивості алергенів:

- * А) Макромолекулярність**
- * В) Білкова природа**
- * С) Чужерідність**
- D) Розчинність у воді
- Е) Розчинність у жирах

180. Чи є алерген антигеном?

- * А) Так**
- В) Ні

181. Які з перерахованих алергенів відносяться до алергенів інфекційного походження?

- A) Епідермальні
- В) Харчові
- * С) Бактеріальні**
- * D) Грибкові**
- * Е) Вірусні**

182. Які з перерахованих алергенів переважають серед побутових алергенів?

- * А) Бібліотечний пил**
- * В) Домашній пил**
- * С) Алергени дафній**
- D) Отрута змій

183. Перерахуйте алергени, що відносяться до групи інсектних:

- A) Отрута змій
- * В) Отрута комах, що жалять**
- * С) Слина комах, що кусають**
- * D) Пил з частинок комах**

184. Які з перерахованих реакцій відносяться до реакцій реагінового типу?

- * А) Алергічні реакції негайного типу**
- B) Алергічні реакції уповільненого типу
- * С) Реакції анафілактичного типу**
- D) Реакції цитотоксичного типу

185. На протязі якого часу розвивається реакція негайного типу?

- A) 1-2 хв
- * В) 5-30 хв**
- C) 2-3 години
- D) До 10-12 годин
- E) 6 годин

186. На протязі якого часу зазвичай розвивається реакція гіперчутливості уповільненого типу?

- A) 1-2 хв
- B) 5-20 хв
- C) 10-12 годин
- * D) 24-72 години**

187. Яким клітинам належить основне значення у розвитку патохімічної стадії алергії реагінового типу?

- * A) Базофілам**
- * B) Опасистим клітинам**
- C) Гістіоцитам

188. Переважна локалізація клітин, що забезпечують розвиток патохімічної стадії алергії реагінового типу:

- * A) У кров'яному руслі**
- B) У лімфовузлах
- * C) У сполучній тканині навколо судинних терміналей**
- D) У паренхіматозних органах

189. Як змінюються стінки судин під впливом медіаторів запалення?

- A) Зменшується проникність судин
- B) Не змінюється проникність судин
- * C) Підвищується проникність судин**

190. Які судини найбільш схильні до впливу медіаторів алергічного запалення?

- * A) Дрібні**
- B) Середні
- C) Великі

191. Зазначте, де підвищується вміст еозинофілів при алергічних захворюваннях органів дихання реакінового типу?

*** А) У крові**

В) У сечі

*** С) У харкотинні**

192. Як називається сенсibilізація при підвищеній чутливості до одного алергену?

А) Активна

В) Пасивна

С) Внутрішньоутробна

*** D) Моновалентна**

Е) Полівалентна

ґ) Перехресна

193. Як називається сенсibilізація при підвищеній чутливості до багатьох алергенів?

А) Активна

В) Пасивна

С) Внутрішньоутробна

D) Моновалентна

*** E) Полівалентна**

ґ) Перехресна

194. Як називається сенсibilізація при підвищеній чутливості сенсibilізованого організму до інших антигенів, що мають загальні детермінанти з алергеном, що викликав сенсibilізацію?

- A) Активна
- B) Пасивна
- C) Внутрішньоутробна
- D) Моновалентна
- E) Полівалентна

*** F) Перехресна**

195. Зазначте стадії розвитку алергічних реакцій:

- * A) Імунологічна**
- * B) Патохімічна**
- * C) Патофізіологічна**
- D) Нейроендокринна
- E) Секреторна

196. Що є "центральною фігурою" імунної системи?

- A) Антиген
- B) Антитіло
- * C) Лімфоцит**
- D) Імуноглобулін

197. Які основні субпопуляції утворюють посттимічні лімфоцити?

- * A) Т-хелпери-1**
- * B) Т-хелпери-2**
- * C) Т-ефектори**
- D) Природні кілери
- E) В-лімфоцити

198. Які синоніми використовуються для визначення алергічних реакцій реакінового типу?

- * А) Атопічний тип алергії**
- * В) Анафілактичний тип алергії**
- * С) Алергічна реакція негайного типу**
- D) Алергічна реакція уповільненого типу
- E) Цитотоксична реакція
- * F) Гіперчутливість негайного типу**

199. Які органи можуть бути "шоковими "при алергії реакінового типу?

- * А) Шкіра**
- * В) Органи дихання**
- * С) Кишечник**
- * D) Кон'юнктива ока**
- E) Селезінка
- F) Тимус

200. Зазначте захворювання, розвиток яких може бути зумовлений реакціями реакінового типу?

- * А) Атопічна бронхіальна астма**
- * В) Поліноз**
- C) Пневмонія
- * D) набряк Квінке**
- * E) Харчова алергія**
- * F) Медикаментозна алергія**

201. Зазначте, рівні імуноглобулінів яких класів підвищуються при алергії реакінового типу:

*** A) E**

B) D

C) A

*** D) G**

E) M

202. Зазначте основний медіатор алергічної реакції реакінового типу:

*** A) Гістамін**

B) Серотонін

C) Гепарин

D) Фосфоліпаза Д

203. Активація гіпофізарно-наднирникової системи:

*** A) Гальмує розвиток алергії**

B) Посилює розвиток алергії

C) Не впливає на розвиток алергії

204. Природними первинними органоспецифічними алергенами є:

*** A) Алергени кришталіка**

*** B) Алергени щитовидної залози**

*** C) Алергени нервової тканини**

*** D) Алергени тканини яєчка**

E) Алергени лейкоцитів

205. До якої фракції сироваткових білків відносяться антитіла?

A) Альфа

B) Бета

*** C) Гама**

206. Зазначте основний клас імуноглобулінів, наявних у сироватці крові?

- A) M
- * B) G**
- C) A
- D) E
- E) D

207. Зазначте центральний орган імунітету:

- * A) Тимус**
- B) Селезінка
- C) Лімфовузли
- D) Периферична кров
- * E) Пейєрові бляшки кишечника**

208. Імунологічно компетентними є:

- * A) Т-лімфоцити**
- * B) В-лімфоцити**
- * C) Макрофаги**
- D) Еритроцити

209. Біологічні функції секреторного імуноглобуліну А:

- * A) Перешкоджає прикріпленню збудників до клітин слизової оболонки**
- * B) Пригнічує ріст бактерій**
- * C) Нейтралізує токсини**
- * D) Захищає слизові оболонки від інфекції**
- E) Зумовлює опсонізацію

210. Зазначте алергічні захворювання, що можуть бути викликані неінфекційними алергенами:

- * А) Атопічна бронхіальна астма**
- * В) Поліноз**
- * С) Атопічний дерматит**
- * D) набряк Квінке, кропив'янка**
- Е) Гельмінтози

211. Відзначте характерний початок розвитку алергічних захворювань, викликаних неінфекційними алергенами:

- * А) Гострий**
- В) Після тривалого періоду продромальних симптомів

212. Зазначте умови, що сприяють розвитку алергічних захворювань, зумовлених неінфекційними алергенами:

- * А) Сезонність**
- * В) наявність алергенів у навколишньому середовищі**
- С) Попередній розвиток важкого інфекційного процесу
- * D) Позитивний алергологічний сімейний анамнез**
- * Е) Специфічна по відношенню до алергену сенсibilізація організму**

213. Зазначте можливі шляхи надходження алергену в організм при алергії, викликаній неінфекційними алергенами:

- * А) Інгаляційний**
- * В) Пероральний**
- * С) Контактний (транскутанний)**
- * D) Парентеральний**
- Е) Жодний із перерахованих шляхів не має значення

214. Зазначте, від чого може залежати вірогідність розвитку алергії неінфекційного генезу у людей з обтяженим алергологічним анамнезом:

- * А) Від екологічних умов**
- * В) Від побутових умов**
- * С) Від широти асортименту вживаних медикаментозних засобів**
- * D) Від професійних умов**
- Е) Від віку і статі

215. Частота виникнення алергії неінфекційного генезу, викликаной медикаментозними алергенами, залежить від:

- * А) Поліпрагмазії**
- * В) Застосування медикаментозних засобів без урахування загальних або перехресно реагуючих детермінант**
- * С) Якості застосовуваних медикаментозних речовин**
- * D) Генетичної схильності**
- * Е) Ефективності проведення індивідуальних і загальних заходів оздоровлення, умов роботи медичних робітників і робітників сфери виробництва медичних і біологічних препаратів**
- Ф) Віку хворого

216. Зазначте алергічні захворювання і стани, які можуть бути зумовлені надходженням в організм харчових алергенів

- * А) Атопічна бронхіальна астма**
- * В) Алергічний риніт, алергічний кон'юнктивіт**
- * С) Поліноз**
- * D) Анафілактичний шок**
- * Е) набряк Квінке, кропив'янка, атопічний дерматит**
- Ф) Все, крім полінозу та анафілактичного шоку

217. Зазначте алергічні захворювання і стани, які можуть бути зумовлені надходженням в організм промислових алергенів?

- * А) Атопічна бронхіальна астма**
- * В) Контактний алергічний дерматит**
- * С) Алергічні захворювання верхніх дихальних шляхів**
- * D) Алергічний кон'юнктивіт**
- * Е) Атопічний дерматит, набряк Квінке, кропив'янка**
- F) Все, крім анафілактичного шоку

218. При яких інфекційних захворюваннях алергічні реакції можуть мати значення в патогенезі захворювання?

- * А) Туберкульозі**
- * В) Скарлатині**
- C) Холері
- * D) Кандидозі**

219. Яка роль антитіл при бактеріальній алергії?

- * А) Мають пряму антибактеріальну дію**
- * В) Нейтралізують бактеріальні токсини**
- * С) Посилюють фагоцитоз**
- D) Провокують аутоімунний процес

220. Для гіперчутливості уповільненого типу при інфекційних захворюваннях характерні:

- A) Короткий інкубаційний період
- * В) Тривалий інкубаційний період**
- * С) Затяжний перебіг захворювання**
- * D) Латентні форми захворювання**

221. Алергія, що індукована збудниками інфекційного захворювання, клінічно може виявлятися:

- * А) Самостійним захворюванням**
- * В) Симптомом інфекційно-алергічного захворювання**
- С) Клінічно не виявляється

222. Які проби використовуються для визначення гіперчутливості до фізичних чинників?

- * А) Теплові і холодіві аплікаційні**
- В) Підшкірні
- С) Внутрішньошкірні
- Д) Інгаляційні

223. При імунотоксичному типі алергічної реакції виявляються через:

- А) 2 доби
- В) 12 годин
- С) 20 хвилин
- Д) 1-2 хвилини
- * Е) 4-6 годин**

224. При клітинному типі алергічної реакції виявляються через:

- А) 3 доби
- * В) 24-48 годин**
- С) 5-8 діб
- Д) 1-2 хвилини
- Е) 4-6 годин

225. Лікування хворих з алергічними захворюваннями повинно бути:

- * А) Етіотропним**
- * В) Патогенетичним**
- * С) Симптоматичним**
- * D) Комплексним**
- * Е) Поетапним**
- * F) Індивідуалізованим**
- G) Тільки етіотропним

226. Зазначте класичний для алергології засіб терапії і профілактики:

- * А) Антигістамінна терапія**
- * В) Специфічна гіпосенсибілізація**
- C) Пасивна імунотерапія
- * D) Неспецифічна імунотерапія**

227. При реагіновому типі алергічні реакції виявляються через:

- A) 48 годин
- B) 25 години
- * C) 5-20 хвилин**
- D) 2 доби

228. Зазначте найбільш часті клінічні прояви полінозу:

- * А) Рино-кон'юнктивальний синдром**
- B) Еозинофільний легеневий інфільтрат
- C) набряк Квінке
- D) Алергічний арахноенцефаліт

229. Які зміни у формулі крові визначаються при полінозі?

- A) Анемія
- * В) Еозинофілія**
- C) Тромбоцитопенія
- D) Зміни кольорового показника
- E) Лейкоцитоз

230. З якими захворюваннями варто проводити диференціальну діагностику полінозу?

- * А) З аденовірусними хворобами**
- * В) Вазомоторним ринітом**
- * С) Кон'юнктивітом вірусним**
- D) Бронхіальною астмою

231. Яка особливість у формулі крові повинна насторожувати на можливу наявність гельмінтозів?

- * А) Лейкоцитоз**
- * В) Анемія**
- * С) Гіпереозинофілія**
- * D) Прискорення ШОЕ**
- E) Лімфоцитоз

232. З якими захворюванням частіше необхідно диференціювати анкілостомідоз?

- A) Гепатитом
- * В) Гострим гастритом**
- * С) Виразковою хворобою дванадцятипалої кишки**
- * D) Анемією Бірмера**
- * E) Бронхіальною астмою**

233. При вживанні якої їжі можливе зараження дифілоботріозом?

- A) М'яса
- B) Сирих овочів
- * C) Сирої риби**
- D) Фруктів
- E) Молока

234. Які препарати використовуються при лікуванні аскаридозу?

- * A) Левамізол**
- * B) Пірантел**
- * C) Альбендазол**
- D) Піразідол

235. Виділіть збудника опісторхозу:

- A) Карликовий ціп'як
- B) Ціп'як бичачий
- C) Лентець широкий
- * D) Котяча двуустка**
- E) Вугриця кишкова

236. Через який продукт, як правило, можливе зараження трихінельозом?

- * A) Некип'ячену воду**
- B) Погано просмажену рибу
- * C) М'ясо свиней або диких тварин**
- * D) Брудні овочі**
- E) Лісові ягоди

237. Який орган найчастіше вражається при ехінококозі?

- * А) Печінка**
- * В) Селезінка**
- * С) Нирки**
- D) Кишечник
- E) Серце

238. Для синдрому Верніке-Корсакова при алкоголізмі характерні:

- * А) Порушення свідомості та сплутаність думок**
- * В) Парез м'язів ока**
- * С) Атаксія**
- D) Пароксизмальна миготлива аритмія

239. Перше місце в загальному комплексі лікування алкоголізму займає такий вид терапії:

- * А) Трудова терапія**
- * В) Дезінтоксикаційна терапія**
- * С) Психотерапія**
- * D) Умовнорефлекторна терапія**
- E) Фізіотерапія

240. Наркологія є галуззю:

- A) Неврології
- * В) Психіатрії**
- * С) Терапії**
- * D) Самостійна**
- * E) Токсикології**

241. Синдром Мелорі-Вейса, який спостерігається при алкогольній хворобі, характеризується:

- * А) Розривом слизової оболонки стравоходу в езофагокардіальній ділянці, що викликаний блюванням**
- В) Вираженою слинотечею
- С) Бронхореєю
- Д) Анурією
- Е) Галюцинаціями

242. Для позначення хворобливого стану, викликаного споживанням наркотичних препаратів, застосовується термін:

- А) Алкоголізм
- В) Лікарська залежність
- С) Пристрасть до лікарських засобів
- * Д) Наркоманія**
- Е) Токсикоманія

243. Найбільш істотна ознака переходу другої стадії алкоголізму в третю:

- * А) Істинні запої**
- В) Псевдозапої
- * С) Початок первинного зниження толерантності до алкоголю**
- * Д) Нестримний характер потягу до алкоголю**
- * Е) Відновлення захисного блювотного рефлексу**

244. При цирозі печінки у хворих на алкоголізм часто спостерігається:

- * А) Внутрішньопечінковий холестаз**
- В) Позапечінковий холестаз
- * С) Гемолітичний синдром**
- * Д) Гемохроматоз**
- * Е) Гіпергамаглобулінемія**

245. При алкогольній хворобі можуть спостерігатись такі ураження печінки:

- * А) Жирова інфільтрація**
- * В) Алкогольний гепатит**
- * С) Цироз печінки**
- * D) Синдром Zieve**
- Е) Хронічний вірусний гепатит

246. Для ураження серцево-судинної системи при алкогольній хворобі характерні:

- * А) Пароксизмальна миготлива аритмія**
- * В) Дилатаційна кардіоміопатія**
- * С) Артеріальна гіпертензія**
- D) Перикардит

247. Для порушення обміну речовин при алкогольній хворобі характерні:

- * А) Гіпертригліцеридемія**
- * В) Гіперурикемія**
- * С) Гіпоглікемія**
- * D) Недостатність фолієвої кислоти з гіперхромною анемією**
- Е) Глюкозурія

248. Патологічний потяг до алкоголю є основним симптомом такого захворювання:

- * А) Прихованої епілепсії**
- * В) Циклотимії**
- * С) Фазних станів психопатії**
- * D) Алкоголізму**
- Е) Побутового пияцтва

249. Які групи препаратів здатні викликати токсикоманію?

- * А) Психотропні (транквілізатори, антидепресанти)**
- * В) Деякі снодійні**
- С) Нестероїдні протизапальні препарати
- * D) Стимулятори (кофеїн та його алкалоїди)**
- * Е) Протипаркінсонічні**

250. Для дизентерії характерні:

- * А) Прони у вигляді "малинового желе"**
- * В) Болі в животі**
- * С) Тенезми**
- D) Стілець у вигляді "рисового відвару"

251. До ранніх симптомів раку шлунка відносяться такі групи проявів:

- * А) Безпричинна слабкість, зниження працездатності, швидка стомлюваність, психічна депресія, апатія**
- * В) Немотивована огида до їжі, шлунковий дискомфорт**
- * С) Немотивоване схуднення, блідість, анемія**
- D) Жовтяниця

252. Найбільш частий симптом раку шлунка:

- * А) Відрижка**
- * В) Відчуття переповнення шлунка**
- * С) Печія**
- * D) Біль у епігастральній ділянці**
- E) Пронос

253. Для малярії характерні:

- * А) Лихоманка з пропасницею і критичним зниженням t° тіла**
- * В) Збільшення печінки та селезінки**
- * С) Анемія, тромбоцитопенія**
- D) Гіпертромбоцитоз

254. "Німі" форми рака шлунка найчастіше зустрічаються при локалізації пухлини в такому відділі шлунка:

- * А) Велика кривизна**
- B) Передня стінка
- * С) Задня стінка**
- * D) Дно шлунка**
- E) Кардіальний відділ

255. Для карциноїдного синдрому характерні:

- * А) Минуча ціанотична гіперемія шкіри**
- * В) Напади бронхоспазму**
- * С) Різке падіння АТ**
- * D) Діарея**
- E) Брадикардія

256. Діагностична ознака, яка відрізняє інсулому від рака підшлункової залози:

- * А) Нормальна ШОЕ**
- * В) Пангіперхлоргідрія**
- C) Відсутність клінічної симптоматики
- D) Характер жовтяниці
- * Е) Поява гіперінсулінемії**

257. Рак великого дуоденального сосочка відрізняється від раку головки підшлункової залози такими симптомами:

- A) Позитивним симптомом Курвуазье
- * B) Кровотечею з пухлини**
- * C) Розвитком холангіту**
- * D) Приєднанням панкреатиту**
- * E) Ранньою появою жовтяниці хвилеподібного характеру**

258. Найбільш виражений і найбільш постійний клінічний симптом раку тіла і хвоста підшлункової залози:

- A) Розвиток гастродуоденальної непрохідності
- * B) Механічна жовтяниця**
- * C) Біль в епігастральній ділянці**
- * D) Значне схуднення**
- * E) Диспепсичні розлади**

259. Клінічні прояви раку підшлункової залози в дожовтяничному періоді мають симптоми, подібні до таких захворювань:

- * A) Гастрит**
- * B) Цукровий діабет**
- * C) Панкреатит**
- D) Ентероколіт
- * E) Холангіт**

260. Найбільш часта локалізація раку підшлункової залози:

- * A) Дифузна**
- * B) Хвіст**
- * C) Тіло**
- * D) Головка**
- E) Вивідна протока

261. Найбільш вірогідний метод діагностики доброякісних пухлин товстої кишки при позакишковому поширенні процесу:

- A) Глибока пальпація
- * B) Колоноскопія**
- * C) Ірігоскопія**
- * D) Біопсія**
- * E) Лапароскопія**

262. Ракова пухлина товстого кишечника частіше всього розташовується в такому відділі:

- A) Апендикулярному відростку
- * B) Поперечно-ободовій кишці**
- * C) Сліпій і сигмовидній кишці**
- * D) Низхідному відділі**
- * E) Селезінковому вигині**

263. При підозрі на рак товстої кишки необхідно провести такі обстеження:

- A) Реакцію кала на стеркобілін
- * B) Ірігоскопію**
- * C) Колоноскопію**
- * D) Пальцеве дослідження прямої кишки**
- * E) Ректороманоскопію**

264. Для раку правих відділів ободової кишки характерні:

- * A) Анемія**
- * B) Біль у животі**
- C) Гостра кишкова непрохідність

265. У переважної більшості хворих першими ознаками раку прямої кишки є:

- A) Стрічкоподібний кал
- * B) Несправжні позиви до дефекації**
- * C) Поява крові і слизу в калі**
- * D) Почуття незадоволення після акту дефекації**
- * E) Біль внизу живота, в крижах**

266. Рак прямої кишки діагностується на основі:

- A) Імунологічного дослідження
- B) Серологічного дослідження
- * C) Пальцевого дослідження**
- * D) Ірігоскопічного дослідження**
- * E) Ректороманоскопії і колоноскопії з біопсією**

267. Показання до проведення тромболізу при ішемічній хворобі серця:

- A) Дрібновогнищевий інфаркт міокарда
- B) Нестабільна стенокардія
- * C) Великовогнищевий інфаркт міокарда**
- D) При стабільній стенокардії для профілактики інфаркту міокарда
- E) Варіантна стенокардія