

ЗАВАНТАЖЕНО З САЙТУ ТЕСТУВАННЯ.УКР

Остеохондроз хребта

Категорія: **Нейрохірургія**

Кількість запитань: **38**

1. Біль та гіпестезія шкіри при компресії корінця S1 локалізується

- * А) по задньозовнішній поверхні стегна**
- В) по передній поверхні ноги
- * С) по задньозовнішній поверхні гомілки**
- * D) по задньозовнішній поверхні стопи**

2. Якими є рентгенологічні ознаки при остеохондрозі хребта?

- * А) деформуючий артроз**
- * В) деформуючий спондильоз**
- * С) остеохондроз**
- Д) звуження основи коренів дуг

3. Позначте клінічні прояви розвитку остеохондрозу

- * А) люмбаго**
- * В) люмбалгія**
- * С) шийні простріли**
- * D) радикулярний синдром**
- Е) синдром Броун-Секара
- * F) мієлопатія**

4. Що з наведеного є особливостями прояву поперекового остеохондрозу

- * А) радикулярний синдром**
- * В) наростання больового синдрому поперекового остеохондрозу**
- * С) патологічне викривлення хребта**
- Д) синдром Броун-Секара

5. Що з наведеного є особливостями прояву грудного остеохондрозу

- * А) біль в грудному відділі хребта**
- * В) швидка втомлюваність при ходьбі**
- * С) розвиток рухових порушень**
- D) дисоційований тип порушення чутливості
- * Е) симпаталгічний синдром**
- * F) синдром ураження артерії Адамкевича**

6. Що з наведеного є особливостями шийного остеохондрозу

- * А) шийні простріли**
- * В) радикулярні синдроми**
- C) синдром Клод Бернара-Горнера
- * D) нейрорефлекторний синдром**
- * Е) синдром вертебробазиллярної недостатності**
- * F) цервікальна мієлопатія**

7. До принципів консервативного лікування остеохондрозу хребта відносять

- * А) анталгічна терапія**
- * В) дегідратуюча терапія**
- C) антикоагулянти
- D) дихальні аналептики
- * Е) покращення мікроциркуляції**
- * F) вітамінотерапія**

8. Що з наведеного є ознаками вертебро-базиллярної недостатності

*** А) біль в потиличній ділянці**

В) зниження зору

*** С) тиск в очних яблуках**

*** D) головокружіння**

*** Е) шум**

Ф) синдром Броун-Секара

9. Позначте симптоми хронічної диско генної церві кальної мієлопатії

*** А) пірамідні розлади**

*** В) провідникові порушення чутливості**

С) хапальний симптом Янишевського

*** D) атрофії**

*** Е) фасцикуляції у м'язах рук**

10. Фактори, що сприяють цервікальній мієлопатії

А) поперековий остеохондроз

*** В) стиснення передньої спіральної та корінцевих артерій**

*** С) злуковий арахноїдит**

Д) сирінгомієлія

11. Синдроми, що виникають при шийному остеохондрозі

*** А) компресійні**

*** В) рефлекторні**

С) псевдобульбарний

*** D) шийні простріли**

12. Позначте симптоми серединної грижі диску грудного відділу хребта

- * А) симетричний пара парез**
- В) корінцевий симптом
- С) синдром ураження конусу спинного мозку
- * D) гіпестезія з двох сторін**

13. Позначте симптоми при парамедіанних грижах грудних дисків

- А) синдром Броун-Секара
- В) синдром ураження артерії Лазорта
- * С) переважання симптомів ураження однієї сторони спинного мозку**
- * D) корінцеві болі**

14. Фактори, що впливають на розвиток остеохондроза хребта

- * А) фізична перенапруга**
- В) прийом інсуліну
- * С) хронічна мікро травматизація хребта**
- * D) порушення хімізму дисків**
- * Е) атеросклеротичні зміни судин, що живлять хребет**
- * F) аутоімунні реакції**

15. Що з наведеного є ознаками ураження корінця C5

- А) порушення чутливості по внутрішній поверхні плеча
- * В) біль в ділянці шиї, надпліччя, зовнішньої поверхні плеча**
- С) слабкість V пальця руки
- * D) слабкість дельтовидного м'язу**
- * Е) порушення чутливості по зовнішній поверхні плеча**

16. Що з наведеного є ознаками ураження корінця C6

- A) порушення діафрагмального дихання
- * B) біль в ділянці шиї, в лопатці, по зовнішній поверхні плеча, променевого краю передпліччя, великого пальця
- * C) порушення чутливості по променевого краю передпліччя, в великому пальці
- * D) зниження рефлексу із сухожилку двоголового м'язу

17. Що з наведеного є ознаками ураження корінця C7

- A) синдром Броун-Секара
- * B) біль в ділянці шиї, лопатки, задньої поверхні плеча, задньої поверхні передпліччя, вказівному та середньому пальцях
- C) порушення діафрагмального дихання
- * D) порушення чутливості по задній поверхні плеча, задньої поверхні передпліччя, вказівному та середньому пальцях
- * E) слабкість в триголовому м'язі

18. Що з наведеного є ознаками ураження корінця C8

- * A) біль в ділянці шиї, по ульнарній поверхні передпліччя, в мізинці
- * B) порушення чутливості по ульнарній поверхні передпліччя, в мізинці
- * C) зниження або відсутність супінаторного рефлексу
- D) захисні рефлекси Марі-Фуа

19. При тунельному ураженні n.suprascapularis спостерігаються

- * A) біль в надлопатковій ділянці
- * B) парез зовнішніх ротаторів плеча
- * C) гіпотрофія mm.supraspinatus et infraspinatus
- D) біль іррадіює по внутрішній поверхні руки
- * E) болючість при натискуванні в ділянці надпліччя над проекцією надлопаткового нерву

20. Стенокардію при шийному та грудному остеохондрозі дозволяє виключити

- * А) тривалість болю більше декількох годин**
- * В) неефективність нітрогліцерину**
- С) наявність синдрому Броун-Секара
- * D) відсутність змін на ЕКГ**

21. Що з наведеного є проявом дискогенної цервікальної мієлопатії

- * А) підвищення сухожилкових та періостальних рефлексів**
- В) корінцевий біль
- * С) наявність патологічних рефлексів**
- * D) парези кінцівок**
- * Е) порушення чутливості**
- * F) фасцикулярні посмикування**

22. Диференційний діагноз між боковим аміотрофічним склерозом та дискогенною цервікальною мієлопатією базується на

- А) дисоційований тип порушення чутливості
- * В) відсутності бульбарного синдрому**
- * С) доброякісний перебіг впродовж багатьох років**
- * D) наявність на МР томограмах виражених гриж міжхребцевих дисків на шийному рівні**

23. При синдромі передньої спіральної артерії (синдром Преображенського) спостерігаються

- * А) спастична нижня параплегія**
- * В) дисоційовані розлади чутливості**
- * С) тазові порушення**
- D) синдром Бернара-Горнера

24. Диференційний діагноз між туберкульозним спондилітом та остеохондрозом грудного відділу хребта базується на

- * А) рентгенологічній картині**
- * В) туберкулінових пробах**
- * С) запальних змінах крові**
- D) захисних рефлексів Марі-Фуа
- * Е) підвищеній температурі тіла**

25. Диференційний діагноз між стенокардією та остеохондрозом грудного відділу хребта базується на

- * А) характеру болі та її зміні після прийому нітрогліцерину**
- * В) обмеженні рухів в грудному відділі хребта**
- C) синдромі Броун-Секара
- * D) порушенні чутливості в ділянці декількох грудних сегментів**
- * Е) наявності чи відсутності змін на ЕКГ**

26. Сколіоз - найбільш частий симптом при

- * А) задньобоковій грижі міжхребцевих дисків**
- B) медіанній грижі міжхребцевих дисків

27. В'ялі паралічі при остеохондрозі поперекового відділу хребта розвиваються при

- A) значному анталгічному синдрому
- * В) стисненні всього масиву корінців cauda equina серединною грижею**
- * С) компресії артерії Депрож-Готерона**
- D) при протрузіях міжхребцевих дисків

28. Біль та гіпестезія шкіри при компресії корінця L5 локалізується

- A) по передній поверхні ноги
- B) по задній поверхні ноги
- * C) по зовнішній поверхні стегна**
- * D) по передньозовнішній поверхні гомілки**

29. Що з наведеного є показами до оперативного лікування при грижах диску поперекового відділу хребта

- A) дисоційований тип порушення чутливості
- * B) виражений больовий синдром**
- * C) неефективність консервативної терапії**
- * D) тривала непрацездатність**

30. Типи розвитку синдрому компресії кінського хвоста

- * A) повільно, неухильно прогресуючий**
- * B) прогресуючий з ремісіями больового синдрому**
- * C) гострий, інсультподібний**
- D) з періодичними регресами неврологічної симптоматики

31. Для гіпертрофії жовтої зв'язки без грижі диску характерні

- * A) поступовий розвиток корінцевих синдромів**
- * B) відсутність в анамнезі люмбаго**
- * C) кіфоз в поперековому відділі**
- D) синдром Броун-Секара
- * E) відсутність даних про зв'язок захворювання із травмою**
- * F) згладженість поперекового лордозу**

32. Неврологічні синдроми поперекового остеохондрозу потрібно диференціювати із

- * **A) невриномою кінського хвоста**
- * **B) хворобою Бехтерева**
 - C) тромбофлебітом
- * **D) анкілозуючим гіперостозом**
- * **E) туберкульозним спондилітом**
- * **F) мієломною хворобою**
- * **G) ураженням кульшових суглобів**
- * **H) тунельними синдромами ураження периферичних нервових стовбурів**

33. Синдром хребцевої артерії при шийному остеохондрозі проявляється

- * **A) болем, парестезіями у шийно-потиличній ділянці**
- * **B) ірадіацією болю у тім'я, скроню, завушну ділянку**
 - C) геміплегією
 - D) порушенням ковтання
- * **E) відчуттям стороннього тіла в оці на стороні синдрому**
- * **F) головокружінням, що супроводжується нудотою, блювотою**
- * **G) фотопсіями**

34. На оглядових рентгенограмах при шийному остеохондрозі виявляються

- * **A) випрямлення фізіологічного лордозу в одному чи декількох шийних сегментах**
- * **B) місцевий кіфоз**
 - C) руйнування дуг хребців
 - D) остеопороз остистих відростків
- * **E) зменшення висоти міжхребцевих дисків**
- * **F) передні та задні крайові кісткові розростання тіл хребців**
- * **G) деформуючий спондиліоз**
- * **H) нерівномірність кінцевих пластинок**
- * **-) субхондральний склероз**

35. Які є стадії розвитку остеохондроза хребта

- A) стадія руйнування тіла хребця
- * B) стадія внутрішньо дискового процесу**
- * C) стадія порушення фіксаційної здатності диска**
- * D) стадія повного розриву диску та формування грижі диску**
- * E) стадія ураження інших елементів хребта**

36. Для хірургічного лікування поперекового остеохондрозу абсолютним показом є

- * A) кауда-сндром**
- B) трофічні порушення в ділянці стоп
- C) патологічні рефлекс на ногах

37. Позначте рентгенологічні ознаки остеохондрозу

- * A) зменшення висоти міжхребцевих дисків**
- * B) потовщення та нерівність кінцевих пластинок**
- * C) склероз суміжних тіл хребців**
- * D) остеофіти**
- * E) зміна розмірів міжхребцевих отворів**
- F) руйнування тіл хребців

38. При шийній мієлопатії показами до хірургічного лікування є

- * A) відсутність ефекту від консервативної терапії**
- B) невелика давність захворювання
- * C) наростання спінальних симптомів**
- * D) виражений спондильоз на одному рівні**
- E) відсутність компресійного синдрому
- * F) ознаки компресії спинного мозку**
- * G) ліквородинамічний блок**