

ЗАВАНТАЖЕНО З САЙТУ ТЕСТУВАННЯ.УКР

Епілепсія

Категорія: **Нейрохірургія**

Кількість запитань: **35**

1. При скроневій епілепсії спостерігаються

- * **A) вегетативна аура**
- * **B) психічна аура**
- C) чутлива аура
- * **D) сенсорна аура**

2. Лікування травматичної епілепсії

- * **A) має бути раннім**
- B) має проводитись все життя
- * **C) має бути тривалим**
- * **D) має бути систематичним**
- * **E) має комплексним**

3. Покази до хірургічного лікування травматичної епілепсії

- * **A) наявність рубцевих змін в мозку та оболонок**
- B) дифузні зміни мозку та його оболонок
- C) рідкі епінапади, що піддаються консервативній терапії
- * **D) кісти мозку та оболонок**
- * **E) кісткові відламки в порожнині черепа**
- * **F) сторонні тіла в порожнині черепа**
- * **G) епілептичний стан, що не піддається консервативного лікування**

4. Особливості клінічного перебігу травматичної епілепсії

- * **A) розвиток в пізньому періоді черепно-мозкової травми**
- * **B) аритмічність нападів**
- * **C) нестійкість**
- D) грубі порушення інтелекту
- E) стереотипність нападів
- * **F) прогредієнтність**
- * **G) відсутність стереотипності нападів**

5. Особливості епінападів при пухлинах головного мозку

- A) епілептичний стан
- * B) поява після нападу симптомів випадіння, котрі спочатку можуть мати транзиторний характер
- * C) поглиблення та стійкість парезів під час повторення нападів
- * D) при значному наростанні рухових порушень напади стають рідшими
- * E) перші напади можуть мати генералізований характер, а послідуючі - парціальний
- * F) поява гіпертензійного синдрому

6. При менінгіомах епілептичні напади

- * A) мають парціальний сенсомоторний, рідше соматомоторний характер
- * B) однотипові
- * C) довгий час є єдиними симптомами захворювання
- D) мають вигляд типовий для епілептичного стану

7. Для епілептичних нападів при олігодендрогліомах характерні

- * A) моторний тип нападів
- * B) велике розмаїття вогнищезового початку
- C) однотипність нападів
- * D) схильність до серійного протікання
- * E) багаторічний період ізолюваного існування нападів

8. Для астроцитом характерні

- * A) моторний тип нападів
- B) епілептичний стан
- * C) мономорфність перебігу
- * D) відносно короткий період ізолюваного існування нападів

9. Особливості епілептичних нападів при арахноїдиті головного мозку

- A) груба неврологічна симптоматика
- * B) поліморфність нападів
- * C) вираженість вегетативних симптомів
- * D) загально мозкова симптоматика (головний біль, блювота) слабо виражена
- * E) симптоми випадіння після нападу можуть бути відсутніми, вони не поглиблюються

10. Епілептичні напади при цистіцеркозі головного мозку характеризують

- * A) поліморфність нападів
- * B) динамічність, мобільність нападів
- * C) аритмічність нападів з тривалими ремісіями
- * D) превалювання симптомів подразнення (епінапади) над легкими симптомами випадіння
- E) груба вогнищева симптоматика

11. Епілепсію необхідно диференціювати із

- * A) істерією
- * B) уремією
- * C) еклампсією
- D) хворобою Піка

12. Судомні напади можуть виникати при

- A) міастенії
- * B) ревматичному ураженні нервової системи
- * C) малярійному ушкодженні нервової системи
- * D) пухлинах мозку
- * E) паразитарному захворюванні мозку
- * F) інтоксикаціях

13. При судомних нападах з алкогольною інтоксикацією спостерігаються

- * А) гіпергідроз**
- * В) ціаноз обличчя**
- С) облісіння
- * D) тремор рук**
- * Е) тремор язика**

14. Основні ознаки судомних нападів при хронічному отруєнні свинцем

- * А) прогресування захворювання**
- В) гіперпітуїтаризм
- * С) головний біль, головокружіння**
- * D) ослаблення інтелекту**
- * Е) розлади пам'яті, мови**
- * F) розвиток депресії**

15. При епілепсії широко використовуються

- А) інсулін
- * В) фенобарбітал**
- * С) дифенін**
- * D) аміназин**
- * Е) оксибутират натрію**

16. Дія дифеніну на центральну нервову систему

- * А) пригнічення рухових центрів головного мозку**
- * В) заспокійлива дія**
- * С) седативна дія**
- D) збуджуюча дія

17. Найбільш часті напади в структурі пароксизмального синдрому скроневої епілепсії

- * А) генералізовані судомні напади, скроневі псевдоабсанси**
- В) геміплегія
- * С) психомоторні**
- * D) психосенсорні**
- * Е) соматосенсорні**
- * F) мовні**

18. При великому епілептичному нападі може спостерігатись

- А) нервова анорексія
- * В) відчуття страху**
- * С) відчуття радості**
- * D) дежа-вю**

19. При великому епілептичному нападі може спостерігатись

- * А) сенсорна аура**
- * В) моторна аура**
- * С) вегетативна аура**
- * D) психічна аура**
- Е) нервова анорексія

20. Фази великого епілептичного нападу

- * А) аура**
- * В) тонічна**
- * С) клоніко-тонічна**
- D) анорексія
- * Е) сопорозний стан**

21. Хірургічне лікування епілепсії показане при

- * А) наявності локалізованого епілептичного вогнища**
- * В) доступності церебральної структури для хірургічної деструкції**
- С) ефективності протисудомної терапії
- * D) неефективність тривалого та систематичного медикаментозного лікування**
- * Е) відсутність протипоказів до операції (порушення психіки)**

22. При вогнищевій епілепсії вогнище найбільш часто локалізується

- * А) в скроневій частці**
- * В) на конвексимальній поверхні лобно-скроневої ділянки**
- С) на медіальній поверхні лобно-скроневої ділянки
- Д) в ділянці потиличного полюсу

23. Найбільш часті етіологічні фактори скроневої епілепсії

- А) мозковий інсульт
- * В) пренатальні порушення**
- * С) натальні порушення**
- * D) інфекційні захворювання**
- Е) тромбоз середньої мозкової артерії

24. Для скроневої епілепсії найбільш характерні

- * А) психомоторні напади**
- В) дифузні напади
- * С) абортівні напади**
- Д) джексоновські напади

25. Основні покази до стереотаксичної операції при скроневій епілепсії

- * А) наявність типових скроневих нападів**
- В) наявність грубих рухових порушень
- * С) наявність малих нападів з чітким скроневим компонентом**
- * D) наявність бітемпоральних вогниш**
- * Е) виражені емоційні порушення**

26. При скроневій епілепсії з правостороннім вогнищем ураження виражені

- А) аграфія
- * В) вегетативно-вісцеральні прояви**
- * С) деперсоналізація**
- * D) тривога, депресія**

27. При скроневій епілепсії з лівостороннім вогнищем ураження спостерігається

- * А) переважання слухових розладів**
- * В) порушення сприйняття мови**
- * С) порушення читання**
- D) астереогноз

28. Джексонівська епілепсія може проявлятися

- * А) моторними нападами**
- * В) сенсорними нападами**
- С) психозом
- * D) сенсомоторними нападами**

29. Джексонівські напади часто є проявом

- А) алкогольної інтоксикації
- * В) пухлини півкуль великого мозку**
- * С) артеріо-венозної мальформації**
- D) забою мозку в гострому періоді захворювання

30. Характерними ознаками джексонівських нападів при артеріо-венозних аневризмах є їх поєднання із передвісниками нападу

- * А) головним болем**
- В) анізорефлексією
- * С) нудотою, блювотою**
- * D) головокружінням**
- * Е) транзиторними симптомами випадіння**

31. Психічні порушення, що найбільш часто спостерігаються при скроневій епілепсії

- А) психози
- * В) перманентні стани в інтелектуально-мнестичній сфері**
- * С) перманентні стани в емоційній сфері**
- * D) дисфорія**

32. Специфічні форми дитячої епілепсії

- * А) спазм немовляти**
- * В) пікноепілепсія**
- * С) синдром Леннокса-Гасто**
- * D) міоклонічна епілепсія**
- Е) великий судомний напад

33. Для нападів, що спостерігаються під час захворювання правцем, характерні

- * А) збереження свідомості**
- * В) наявність тонічних судом, що викликають опістотонус**
- * С) тризм жувальних м'язів**
- D) наявність нюхової, смакової аури
- * Е) напруження мимічних м'язів (сардонічна посмішка)**

34. Напади, що спостерігаються при отруєнні стрихніном характеризуються

- * А) відсутністю втрати свідомості під час судом**
- * В) наявністю, окрім судом, тремтіння кінцівок**
С) наявністю зорової аури
- * D) болями в кінцівках**
- * Е) туго рухомістю в кінцівках**

35. Особливості психогенного нападу при істерії

- * А) часто починається в присутності інших**
В) втрата свідомості
- * С) при падінні хворий не отримує тілесних пошкоджень**
- * D) хворий не прикусує язик**
- * Е) не відбувається сечовиділення**
- * F) судоми здебільшого в розгиначах (опістотонус)**
- * G) збереженість реакції зіниць на світло**
- * Н) хворі вдають активного опору при намаганні розплющити очі**