

ТЕСТУВАННЯ.УКР Бази тестів

Буклет Клінічна фармація року

Цей тест можна пройти в режимі онлайн тестування на сайті <https://тестування.укр/testkrok/studing/187>

Це офіційні тести з сайту Центру тестування <https://www.testcentr.org.ua/>

1. У больного ИБС через 6 месяцев лечения развилась толерантность к нитратам пролонгированного действия. Какое ЛС с нитратоподобным эффектом необходимо рекомендовать в этом случае?
 - A. Молсидомин *
 - B. Нифедипин
 - C. Празозин
 - D. Верапамил
 - E. Метопролол
2. При артериальной гипертензии прием лозартана противопоказан при следующих состояниях:
 - A. Беременность *
 - B. Гипергликемия
 - C. Мочекислый диатез
 - D. Гиперлипидемия
 - E. Гипокалиемия
3. Женщина 48-ми лет поступила в кардиологическое отделение с диагнозом ИБС: стенокардия. Приступы возникают 1-2 раза в день. Какой препарат наиболее целесообразно рекомендовать для лечения?
 - A. Изосорбида динитрат *
 - B. Эуфиллин
 - C. Но-шпа
 - D. Папаверин
 - E. Дипиридамол
4. Какие из нижеприведенных ЛС применяются при инфаркте миокарда для проведения тромболитической терапии:
 - A. Стрептокиназа *
 - B. Гепарин
 - C. Фенилин
 - D. Тиклопидин
 - E. Ацетилсалициловая кислота
5. Больному, перенесшему инфаркт миокарда, рекомендуется прием ацетилсалициловой кислоты с целью:
 - A. Уменьшения агрегации тромбоцитов *
 - B. Понижения температуры тела
 - C. Расширения коронарных сосудов

- D. Уменьшения воспаления
 - E. Снижения уровня холестерина
6. При лечении эналаприлом возможны следующие побочные эффекты:
- A. Кашель *
 - B. Слюнотечение
 - C. Гипокалиемиа
 - D. Запоры
 - E. Отеки голени
7. Проконсультируйте молодого врача: Какой препарат является специфическим антидотом при отравлении препаратами железа?
- A. Дефероксамин *
 - B. Протамина сульфат
 - C. Бемегрид
 - D. Атропин
 - E. Пеницилламин
8. Вагітна жінка захворіла на пневмонію тяжкого перебігу. Який з названих антибактеріальних препаратів доцільно їй призначити:
- A. Цефотаксим *
 - B. Гентаміцину сульфат
 - C. Тетрацикліну гідрохлорид
 - D. Офлоксацин
 - E. Бісептол
9. Одним з головних показників елімінації лікарських засобів з організму людини є:
- A. Період напіввиведення *
 - B. Об'єм розподілу
 - C. Біодоступність
 - D. Біоеквівалентність
 - E. Максимальна концентрація у крові
10. Які з наведених антигіпертензивних препаратів мають калійзберігаючу дію?
- A. Триамтерен *
 - B. Фуросемід
 - C. Празозін
 - D. Метопролол
 - E. Дилтіазем
11. У хворого на тромбофлебіт нижніх кінцівок виникли ознаки передозування гепарину. В цій ситуації показано введення:
- A. Протаміну сульфату *
 - B. Феніліну
 - C. Вікасолу

- D. Пентоксифіліну
- E. Дипіридамолу

12. Проконсультуйте молодого врача: Какой препарат является специфическим антидотом при отравлении препаратами железа?
- A. Дефероксамин *
 - B. Протамина сульфат
 - C. Бемегрид
 - D. Атропин
 - E. Пеницилламин
13. В аптеку звернулася мама 2-х місячної дитини з проханням видати жарознижувальний препарат. Який препарат Ви порекомендуєте для дитини?
- A. Парацетамол *
 - B. Німесулід
 - C. Ацетилсаліцилову кислоту
 - D. Індометацин
 - E. Діклофенак натрію
14. У 6-літньому віці дитина захворіла пневмонією, з приводу якої був призначений антибіотик. Після лікування дитина втратила слух. Яка група антибіотиків могла викликати це ускладнення ?
- A. Аміноглікозиди *
 - B. Цефалоспорини
 - C. Макроліди
 - D. Пеніциліни природні
 - E. Пеніциліни напівсинтетичні
15. Хвора 52-х років перенесла інфаркт міокарда і виписана на амбулаторний нагляд. Яку добову дозу ацетилсаліцилової кислоти необхідно призначити з метою профілактики тромбоутворення?
- A. 100 мг *
 - B. 500 мг
 - C. 1000 мг
 - D. 2000 мг
 - E. 3000 мг
16. Хворому з артеріальною гіпертензією було призначено один з антигіпертензивних засобів. Артеріальний тиск нормалізувався, однак хворого почав турбувати постійний сухий кашель. Який з перерахованих препаратів має таку побічну дію.
- A. Еналаприлу малеат *
 - B. Анаприлін
 - C. Клофелін
 - D. Фуросемид
 - E. Ніфедипін

17. Ответьте на вопрос провизора-интерна: какой слабительный препарат повышает тонус матки.
- A. Касторовое масло *
 - B. Вазелиновое масло
 - C. Оливковое масло
 - D. Глицерин
 - E. Подсолнечное масло
18. Объясните врачу скорой помощи почему снижается антикоагулянтный эффект синкумара при одновременном его применении с фенобарбиталом?
- A. Фенобарбитал активирует микросомальные ферменты печени *
 - B. Фенобарбитал ингибирует микросомальные ферменты печени
 - C. Развивается аллергия к синкумару
 - D. Проявляется антагонизм этих препаратов
 - E. Происходит взаимная инактивация
19. Ответьте на вопрос врача-интерна: широта терапевтического действия – это диапазон доз:
- A. От минимальной терапевтической до минимальной токсической *
 - B. От средней терапевтической до минимальной токсической
 - C. От разовой до курсовой
 - D. От минимальной терапевтической до максимальной токсической
 - E. От разовой до суточной
20. Выберите оптимальный антибактериальный препарат для лечения микоплазменной пневмонии:
- A. ровамицин *
 - B. гентамицин
 - C. пенициллин
 - D. ампициллин
 - E. амоксиклав
21. Який із наведених препаратів повинен входити в якості антидоту до аптечки невідкладної допомоги на підприємствах, де можливі гострі отруєння сполуками миш'яку, ртуті, хрому, вісмуту?
- A. Унітіол *
 - B. Адреналін
 - C. Атропін
 - D. Морфін
 - E. Дроперидол
22. До Вас в аптеку звернулася жінка з дитиною 5 років, яка випила флакон очних капель. Через 30 хв. після цього у неї виникли задишка, утруднене ковтання, хрипота, розширення зіниць, гіпертермія. Який із препаратів міг спричинити описані прояви?
- A. Атропін *
 - B. Адреналін

- C. Мезатон
- D. Пілокарпін
- E. Новокаїн

23. У хворого хронічний гастрит типу А зі зниженою секреторною функцією, перніціозна анемія. Який з препаратів показаний хворому?
- A. Ціанокобаламін *
 - B. Адреналін
 - C. Дифенгідрамін
 - D. Вікалін
 - E. Дротаверин
24. Хвору 53-х років після фізичного навантаження почав турбувати біль за грудниною з іррадіацією в ліву руку. Який препарат слід призначити для усунення больового приступу?
- A. Нітрогліцерин *
 - B. Ізосорбїду 5-мононітрат
 - C. Ніфедипін
 - D. Метопролол
 - E. Дилтіазем
25. До Вас звернулася хвора на хронічний панкреатит з вираженими проявами недостатності зовнішньо-секреторної функції підшлункової залози. Який з наведених ЛЗ найдоцільніше призначити в даному випадку?
- A. Панкреатин *
 - B. Дротаверин
 - C. Де-нол
 - D. Омепразол
 - E. Ацидин-пепсин
26. Хворому в ділянці хірургічного розтину тканин ввели 0,25% розчин новокаїну. Зненацька пацієнт покритися червоними плямами. Виникли інтенсивне потовиділення, тахікардія, набряк слизової носа, бронхоспазм. Яка причина цього ускладнення?
- A. Алергічна реакція негайного типу *
 - B. Алергічна реакція сповільненого типу
 - C. Місцевоподразнююча дія
 - D. Тахіфілаксія
 - E. Синдром відміни
27. У хворого Н., 15 років, вперше виявлено цукровий діабет I типу. Який цукрознижуючий засіб необхідно призначити:
- A. Інсулін *
 - B. Метформін
 - C. Діабетон
 - D. Глюренорм
 - E. Глібенкламід

28. Під час оперативного втручання, яке здійснювалось під місцевою анестезією 0,25 % розчином новокаїну, пацієнт зненацька покритися червоними плямами, виникли інтенсивне потовиділення, тахікардія, набряк слизової носа, бронхоспазм. Яка причина цього ускладнення ?
- A. Алергічна реакція негайного типу *
 - B. Алергічна реакція сповільненого типу
 - C. Тахіфілаксія
 - D. Синдром віддачі
 - E. Синдром відміни
29. Проконсультуйте молодого колегу: якому із перелічених нестероїдних протизапальних засобів притаманний найслабший пошкоджуючий вплив на слизову оболонку ШКТ?
- A. Німесулід *
 - B. Диклофенак
 - C. Індометацин
 - D. Піроксикам
 - E. Ацетилсаліцилова кислота
30. У хворого, який тривалий час лікується з приводу ревматоїдного артриту, виявлено гіперглікемію. Котрий із препаратів міг її спричинити?
- A. Дексаметазон *
 - B. Диклофенак натрію
 - C. Ібупрофен
 - D. Делагіл
 - E. Левамизол
31. Хвора із сезонним вазомоторним ринітом, яка працює диспетчером на залізниці, звернулася в аптеку за порадою: котрий із антигістамінних лікарських засобів не має пригнічувальної дії на ЦНС?
- A. Лоратадин *
 - B. Клемастин
 - C. Дипразин
 - D. Дифенгідрамін
 - E. Піпольфен
32. Проконсультуйте молодого колегу: який лікарських засобів застосовують при гострому інфаркті міокарда з метою тромболітичної терапії?
- A. Альтеплаза *
 - B. Ацетилсаліцилова кислота
 - C. Гепарин
 - D. Пентоксифілін
 - E. Фраксипарин
33. Після тижневої фармакотерапії артеріальної гіпертензії лізиноприлом в дозі 10 мг 2 раз на добу у хворого з'явилися періодично виникаючі напади сухого кашлю. Чим це може бути зумовлене?

- A. Накопиченням в крові залишку брадикініну *
 - B. Підвищенням тонузу кашльового центру
 - C. Загостренням супутньої патології
 - D. Пригніченням синтезу альдостерону
 - E. Зменшення вмісту в крові адреналіну
34. Хворому К, 54 років, який кілька років страждає хронічним гіперацидним гастритом, призначений альмагель. Які ускладнення фармакотерапії з боку органів травлення можуть виникнути перш за все?
- A. Закреп *
 - B. Нудота
 - C. Анорексія
 - D. Блювота
 - E. Діарея
35. У хворі 26 років діагностовано позагоспітальна пневмонія, спричинена мікоплазмою. Виберіть необхідний протимікробний лікарський засіб:
- A. Роваміцин *
 - B. Амоксицилін
 - C. Гентаміцин
 - D. Бензілпеніцилін
 - E. Амоксиклав
36. Хвора 60 років страждає гіпертонічною хворобою II стадії, ішемічною хворобою серця, бронхіальною астмою. Після корекції фармакотерапії стався напад бронхоспазму, зросла задишка. Який лікарський засіб спричинив ускладнення?
- A. Пропранолол *
 - B. Ніфедипин
 - C. Еуфілін
 - D. Мукалтін
 - E. Сальбутамол
37. У хворого 60 років після емоційного перенапруження з'явився біль за грудиною з ірадіацією в ліву руку. Назвіть лікарський засіб, який тамує больовий синдром:
- A. Нітрогліцерин *
 - B. Ніфедипин
 - C. Дилтіазем
 - D. Пропранолол
 - E. Метопролол
38. До провізора в аптеці звернулась жінка з проханням відпустити жарознижуючий засіб для дитини 8 місяців. Який препарат Ви порадите?
- A. Парацетамол *
 - B. Ацетилсаліцилова кислота
 - C. Індометацин
 - D. Діклофенак натрію

Е. Піроксикам

39. Хворий 59 років переніс інфаркт міокарду. Для попередження тромбоутворення призначена ацетилсаліцилова кислота. Визначте раціональну добову дозу:
- A. 100 мг *
 - B. 500 мг
 - C. 1000 мг
 - D. 2000 мг
 - E. 3000 мг
40. До лікаря звернувся хворий 70 років з приводу підвищеного артеріального тиску. З анамнезу відомо про наявність доброякісної гіперплазії передміхурової залози. Який лікарський засіб бажано призначити даному хворому?
- A. Доксазозин *
 - B. Еналаприл
 - C. Пропранолол
 - D. Дилтіазем
 - E. Лозартан
41. У жінки, яка тривалий час лікується з приводу інфільтративно-вогнищезового туберкульозу, різко знизився слух. Який з перерахованих препаратів міг викликати таку побічну дію?
- A. Стрептоміцин *
 - B. Ізоніазид
 - C. Етамбутол
 - D. Рифампіцин
 - E. Етіонамід
42. Препаратом вибору для терапії острого пієлонефриту у беременної жінки в I триместрі є:
- A. амоксицилін *
 - B. норфлоксацин
 - C. бисептол
 - D. гентаміцин
 - E. хлорамфеникол
43. У беременної жінки Р., 38 років з сахарним діабетом II типу (інсуліннезависимим) препаратом вибору є:
- A. інсулін *
 - B. глібенкламід
 - C. метформин
 - D. толбутамід
 - E. буформин
44. Яким найбільш раціональним препаратом можна порекомендувати для лікування риніту при ОРВИ для дитини в віці 7 місяців?

- A. 0,9 % раствор поваренной соли в теплой воде *
 - B. нафтизин
 - C. галазолин
 - D. пиносол
 - E. Мазь "Бороментол"
45. Какой из указанных антибактериальных препаратов нерационально назначить больному К., 56 лет с сахарным диабетом II типа, получающим глибенкламид?
- A. бисептол *
 - B. мидекамицин
 - C. гентамицин
 - D. бензилпенициллин
 - E. доксициклин
46. Какая из указанных фармакологических групп препаратов антигипертензивного действия противопоказана для больных с бронхиальной астмой?
- A. бета-адреноблокаторы *
 - B. ингибиторы АПФ
 - C. антагонисты кальция
 - D. блокаторы ангиотензиновых рецепторов
 - E. диуретики
47. Прием какого препарата может вызвать развитие запора у больного, получающего комбинированную терапию артериальной гипертензии:
- A. верапамил *
 - B. фуросемид
 - C. триметазидин
 - D. панангин
 - E. ацетилсалициловая кислота в малых дозах
48. Какой препарат можно порекомендовать для симптоматического лечения мышечной боли у ребенка 5 лет?
- A. парацетамол *
 - B. ацетилсалициловая кислота
 - C. диклофенак натрия
 - D. индометацин
 - E. целекоксиб
49. Хворому К., 45 років, з діагнозом ревматоїдний артрит та пептична виразка шлунка, необхідно призначити НПЗЗ. Який препарат є найбільш доцільним?
- A. Целекоксиб *
 - B. Діклофенак натрію
 - C. Ацетилсаліцилова кислота
 - D. Індометацин
 - E. Піроксикам

50. Больному К., с диагнозом: желчекаменная болезнь, для растворения холестериновых желчных камней показано применение препарата:
- A. урсодезоксихолиевая кислота *
 - B. гамма-аминомасляная кислота
 - C. ацетисалициловая кислота
 - D. лимонная кислота
 - E. мефенамовая кислота
51. С чего наиболее целесообразно начинать лечение больного, у которого впервые развился приступ бронхиальной астмы?
- A. Ингаляции бета2-адреномиметика *
 - B. Ингаляции глюкокортикостероида
 - C. Адреномиметики парентерально
 - D. М-холинолитики
 - E. H2-гистаминоблокаторы
52. Каков препарат выбора при лечении больных с артериальной гипертензией и аденомой предстательной железы?
- A. Доксазозин *
 - B. Эналаприл
 - C. Каптоприл
 - D. Верошпирон
 - E. Верапамил
53. Хвора Н., 68 років, тривалий час застосовує фуросемід для лікування серцевої недостатності. Зазначте лікарський засіб для профілактики гіпокаліємії при прийомі фуросемида:
- A. Панангін *
 - B. АТФ-лонг
 - C. Мілдронат
 - D. Триметазидин
 - E. Сустанк-форте
54. Хвора 52-х років страждає підвищенням артеріального тиску протягом місяця. З анамнезу відомо, що останні 5 років хворіє бронхіальною астмою. Яка група гіпотензивних препаратів небажана для хворої?
- A. Блокатори бета-адренорецепторів *
 - B. Антагоністи іонів кальцію
 - C. Транквілізатори
 - D. Антагоністи ангіотензинових рецепторів
 - E. Діуретики
55. Відповідаючи на запитання лікаря-хірурга про можливість тривалого консервативного лікування та розсмоктування холестеринових каменів в жовчному міхурі, зазначте рекомендований лікарський засіб:
- A. Урсодезоксихолиєва кислота *

- В. Хофітол
- С. Алохол
- Д. Любіл
- Е. Легалон

56. У хворого 18-ти років діагностовано: дисемінований туберкульоз легень. Який лікарський засіб необхідний для етіотропної фармакотерапії?
- А. Ізоніазид *
 - В. Бензилпеніциліну натрієва сіль
 - С. Триметоприм
 - Д. Лінкоміцин
 - Е. Метронідазол
57. Вагітна жінка (III триместр) захворіла ГРВЗ з підвищенням температури тіла до 39 С. Який ЛЗ Ви зможете їй запропонувати?
- А. Парацетамол *
 - В. Целекоксиб
 - С. Індометацин
 - Д. Ацетилсаліцилова кислота
 - Е. Диклофенак натрію
58. Яке з нижченаведених показань для застосування бензатин бензилпеніциліну є правильним:
- А. Лікування сифілісу *
 - В. Кишкові інфекції
 - С. Пневмонія
 - Д. Ангіна
 - Е. Фурункульоз
59. До провізора звернувся пацієнт, якому рекомендовано прийом ацетилсаліцилової кислоти як антиагреганта. Яку добову дозу у грамах слід рекомендувати для постійного прийому?
- А. 0,1—0,3 *
 - В. 0,5-1,0
 - С. 1,0-2,0
 - Д. 2,0-3,0
 - Е. Більше 4,0
60. У хворого з артеріальною гіпертензією та хронічним бронхітом раптово виник сухий кашель, задишка; температура тіла не змінилась. Відомо, що хворий приймає каптоприл. Чим можна пояснити цей феномен?
- А. Збільшене утворення брадикініну *
 - В. Збільшене утворення ангіотензину I
 - С. Збільшене утворення реніну
 - Д. Зменшене утворення альдостерону
 - Е. Збільшення утворення Na-уретичного пептиду

61. Антидотна терапія при отруєннях неорганічними сполуками ртуті здійснюється використанням:
- A. Унітіол *
 - B. Налоксон
 - C. Тетацин кальцію
 - D. Десферал
 - E. Дексаметазон
62. Під час лікування хронічної серцевої недостатності дигоксином у хворого виникла брадикардія, нудота, блювота, погіршення зору. Який з препаратів є антидотом в цьому випадку?
- A. Унітіол *
 - B. Тетацин-кальцій
 - C. Дипіроксам
 - D. Амлінітріт
 - E. Атропину сульфат
63. Хворий 46-ти років хворий на хронічний бронхіт звернувся в аптеку. Який лікарський засіб можна придбати в аптеці для полегшення відходження густого та в'язкого харкотиння?
- A. Амброксол *
 - B. Фалімінт
 - C. Лібексин
 - D. Глаувент
 - E. Сальбутамол
64. Вагітна жінка 26-ти років (III триместр вагітності) скаржиться на підвищення температури тіла до 39°C. Який жарознижуючий лікарський засіб можна запропонувати в даній ситуації?
- A. Парацетамол. *
 - B. Аспірин.
 - C. Диклофенак.
 - D. Анальгін.
 - E. Індометацин.
65. У хворого на виразкову хворобу під час комбінованої фармакотерапії випорожнення набули чорного забарвлення. Назвіть препарат, який міг спричинити таку зміну:
- A. Вісмуту субцитрат; *
 - B. Омепразол;
 - C. Актовегін;
 - D. Метронідазол;
 - E. Ранітидин.
66. Хворий, яка страждає на бронхіальну астму встановлено діагноз гіпертонічної хвороби. Який гіпотензивний препарат протипоказаний даній пацієнтці?
- A. Анаприлін; *

- В. Каптоприл;
- С. Амлодипін;
- Д. Гіпотіазид;
- Е. Верапаміл.

67. Хвора К., вагітність I триместр, встановлено діагноз гострого пієлонефриту. Який антибіотик є препаратом вибору для лікування даної пацієнтки?

- А. Амоксицилін; *
- В. Норфлуксацин;
- С. Гентаміцин;
- Д. Хлорамфенікол;
- Е. Амікацин.

68. У хворого М., який тривалий час хворіє на хронічний гепатит, встановлено діагноз пневмонії. Який з антибактеріальних лікарських засобів можна використати у даній клінічній ситуації?

- А. Амоксициліну; *
- В. Тетрациклін;
- С. Бісептол;
- Д. Ріфампіцин;
- Е. Ванкоміцин;

69. Хвора 25-ти років протягом 7 днів отримувала антибіотикотерапію, яка ускладнилась розвитком дисбактеріозу кишечника. Яку із груп лікарських засобів слід використати для лікування даного ускладнення?

- А. Пробіотики *
- В. Спазмолітики
- С. Жовчогінні
- Д. Антациди
- Е. Адаптогени

70. Хворій 57-ми років встановлено діагноз ревматоїдного артриту, в анамнезі виразкова хвороба. Який препарат із групи НПЗП можна рекомендувати даній хворій?

- А. Целекоксиб; *
- В. Диклофенак;
- С. Аспірин;
- Д. Індометацин;
- Е. Мефенамова кислота.

71. Хворому на пневмонію середньо важкого перебігу лікар призначив цефтріаксон 1 раз на добу. Призначення препарату 1 раз на добу пов'язане з:

- А. Повільним виведенням з організму *
- В. Бактерицидним ефектом
- С. Широким спектром дії
- Д. Здатністю накопичуватись в легенях
- Е. Погано всмоктується з місця введення

72. Для лікування інфекції сечовидільних шляхів лікар-інтерн призначив хворому препарат з групи нітрофуранів нітрофуроксазид. Лікарем допущена помилка, оскільки препарат:
- A. Не всмоктується з травного каналу *
 - B. Виводиться з сечею в неактивному стані
 - C. Має нефротоксичний ефект
 - D. Володіє бактеріостатичним ефектом
 - E. Повільно виводиться з організму
73. Який з нижченаведених препаратів є препаратом вибору для профілактики виникнення нападів бронхіальної астми.
- A. Кромолін-натрій *
 - B. Сальбутамол
 - C. Дротаверин
 - D. Димедрол
 - E. Амброксол
74. У хворого гіпертонічною хворобою виявлено обструктивний бронхіт. Який із зазначених гіпотензивних препаратів йому протипоказаний?
- A. Анаприлін *
 - B. Гіпотіазид
 - C. Допегіт
 - D. Раунатин
 - E. Клофелін