

ТЕСТУВАННЯ.УКР Бази тестів

Буклет Фармакологія року

Цей тест можна пройти в режимі онлайн тестування на сайті <https://тестування.укр/testkrok/studing/192>

Це офіційні тести з сайту Центру тестування <https://www.testcentr.org.ua/>

1. З якою метою хворому із стенокардією призначили ацетилсаліцилову кислоту ?
 - A. дезагрегантної дії *
 - B. пригнічення фібрінолітичної активності крові
 - C. агрегантної дії
 - D. протизапальної дії
 - E. підвищення фібрінолітичної активності крові
2. Хворий 32-х років приймає протитуберкульозні препарати. Через деякий час він помітив, що сеча набула червоно-оранжевого кольору. Який препарат сприяв появі цього явища?
 - A. рифампіцин *
 - B. ізоніазид
 - C. піразінамід
 - D. етамбутол
 - E. стрептоміцину сульфат
3. При інфаркті міокарду була проведена нейролептанальгезія. Який препарат з групи нейролептиків найчастіше застосовується спільно з фентанілом?
 - A. Дроперидол *
 - B. Етаперазин
 - C. Левомепромазин
 - D. Клозапін
 - E. сульпірид
4. У хворого 55 років на 4-й день лікування індометацином виникла шлункова кровотеча в результаті виразки слизової оболонки шлунка. З чим пов'язана ulcerогенна дія препарату?
 - A. Зменшення активності циклооксигенази-1 (ЦОГ-1) *
 - B. Зменшення активності циклооксигенази-2 (ЦОГ-2)
 - C. Зменшення активності ліпооксигенази (ЛОГ)
 - D. Зменшення активності тромбоксансинтетази
 - E. Зменшення активності простагліцинісинтетази
5. У хворій 45 років, котра протягом двох тижнів приймає неодикумарін з приводу тромбофлебіту, при черговому обстеженні в крові виявлено зниження протромбіну, в сечі спостерігається мікрогематурія. Який лікарській засіб необхідно застосувати в якості антагоністу неодикумарину?
 - A. Вікасол *
 - B. Протаміну сульфат
 - C. Натрію цитрат

- D. Гепарин
- E. Кислота амінокапронова

6. До приймального відділення був доставлений хворий зі скаргами на утруднене дихання, слинотечу, спастичні болі у животі, діарею, запаморочення, зниження гостроти зору. Був встановлений діагноз: отруєння фосфорорганічними сполуками. Які препарати доцільно включити до складу патогенетичної терапії?
- A. Атропіну сульфат та дипіроксим *
 - B. Тіосульфат натрію та бемеGRID
 - C. Тетацин-кальцій та унітіол
 - D. Налорфіну гідрохлорид та бемеGRID
 - E. Глюкозу та бемеGRID
7. До приймального відділення доставлений хворий зі скаргами на сухість в роті, фотофобію та порушення зору. Шкіра гіперемійована, суха, зіниці розширені, тахікардія. Був встановлений діагноз: отруєння алкалоїдами красавки. Який з лікарських засобів доцільно застосувати?
- A. Прозерин *
 - B. Ацеклідин
 - C. Пілокарпін
 - D. Армін
 - E. Дипіроксим
8. Хворому з гіпертонічною хворобою призначено каптоприл. Який механізм дії даного препарату?
- A. Пригнічення активності ангіотензинперетворюючого ферменту *
 - B. Блокада бета-адренорецепторів
 - C. Блокада альфа-адренорецепторів
 - D. Блокада рецепторів ангіотензину II
 - E. Блокада повільних кальцієвих каналів
9. Хворому з гіпертензивною кризою ввели внутрішньовенно клофелін. Який механізм лежить в основі антигіпертензивної дії клофеліну?
- A. Стимуляція центральних пресинаптичних альфа-2-адренорецепторів *
 - B. Блокада периферичних альфа-1-адренорецепторів
 - C. Блокада бета-адренорецепторів
 - D. Блокада H-холінорецепторів вегетативних гангліїв
 - E. Пряма міотропна дія на судини
10. Хворому з виразковою хворобою призначено ранітидин. Кислотність шлункового соку значно знизилась. Який механізм лежить в основі дії даного препарату?
- A. Блокада H₂-гістамінових рецепторів *
 - B. Блокада H₁-гістамінових рецепторів
 - C. Блокада M-холінорецепторів
 - D. Пригнічення активності H⁺K⁺-АТФ-ази
 - E. Блокада H-холінорецепторів вегетативних гангліїв

11. Хворому з ознаками інтоксикації серцевими глікозидами призначено унітіол. Який механізм лікувальної дії препарату?
- A. Реактивація мембранної K^+, Na^+ -АТФ-ази *
 - B. Зв'язування іонізованого Ca^{2+}
 - C. Збільшення проникнення K^+ в міокардіоцити
 - D. Збільшення вмісту Na^+ в міокарді
 - E. Індукція метаболізму серцевих глікозидів
12. Для зняття марення і галюцинацій у хворій на шизофренію лікар використав аміназин. Який механізм антипсихотичної дії препарату?
- A. Інгібування дофамінергічних процесів в ЦНС *
 - B. Стимуляція адренергічних і дофамінергічних процесів в ЦНС
 - C. Стимуляція холінергічних процесів в ЦНС
 - D. Інгібування холінергічних процесів в ЦНС
 - E. Інгібування адренергічних процесів в ЦНС
13. У чоловіка 52-х років діагностовано системний амебіаз з ураженням кишечника, печінки, легень. Який препарат слід призначити?
- A. Метронідазол *
 - B. Хініфон
 - C. Тетрациклін
 - D. Хінгамін
 - E. Фталазол
14. Внаслідок інфаркту міокарда у хворого виникла шлуночкова аритмія. Серцевий ритм нормалізувався після введення протиаритмічного засобу з місцевоанестезуючою активністю. Який препарат введено?
- A. Лідокаїн *
 - B. Новокаїнамід
 - C. Верапаміл
 - D. Панангін
 - E. Пропранолол
15. У приймальне відділення поступив у важкому стані чоловік 38 років, який отруївся сулемою. Який антидот треба негайно ввести хворому?
- A. Унітіол *
 - B. Дипіроксим
 - C. Атропін
 - D. Налорфін
 - E. Ізонітрозин
16. Жінка 33-х років, яка тривалий час лікується з приводу хронічного поліартриту, скаржиться на підвищення артеріального тиску, зміни розподілу жирової тканини, порушення менструального циклу. Який препарат приймає хвора?
- A. Преднізолон *
 - B. Індометацин

- C. Бугадіон
 - D. Синафлан
 - E. Діклофенак натрію
17. Вагітна жінка (20 тижнів вагітності) захворіла на пневмонію. Який хіміотерапевтичний препарат можна порадити її лікарю для призначення хворій, без загрози для розвитку плода?
- A. Бензілпеніцилін *
 - B. Гентаміцин
 - C. Сульфален
 - D. Левоміцетин
 - E. Офлоксацин
18. При проведенні оперативного втручання в якості міорелаксанту було застосовано тубокурарину хлорид. Який засіб-антагоніст слід ввести хворому для відновлення у нього самостійного дихання?
- A. Прозерин *
 - B. Дитилін
 - C. Цитітон
 - D. Етимізол
 - E. Бензогексоній
19. Хворому з алергічним дерматитом був призначений супрастин. До якої групи антиалергічних засобів належить цей препарат ?
- A. Блокатори H 1 гістамінових рецепторів *
 - B. Глюкокортикостероїди
 - C. Інгібітори дегрануляції тучних клітин
 - D. Антагоністи лейкотрієнових рецепторів
 - E. Блокатори H 2 гістамінових рецепторів
20. Дитина випадково випила із флакона розчин, який її бабуся використовувала для лікування глаукоми. Виявилось, що це був пілокарпіну гідрохлорид. Який лікарський засіб можна застосувати в якості атидоту?
- A. Атропін *
 - B. Карбахолін
 - C. Ацеклідин
 - D. Бензогексоній
 - E. Пентамін
21. Жінка, яка страждає на невроз, погано спить. Якому з перерахованих засобів слід віддати перевагу для лікування безсоння?
- A. Нітразепам *
 - B. Фенобарбітал
 - C. Етамінал-натрій
 - D. Бромізовал
 - E. Настоянка валеріани

22. У наркоманів після закінчення дії наркотику виникають тяжкі психічні, неврологічні і соматичні порушення. Як називається цей симптомокомплекс?
- A. Абстинентний синдром *
 - B. Тахіфілаксія
 - C. Сенсibiliзація
 - D. Кумуляція
 - E. Толерантність
23. С какой группой диуретиков нельзя одновременно назначать гипотензивные средства, относящиеся к группе ингибиторов ангиотензин превращающего фермента?
- A. Калий сберегающие *
 - B. Тиазидные
 - C. Петлевые
 - D. Ксантины
 - E. Осмотические
24. В аптеку звернувся хворий, який протягом місяця приймав феназепам. Хворий наполягав на придбанні ще двох упаковок цього препарату, пояснюючи тим, що він без діазепаму погано себе почуває. Що лежить в основі побічної дії препарату, що розвинулася у хворого?
- A. лікова залежність *
 - B. ідіосинкразія
 - C. синдром післядії
 - D. кумуляція
 - E. толерантність
25. Хворому на алергічний риніт призначили ефедрин в краплях для носа. Закапування препарату в ніс значно покращило стан хворого, що спонукало його до застосування цього засобу кожні 2 години, але ефект був відсутнім. Що лежить в основі неефективності ефедрину?
- A. Тахіфілаксія *
 - B. Лікарська залежність
 - C. Ідіосинкразія
 - D. Алергія
 - E. Кумуляція
26. Хворому з гіпертензивним кризом в комплексному лікуванні необхідно призначити сечогінний засіб. Порадьте лікарю-інтерну, який препарат необхідно ввести хворому?
- A. Фуросемід *
 - B. Діакарб
 - C. Спіронолактон
 - D. Тріамтерен
 - E. Амілорид
27. Який протипротозойний засіб можна порекомендувати жінці, яка хворіє на трихомоніаз?
- A. Метронідазол *

- В. Примахін
- С. Хлоридин
- Д. Солюсурьмін
- Е. Хініофон

28. Порекомендуйте хворому на хронічний бронхіт, який відхаркувальний засіб можна придбати в аптеці для полегшення відходження густого та в'язкого харкотиння.
- А. Амброксол *
 - В. Фалімінт
 - С. Глаувент
 - Д. Лібексин
 - Е. Сальбутамол
29. Виберіть антисептик із групи галогеномісних сполук, який можна покласти в аптечку для дитини, що збирається у літній табір:
- А. Розчин йоду спиртовий *
 - В. Брильянтовий зелений
 - С. Міді сульфат
 - Д. Метиленовий синій
 - Е. Розчин формальдегіду
30. Який місцевий анестетик краще придбати в аптеці для знеболення при екстракції зуба?
- А. Лідокаїн *
 - В. Дикаїн
 - С. Анестезин
 - Д. Совкаїн
 - Е. Кокаїн
31. До аптеки надійшов препарат нового покоління нестероїдних протизапальних засобів "мелоксикам". Вкажіть, якими перевагами володіє даний препарат, як переважний блокатор циклооксигенази-2, порівняно з іншими нестероїдними протизапальними засобами:
- А. Мінімальна побічна дія на травний канал *
 - В. Виразний міоспазмолітичний ефект
 - С. Наявність інтерферогенних властивостей
 - Д. Мінімальна побічна дія на кровотворення
 - Е. Значне пригнічення активності протеаз
32. При відсутності в аптеці фенотеролу в інгаляціях яким препаратом із групи бронхоселективних бета-2-адреноміметиків можна його замінити?
- А. Сальбутамолом *
 - В. Ізадрином
 - С. Метацином
 - Д. Ефедрином
 - Е. Еуфіліном

33. Проконсультуйте лікаря, яким найбільш близьким за дією препаратом можна замінити відсутній в аптеці ацетилцистеїн.
- A. Амброксол *
 - B. Натрію хлорид
 - C. Кодеїну фосфат
 - D. Лібексин
 - E. Натрію гідрокарбонат
34. Дайте відповідь на запитання терапевта - який сучасний антигістамінний препарат краще застосувати людям, робота, який потребує швидкої реакції на оточуюче?
- A. Лоратадин *
 - B. Димедрол
 - C. Дипразин
 - D. Супрастин
 - E. Піпольфен
35. При відсутності в аптеці строфантину яким препаратом із групи серцевих глікозидів можна його замінити?
- A. Коргликон *
 - B. Ізоланід
 - C. Дигітоксин
 - D. Адонізид
 - E. Целанід
36. Назвіть найбільш типовий симптом отруєння атропіном.
- A. Розширення зіниць, що не реагують на світло. *
 - B. Звуження зіниць, які не реагують на світло.
 - C. Підвищене потововиділення.
 - D. Брадикардія.
 - E. Зниження внутрішньочного тиску.
37. Хворий звернувся до лікаря офтальмолога із скаргами на зниження нічного зору, сухість рогівки. Який препарат призначив лікар?
- A. Ретинол *
 - B. Піридоксин
 - C. Токоферол
 - D. Аскорбінова кислота
 - E. Кокарбоксілаза
38. У хворого на гіпертонічну хворобу підвищений рівень реніну в плазмі крові. Який з перерахованих фармакологічних груп треба віддати перевагу для лікування даного хворого?
- A. Інгібітори АПФ *
 - B. Альфа-адреноблокатори
 - C. Діуретики
 - D. Антагоністи іонів кальцію

Е. Симпатолітики

39. Хворому на виразкову хворобу шлунку призначили альмагель. Яка з фармакологічних властивостей препарату використовується для лікування цієї патології?
- A. Нейтралізація HCl *
 - B. Місцевоанестезуюча дія
 - C. Блокада H₂-гістамінорецепторів
 - D. Блокада M-холінорецепторів
 - E. Протизапальна дія
40. При тривалому застосуванні фенобарбіталу у хворого з епілепсією розвинулася толерантність до препарату. Що лежить в основі розвитку даного явища?
- A. Прискорення біотрансформації *
 - B. Послаблення процесу всмоктування
 - C. Підвищення чутливості рецепторів
 - D. Пригнічення біотрансформації
 - E. Накопичення речовини в організмі
41. Хворому на депресію лікар призначив препарат із групи трициклічних антидепресантів. Назвіть препарат.
- A. амітриптилін *
 - B. феназепам
 - C. дроперидол
 - D. аміналон
 - E. кофеїн
42. Хвора на гіпертонічну хворобу звернулася до лікаря зі скаргою на сухий кашель, що виник на фоні лікування. Який гіпотензивний препарат вона використовувала?
- A. лізиноприл *
 - B. атенолол
 - C. ніфедипін
 - D. фуросемід
 - E. дихлотіазид
43. В аптеку звернувся хворий, якому з приводу виразкової хвороби лікар призначив фамотидин. Поясніть, який механізм лежить в основі дії даного препарату?
- A. Блокада H₂-гістамінових рецепторів *
 - B. Блокада H₁-гістамінових рецепторів
 - C. Блокада M-холінорецепторів
 - D. Пригнічення активності H⁺K⁺АТФ-ази
 - E. Блокада холінорецепторів симпатичних гангліїв
44. Що відображає такий фармакокінетичний параметр лікарських засобів як період напіввиведення (T_{1/2})?
- A. Проміжок часу, за який концентрація препарату в плазмі крові зменшується на 50

% *

- В. Об'єм плазми крові, який звільняється від препарату за одиницю часу
- С. Час повного виведення препарату з організму
- Д. Швидкість виведення препарату через нирки
- Е. Співвідношення між швидкістю виведення препарату та його концентрацією у плазмі крові

45. Зменшення всмоктування препаратів групи тетрацикліну при їх одночасному застосуванні з антацидними засобами є прикладом:

- А. Фармакокінетичної несумісності *
- В. Фармацевтичної несумісності
- С. Фармакодинамічної несумісності
- Д. Синергізму препаратів
- Е. Функціонального антагонізму препаратів

46. Больному епілепсією назначен диуретический препарат. Определите этот препарат.

- А. Диакарб *
- В. Верошпирон
- С. Фуросемид
- Д. Гипотиазид
- Е. Маннит

47. Помогите студенту медицинского вуза выбрать адренергический препарат для лечения анафилактического шока.

- А. Адреналина гидрохлорид *
- В. Клофелин
- С. Галазолин
- Д. Фенотерол
- Е. Изадрин

48. Дайте ответ посетителю Вашей аптеки, какой побочный эффект характерен для каптоприла?

- А. сухой кашель *
- В. повышение артериального давления
- С. гипергликемия
- Д. нарушения ритма сердца
- Е. гіпокаліємія

49. Проконсультуйте, який препарат з групи антигістамінних засобів не проявляє снодійної та седативної дії.

- А. лоратидин *
- В. дімедрол
- С. дипразин
- Д. супрастин
- Е. тавегіл

50. Дайте відповідь провізору-інтерну: який з препаратів відноситься до препаратів задньої долі гіпофізу ?
- A. Окситоцин *
 - B. Інсулін
 - C. Преднізолон
 - D. Тіреоїдин
 - E. Естрон
51. Допоможіть лікарю вибрати препарат для замісної терапії після видалення щитовидної залози.
- A. L-тироксин *
 - B. Інсулін
 - C. Преднізолон
 - D. Паратиреоїдин
 - E. Мерказоліл
52. У лікуванні гіпертонічної хвороби лікар призначив засіб, що блокує ангіотензинові рецептори. Вкажіть препарат :
- A. Лозартан *
 - B. Ніфедипін
 - C. Празозин
 - D. Каптоприл
 - E. Апресин
53. Який механізм дії диклофенаку натрію?
- A. Блокує циклооксигеназу *
 - B. Активує синтез фосфодіестерази
 - C. Пригнічує холінестеразу
 - D. Активує аденілатциклазу
 - E. Пригнічує фосфодіестеразу
54. Хворому з виразкою шлунка призначили омепразол. Який механізм дії цього препарату ?
- A. Пригнічення H⁺K⁺-АТФази *
 - B. Блокада гістамінових H₂-рецепторів
 - C. Блокада M-холінорецепторів
 - D. Нейтралізація HCl
 - E. Стимуляція утворення слизу
55. Який з антисептичних препаратів свою бактерицидну дію проявляє за рахунок утворення атомарного кисню?
- A. Калію перманганат *
 - B. Хлорамін
 - C. Фурацилін
 - D. Етоній
 - E. Срібла нітрат

56. Больному с дискинезией пищеварительного тракта назначен метоклопрамид. С чем связан противорвотный эффект этого препарата?
- A. Блокада D₂-рецепторов *
 - B. Блокада M₁-холинорецепторов
 - C. Блокада H₁-рецепторов
 - D. Стимуляция бета-адренорецепторов
 - E. Стимуляция M₁-холинорецепторов
57. При лечении хронической сердечной недостаточности дигитоксеном у больного появились признаки интоксикации этим препаратом. Врач назначил унитиол. Объясните, в чём заключается механизм действия унитиола при интоксикации сердечными гликозидами?
- A. Восстановление активности K⁺-Na⁺-АТФ-азы *
 - B. Связывание ионов кальция
 - C. Повышение уровня натрия в кардиомиоцитах
 - D. Повышение проницаемости для калия в кардиомиоцитах
 - E. Связывание гликозида в комплексное соединение
58. Відносна кількість лікарського засобу, що надходить з місця введення до системного кровообігу називається:
- A. біодоступність *
 - B. період напівадсорбції
 - C. період напіввиведення
 - D. об'єм розподілу
 - E. період напівелімінації
59. Хворий 67 років з хронічною серцевою недостатністю отримує дигоксин. Для зменшення побічної дії дигоксину лікар порадив його комбінувати з:
- A. Панангіном *
 - B. Глюконатом кальцію
 - C. Еуфіліном
 - D. Дихлотіазидом
 - E. Хлоридом кальцію
60. На тлі тривалого введення гепарину у хворого розвинулась шлункова кровотеча. Назвіть специфічний антидот гепарину, який треба негайно застосувати:
- A. Протаміну сульфат *
 - B. Дипіроксим
 - C. Вікасол
 - D. Бемегрид
 - E. Натрію цитрат
61. Який основний механізм дії лежить в основі бактерицидного впливу бензилпеніциліну на кокову флору?
- A. порушення синтезу стінки мікробної клітини *
 - B. пригнічення синтезу білка

- С. пошкодження проникності цитоплазматичної мембрани
 - Д. активація імунної системи макроорганізму
 - Е. підвищення фагоцитарної активності лейкоцитів
62. Больному, страждующому неврозом с явлениями тревоги и страха, врач назначил диазепам. Какой фармакологический эффект препарата позволяет применять его для лечения данного заболевания?
- А. Анксиолитический *
 - В. Противоаритмический
 - С. Противовоспалительный
 - Д. Гипотензивный
 - Е. Антиангинальный
63. Больному с нарушением сердечного ритма ввели лидокаин. Каким фармакологическим эффектом, помимо местноанестезирующего, обладает этот препарат?
- А. Антиаритмический *
 - В. Снотворный
 - С. Жаропонижающий
 - Д. Антидепрессивный
 - Е. Ноотропный
64. Больному с острым отравлением необходимо провести форсированный диурез. Какой препарат можно применить с этой целью?
- А. Фуросемид *
 - В. Кофеин бензоат натрия
 - С. Галантамина гидробромид
 - Д. Эналаприл
 - Е. Пирацетам
65. Больному после перенесенной черепно-мозговой травмы, врач назначил пирацетам. К какой фармакологической группе относится этот препарат?
- А. Ноотропные препараты *
 - В. Ненаркотические анальгетики
 - С. Транквилизаторы
 - Д. Средства для наркоза
 - Е. Нейролептики
66. Больному, страдающему гипертонической болезнью, врач назначил лизиноприл. Каким механизмом действия обладает этот препарат?
- А. Блокирует АПФ *
 - В. Блокирует альфа-адренорецепторы
 - С. Блокирует бета-адренорецепторы
 - Д. Стимулирует бета-адренорецепторы
 - Е. Блокирует М-холинорецепторы

67. Для лечения атеросклероза больной в аптеке приобрел гиполипидемический препарат из группы фибратов. Назовите этот препарат?
- A. Фенофибрат *
 - B. Дротаверина гидрохлорид
 - C. Бисакодил
 - D. Спиринолактон
 - E. Силибор
68. Для купирования приступа стенокардии больной использует нитроглицерин в капсулах. Какой рациональный путь введения этого препарата ?
- A. Сублингвальный *
 - B. Пероральный
 - C. Ректальный
 - D. Ингаляционный
 - E. Подкожный
69. В больницу доставлен ребенок с признаками отравления алкалоидами белладонны. Какой препарат необходимо применить в качестве антидота?
- A. Прозерин *
 - B. Магния сульфат
 - C. Кофеин бензоат натрия
 - D. Парацетамол
 - E. Натрия вольпроат
70. Врач назначил больному по поводу хронического запора, препарат бисакодил. Через 3 недели лечения больной обратил внимание на уменьшение слабительного эффекта. С развитием какого побочного эффекта это связано?
- A. Привыкание *
 - B. Пристрастие
 - C. Сенсibilизация
 - D. Кумуляция
 - E. Дисбактериоз
71. Посоветуйте больному с острым бронхитом, муколитический препарат, который облегчает отхаркивание.
- A. Ацетилцистеин *
 - B. Глауцин
 - C. Лоратидин
 - D. Диклофенак натрия
 - E. Дротаверина гидрохлорид
72. Вы сотрудник аптечного склада. При внесении поступивших препаратов в компьютерную базу данных укажите к какой фармакологической группе относится парацетамол.
- A. Ненаркотический анальгетик *
 - B. Снотворное средство
 - C. Диуретическое средство

- D. Гипотензивное средство
- E. Антиангинальное средство

73. Провизор посоветовал больному противоязвенный препарат, который блокирует гистаминовые рецепторы слизистой желудка.

- A. Фамотидин *
- B. Омепразол
- C. Альмагель
- D. Атропина сульфат
- E. Пирензепин

74. Больному стенокардией назначили метопролол. Какой фармакологический эффект позволяет применять этот препарат для лечения стенокардии?

- A. Антиангинальный *
- B. Гипотензивный
- C. Антиаритмический
- D. Антиагрегантный
- E. Бронхолитический

75. В связи со слабостью родовой деятельности врач назначил роженице гормональный препарат для стимуляции родов. Назовите препарат.

- A. Окситоцин *
- B. Глибенкламид
- C. Преднизолон
- D. Инсулин
- E. L-тироксин

76. Ответьте на вопрос своего коллеги провизора. Какой нестероидный противовоспалительный препарат относится к средствам, селективно блокирующим ЦОГ2?

- A. Целекоксиб *
- B. Анальгин
- C. Парацетамол
- D. Диклофенак-натрия
- E. Кислота ацетилсалициловая

77. Дайте ответ на вопрос медсестры: гипогликемическое действие какого препарата обусловлено стимуляцией бета-клеток поджелудочной железы?

- A. Глибенкламид *
- B. Преднизолон
- C. Адреналина гидрохлорид
- D. Ретаболил
- E. Гепарин

78. У пожилого больного развилась послеоперационная атония кишечника. Какой

антихолинестеразний препарат показан ему?

- A. Прозерин *
- B. Дитилин
- C. Пилокарпина гидрохлорид
- D. Атропина сульфат
- E. Метопролол

79. Больному с болезнью Паркинсона назначили препарат с преобладающим влиянием на дофаминергическую систему. Назовите это лекарственное средство?

- A. Леводопа *
- B. Зопиклон
- C. Дроперидол
- D. Аминазин
- E. Лоразепам

80. У больного в связи с обострением мочекаменной болезни возникла почечная колика. Какой препарат необходимо ввести для устранения колики?

- A. Дротаверина гидрохлорид *
- B. Силибор
- C. Альмагель
- D. Этимизол
- E. Прозерин

81. Хворому Н. 56 р. який хворіє на ІХС було призначено метопролол. Який механізм дії бета-адреноблокаторів при ІХС?

- A. Зменшують потребу міокарда в кисні *
- B. Збільшують потребу міокарда в кисні
- C. Розширюють коронарні судини
- D. Зменшують тонус периферичних судин
- E. Звужують коронарні судини

82. Хворий, що страждає на алергічний дерматит звернувся в лікарню. Який препарат з метою протизапальної та протиалергічної дії необхідно призначити?

- A. Преднізолон *
- B. Етамід
- C. Окситоцин
- D. Інсулін
- E. Ретаболіл

83. Хворому на атеросклероз було призначено антиатеросклеротичний засіб. Вкажіть який це препарат?

- A. Фенофібрат *
- B. Аскорбінова кислота
- C. Пірацетам
- D. Дексаметазон
- E. Бутадіон

84. У хворого після бджолиних укусів розвинувся набряк Квінке. Який препарат треба негайно ввести хворому з метою усунення цього стану?
- A. Адреналіну гідрохлорид *
 - B. Натрію хлорид
 - C. Платифіліну гідротартрат
 - D. Атропіну сульфат
 - E. Анаприлін
85. Чоловік 55 років скаржиться на безсоння, дратівливість, загальну слабкість. Який з вказаних нижче препаратів доцільно призначити в даному випадку?
- A. Нітразепам *
 - B. Аміназин
 - C. Трифтазин
 - D. Дроперидол
 - E. Амітриптилін
86. Хворому на гіпертонічну хворобу з метою зниження артеріального тиску було призначено метопролол. Який механізм дії цього препарату:
- A. Блокування бета-адренорецепторів *
 - B. Блокування альфа-адренорецепторів
 - C. Непряма адреноміметична дія
 - D. Спазмолітична дія
 - E. Блокування ангіотензинових рецепторів
87. Хворому на бронхіальну астму для усунення нападу було призначено препарат, в основі механізму дії якого лежить стимулювання переважно бета-2-адренорецепторів. Назвіть препарат:
- A. Сальбутамол *
 - B. Адреналіну гідрохлорид
 - C. Дроперидол
 - D. Клофелін
 - E. Ізадрін
88. Хворій на паркінсонізм для усунення м'язевої ригідності було призначено препарат, який є попередником дофаміну. Назвіть цей препарат:
- A. Леводопа *
 - B. Аміназин
 - C. Парацетамол
 - D. Скопаламіну гідробромід
 - E. Атропіну сульфат
89. Хворому на невроз було призначено анксиолітичний засіб, похідне бензодіазепіну. Назвіть препарат:
- A. Діазепам *
 - B. Атропіну сульфат
 - C. Піроксікам

- D. Ретаболіл
- E. Циклодол

90. Хворій 34-х років, яка хворіє на бронхіт, лікар призначив протикашльовий засіб центральної дії. Який це препарат?
- A. Глауцин *
 - B. Корглікон
 - C. Еналаприл
 - D. Фуросемід
 - E. Ферковен
91. Хворому на інсуліннезалежний цукровий діабет було призначено синтетичний протидіабетичний препарат з групи похідних сульфонілсечовини. Назвіть препарат:
- A. Глібенкламід *
 - B. Інсулін
 - C. Анаприлін
 - D. Преднізолон
 - E. Фуросемід
92. Допоможіть лікарю підібрати препарат із групи нестероїдних протизапальних засобів, який є інгібітором ЦОГ-2 і не пошкоджує шлунок.
- A. Целекоксиб *
 - B. Кислота ацетилсаліцилова
 - C. Індометацин
 - D. Парацетамол
 - E. Диклофенак-натрій
93. Поясніть лікарю, як коректно називати явище, коли при тривалому застосуванні препарату його ефективність знижується:
- A. Звикання *
 - B. Сенсibiliзація
 - C. Кумуляція
 - D. Залежність
 - E. Тахіфілаксія
94. Хворого попередили, що при застосуванні препарату, який йому призначили, може виникнути кашель. Назвіть цей препарат:
- A. Лізіноприл *
 - B. Клофелін
 - C. Фенігидин
 - D. Діхлотіазид
 - E. Метопролол
95. Хворому при гострому отруєнні для форсованого діурезу призначили петлевий діуретик. Який це препарат ?

- A. Фуросемід *
 - B. Манніт
 - C. Гідрохлортіазид
 - D. Тріамтерен
 - E. Спіронолактон
96. Хворому на гіпертонічну хворобу призначено лізіноприл. Який типовий побічний ефект йому властивий ?
- A. Сухий кашель *
 - B. Закреп
 - C. Підвищення апетиту
 - D. Безсоння
 - E. Блювання
97. Порекомендуйте хворому на глаукому засіб із групи М-холіноміметиків.
- A. Пілокарпіну гідрохлорид *
 - B. Ефедрину гідрохлорид
 - C. Сульфацил натрій
 - D. Атропіну сульфат
 - E. Левоміцетин
98. Лікар - провізору: " Нагадайте мені, колего, як називають явище, коли один препарат підсилює дію іншого".
- A. Потенціювання *
 - B. Антагонізм
 - C. Сенсibiliзація
 - D. Абстиненція
 - E. Тахіфілаксія
99. Проконсультуйте лікаря-інтерна, чому одночасно з препаратами заліза не доцільно застосовувати антацидні засоби?
- A. Погіршується всмоктування препаратів заліза *
 - B. Збільшується зв'язування з білками крові
 - C. Порушується депонування заліза в організмі
 - D. Підсилюється інтоксикація препаратами заліза
 - E. Прискорюється елімінація препаратів заліза
100. Хворій для лікування пневмонії призначено доксицикліцину гідрохлорид. До якої групи антибіотиків відноситься даний препарат ?
- A. Тетрацикліни *
 - B. Аміноглікозиди
 - C. Макроліди
 - D. Цефалоспорини
 - E. Пеніциліни

101. Ви - провізор аптеки. Яку групу бронхолітиків слід замовити пульмонологічному відділенню для лікування хворих на бронхіальну астму?
- A. Бета-2-адреноміметики *
 - B. Бета-адреноблокатори
 - C. М-холіноміметики
 - D. Н-холіноміметики
 - E. Антихолінестеразні засоби
102. Больному с острой сердечной недостаточностью и непереносимостью сердечных гликозидов был введен добутамин. Какой механизм действия этого препарата?
- A. Стимуляция бета -1-адренорецепторов *
 - B. Стимуляция альфа-адренорецепторов
 - C. Блокада K⁺ -, Na⁺-АТФ-азы
 - D. Угнетения активности фосфодиэстеразы
 - E. Стимуляция М-холинорецепторов
103. Для лечения тромбоза врач назначил больному препарат из группы антикоагулянтов прямого действия. Назовите этот препарат.
- A. Гепарин *
 - B. Фенилин
 - C. Синкумар
 - D. Неодикумарин
 - E. Викасол
104. Больному хронической сердечной недостаточностью назначили сердечный гликозид из группы наперстянки. Назовите этот препарат:
- A. Дигоксин *
 - B. Строфантин
 - C. Корвалол
 - D. Коргликон
 - E. Кордиамин
105. У хворого після вакцинації розвинувся анафілактичний шок. Назвіть препарат вибору.
- A. Адреналіну гідрохлорид *
 - B. Анаприлін
 - C. Нафтізин
 - D. Сальбутамол
 - E. Дитилін
106. Хворий похилого віку страждає запором, в основі якого лежить гіпотонія товстого кишечника. Який препарат слід призначити хворому?
- A. Бісакодил *
 - B. Натрію сульфат
 - C. Касторову олію
 - D. Атропіну сульфат
 - E. Новокаїнамід

107. Хворому на гострий бронхіт призначили муколітичний засіб. Назвіть препарат.
- A. Ацетилцистеїн *
 - B. Глауцин
 - C. Кодеїну фосфат
 - D. Етимізол
 - E. Бемегрид
108. Жінка після перенесеного стресу погано спить. Якому з перерахованих снодійних засобів слід віддати перевагу для лікування безсоння ?
- A. Нітразепам *
 - B. Фенобарбітал
 - C. Хлоралгідрат
 - D. Аміназин
 - E. Барбітал
109. У наркоманів після закінчення дії наркотику виникають тяжкі психічні, неврологічні і соматичні порушення. Як називається цей симптомокомплекс?
- A. Абстинентний синдром *
 - B. Ідіосинкразія
 - C. Сенсibiliзація
 - D. Кумуляція
 - E. Толерантність
110. Жінці 65 років з переломом нижньої щелепи призначили препарат із групи наркотичних анальгетиків. Назвіть препарат.
- A. Промедол *
 - B. Пірацетам
 - C. Гепарин
 - D. Циннаризин
 - E. Фуросемід
111. Хворому на гіпертонічну хворобу призначили препарат з групи неселективних бета-адреноблокаторів. Вкажіть цей препарат:
- A. Анаприлін *
 - B. Празозин
 - C. Прозерин
 - D. Адреналіну гідрохлорид
 - E. Лабеталол.
112. У хворого гостре отруєння морфіном. Який препарат слід ввести в якості антидоту?
- A. Налоксон *
 - B. Лобеліну гідрохлорид.
 - C. Бемегрид.
 - D. Атропіну сульфат
 - E. Унітіол

113. Для лікування глаукоми лікар вирішив призначити хворому холіноміметичний засіб прямої дії. Який це препарат?
- A. Пілокарпіну гідрохлорид *
 - B. Цинку сульфат
 - C. Сульфацил натрію
 - D. Платифіліну гідротартрат
 - E. Атропіну сульфат
114. У процесі фармакотерапії бронхіту у хворого виникли диспептичні розлади, фотодерматит, порушення функції печінки. Який препарат із призначених хворому міг спричинити ці явища?
- A. Доксидиклін *
 - B. Парацетамол
 - C. Кислота аскорбінова.
 - D. Ацетилцистеїн.
 - E. Кодеїну фосфат
115. Хворий страждає на жовче-кам'яну хворобу. Який засіб слід йому призначити з метою усунення печінкової коліки?
- A. Магнію сульфат *
 - B. Амальгель
 - C. Контрикал
 - D. Бісакодил
 - E. Панкреатин.
116. Допоможіть лікарю вибрати наркотичний анальгетик, який можна використати для знеболення пологів?
- A. Промедол *
 - B. Парацетамол
 - C. Кодеїну фосфат
 - D. Фентаніл
 - E. Анальгін
117. У стаціонар надійшов хворий з діагнозом "Виразкова хвороба шлунку у фазі загострення". Проконсультуйте лікаря-інтерна який препарат знизить функцію залоз шлунку за рахунок блокади H₂ -рецепторів
- A. Фамотидин *
 - B. Екстракт беладони сухий
 - C. Метацин
 - D. Атропіну сульфат
 - E. Платифіліну гідротартрат
118. Виберіть на аптечному складі для хірургічного відділення антихолінергічний засіб зворотної дії для призначення хворим в післяопераційному періоді з атонією кишечника та сечового міхура
- A. Прозерин *

- В. Фосфакол
 - С. Бензогексоній
 - D. Атропіну сульфат
 - Е. Дитилін
119. До міжлікарняної аптеки надійшло замовлення від хірургічного відділення на отримання препарату з групи міорелаксантів депольаризуючого типу дії для проведення хірургічних втручань. Який препарат було замовлено?
- A. Дитилін *
 - В. Нікотин
 - С. Атропіну сульфат
 - D. Метацін
 - Е. Гігроній
120. До провізора звернулася хвора з проханням відпустити засіб від болю голови, який одночасно має антиагрегатну дію. Назвіть цей препарат?
- A. Кислота ацетилсаліцилова *
 - В. Кодеїну фосфат
 - С. Промедол
 - D. Трамадол
 - Е. Фентаніл
121. Хворому після гострого інфаркту міокарду лікар порекомендував протягом 3-4 місяців приймати ацетилсаліцилову кислоту. На яку дію ацетилсаліцилової кислоти розраховував лікар?
- A. Антиагрегантну *
 - В. Жарознижуючу
 - С. Анальгезуючу
 - D. Протизапальну
 - Е. Спазмолітичну
122. Лікар-інтерн звернувся до фармацевта за порадою, який засіб краще призначити хворому з діагнозом: амебна дизентерія.
- A. Метронідазол *
 - В. Пірантел
 - С. Левомізол
 - D. Біцілін-5
 - Е. Бензилпеніциліну натрієва сіль
123. Во время оперативного вмешательства с применением миорелаксанта тубокурарина у пациента развилось нарушение дыхания, которое было ликвидировано после введения прозерина. Какому термину соответствует указанное взаимодействие между лекарствами?
- A. Антагонизм *
 - В. Кумуляція
 - С. Несовместимость

- D. Тахифілаксія
- E. Синергізм

124. У больного, который длительное время страдал заболеванием желудка выявлена гиперхромная анемия. Какое из перечисленных средств применяется для лечения этой патологии?
- A. Цианокобаламин *
 - B. Аскорбиновая кислота
 - C. Унитиол
 - D. Феррум Лек
 - E. Оксиферрискорбон
125. Женщине 25 лет с явлениями острой интоксикации морфином был введен налоксон, вызвавший быстрое улучшение ее состояния. Каков механизм действия этого препарата?
- A. Блокада опиоидных рецепторов *
 - B. Блокада ГАМК-рецепторов
 - C. Блокада серотониновых рецепторов
 - D. Блокада дофаминовых рецепторов
 - E. Блокада бензодиазепиновых рецепторов
126. У наркологічне відділення надійшов хворий з діагнозом - морфінізм. Лікар відзначив зниження фармакологічної активності морфіну. Як називається явище, коли зменшується ефективність препарату при повторному введенні?
- A. Звикання *
 - B. Матеріальна кумуляція
 - C. Функціональна кумуляція
 - D. Антагонізм
 - E. Сумація
127. Препаратом вибору для лікування трихомонозної інфекції є:
- A. Метронідазол *
 - B. Олететрин
 - C. Норфлуксацин
 - D. Ністатин
 - E. Клафоран
128. Виберіть препарат для лікування бронхіальної астми з групи ?2 -адреностимуляторів.
- A. Сальбутамол *
 - B. Еуфілін
 - C. Атровент
 - D. Кетотифен
 - E. Беклометазон
129. Хворому з шизофренією призначено нейролептик. Який з перерахованих препаратів належить до цієї групи?

- A. Аміназин *
 - B. Целекоксиб
 - C. Анаприлін
 - D. Морфін
 - E. Пірацетам
130. В аптеку звернувся студент з проханням поради лікарський засіб для усунення проявів алергічного риніту, який виникає у нього під час цвітіння липи. Який засіб можна застосувати?
- A. Лоратидин *
 - B. Адреналін
 - C. Анаприлін
 - D. Амброксол
 - E. Лозартан
131. У хворого встановлено діагноз - виразкова хвороба шлунка. Препарат з якої з перелічених груп лікарських засобів необхідно використати в комплексній терапії пацієнта ?
- A. Блокатори H-2 гістамінорецепторів *
 - B. Блокатори H-1 гістамінорецепторів
 - C. ?-Адреноблокатори
 - D. ? -Адреноблокатори
 - E. ?? Адреноміметики
132. Пацієнтці з ревматоїдним артритом та супутньою виразковою хворобою дванадцятипалої кишки необхідно призначити нестероїдний протизапальний препарат. Який препарат є препаратом вибору в даному випадку?
- A. Целекоксиб *
 - B. Ацетилсаліцилова кислота
 - C. Парацетамол
 - D. Анальгін
 - E. Диклофенак-натрій
133. Пацієнту з ішемічною хворобою серця для швидкого зняття приступу стенокардії лікар призначив лікарський препарат, який необхідно вживати під язик. Вкажіть цей препарат.
- A. Нітрогліцерин *
 - B. Корглікон
 - C. Ізосорбїду мононітрат
 - D. Лізіноприл
 - E. Аміодарон
134. При проведенні проби на чутливість до бензилпеніциліну у пацієнта розвинувся анафілактичний шок. Яким препаратом слід обколоти місце введення антибіотика?
- A. Адреналіну гідрохлорид *
 - B. Норадреналіну гідротартрат
 - C. Атропіну сульфат
 - D. Пропранонол

Е. Цефтріаксон

135. Назовите препарат из группы тетрациклинов, который назначили больному для лечения бронхита
- А. Доксициклина гидрохлорид *
 - В. Бензилпенициллина натриевая соль
 - С. Ацикловир
 - Д. Изониазид
 - Е. Хингамин
136. Для лечения атеросклероза больной приобрел в аптеке гиполипидемический препарат фенофибрат. К какой фармакологической группе относится этот препарат?
- А. Фибраты *
 - В. Нитрофураны
 - С. Блокаторы кальциевых каналов
 - Д. (-адреноблокаторы
 - Е. М-холиноблокаторы
137. Напомните своему коллеге провизору как называется явление, когда один препарат ослабляет действие другого?
- А. Антагонизм *
 - В. Привыкание
 - С. Сенсбилизация
 - Д. Потенцирование
 - Е. Тахифилаксия
138. Объясните своему коллеге провизору, какие показания к применению налоксона?
- А. Острое отравление наркотическими анальгетиками *
 - В. Отравление тяжелыми металлами
 - С. Отравление сердечными гликозидами
 - Д. Отравление алкалоидами спорыньи
 - Е. Отравление атропина сульфатом
139. Больному для лечения бронхиальной астмы, врач назначил препарат из группы (-адреномиметиков. Укажите этот препарат?
- А. Сальбутамол *
 - В. Диазепам
 - С. Доксициклина гидрохлорид
 - Д. Нитроглицерин
 - Е. Дигоксин
140. Какой из перечисленных ниже препаратов при сублингвальном применении быстро купирует приступ стенокардии?
- А. Нитроглицерин *
 - В. Дигоксин

- С. Амиодарон
- Д. Лизиноприл
- Е. Коргликон

141. Благодаря какому фармакологическому эффекту диазепам применяется для лечения неврозов?
- А. Анксиолитическому *
 - В. Анальгетическому
 - С. Диуретическому
 - Д. Жаропонижающему
 - Е. Антидепрессивному
142. Вы - провизор, проходящий интернатуру. При сдаче тестового экзамена выберите из предложенных фармакологических эффектов тот, который позволяет применять аминазин для лечения психозов?
- А. Антипсихотический *
 - В. Гипотермический
 - С. Противоспалительный
 - Д. Противорвотный
 - Е. Спазмолитический
143. Ответьте на вопрос своего коллеги провизора, какой механизм действия НПВС целекоксиба?
- А. Селективное ингибирование ЦОГ-2 *
 - В. Блокада АПФ
 - С. Стимуляция М-холинорецепторов
 - Д. Блокада H2-гистаминовых рецепторов
 - Е. Стимуляция (2-адренорецепторов)
144. Ответьте на вопрос молодого врача: как называется способность лекарств накапливаться в организме больного?
- А. Кумуляция *
 - В. Антагонизм
 - С. Синергизм
 - Д. Привыкание
 - Е. Аллергия
145. Вы провизор ЦРА. Выберите из поступивших в вашу аптеку препаратов тот, который относится к жирорастворимым витаминным препаратам
- А. Ретинола ацетат *
 - В. Окситоцин
 - С. Ацикловир
 - Д. Гепарин
 - Е. Димедрол

146. Помогите молодому врачу выбрать из имеющихся у вас в аптеке химиотерапевтических средств препарат для лечения больного, страдающего герпесом
- A. Ацикловир *
 - B. Рифампицин
 - C. Доксициклина гидрохлорид
 - D. Хингамин
 - E. Метронидазол
147. Какой фармакологический эффект ацетилсалициловой кислоты позволяет применять ее у больных с ИБС для профилактики тромбозов?
- A. Антиагрегантный *
 - B. Анальгезирующий
 - C. Жаропонижающий
 - D. Ульцерогенный
 - E. Противовоспалительный
148. Больному с глаукомой врач назначил прозерин в виде глазных капель. К какой фармакологической группе относится этот препарат?
- A. Антихолинэстеразный обратимого действия *
 - B. М-холиноблокатор
 - C. Н-холиномиметик
 - D. (-)адреноблокатор
 - E. (-)адреномиметик
149. Какой препарат из группы местноанестезирующих средств применяется у больных с нарушением сердечного ритма?
- A. Лидокаин *
 - B. Парацетамол
 - C. Морфина гидрохлорид
 - D. Кофеина-бензоат натрия
 - E. Нитразепам
150. Хворому з нирковою колькою в комплексну терапію долучено спазмолітик з групи М-холіноблокаторів.
- A. Атропін *
 - B. Прозерін
 - C. Галантамін
 - D. Дитилін
 - E. Бензогексоній
151. В лікуванні екстрасистолії використан неселективний ?-адреноблокатор.
- A. Анаприлін *
 - B. Атенолол
 - C. Фентоламін
 - D. Празозін
 - E. Резерпін

152. Хворому у стані психозу призначено антипсихотік.
- A. Аміназин *
 - B. Діазепам
 - C. Циклодол
 - D. Кофеїн
 - E. Фенобарбітал
153. Страх, емоційна напруга у хворого неврозом дозволили лікарю підібрати препарат, знижуючий ці симптоми.
- A. Діазепам *
 - B. Карбонат літія
 - C. Сіднокарб
 - D. Ноотропіл
 - E. Кофеїн
154. Хворому на бронхіальну астму було призначено сальбутамол після якого зникли симптоми бронхоспазму. Це пов'язано зі стимуляцією:
- A. β -2-адренорецепторів *
 - B. α -1-адренорецепторів
 - C. М-холінорецепторів
 - D. Синтезу ацетилхоліну
 - E. β -1-адренорецепторів
155. Після довготривалого прийому ізосорбїду для профілактики приступів стенокардії хворий відмітив значне зниження ефекту останнього. Яке явище мало місце?
- A. Толерантність *
 - B. Кумуляція
 - C. Фізична залежність
 - D. Алергія
 - E. Потенціювання
156. Під час слабкості пологової діяльності призначають:
- A. Окситоцин *
 - B. Но-шпу
 - C. Прогестерон
 - D. Вікасол
 - E. Фенотерол
157. Хворому для профілактики тромбоутворення з ІХС був призначений препарат з групи нестероїдних протизапальних засобів.
- A. Кислота ацетилсаліцилова *
 - B. Ібупрофен
 - C. Піроксикам
 - D. Кислота мефенамова
 - E. Індометацин

158. Хворому на інфаркт міокарду вводили внутрішньовенно антикоагулянт прямої дії.
- A. Гепарин *
 - B. Неодикумарин
 - C. Вікасол
 - D. Тромбін
 - E. Кальцію глюконат
159. Вкажіть антибіотик для лікування сифілісу.
- A. Бензилпеніцилін *
 - B. Стрептоміцин
 - C. Канаміцин
 - D. Амфотерицин
 - E. Ністатин
160. Діагностовано трихомоніаз. Який антимікробний препарат необхідно призначити?
- A. Метронідазол *
 - B. Ампіцилін
 - C. Хлорохін
 - D. Ністатин
 - E. Гентаміцин
161. У пацієнта з'явилися герпетичні висипання. Який засіб необхідно призначити?
- A. Ацикловір *
 - B. Гентаміцин
 - C. Клотримазол
 - D. Бензилпеніцилін
 - E. Бісептол
162. Для індивідуальної профілактики малярії було призначено препарат.
- A. Хінгамін *
 - B. Рифампіцин
 - C. Ампіцилін
 - D. Гентаміцин
 - E. Бісептол (Ко-тримаказол)
163. Відпускаючи з аптеки глауцину гідрохлорид хворому на хронічний бронхіт про який типовий побічний ефект слід його застережити ?
- A. Зниження артеріального тиску *
 - B. Збудження центральної нервової системи
 - C. Порушення серцевого ритму
 - D. Підвищення внутрішньочного тиску
 - E. Алергічні висипи на шкірі
164. Хворій для лікування алергічного дерматиту після укусів бджіл призначено лоратадин. Який механізм протиалергічної дії препарату?

- A. Пригнічення H1-гістамінових рецепторів *
 - B. Пригнічення H2-гістамінових рецепторів
 - C. Блокада D4-лейкотрієнових рецепторів
 - D. Зменшення вивільнення лейкотрієну
 - E. Антисеротонінова активність
165. Лікар при підозрі на холеру призначив пацієнту доксицикліну гідрохлорид. До якої групи антибіотиків відноситься даний препарат?
- A. Тетрацикліни *
 - B. Пеніциліни
 - C. Цефалоспорини
 - D. Циклічні поліпептиди
 - E. Макроліди та азаліди
166. Який із холінотропних лікарських засобів застосовують при глаукомі для зниження внутрішньоочного тиску?
- A. Пілокарпін *
 - B. Атропін
 - C. Платифілін
 - D. Скополамін
 - E. Метацин
167. Хворому 30 років із розладом сну і неурівноваженістю психоемоційної сфери лікар призначив діазепам. Чим обумовлений психоседативний ефект препарату?
- A. Активацією ГАМК-ергічної системи *
 - B. Гальмуванням лімбічної системи
 - C. Гальмуванням ретикулярної формації
 - D. Зменшенням кількості норадреналіну в ЦНС
 - E. Гальмуванням опіоїдних рецепторів
168. Чому бензилпеніциліну натрієву сіль не застосовують всередину?
- A. Руйнується HCl шлунку *
 - B. Погано всмоктується в кишечнику
 - C. Подразнює слизову оболонку шлунка
 - D. Зменшує утворення HCl шлунку
 - E. Руйнується пеніциліназою
169. Порадьте лікарю при кровотечі, обумовленій тривалим застосуванням неодикумарину, препарат антагоніст.
- A. Вікасол; *
 - B. Кислота амінокапронова;
 - C. Етамзилат;
 - D. Фібриноген;
 - E. Кислота аскорбінова.

170. Який препарат при передозуванні наркотичним анальгетиком слід застосовувати в якості антидоту для зняття пригнічення дихального центру?
- A. Налоксон; *
 - B. Кордіамін;
 - C. Етимізол;
 - D. Камфора;
 - E. Нашатирний спирт.
171. У жінки затяжний період пологової діяльності. Із переліку препаратів виберіть той, який завдяки фізіологічній дії стимулюватиме пологову діяльність.
- A. Окситоцин; *
 - B. Прозерин;
 - C. Пахикарпін;
 - D. Прогестерон;
 - E. Естрон.
172. Хворій 48-ми років для зняття важкого нападу бронхіальної астми внутрішньовенно ввели розчин преднізолону. До якої групи гормонпрепаратів належить преднізолон?
- A. Глюкокортикоїди; *
 - B. Гестагенні препарати;
 - C. Естрогенні препарати;
 - D. Мінералокортикоїди;
 - E. Анаболічні стероїди.
173. Ви працюєте в аптеці, яка розташована на території шкірно-венерологічного диспансеру. Проконсультуйте лікаря-інтерна: який антибіотик є препаратом вибору для лікування сифілісу?
- A. Бензилпеніциліну натрієва сіль; *
 - B. Лінкоміцину гідрохлорид;
 - C. Леворину натрієва сіль;
 - D. Стрептоміцину сульфат;
 - E. Поліміксину М сульфат.
174. Ви працюєте на фармацевтичній фірмі у відділі реалізації ліків. Поясніть провізору-інтерну: до якої фармакологічної групи належить фенотірат.
- A. Гіполіпідемічні засоби; *
 - B. Інгібітори фібринолізу;
 - C. Снодійні засоби;
 - D. Антигіпертензивні засоби;
 - E. Антикоагулянти непрямої дії.
175. Ви провізор-інформатор працюєте в аптеці. Порадьте хворому з загостренням ревматоїдного артриту знеболювальний протизапальний препарат, що найменше шкодить шлунку.
- A. Целекоксиб; *
 - B. Диклофенак-натрій;

- С. Кислота ацетилсалцилова;
- Д. Ібупрофен;
- Е. Индометацин.

176. Ви - провізор аптеки. Для оформлення вітрини сечогінних препаратів виберіть "петльовий" діуретик екстренної, сильної і короткотривалої дії:

- А. Фуросемід; *
- В. Клопамід;
- С. Діакарб;
- Д. Спіронолактон;
- Е. Тріамтерен.